

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием Новосибирской области**
по специальности «Лечебное дело»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа
квалификационного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо Установите порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	17
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	24

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 50%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	32
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	46
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	54

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 20%, задание на установление правильного порядка - 20%, типовые задачи -10%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	62
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	69
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	81
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	89

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Лечебное дело»
Вторая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный ответ

Медицинская деонтология

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента
- ☒ учение о профессиональном долге

2. Выберите правильный ответ

Субъективно-психологическая сторона любого заболевания на основе переживаний, ощущений, представлений больного

- ☐ фрустрация
- ☐ апатия
- ☒ внутренняя картина болезни
- ☐ депрессия

3. Выберите правильный ответ

Преувеличение больным имеющихся симптомов, субъективных жалоб

- ☐ симуляция
- ☒ аггравация
- ☐ диссимуляция
- ☐ ипохондрия

4. Выберите правильный ответ

Тип реакции на болезнь, характеризующийся поиском информации, тревожностью, беспокойством, угнетенным настроением

- ☐ невротический
- ☐ ипохондрический
- ☐ сенситивный
- ☒ тревожный

5. Выберите правильный ответ

Угнетенно-подавленное настроение, с пессимистическими взглядами в будущее

- ☐ ипохондрия
- ☐ апатия
- ☒ депрессия
- ☐ стресс

6. Выберите правильный ответ

Тип реакции на болезнь, характеризующийся концентрацией внимания на различных субъективных ощущениях, желанием рассказать о них окружающим

- ☐ невротический
- ☒ ипохондрический
- ☐ меланхолический
- ☐ тревожный

7. Выберите правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

8. Выберите правильный ответ

Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из окружающей среды

- ☐ невроз
- ☐ лихорадка
- ☐ фобии
- ☒ стресс

9. Выберите правильный ответ

Эвтаназия в России

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

10. Выберите правильный ответ

Патологический страх перед существующим или несуществующим устрашающим объектом

- ☐ паранойя
- ☐ депрессия
- ☒ фобии
- ☐ апатия

11. Выберите правильный ответ

Формы проявления страха и тревоги у пациента зависят

- ☐ от диагноза заболевания
- ☐ от тяжести и течения болезни
- ☒ от особенностей личности, возраста, половой принадлежности
- ☐ от половой принадлежности

12. Выберите правильный ответ

Ятрогенные заболевания

- ☐ обусловленные вредными факторами производства
- ☒ вызванные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболевания с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболевания наследственного генеза

13. Выберите два правильных ответа

Термин «деловая субординация» – это

- ☒ распоряжения старшего по должности, являются обязательными для подчиненных

- ☐ демократизм в отношениях коллег
- ☒ уважение к старшим по должности
- ☐ панибратство

14. Выберите два правильных ответа

Профессиональная тайна – это

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

15. Выберите три правильных ответа

Основные задачи медицинской этики

- ☒ добросовестный труд
- ☒ внимательное и заботливое отношение к пациенту
- ☒ готовность всегда и при всех условиях оказать помощь пациенту
- ☐ социально-психологическая помощь
- ☐ чувство коллегиальности
- ☐ соблюдение дисциплины

16. Выберите правильный ответ

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- ☐ 0–45 см
- ☒ 45–120 см
- ☐ 120–400 см
- ☐ 400–500 см

17. Выберите три правильных ответа

Агрессивность пациента может вызываться

- ☒ психическими заболеваниями
- ☒ болью и стрессом
- ☐ изменением климатических условий
- ☒ страхом
- ☐ внимательным и заботливым отношением
- ☐ сменой рациона питания

18. Выберите правильный ответ

Психосоматические заболевания

- ☐ соматические заболевания или нарушения, причиной которых являются физические факторы
- ☐ психические заболевания, причиной которых являются физические факторы
- ☒ соматические заболевания, причиной которых являются психотравмирующие переживания острого или затяжного характера
- ☐ соматические заболевания, причиной которых являются психофизические факторы

19. Выберите правильный ответ

Уровень общения медицинского персонала с пациентом

- ☐ доверительный
- ☐ социальный
- ☐ внушительно-убеждающий
- ☒ межличностный

20. Выберите правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс
- ☐ медицинский этикет
- ☐ медицинская деонтология
- ☒ медицинская этика

21. Выберите правильный ответ

Эффективному общению с пациентами и их обучению способствует

- ☒ положительная обратная связь
- ☐ суждение о нем
- ☐ замечания
- ☐ выполнение их требований

22. Выберите правильный ответ

Отсутствие волевой активности, или каких-либо побуждений к действию

- ☒ абulia
- ☐ астения
- ☐ ипохондрия
- ☐ депрессия

23. Выберите правильный ответ

Взаимоотношения в коллективе не основываются

- ☐ на взаимном уважении
- ☒ на подчинении старшему по возрасту независимо от должности
- ☐ на четком выполнении своих профессиональных обязанностей
- ☐ на субординации

24. Выберите правильный ответ

Дезинфекция – метод уничтожения форм микроорганизмов

- ☐ патогенных
- ☒ условно-патогенных и патогенных
- ☐ всех форм жизнедеятельности
- ☐ не патогенных

25. Выберите правильный ответ

Стерилизация – процесс уничтожения на изделиях медицинского назначения

- ☐ патогенных микроорганизмов
- ☒ всех форм жизнедеятельности микроорганизмов
- ☐ патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
- ☐ не патогенных

26. Выберите правильный ответ

После использования фонендоскоп протирается раствором

- ☐ перекиси водорода 3-х процентного
- ☐ лизафина 2-х процентного
- ☐ хлорамина 3-х процентного
- ☒ этилового спирта 70 процентного

27. Выберите правильный ответ

Гигиеническая обработка рук предусматривает

- ☐ мытье рук двукратным намыливанием
- ☒ обработку рук кожным антисептиком
- ☐ мытье рук однократным намыливанием

☐ мытье рук двукратным намыливанием с последующей двукратной обработкой кожным антисептиком

28. Выберите два правильных ответа

Для защиты медицинского персонала от воздушно-капельных инфекций используют

- ☐ ватно-марлевые повязки
- ☒ одноразовые маски
- ☐ защитные экраны
- ☒ респираторы
- ☐ защитные очки

29. Выберите два правильных ответа

При выполнении инвазивных процедур используются перчатки

- ☒ нестерильные смотровые
- ☒ хирургические стерильные
- ☐ промышленные
- ☐ хозяйственные
- ☐ использование перчаток не обязательно

30. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обширными травмами используются перчатки

- ☐ промышленные
- ☐ хозяйственные
- ☐ смотровые нестерильные
- ☒ хирургические стерильные

31. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обильным наружным кровотечением используют

- ☐ одну пару перчаток
- ☒ две пары перчаток
- ☐ использование перчаток не обязательно

32. Выберите правильный ответ

Число этапов обработки клинка ларингоскопа

- ☐ один
- ☐ два
- ☒ три
- ☐ четыре

33. Выберите правильный ответ

Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких обрабатываются

- ☐ после окончания смены
- ☒ после каждого пациента
- ☐ не обрабатываются
- ☐ раз в 3 дня

34. Выберите правильный ответ

Для обработки места инъекций и пункций используется

- ☐ 96 процентный этиловый спирт
- ☐ метиловый спирт
- ☐ 70 процентный раствор этилового спирта
- ☒ спиртосодержащие кожные антисептики

35. Выберите правильный ответ

К индивидуальным средствам защиты от внутрибольничных инфекций не относятся

- ☐ халаты, фартуки, хлопчатобумажные костюмы
- ☐ медицинские шапочки
- ☒ индивидуальные шприцы
- ☐ лицевые маски, респираторы

36. Выберите правильный ответ

Частота смены респиратора при эпидемиологическом неблагополучии по гриппу каждые

- ☐ шесть часов
- ☒ два часа
- ☐ три часа
- ☐ восемь часов

37. Выберите правильный ответ

Уровень дезинфекции рук медицинского персонала перед и после осмотра пациента

- ☐ профилактический
- ☒ гигиенический
- ☐ хирургический
- ☐ социальный

38. Выберите два правильных ответа

На гигиеническом уровне обработку рук проводят

- ☐ при бытовом загрязнении
- ☒ перед инвазивными процедурами
- ☒ до и после снятия перчаток
- ☐ перед приемом пищи
- ☐ при любом загрязнении рук

39. Выберите правильный ответ

После проведения инвазивных манипуляций шприцы с иглами, шарики, салфетки

- ☐ оставляют на месте оказания медицинской помощи
- ☐ собирают в полиэтиленовый пакет
- ☒ собирают в контейнер
- ☐ в лоток

40. Выберите два правильных ответа

К отходам класса Б относят

- ☐ ватные шарики от больного лихорадкой Денге
- ☒ салфетки, загрязненные выделениями пациента, в т.ч. кровью
- ☐ отходы, не контактирующие с биологическими жидкостями пациента
- ☒ пищевые отходы из инфекционного отделения
- ☐ мусор из административных помещений

41. Выберите правильный ответ

Правила снятия перчаток с рук после манипуляции

- ☒ перчатки снимают и дезинфицируют в дезрастворе
- ☐ перчатки моют под краном и снимают
- ☐ перчатки обрабатывают салфеткой, не снимая, затем моют под краном и снимают
- ☐ перчатки обрабатывают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, не снимая, моют проточной водой, снимают и дезинфицируют в дезрастворе

42. Выберите правильный ответ

Обработка одноразовых изделий медицинского назначения

- ☒ дезинфекция и утилизация
- ☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка
- ☐ предстерилизационная очистка, стерилизация
- ☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка, утилизация

43. Выберите правильный ответ

Туберкулез – это заболевание

- ☐ наследственное
- ☒ социальное
- ☐ зоонозное
- ☐ соматическое

44. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза

- ☐ вирус
- ☐ бактерия
- ☒ микобактерия
- ☐ кокк

45. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев

46. Выберите три правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный
- ☒ африканский
- ☐ свиной

47. Выберите два правильных ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное

48. Выберите правильный ответ

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

49. Выберите правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

50. Выберите правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

51. Выберите правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ в общественном транспорте
- ☐ случайный

52. Выберите два правильных ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска

53. Выберите два правильных ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

54. Выберите правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

55. Выберите правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

56. Выберите правильный ответ

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 дня

57. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза

- ☒ вакцинация и ревакцинация против туберкулеза
- ☐ химиопрофилактика контактными лицам
- ☐ проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

58. Выберите правильный ответ

Массовая туберкулинодиагностика проводится

- ☐ с 1 месяца
- ☐ с 3 месяцев
- ☐ с 6 месяцев
- ☒ с 12 месяцев

59. Выберите три правильных ответа

Цель постановки пробы Манту

- ☐ лечение туберкулеза
- ☒ диагностика туберкулеза
- ☐ профилактика туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных
- ☒ отбор на ревакцинацию

60. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д

61. Выберите правильный ответ

Пробу Манту проводят 1 раз в год

- ☐ до 14 лет
- ☐ до 15 лет
- ☒ до 18 лет
- ☐ до 30 лет

62. Выберите правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ бактерия
- ☐ микобактерия
- ☒ вирус
- ☐ кокк

63. Выберите правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

- ☐ вспышка
- ☐ эпидемия
- ☒ пандемия
- ☐ групповые заболевания

64. Выберите правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56°C в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ нагревание при 56°C в течение 1 минуты
- ☐ воздействие радиации

65. Выберите правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- ☐ больной человек
- ☐ больное животное
- ☐ вирусоноситель

- ☒ человек с момента заражения

66. Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- ☐ слюна
- ☐ слезная жидкость
- ☒ кровь
- ☐ спинномозговая жидкость

67. Выберите правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

- ☒ искусственный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ трансмиссивный

68. Выберите правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

69. Выберите три правильных ответа

ВИЧ не передается

- ☒ через рукопожатия
- ☒ через укусы насекомых
- ☐ при половых контактах
- ☐ во время беременности
- ☒ при разговоре

70. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

- ☒ кровь
- ☐ секрет потовых желез
- ☐ моча
- ☒ сперма
- ☒ грудное молоко
- ☐ слюна

71. Выберите правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

72. Выберите правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

73. Выберите правильный ответ

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- ☐ Уголовный кодекс
- ☐ Конституция РФ
- ☐ Трудовой кодекс

☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

74. Выберите правильный ответ

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- ☐ близкий родственник
- ☐ дежурный (лечащий) врач или родственник
- ☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач
- ☐ законный представитель

75. Выберите правильный ответ

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- ☐ паспорт
- ☒ страховой медицинский полис
- ☐ медицинская карта амбулаторного пациента
- ☐ история болезни

76. Выберите правильный ответ

Обязательное медицинское страхование в РФ

- ☐ имущественное
- ☐ личное
- ☒ всеобщее
- ☐ групповое

77. Выберите правильный ответ

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- ☒ обязательно
- ☐ желательно
- ☐ необязательно
- ☐ по согласованию

78. Выберите два правильных ответа

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное
- ☐ коллективное

79. Выберите правильный ответ

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
- ☒ 15-ти летнего возраста
- ☐ 16-ти летнего возраста
- ☐ 17-ти летнего возраста

80. Выберите правильный ответ

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программой медицинского страхования

- ☐ обязательного
- ☒ добровольного
- ☐ любого
- ☐ всеобщего

81. Выберите два правильных ответа

Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается

- ☐ при плановом проведении медицинского вмешательства
- ☒ в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- ☒ если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
- ☐ для устранения угрозы жизни человека
- ☐ не допускаются

82. Выберите правильный ответ

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения в настоящее время

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом от населения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

83. Выберите правильный ответ

Шина при переломе костей голени накладывается от кончиков пальцев до

- ☐ коленного сустава
- ☐ до нижней трети бедра
- ☐ до тазобедренного сустава
- ☒ до верхней трети бедра

84. Выберите правильный ответ

Открытый метод лечения ожогов показан при ожогах

- ☒ лица
- ☐ кистей
- ☐ стоп
- ☐ живота

85. Выберите правильный ответ

Термоизолирующая повязка применяется при

- ☐ ожогах
- ☒ отморожении
- ☐ общем замерзании
- ☐ озноблении

86. Выберите правильный ответ

Признак ушиба мягких тканей

- ☐ деформация
- ☒ боль, кровоподтёк
- ☐ крепитация
- ☐ гиперемия

87. Выберите правильный ответ

Дренирование раны обеспечивает

- ☒ отток содержимого
- ☐ заживление первичным натяжением
- ☐ образование грануляций
- ☐ ускорение регенерации

88. Выберите правильный ответ

Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей применяют

- ☐ сразу после травмы
- ☐ в ближайшие часы
- ☒ на 2–3 суток
- ☐ через неделю

89. Выберите правильный ответ

Конечность иммобилизуется в том положении в котором оказалась после

- ☐ ушиба
- ☐ перелома
- ☐ растяжения
- ☒ вывиха

90. Выберите правильный ответ

Иммобилизации шейного отдела позвоночника проводится

- ☐ ватно-марлевым кругом
- ☒ воротником Шанца
- ☐ крестообразной повязкой
- ☐ кольцами Дельбе

91. Выберите правильный ответ

Окклюзионная повязка применяется при ранении

- ☐ живота
- ☐ головы
- ☐ шеи
- ☒ грудной клетки

92. Выберите правильный ответ

Транспортная иммобилизация обеспечивает

- ☐ профилактику кровотечения
- ☐ ускорение регенерации тканей
- ☐ психо-эмоциональный покой пациента
- ☒ профилактику травматического шока

93. Выберите правильный ответ

Доскообразный живот является признаком

- ☒ перфоративной язвы желудка
- ☐ острого аппендицита
- ☐ острого холецистита
- ☐ острого панкреатита

94. Выберите два правильных ответа

Пациента с переломом позвоночника транспортируют на твердых носилках

- ☒ лёжа на спине
- ☒ с валиками под физиологическими изгибами
- ☐ на правом боку
- ☐ на левом бок

95. Выберите два правильных ответа

Мероприятия доврачебной помощи при вывихе плеча

- ☒ транспортная иммобилизация
- ☐ вправление вывиха
- ☒ введение анальгетиков
- ☐ окклюзионная повязка

96. Выберите два правильных ответа

Способ транспортировки при переломе костей таза (лёжа)

- ☐ на животе на мягких носилках
- ☒ на твёрдых носилках
- ☒ в положении «лягушки»

- ☐ на боку

97. Выберите два правильных ответа

Укушенным животными пациентам проводится профилактика

- ☒ столбняка
- ☐ газовой гангрены
- ☒ бешенства
- ☐ актиномикоза

98. Выберите два правильных ответа

Транспортная иммобилизация проводится шинами

- ☒ Крамера
- ☒ пневматическими
- ☐ Белера
- ☐ Кузьминского

99. Выберите два правильных ответа

Мероприятия профилактики ожогового шока на догоспитальном этапе

- ☒ введение анальгетика
- ☐ асептической повязки
- ☐ антибиотикотерапия
- ☒ инфузионная терапия

100. Выберите правильный ответ

Синдром рикошета наблюдается при применении

- ☐ В-2 агонистов 3-4 раза в день
- ☐ М -холиноблокаторов
- ☒ В- 2-агонистов чаще 6 раз в день
- ☐ глюкокортикостероидов

101. Выберите правильный ответ

Механизм действия глюкокортикостероидов при купировании приступов бронхиальной астмы

- ☐ противокашлевой
- ☒ противовоспалительный
- ☐ противоаллергический
- ☐ противошоковый

102. Выберите правильный ответ

Побочное действие эуфиллина

- ☐ повышение АД
- ☐ брадикардия
- ☐ сонливость
- ☒ тахикардия

103. Выберите правильный ответ

Длительность действия В-2 агонистов короткого действия

- ☐ 2-4 часа
- ☒ 4-6 часов
- ☐ 6-8 часов
- ☐ 8-10 часов

104. Выберите правильный ответ

Тахикардия - это побочное явление

- ☐ атровента
- ☒ сальбутамола
- ☐ беродуала
- ☐ спирива

105. Выберите правильный ответ

Побочное явление ингаляционных ГКС

- ☐ повышение АД
- ☒ кандидоз полости рта
- ☐ синдром «Кушингоида»
- ☐ повышение массы тела

106. Выберите правильный ответ

Механизм действия беротека

- ☐ блокада М холинорецепторов
- ☒ стимуляция В-2 адренорецепторов
- ☐ стимуляция М холинорецепторов
- ☐ блокада гистаминорецепторов

107. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при инфаркте миокарда

- ☐ валидол, лазикс
- ☐ корвалол, пентамин
- ☒ морфин, актилизе
- ☐ но-шпа, атропин

108. Выберите правильный ответ

Отек легких - это форма острой недостаточности

- ☐ коронарной
- ☒ левожелудочковой
- ☐ правожелудочковой
- ☐ сосудистой

109. Выберите правильный ответ

Самое грозное осложнение фибрилляции предсердий

- ☐ приступ стенокардии
- ☐ гипертонический криз
- ☒ тромбоэмболии
- ☐ коллапс

110. Выберите правильный ответ

Аускультативно при гипертоническом кризе

- ☐ ослабление первого тона на верхушке
- ☐ ослабление второго тона на верхушке
- ☒ акцент второго тона на аорте
- ☐ акцент второго тона на легочной артерии

111. Выберите правильный ответ

Удушье и обильная пенная розовая мокрота на фоне гипертонического криза - это

- ☐ долевая пневмония
- ☐ легочное кровотечение
- ☒ отек легких
- ☐ тромбоэмболия легочной артерии

112. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы кардиогенного шока

- ☐ лихорадка, тахикардия
- ☐ кашель, одышка
- ☒ снижение АД, частый нитевидный пульс
- ☐ напряженный пульс

113. Выберите правильный ответ

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец

- ☐ Р
- ☒ Q
- ☐ R
- ☐ S

114. Выберите правильный ответ

Основным симптомом полной А-V блокады является

- ☐ коллапс
- ☐ одышка
- ☒ обморок
- ☐ лихорадка

115. Выберите два правильных ответа

Неотложная догоспитальная помощь при острой потере зрения в результате гипертонического криза

- ☒ 1 таблетка нитроглицерина под язык
- ☒ 2 мл - 2% р-ра папаверина гидрохлорида
- ☐ коррекция зрения очками
- ☐ тонометрия
- ☐ все выше перечисленные варианты

116. Выберите правильный ответ

Расширять зрачок нельзя при

- ☐ офтальмоскопии
- ☐ иридоциклите
- ☐ блефарите
- ☒ глаукоме

117. Выберите правильный ответ

Противопоказано при проникающем ранении глаза

- ☒ заложить за веки мазь
- ☐ промыть конъюнктивальную полость водой
- ☐ закапать 20% раствор сульфацила натрия
- ☐ провести тонометрию

118. Выберите правильный ответ

Инородное тело из носа удаляют

- ☒ крючком
- ☐ пинцетом
- ☐ корцангом
- ☐ проволочной петлей

119. Выберите правильный ответ

Беспокойное поведение ребенка при надавливании на козлосок - симптом

- ☒ отита
- ☐ стоматита
- ☐ ангины
- ☐ нарушение прорезывания зубов

120. Выберите правильный ответ

Грязно-серый, трудно снимаемый налет на миндалинах, характерен для

- ☒ дифтерии
- ☐ аденоидов
- ☐ фолликулярной ангины
- ☐ лакунарной ангины

121. Выберите правильный ответ

Симптом «хлопка» характерен для

- ☒ инородного тела трахеи
- ☐ дифтерии гортани
- ☐ травмы гортани
- ☐ острого ларингита

122. Выберите правильный ответ

Признаки лакунарной ангины

- ☒ белый, легко снимающийся налет на миндалинах

- ☐ грязно-серые пленки на миндалинах, дужках, мягком небе трудно снимаются
- ☐ налетов нет
- ☐ темно-серый налет, легко снимается

123. Выберите два правильных ответа

Осложнения фурункула носа

- ☒ внутричерепные
- ☒ сепсис
- ☐ повышение АД
- ☐ носовое кровотечение
- ☐ серозные выделения из носа

124. Выберите правильный ответ

Транспортировка пациента при инородном теле в трахее

- ☒ в полусидячем положении
- ☐ лежа на боку
- ☐ лежа на спине
- ☐ лежа на животе

125. Выберите два правильных ответа

Неотложная помощь пациенту с носовым кровотечением

- ☒ голову пациента слегка наклонить вперед
- ☒ ввести в нижнюю треть полости носа гемостатическую губку
- ☐ голову пациента запрокинуть назад
- ☐ грелку на переносицу
- ☐ сосудосуживающие капли в нос

126. Выберите правильный ответ

Симптом натяжения при пояснично-крестцовом радикулите

- ☐ ригидность затылочных мышц
- ☒ симптом Ласега
- ☐ симптом Горнера
- ☐ симптом Брудзинского

127. Выберите правильный ответ

Артериальное давление при геморрагическом инсульте обычно

- ☒ повышено
- ☐ в норме
- ☐ понижено
- ☐ не меняется

128. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

129. Выберите правильный ответ

Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке (недель)

- ☐ 10-12
- ☐ 2-3
- ☒ 5-6
- ☐ 8-9

130. Выберите правильный ответ

Шейка матки при шейечной беременности имеет форму

- ☒ бочкообразную

- ☐ цилиндрическую
- ☐ округлую
- ☐ коническую

131. Выберите правильный ответ

Трубный аборт возникает при имплантации плодного яйца в части маточной трубы

- ☐ истмической
- ☐ интерстициальной
- ☒ ампулярной
- ☐ интрамуральной

132. Выберите правильный ответ

Меноррагия - это менструации

- ☐ скудные короткие
- ☒ длительные обильные
- ☐ болезненные
- ☐ редкие

133. Выберите два правильных ответа

Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения чаще встречаются

- ☐ после родов
- ☒ в перименопаузальном периоде
- ☐ после аборта
- ☐ в репродуктивном возрасте
- ☒ в периоде полового созревания

134. Выберите правильный ответ

Основной клинический симптом подслизистой миомы матки

- ☐ боль внизу живота
- ☐ железодефицитная анемия
- ☒ меноррагия (гиперменструальный синдром)
- ☐ вторичное бесплодие

135. Выберите два правильных ответа

Апоплексия яичника - это

- ☐ воспаление яичников
- ☒ разрыв яичника
- ☒ кровоизлияние в яичник
- ☐ нарушение кровоснабжения яичника
- ☐ спаечный процесс

136. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод исследования при внематочной беременности

- ☒ пункция заднего свода влагалища
- ☐ осмотр наружных половых органов
- ☐ двуручное влагалищное исследование
- ☐ ректоабдоминальное исследование

137. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод остановки маточного кровотечения

- ☒ лечебно-диагностическое выскабливание
- ☐ осмотр наружных половых органов
- ☐ двуручное влагалищное исследование
- ☐ ректоабдоминальное исследование

138. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую руку накладывается электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☒ желтого цвета

- ☐ черного цвета
- ☐ красного цвета

139. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую руку накладыва-
ется электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☐ черного цвета
- ☒ красного цвета

140. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую ногу накладывает-
ся электрод

- ☒ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☐ черного цвета
- ☐ красного цвета

141. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую ногу накладыва-
ется электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☒ черного цвета
- ☐ красного цвета

142. Выберите правильный ответ

При записи грудной V1 электрод располага-
ется

- ☒ у правого края грудины в IV межреберье
- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ между электродами V2 и V4
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

143. Выберите правильный ответ

При записи грудной V2 электрод располага-
ется

- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
- ☒ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ по правой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

144. Выберите правильный ответ

При записи грудной V3 электрод располага-
ется

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☒ между электродами V2 и V4
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по левой передней подмышечной линии на уровне электрода V4

145. Выберите правильный ответ

При записи грудной V4 электрод располага-
ется

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
- ☒ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по передней подмышечной линии в VI межреберье

146. Выберите правильный ответ

При записи грудной V5 электрод располага-
ется

- ☐ срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☒ передней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☐ средней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☐ задней подмышечной линии на уровне электрода V4

147. Выберите правильный ответ

При записи грудной V6 электрод располага-
ется

- ☐ срединно-ключичной линии в V межребе-
рье
- ☐ передней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☒ средней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☐ задней подмышечной линии на уровне электрода V4

148. Выберите правильный ответ

Стандартными отведениями на ЭКГ называ-
ются

- ☒ I, II, III
- ☐ aVR, aVL, aVF
- ☐ V1, V2, V3
- ☐ V7-V9

149. Выберите правильный ответ

Первоочередным мероприятием у постра-
давшего без сознания после падения с высо-
ты или ныряния в воду является

- ☐ выполнение тройного приема Сафара
- ☐ интубация трахеи
- ☒ фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника
- ☐ внутривенное введение глюкокортикоид-
ных препаратов

150. Выберите правильный ответ

Шкала Глазго используется для оценки

- ☒ уровня угнетения сознания
- ☐ степени тяжести шока
- ☐ выраженности дыхательных расстройств при коме
- ☐ состояния новорожденного

151. Выберите правильный ответ

Диаметр зрачка в норме при обычном осве-
щении примерно равен

- ☐ 0,5 мм
- ☐ 1-1,5 мм
- ☐ 2-2,5 мм
- ☒ 3-4 мм

152. Выберите правильный ответ

Глубина продавливания грудины при прове-
дении закрытого массажа сердца взрослому
человеку

- ☐ 1-2 см
- ☒ 5 см

- ☐ 7-8 см
- ☐ 9-10 см

153. Выберите правильный ответ

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- ☐ повернута набок
- ☒ запрокинута назад
- ☐ согнута вперед
- ☐ в исходном положении

154. Выберите правильный ответ

Признаки клинической смерти

- ☒ потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях
- ☐ спутанность сознания и возбуждение
- ☐ нитевидный пульс на сонных артериях
- ☐ дыхание не нарушено

155. Выберите правильный ответ

Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца

- ☐ перелом ключицы
- ☒ перелом ребер
- ☐ повреждение трахеи
- ☐ перелом позвоночника

156. Выберите правильный ответ

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- ☒ центр грудной клетки
- ☐ на границе верхней и средней третей грудины
- ☐ на границе средней и нижней третей грудины
- ☐ в пятом межреберном промежутке слева

157. Выберите правильный ответ

Правило укладывания больного при сердечно-легочной реанимации

- ☐ приподнять ножной конец
- ☐ приподнять головной конец
- ☒ положить на твердую ровную поверхность
- ☐ опустить головной конец

158. Выберите правильный ответ

К недостатку кислорода наиболее чувствительны клетки

- ☒ мозга
- ☐ сердца
- ☐ легких
- ☐ почек

159. Выберите три правильных ответа

Противопоказания к проведению реанимационных мероприятий

- ☒ явная биологическая смерть
- ☐ необоснованная смерть
- ☐ злокачественная опухоль
- ☒ безуспешность реанимационных мероприятий в течение 20-30 мин
- ☒ терминальная стадия неизлечимого заболевания

160. Выберите правильный ответ

Мраморный цвет кожи является признаком

- ☐ нарушения обмена веществ с накоплением кислых продуктов
- ☒ нарушения периферического кровообращения
- ☐ шока
- ☐ спазма мелких сосудов кожи

161. Выберите правильный ответ

Зонд в желудок взрослого человека вводится

- ☐ на расстояние 30-35 см
- ☐ до второй отметки
- ☒ на расстояние от крыльев носа до мочки уха, умноженное на 3
- ☐ до появления рвоты

162. Выберите два правильных ответа

Основное осложнение коматозных состояний

- ☒ аспирация желудочного содержимого
- ☒ синдром позиционного сдавления
- ☐ тромбоэмболия легочной артерии
- ☐ острый инфаркт миокарда

163. Выберите правильный ответ

Общий объем жидкости для промывания желудка у детей определяется из расчета

- ☐ 1 л на 1 кг веса
- ☒ 1 л на 1 год жизни
- ☐ 1 л на кв.м площади тела
- ☐ 10 л минус вес ребенка

164. Выберите правильный ответ

Шок – это

- ☐ острая сердечная недостаточность
- ☐ острая сердечно-сосудистая недостаточность
- ☒ острое нарушение периферического кровообращения
- ☐ острая сердечно-легочная недостаточность

165. Выберите правильный ответ

Максимальным повреждающим действием на стенку вены обладает препарат

- ☐ тиопентал натрия
- ☐ промедол
- ☐ физиологический раствор NaCl
- ☒ 10% раствор хлористого калия

166. Выберите правильный ответ

Постуральный дренаж предполагает

- ☐ дренирование плевральной полости подводным дренажом
- ☐ дренирование плевральной полости трубкой с клапаном
- ☐ дренирование плевральной полости с активной аспирацией
- ☒ особые положения больного, обеспечивающие отток мокроты из трахеобронхиального дерева

167. Выберите правильный ответ

Укажите концентрацию изотонического раствора глюкозы

- ☐ 0,85%
- ☐ 3%
- ☐ 10%
- ☒ 5%

168. Выберите правильный ответ

Признак ожога 2-ой степени

- ☐ гиперемия кожи
- ☒ отслойка эпидермиса с образованием пузырей
- ☐ омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосных луковиц, потовых и сальных желез
- ☐ некроз всех слоев

169. Выберите правильный ответ

Пути введения адреналина при проведении первичной реанимации новорожденного

- ☐ внутривенный + подкожный
- ☐ эндотрахеальный + подкожный
- ☐ подкожный + внутримышечный
- ☒ внутривенный + эндотрахеальный

170. Выберите правильный ответ

Прекратить наружный массаж сердца можно при появлении у ребенка ЧСС более (ударов/минуту)

- ☐ 50
- ☐ 100
- ☒ 80
- ☐ 140

171. Выберите правильный ответ

Критерием живорождения не является

- ☐ пульсация сосудов пуповины
- ☐ наличие сердечной деятельности
- ☐ наличие спонтанного дыхания
- ☒ разлитой цианоз

172. Выберите правильный ответ

При проведении сердечно-легочной реанимации новорожденным соотношение ЧД:ЧСС

- ☐ 2:5
- ☐ 1:2
- ☒ 1:3
- ☐ 1:5

173. Выберите правильный ответ

Дошкольный период продолжается

- ☐ с 4 недель до 1 года
- ☒ с 4 до 7 лет
- ☐ от 1 до 3 лет
- ☐ от 7 до 12 лет

174. Выберите правильный ответ

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными действительна

- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☒ 3 дня
- ☐ 21 день

175. Выберите правильный ответ

Первая профилактическая прививка в детском учреждении после поступления проводится не ранее, чем через

- ☐ 3 месяца
- ☐ 6 месяцев
- ☒ 1 месяц
- ☐ 1 год

176. Выберите правильный ответ

Антропометрия – это

- ☐ подсчет пульса
- ☐ измерение артериального давления
- ☒ измерение массы тела
- ☐ подсчет частоты дыхания
- ☒ измерение длины тела

177. Выберите правильный ответ

Вакцины хранятся при температуре в градусах по Цельсию

- ☐ от +8 до +10
- ☐ от +12 до +14
- ☒ от +2 до +8
- ☐ от +20

178. Выберите два правильных ответа

К проведению профилактических прививок допускается

- ☐ любой сотрудник поликлинического отделения
- ☐ участковая медсестра
- ☒ медсестра с допуском к вакцинации
- ☐ медсестра с катаральными проявлениями
- ☒ медсестра без катаральных проявлений

179. Выберите правильный ответ

Признак внутриутробной гипоксии

- ☐ шум пуповины
- ☒ учащение сердцебиения плода свыше 160 ударов в минуту
- ☐ выслушивание сердцебиения плода ниже пупка
- ☐ отсутствие шевеления плода

180. Выберите правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- ☐ боль в грудной клетке
- ☐ лихорадка
- ☒ одышка
- ☐ слабость

181. Выберите правильный ответ

Основной симптом острого бронхита у детей

- ☐ слабость
- ☐ повышение температуры
- ☐ снижение аппетита
- ☒ кашель

182. Выберите правильный ответ

Бронхиальная астма у ребенка характеризуется

- ☐ лихорадкой
- ☐ судорогами
- ☒ приступами удушья
- ☐ отеками

183. Выберите правильный ответ

К проявлениям недостаточности кровообращения относится

- ☐ увеличение селезенки
- ☐ рвота
- ☒ тахикардия
- ☐ боли в животе

184. Выберите правильный ответ

При обмороке ребенку следует придать положение

- ☐ лежа с приподнятым головным концом

- ☒ лежа с приподнятым ножным концом
- ☐ лежа на боку
- ☐ сидя с опущенными ногами

185. Выберите правильный ответ

Атопический дерматит у детей характеризуется поражением

- ☐ центральной нервной системы
- ☐ сердца
- ☒ кожи
- ☐ почек

2. Современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности

186. Выберите правильный ответ

Препараты для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
- ☒ антиретровирусные
- ☐ симптоматические
- ☐ гормональные

187. Выберите правильный ответ

Наиболее ранний срок обнаружения антител с момента заражения

- ☐ 1 неделя
- ☐ 1 месяц
- ☒ 2 недели
- ☐ 2 месяца

188. Выберите правильный ответ

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

189. Выберите правильный ответ

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
- ☐ для выявления ВИЧ
- ☒ для тестирования при аварийных ситуациях
- ☐ для ранней диагностики

190. Выберите правильный ответ

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

191. Выберите правильный ответ

Основные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

- ☒ серологические
- ☐ генетические
- ☐ люминесцентные
- ☐ бактериологические

192. Выберите правильный ответ

Реакция, используемая для диагностики ВИЧ-инфекции в МО

- ☐ иммунный блоттинг (ИБ)
- ☒ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ полимеразная цепная реакция (ПЦР)
- ☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

193. Выберите правильный ответ

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 1 сутки

194. Выберите правильный ответ

Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

195. Выберите правильный ответ

Срок направления экстренного извещения о впервые выявленном онкопроцессе (в днях)

- ☒ 3
- ☐ 7
- ☐ 10
- ☐ 15

196. Выберите правильный ответ

Сустав, в котором чаще происходит вывих

- ☐ локтевой
- ☐ коленный
- ☒ плечевой
- ☐ тазобедренный

197. Выберите правильный ответ

Достоверный признак вывиха

- ☒ пружинящая фиксация
- ☐ патологическая подвижность
- ☐ нарушение функции
- ☐ отёк, боль

198. Выберите правильный ответ

Признак рака желудка IV стадии

- ☐ психическая депрессия
- ☒ наличие уплотнений в левой надключичной области
- ☐ желудочный дискомфорт
- ☐ отказ от мясных блюд

199. Выберите правильный ответ

Опоясывающая боль в эпигастриальной области характерна для

- ☒ панкреатита
- ☐ холецистита
- ☐ аппендицита
- ☐ перитонита

200. Выберите два правильных ответа

Признаки рака молочной железы

- ☒ втянутый сосок
- ☒ безболезненное уплотнение
- ☐ болезненное уплотнение
- ☐ симптом флюктуации

201. Выберите два правильных ответа

Доскообразный живот является признаком

- ☒ перфоративной язвы желудка
- ☐ острого аппендицита
- ☐ острого холецистита
- ☒ острого перитонита

202. Выберите правильный ответ

Потеря сознания через «светлый промежуток» является признаком

- ☐ сотрясения
- ☐ ушиба
- ☒ сдавления
- ☐ перелома основания черепа

203. Выберите два правильных ответа

Осложнения при переломе костей таза

- ☐ вынужденное положение
- ☒ разрыв мочевого пузыря
- ☐ гематурия
- ☒ разрыв уретры

204. Выберите два правильных ответа

Признаки гемотораксов

- ☐ нарастающая одышка, цианоз
- ☐ коробочный звук
- ☒ тупость в нижних отделах грудной клетки
- ☒ одышка и бледность кожных покровов

205. Выберите два правильных ответа

Для определения площади ожоговой поверхности используется правило

- ☒ ладони
- ☒ девятки
- ☐ Безредки
- ☐ Вишневского

206. Выберите правильный ответ

Максимальный срок пребывания жгута Эсмарха на конечности

- ☒ 1,5/2 часа
- ☐ 1 час
- ☐ 30 минут
- ☐ 15/20 минут

207. Выберите правильный ответ

Вид операции, излечивающий от онкопроцесса

- ☐ паллиативная
- ☐ плановая
- ☐ экстренная
- ☒ радикальная

208. Выберите правильный ответ

Истечение крови и ликвора из ушей и носа при ЧМТ характерно для

- ☐ сдавления
- ☐ ушиба
- ☐ сотрясения
- ☒ перелома основания черепа

209. Выберите правильный ответ

Симптом скрытого желудочного кровотечения

- ☐ боли в эпигастрии
- ☒ дёгтеобразный стул
- ☐ метеоризм
- ☐ желудочный дискомфорт

210. Выберите правильный ответ

Гиперемия с четкими границами - признак

- ☒ рожистого воспаления
- ☐ флегмоны
- ☐ абсцесса
- ☐ лимфангоита

211. Выберите правильный ответ

Репозиция проводится при (переломах)

- ☐ открытых
- ☐ закрытых
- ☐ без смещения
- ☒ со смещением

212. Выберите правильный ответ

Кратковременная потеря сознания вслед за травмой при ЧМТ является признаком

- ☒ сотрясения
- ☐ ушиба
- ☐ сдавления
- ☐ перелома основания черепа

213. Выберите правильный ответ

Методом эндоскопической диагностики является

- ☐ ирригоскопия
- ☒ колоноскопия
- ☐ компьютерная томография
- ☐ урография

214. Выберите правильный ответ

Пальпацию живота начинают с

- ☒ со здоровой стороны живота
- ☐ с больной стороны живота

☐ всегда с верхних отделов живота

☐ всегда с нижних отделов живота

215. Выберите правильный ответ

Опоясывающая боль в эпигастральной области характерна для

☒ панкреатита

☐ холецистита

☐ аппендицита

☐ перитонита

216. Выберите правильный ответ

Наиболее опасный симптом ранения

☒ кровотечение

☐ боль

☐ зияние

☐ нарушение функции

217. Выберите правильный ответ

Самое частое осложнение случайных ран

☐ столбняк

☒ нагноение

☐ сепсис

☐ газовая гангрена

218. Выберите правильный ответ

Признак дореактивного периода отморожений

☒ ткани бледные, холодные

☐ пузыри с серозным содержимым

☐ пузыри с геморрагическим содержимым

☐ струп чёрного цвета

219. Выберите правильный ответ

Достоверный признак разрыва мышц

☐ нарушение функции

☐ отёк, кровоподтёк

☒ дефект по ходу мышц

☐ локальная болезненность

220. Выберите правильный ответ

Осложнение в процессе лечения отморожений

☒ присоединение простудных заболеваний

☐ токсемия

☐ некроз тканей

☐ появление демаркационной линии

221. Выберите правильный ответ

Позднее осложнение отморожений

☐ облитерирующий атеросклероз

☐ некроз тканей

☒ облитерирующий эндартериит

☐ простудные заболевания

222. Выберите правильный ответ

Гематогенный остеомиелит начинается

☒ остро с симптомов тяжелой интоксикации

☐ остро с признаков местного воспаления

☐ постепенно нарастающей интоксикации

☐ острой боли в пораженной конечности

223. Выберите правильный ответ

Степень отморожений можно определить

☐ сразу после согревания

☐ на 2-ой день

☐ в до реактивном периоде

☒ спустя несколько дней

224. Выберите правильный ответ

Отличительный признаком ожога II степени является - наличие

☒ пузырей

☐ гиперемии

☐ струпа

☐ отёка

225. Выберите правильный ответ

Злокачественная опухоль

☐ состоит из зрелых клеток

☒ рецидивирует, метастазирует

☐ имеет четкие границы

☐ не прорастает соседние ткани

226. Выберите правильный ответ

Признак желудочного кровотечения

☒ рвота кофейной гущей

☐ выделение пенистой крови

☐ притупление в отлогих местах живота

☐ примесь свежей крови в каловых массах

227. Выберите правильный ответ

Самый достоверный метод диагностики онкопроцесса

☐ рентгенологический

☐ радиоизотопный

☒ гистологический

☐ ультрозвуковой

228. Выберите правильный ответ

Болезненная осевая нагрузка является признаком

☐ вывиха

☒ перелома

☐ ушиба

☐ растяжения связок

229. Выберите два правильных ответа

Основными причинами развития инфекционно-токсического шока при менингококковой инфекции являются

☐ потеря жидкости

☐ повышение гематокрита

☐ потеря плазмы и форменных элементов крови

☒ бактериемия

☒ эндотоксемия

230. Выберите правильный ответ

Патогномоничный признак отравления окисью углерода у детей

☐ глубокий сон

☐ приступ апноэ

☒ карминно-розовая окраска кожи

☐ тяжелая гипотония мышц

231. Выберите правильный ответ

Количество промывной жидкости

☒ 1 литр на год жизни

☐ 0,5 литра на год жизни

☐ 1,5 литра на год жизни

☐ 0,1 литра на год жизни

232. Выберите правильный ответ

Промывать желудок можно

- ☐ раствором гидрокарбоната-натрия
- ☐ раствором кислоты
- ☐ водой с добавлением перманганата калия
- ☒ чистой водой

233. Выберите правильный ответ

Токсическое действие угарного газа вызывает

- ☒ образование карбоксигемоглобина
- ☐ образование метгемоглобина
- ☐ гемолиз эритроцитов
- ☐ образование оксигемоглобина

234. Выберите правильный ответ

Пути попадания отравляющих веществ в организм ребенка

- ☐ через рот
- ☐ через кожу
- ☐ через дыхательные пути
- ☒ через рот, через кожу, через дыхательные пути

235. Выберите правильный ответ

Скрытый период отсутствует при проникновении яда через

- ☐ желудок
- ☐ кожу
- ☐ легкие
- ☒ местном воздействии прижигающих ядов

236. Выберите правильный ответ

Острый аппендицит у детей чаще всего встречается

- ☐ у детей до 1-го года
- ☐ с 1 до 3-х лет
- ☐ 4-7 лет
- ☒ старше 8-ми лет

237. Выберите правильный ответ

Какие симптомы характерны для начальных проявлений острого аппендицита у детей раннего возраста

- ☒ боли в области пупка
- ☐ многократная рвота
- ☐ боли в правой подвздошной области
- ☐ жидкий стул

238. Выберите правильный ответ

Наиболее часто встречаемая форма непроходимости у детей

- ☒ инвагинация кишечника
- ☐ спаечная непроходимость
- ☐ странгуляционная непроходимость
- ☐ обтурационная непроходимость

239. Выберите правильный ответ

Чаще всего инвагинация кишечника встречается в возрасте

- ☐ 1-6 месяцев
- ☒ 6-18 месяцев
- ☐ старше 3-х лет
- ☐ младший школьный

240. Выберите два правильных ответа

Какие препараты чаще всего используются для купирования судорог у детей

- ☒ сибазон

- ☐ аминазин
- ☐ дроперидол
- ☐ гексенал
- ☒ оксибутират-натрия

241. Выберите три правильных ответа

Характерные симптомы при инвагинации кишечника

- ☒ схваткообразные боли
- ☒ выделение крови из прямой кишки
- ☒ определение инвагината при пальпации
- ☐ рвота кофейной гущей
- ☐ судороги
- ☐ повышение температуры

242. Выберите три правильных ответа

Признаки гипокальциемических судорог у детей

- ☐ очаговый характер
- ☒ ларингоспазм
- ☐ положительный эффект введения седуксена
- ☒ положительный симптом Хвостека
- ☒ карпопедальный спазм
- ☐ положительная менингеальная симптоматика

243. Выберите правильный ответ

Какое осложнение чаще всего возникает при высокой лихорадке у детей раннего возраста

- ☐ острая почечная недостаточность
- ☐ недостаточность кровообращения
- ☒ судороги
- ☐ отек легких

244. Выберите правильный ответ

Для острого стенозирующего ларинготрахеита нехарактерно

- ☒ обилие влажных хрипов в легких
- ☐ инспираторной одышки
- ☐ отрывистого кашля
- ☐ измененного голоса

245. Выберите правильный ответ

Для острого эпиглоттита нехарактерно

- ☐ подъем температуры
- ☐ интоксикация
- ☐ быстрое начало
- ☒ наличие «лающего» кашля

246. Выберите два правильных ответа

Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется

- ☒ появлением одышки при нагрузке
- ☐ появлением одышки в покое
- ☒ втяжением яремной ямки при вдохе
- ☐ втяжением всех уступчивых мест грудной клетки
- ☐ спутанностью сознания

247. Выберите правильный ответ

Чаще острый стенозирующий ларинготрахеит развивается

- ☐ летом
- ☐ зимой

☐ независимо от времени года

☒ зимой и весной

248. Выберите правильный ответ

Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей развивается в возрасте

☒ от 6 мес до 3 лет

☐ от 3 до 5 лет

☐ старше 5 лет

☐ в период новорожденности

249. Выберите два правильных ответа

Для стеноза гортани 2 стадии характерно

☒ участие вспомогательной мускулатуры при вдохе в покое

☒ акроцианоз в покое

☐ сопор

☐ участие вспомогательной дыхательной мускулатуры при беспокойстве

☐ экспираторная одышка в покое

250. Выберите правильный ответ

Для купирования острого стенозирующего ларинготрахеита проводят ингаляции

☒ пульмикортом

☐ преднизолоном

☐ дексаметазоном

☐ беродуала

251. Выберите три правильных ответа

При остром эпиглоттите противопоказано применение

☐ глюкокортикостероидов

☐ ингаляции увлажненного кислорода

☒ седативных препаратов

☒ спазмолитиков

☒ антигистаминных препаратов

252. Выберите правильный ответ

Клиническая триада менингита

☐ головная боль, боли в животе, рвота

☐ головная боль, боли в животе, лихорадка

☒ головная боль, рвота, лихорадка

☐ боли в животе, рвота, лихорадка

253. Выберите правильный ответ

Сыпь, наиболее характерная для менингококковой инфекции

☐ мелкоточечная

☐ мелкопятнистая

☐ папулезная

☒ геморрагическая

254. Выберите правильный ответ

Наиболее важный диагностический признак менингококцемии

☐ острейшее начало с ознобом и температурой тела 39-41 °C

☐ бледность и цианоз кожных покровов

☒ геморрагическая сыпь

☐ увеличение печени и селезенки

255. Выберите правильный ответ

Наиболее часто применяемый на этапе скорой помощи антибиотик для лечения менингококковой инфекции

☐ пенициллин

☐ ампициллин

☒ цефтриаксон

☐ оксациллин

256. Выберите правильный ответ

Основными симптомами менингококкового менингита являются

☒ лихорадка, рвота, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига

☐ парез конечностей

☐ везикулезная сыпь в сочетании с очаговой неврологической симптоматикой

☐ парез мягкого неба

257. Выберите правильный ответ

Характер стула при остром аппендиците у детей младшего возраста может быть

☐ только нормальный

☐ чаще жидкий

☒ может быть как нормальный, так и жидкий

☐ чаще запоры

258. Выберите правильный ответ

Через какое время при инвагинации кишечника возникает задержка стула и газов

☐ 1-2 часа

☐ 3-5 часов

☒ 6-10 часов

☐ 12-24 часа

259. Выберите правильный ответ

Признаки начала первого периода родов

☐ излитие околоплодных вод

☐ наличие зрелой шейки матки

☒ появление регулярных схваток

☐ вставление головки во вход в малый таз

260. Выберите правильный ответ

Продолжительность первого периода родов у первородящих составляет (часов)

☐ 5-7

☒ 8-12

☐ 11-13

☐ 14-16

261. Выберите правильный ответ

Удлинение безводного промежутка не допустимо более (часов)

☐ 6

☐ 9

☒ 18

☐ 16

262. Выберите правильный ответ

Продолжительность второго периода родов у повторнородящих (часов)

☐ 0,5

☒ 0,5-1

☐ 1-1,5

☐ 1,5-2

263. Выберите правильный ответ

Период изгнания плода начинается с момента

☐ отхождения околоплодных вод

☒ полного открытия шейки матки

- ☐ начала потуг
- ☐ опущения головки на тазовое дно

264. Выберите правильный ответ

Продолжительность послеродового периода

- ☐ 1-2 недели
- ☐ 2-4 недели
- ☐ 4-6 недель
- ☒ 6-8 недель

265. Выберите два правильных ответа

Признаками тяжелой преэклампсии являются

- ☐ нормотония
- ☐ зрение ясное
- ☒ боль в эпигастральной области, рвота
- ☒ мелькание мушек перед глазами
- ☐ фибриллярные подергивания мышц лица

266. Выберите два правильных ответа

Осложнения беременности при сахарном диабете

- ☐ маловодие
- ☐ гипотрофия плода
- ☒ многоводие
- ☒ преэклампсия
- ☐ олигурия

267. Выберите два правильных ответа

Симптомами клинически узкого таза являются

- ☒ отсутствие поступательного движения головки плода
- ☒ положительный признак Вастена
- ☐ слабость родовой деятельности
- ☐ отрицательный признак Вастена
- ☐ свободное мочеиспускание

268. Выберите два правильных ответа

Проявлениями геморрагического шока являются

- ☒ гипотония
- ☒ тахикардия
- ☐ протеинурия
- ☐ брадикардия
- ☐ полиурия

269. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

270. Выберите правильный ответ

Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза

- ☐ резко повышено
- ☒ понижено
- ☐ незначительно повышено
- ☐ нормальное

271. Выберите правильный ответ

Повышение внутриглазного давления

- ☐ конъюнктивит
- ☐ ячмень
- ☐ нистагм
- ☒ глаукома

272. Выберите правильный ответ

Профилактика глаукомы

- ☐ назначение контактных линз
- ☐ проведение носо-слёзных проб
- ☒ регулярная тонометрия
- ☐ закапывания за веки витаминных препаратов

273. Выберите два правильных ответа

Необходимые правила при обработке при чесотке

- ☒ обработка вечером
- ☒ обработка всего кожного покрова
- ☐ обработка в утренние часы
- ☐ обработка поражённых участков кожи
- ☐ экспозиция любого препарата 6 часов

274. Выберите правильный ответ

Пациенты с рожистым воспалением на лице нуждаются

- ☒ в срочной госпитализации
- ☐ госпитализация не показана
- ☐ срочная изоляция
- ☐ срочное лабораторное исследование

275. Выберите правильный ответ

Морфологический элемент крапивницы

- ☒ волдырь
- ☐ пузырь
- ☐ бугорок
- ☐ узел

276. Выберите два правильных ответа

Признаки первичного периода сифилиса

- ☒ эрозия, язва
- ☒ увеличение регионарных лимфоузлов
- ☐ сгруппированные бугорки
- ☐ розеола, папулы
- ☐ мелкоочаговое облысение

277. Выберите два правильных ответа

Типичная локализация высыпаний при чесотке у взрослого человека

- ☒ кисти
- ☒ живот
- ☐ весь кожный покров
- ☐ волосистая часть головы
- ☐ лицо

278. Выберите правильный ответ

Самый контагиозный период сифилиса

- ☒ вторичный период
- ☐ первичный период
- ☐ третичный период
- ☐ инкубационный период

279. Выберите два правильных ответа

Возможные пути передачи чесотки

- ☒ использование белья больного
- ☒ половой контакт
- ☐ употребление недоброкачественной пищи
- ☐ укусы насекомых
- ☐ переливание крови

280. Выберите правильный ответ

Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является

- ☒ отсутствие пульса на сонных артериях
- ☐ отсутствие самостоятельного дыхания
- ☐ широкие зрачки
- ☐ отсутствие сознания

281. Выберите правильный ответ

При потере сознания у пациента, в первую очередь, необходимо проверить

- ☐ реакцию зрачков на свет
- ☐ наличие самостоятельного дыхания
- ☐ пульс на лучевой артерии
- ☒ пульс на сонных артериях

282. Выберите правильный ответ

Наиболее часто при клинической смерти остановка кровообращения проявляется на ЭКГ

- ☐ полной атриовентрикулярной блокадой
- ☐ асистолией
- ☒ фибрилляцией желудочков
- ☐ синусовой тахикардией

283. Выберите правильный ответ

Продолжительность клинической смерти (без проведения реанимационных мероприятий) при обычных условиях окружающей среды составляет

- ☐ 1 минуту
- ☐ 3 минуты
- ☒ 5 минут
- ☐ 15 минут

284. Выберите правильный ответ

Ранним признаком биологической смерти является

- ☐ отсутствие сознания
- ☐ трупное окоченение
- ☒ положительный симптом «кошачьего зрачка»
- ☐ асистолия

285. Выберите правильный ответ

Преимуществом масочной вентиляции легких является

- ☒ техническая простота подсоединения аппарата к больному
- ☐ надежность поддержания герметичности дыхательных путей
- ☐ предупреждение асфиксии вследствие западения корня языка
- ☐ предупреждение аспирации рвотных масс

286. Выберите правильный ответ

К преимуществам искусственной вентиляции через интубационную трубку не относятся

- ☐ обеспечение стабильной проходимости дыхательных путей
- ☒ предупреждение бронхоспазма
- ☐ профилактика аспирации желудочного содержимого
- ☐ герметичность дыхательных путей

287. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения искусственного дыхания свидетельствует

- ☐ видимое выбухание в эпигастрии
- ☒ наличие экскурсии грудной клетки
- ☐ парадоксальный пульс на сонных артериях
- ☐ видимое набухание шейных вен

288. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения непрямого массажа сердца свидетельствует

- ☐ видимое набухание шейных вен
- ☒ наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий грудной клетки
- ☐ перелом ребер
- ☐ наличие пульса на лучевой артерии

289. Выберите правильный ответ

Компрессия грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых выполняется с частотой

- ☐ 40-50 в минуту
- ☐ 60-70 в минуту
- ☒ 100 в минуту
- ☐ 110-120 в минуту

290. Выберите правильный ответ

При проведении реанимационного пособия непрямым массажем сердца и искусственным дыханием проводится в соотношении (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☒ 30:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 только при оказании помощи одним реаниматором
- ☐ 5:1 при оказании помощи двумя реаниматорами

291. Выберите правильный ответ

Суммарная доза адреналина при проведении СЛР взрослому

- ☐ составляет 1 мл 0,1 % раствора
- ☐ составляет 3 мл 0,1% раствора
- ☐ составляет 5 мл 0,1% раствора
- ☒ не ограничена

292. Выберите правильный ответ

Экспираторный характер одышки отмечается при

- ☐ абсцессе легкого, туберкулезе
- ☒ бронхиальной астме, ХОБЛ
- ☐ очаговой и долевой пневмониях
- ☐ отеке легких, сердечной астме

293. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки приступа бронхиальной астмы

- ☐ крепитация
- ☒ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☐ шум трения плевры

294. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки астматического статуса во II стадии

- ☐ крепитация
- ☐ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☒ «немое лёгкое»

295. Выберите правильный ответ

Инфаркт миокарда характеризуется болью

- ☐ колющая боль в области сердца
- ☐ ноющая боль в области сердца
- ☐ сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином
- ☒ сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

296. Выберите правильный ответ

Догоспитальная интенсивная терапия гипергликемической комы заключается в

- ☐ инсулинотерапии
- ☒ инфузии кристаллоидных растворов
- ☐ введении глюкокортикоидов
- ☐ введении лазикса

297. Выберите правильный ответ

Для регидратации при диабетическом кетоацидозе на догоспитальном этапе применим раствор

- ☐ 10% глюкозы
- ☒ 0,9% натрия хлорида
- ☐ 4% натрия гидрокарбоната
- ☐ полиглюкина

298. Выберите правильный ответ

Рациональным объемом лечебных мероприятий на догоспитальном этапе у беременных с гестозом тяжелой степени является

- ☒ масочный наркоз закистью азота с кислородом, внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, госпитализация в акушерский стационар, лежачая на носилках
- ☐ внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, оксигенотерапия, госпитализация в акушерский стационар, лежачая на носилках
- ☐ незамедлительная транспортировка в акушерский стационар без дополнительных лечебных мероприятий
- ☐ масочный наркоз закистью азота с кислородом, внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, вызов «на себя» акушерской бригады

299. Выберите правильный ответ

Рациональная догоспитальная тактика при нарушенной внематочной беременности включает

- ☐ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара без дополнительных лечебных мероприятий
- ☒ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- ☐ обезболивание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

☐ введение сокращающих матку средств (окситоцин), госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

300. Выберите правильный ответ

Диаметр внутреннего просвета коникотомической канюли у ребенка до 10 лет должен быть равен

- ☐ 1 мм
- ☒ 2 мм
- ☐ 4 мм
- ☐ 6 мм

301. Выберите правильный ответ

Какие из препаратов для инфузионной терапии предпочтительно использовать при лечении больных с отеком мозга

- ☐ концентрированные растворы глюкозы
- ☐ декстраны с молекулярной массой 60 000 дальт.
- ☒ растворы гидроксиэтилкрахмала с молекулярной массой не менее 130 000 Дальт
- ☐ альбумин 10%

302. Выберите правильный ответ

Показанием для тромболитической терапии не является

- ☐ подъем сегмента ST на 2 и более мм в двух грудных отведениях
- ☐ подъем ST на 1 и более мм в двух смежных стандартных отведениях
- ☐ длительность болевого синдрома 12 часов
- ☒ остро возникшие нарушения ритма

303. Выберите правильный ответ

Какой из указанных препаратов наиболее эффективен и рекомендован для эмпирической терапии тахиформ нарушений сердечного ритма

- ☐ лидокаин
- ☐ хинидин
- ☐ нифедипин
- ☒ кордарон

304. Выберите три правильных ответа

Какие осложнения возможны при проведении тромболитической терапии в остром периоде инфаркта миокарда

- ☒ анафилактический шок
- ☒ геморрагический шок
- ☒ гематурия

- ☐ артериальная гипертензия
- ☐ осложнений не бывает
- ☐ повышение гематокрита

305. Выберите правильный ответ

Какие из побочных эффектов ингибиторов АПФ, как правило, требуют прекращения лечения

- ☒ ангионевротический отек, кожные реакции в виде эритемы
- ☐ кашель
- ☐ потеря вкусовых ощущений
- ☐ падение АД после первого приема

306. Выберите правильный ответ

Коронарный кровоток осуществляется в фазе

- ☐ изометрии
- ☐ изотонической
- ☒ диастолы
- ☐ не зависит от фаз сердечного цикла

307. Выберите правильный ответ

В результате ингаляции 100% кислорода может развиваться

- ☐ гипертензия и брадикардия
- ☐ гипертензия и снижение пульсового давления
- ☐ резкая гипертензия и апноэ
- ☒ гипотензия и апноэ

308. Выберите правильный ответ

Через сколько часов (минут) у пациентов с инфарктом миокарда начинает увеличиваться уровень тропонина

- ☐ через 24 часа после появления симптомов
- ☐ через 30 минут после появления симптомов
- ☒ через 3 часа после появления симптомов
- ☐ сразу после появления болевого синдрома

309. Выберите правильный ответ

Реперфузионная (ЧКВ или тромболизис) терапия показана всем больным с болью/ дискомфортом и персистирующим подъемом сегмента ST или новой блокадой ЛНПГ длительностью не более

- ☐ 24 часов
- ☐ 6 часов
- ☒ 12 часов
- ☐ 3 часов

310. Выберите правильный ответ

Тромболитическая терапия проводится, если ЧКВ невозможно выполнить в течение

- ☐ 24 часов
- ☒ 120 минут от момента первого контакта с медработником
- ☐ 12 часов
- ☐ 3 часов

311. Выберите правильный ответ

После тромболитической терапии больного направляют

- ☐ кардиологическое отделение
- ☒ в центр с возможностью выполнения ЧТВ

- ☐ реанимационное отделение общего профиля
- ☐ оставляют дома под наблюдения участкового терапевта

312. Выберите правильный ответ

Препараты для тромболизиса

- ☒ алтеплаза, тенектеплаза
- ☐ клопидогрел, прасутгел
- ☐ эноксипарин, фраксипарин
- ☐ метопролол, бисопролол

313. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе без повышения симпатической активности показан

- ☒ урапидил (эбрантил)
- ☐ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

314. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе с высокой симпатической активностью показан

- ☐ урапидил (эбрантил)
- ☒ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

315. Выберите правильный ответ

Центр автоматизма I порядка

- ☒ синусовый узел
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в правом предсердии
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в левом предсердии
- ☐ атриовентрикулярное соединение

316. Выберите правильный ответ

Пароксизм желудочковой тахикардии купируется

- ☐ валосердином
- ☐ нитроглицерином
- ☐ панангином
- ☒ кордароном

317. Выберите правильный ответ

Пароксизм узловой тахикардии купируется

- ☐ лидокаином
- ☐ эуфиллином
- ☐ панангином
- ☒ анаприлином

318. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма трепетания предсердий

- ☐ непрямой массаж сердца
- ☐ задержка дыхания
- ☒ чреспищеводная кардиостимуляция
- ☐ капотен под язык

319. Выберите правильный ответ

Препарат при полной атриовентрикулярной блокаде

- ☐ кордарон
- ☐ верапамил
- ☐ анаприлин

☒ атропин

320. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма мерцательной аритмии

☐ панангин

☒ пропанорм

☐ лидокаин

☐ верапамил

321. Выберите правильный ответ

Купирование гипертонического криза при кардиостимуляции

☐ кордарон

☐ лидокаин

☒ капотен

☐ пропанорм

322. Выберите правильный ответ

Купирование частой желудочковой экстрасистолы при кардиостимуляторе

☐ атропин

☐ верапамил

☐ капотен

☒ кордарон

323. Выберите правильный ответ

Ведущая группа препаратов при гипертоническом кризе с отёком лёгких

☐ наркотические анальгетики

☒ мочегонные

☐ нитраты

☐ гипотензивные

324. Выберите правильный ответ

Основным антикоагулянтом при хронической фибрилляции предсердий является

☐ аспирин

☐ гепарин

☒ варфарин

☐ кардиомагнил

325. Выберите правильный ответ

"Mednet" - это

☒ телекоммуникационная медицинская сеть России

☐ автоматизированная система управления

☐ автоматизированное рабочее место

☐ автоматизированный скрининг

326. Выберите правильный ответ

Автоматизированный скрининг - это

☐ телекоммуникационная сеть

☐ автоматизированный предварительный медицинский осмотр

☒ автоматизированный целевой медицинский осмотр

☐ автоматизированная система управления

327. Выберите три правильных ответа

Виды медицинской информации

☐ общественная

☐ индивидуальная

☐ коллективная

☒ экономическая

☒ технологическая

☒ статистическая

328. Выберите правильный ответ

Второй этап медико-статистического исследования

☐ составление плана исследования

☐ обработка статистического материала

☒ сбор материала

☐ определение объема наблюдений

329. Выберите правильный ответ

Для медицинских исследований достаточной степенью вероятности является [%]

☐ 75

☐ 99,9

☒ 95,0

☐ 68

330. Выберите правильный ответ

Основная цель ОАСУ - "Здравоохранение"

☐ лечение больных на модели

☐ обработка информации

☒ совершенствование управления здравоохранением, обеспечивающее оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи

☐ учет расходования лекарств

331. Выберите правильный ответ

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

☐ отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости

☒ отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением

☐ экстраполяцию и прогнозирование

☐ анализ деятельности МО

332. Выберите правильный ответ

Статистика населения - это:

☐ сведения о здоровье

☐ данные о здравоохранении

☐ показатели деятельности МО

☒ основные количественные данные о населении на момент времени

333. Выберите правильный ответ

Третий этап медико-статистического исследования

☐ составление плана исследования

☐ определение стоимости исследования

☒ обработка, шифровка, свodka материала

☐ внедрение результатов

334. Выберите правильный ответ

Четвертый этап медико-статистического исследования

☐ статистический анализ собранного материала

☐ определение стоимости исследования

☒ анализ, выводы, внедрение в практику

☐ анализ экономической эффективности

☐ медико-социальный анализ результатов

335. Выберите правильный ответ

Судорожный припадок на догоспитальном этапе купируется применением

- ☒ сибазона
- ☐ кофеина
- ☐ димедрола
- ☐ кеторолака

336. Выберите два правильных ответа

На догоспитальном этапе в качестве нейропротекторных препаратов используются

- ☐ пирацетам
- ☒ мексидол
- ☒ глицин
- ☐ сибазон
- ☐ метоклопрамид

337. Выберите правильный ответ

Побочным эффектом при внутривенном введении цитиколина (цероксона) возможно развитие

- ☒ транзиторной гипотензии
- ☐ транзиторной гипертензии
- ☐ тахикардии
- ☐ тошнота, рвота

338. Выберите три правильных ответа

Мероприятия, проводимые на догоспитальном этапе для предотвращения отёка мозга, являются

- ☐ внутривенное введение лазикса
- ☒ обеспечение адекватной оксигенации
- ☒ приподнятый головной конец носилок под углом 30°
- ☒ купирование судорог и психомоторного возбуждения
- ☐ введение сосудорасширяющих средств
- ☐ приподнятый ножной конец носилок

339. Выберите три правильных ответа

Синдром вклинивания ствола мозга включает признаки

- ☐ узкие зрачки с сохраненной реакцией на свет
- ☒ судорожный синдром
- ☒ тенденция к брадикардии
- ☒ прогрессирующее угнетение сознания
- ☐ ясное сознание
- ☐ нормальный ритм дыхания и сердечной деятельности

340. Выберите правильный ответ

Оптимальное время для госпитализации в стационар от начала ишемического инсульта с целью проведения тромболизисной терапии

- ☒ первые 5 часов
- ☐ первые 7 часов
- ☐ первые 6 часов
- ☐ первые 8 часов

341. Выберите правильный ответ

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы биполярного аффективного психоза

- ☐ депрессивной фазы биполярного аффективного психоза
- ☐ эпилепсии
- ☐ кататонического синдрома

342. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при передозировке опиатами включает препарат

- ☒ налоксон
- ☐ кеторолак
- ☐ димедрол
- ☐ сибазон

343. Выберите два правильных ответа

Купирование алкогольного абстинентного синдрома проводят при помощи

- ☒ дезинтоксикационных средств
- ☐ психостимуляторов
- ☐ антибиотиков
- ☐ спазмолитиков
- ☒ транквилизаторов

344. Выберите три правильных ответа

Оказание помощи при эпилептическом приступе включают

- ☒ убрать острые и твёрдые предметы
- ☒ расстегнуть стесняющую одежду
- ☒ повернуть больного на бок
- ☐ попытаться привести пациента в сознание
- ☐ уложить пациента на спину
- ☐ уложить пациента на живот

345. Выберите правильный ответ

Оказание психиатрической помощи службой скорой медицинской помощи обосновано если

- ☒ пациент опасен для себя и окружающих
- ☐ всегда если пациент находится на учёте в психоневрологическом диспансере
- ☐ если пациент страдает соматическим заболеванием
- ☐ если пациент страдает неврологическим заболеванием

346. Выберите два правильных ответа

Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар службой скорой медицинской помощи проводится при наличии у пациента

- ☒ расстройства сознания с психомоторным возбуждением
- ☐ хронического психического расстройства вне обострения по требованию родственников
- ☒ суицидальных проявлений или тенденций
- ☐ хронического психического расстройства вне обострения по требованию соседей
- ☐ хроническое психическое расстройство, когда пациент не опасен для себя и окружающих

347. Выберите правильный ответ

Противопоказанием для применения дроперидола является

- ☐ высокое внутричерепное давление

- ☐ глаукома
- ☒ низкое АД
- ☐ все перечисленное верно

348. Выберите правильный ответ

Допамин увеличивает сократимость миокарда без значительной вазоконстрикции в дозе

- ☒ до 10 мг/кг/мин
- ☐ до 20 мг/кг/мин
- ☐ до 30 мг/кг/мин
- ☐ до 40 мг/кг/мин

349. Выберите правильный ответ

Длительность действия адреналина при внутривенном введении составляет

- ☒ 5 мин
- ☐ 10 мин
- ☐ 15 мин
- ☐ 20 мин

350. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии истинного кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда левого желудочка является применение

- ☐ нитратов и глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ кардиотоников (дофамин), нитратов на фоне поддерживающей инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ сердечных гликозидов и глюкокортикоидов на фоне инфузии поляризующей смеси, ингаляция кислорода
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и мочегонных препаратов

351. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии первой фазы инфекционно-токсического (септического) шока является применение

- ☐ глюкокортикоидов и нитратов на фоне массивной инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ бактериостатических антибиотиков, глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и лазикса на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ глюкокортикоидов и вазопрессоров (норадреналин) на фоне инфузионной терапии, ингаляция кислорода

352. Выберите правильный ответ

Обязательным комплексом интенсивной терапии при анафилактическом шоке на догоспитальном этапе является

- ☒ внутривенное введение адреналина и глюкокортикоидных препаратов на фоне инфузионной терапии, при бронхоспазме - эуфиллин, адекватная респираторная поддержка

- ☐ внутривенное введение глюконата кальция и супрастина
- ☐ внутримышечная инъекция адреналина, супрастина и кордиамина
- ☐ внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов на фоне массивной инфузионной терапии, при бронхоспазме - интубация трахеи и искусственная вентиляция легких

353. Выберите правильный ответ

При аллергическом ангионевротическом отеке без затруднения дыхания рациональной тактикой на догоспитальном этапе является введение

- ☐ только антигистаминных препаратов
- ☐ только глюкокортикоидных препаратов
- ☒ глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
- ☐ адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов

354. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке I степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 20 мл /мин
- ☒ 50-99 мл/мин
- ☐ 100-199 мл/мин
- ☐ 200-300 мл/мин

355. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке II степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 20 мл/мин
- ☐ 50-99 мл/мин
- ☒ 100-199 мл/мин
- ☐ 200-300 мл/мин

356. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке III степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 50-99 мл/мин
- ☐ 100-199 мл/мин
- ☒ 200-300 мл/мин
- ☐ 20 мл /мин

357. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) объемное соотношение переливаемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☒ 2:1
- ☐ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

358. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере более 2 литров (шок III степени) объемное соотношение перели-

ваемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☐ 2:1
- ☒ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

359. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) на догоспитальном этапе препаратом выбора из коллоидных инфузионных растворов является

- ☐ альбумин
- ☐ реополиглюкин
- ☒ 6% раствор гидроксиэтилкрахмала
- ☐ 10% раствор гидроксиэтилкрахмала

360. Выберите правильный ответ

В рациональный объем терапии фельдшерской бригады скорой медицинской помощи при нестабильной стенокардии с отсутствием артериальной гипотензии входит

- ☐ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты (в спрее или внутривенно капельно), при купировании боли - «актив» в поликлинику
- ☐ экстренная госпитализация без дополнительных лечебных мероприятий
- ☒ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты, гепарин, морфин при продолжающейся боли, обязательная госпитализация
- ☐ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты, гепарин, морфин, вызов бригады интенсивной терапии или специализированной кардиологической бригады скорой медицинской помощи

361. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной энцефалопатией, является

- ☐ пропранолол
- ☒ эналаприлат
- ☐ дибазол
- ☐ нитропрепарат

362. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном острым коронарным синдромом, является

- ☐ эналаприлат
- ☒ нитропрепарат
- ☐ магния сульфат
- ☐ пропранолол

363. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном расслаивающей аневризмой аорты, является

- ☐ нитропрепарат
- ☐ эналаприлат
- ☐ магния сульфат
- ☒ эсмолол

364. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном отеком легких, является

- ☒ фуросемид
- ☐ дибазол
- ☐ магния сульфат
- ☐ пропранолол

365. Выберите правильный ответ

Оптимальным способом купирования приступа бронхиальной астмы на догоспитальном этапе является

- ☐ внутривенное введение эуфиллина
- ☐ ингаляция кислорода
- ☒ ингаляционное введение бета-2 адрено-стимуляторов через небулайзер
- ☐ внутривенное введение адреналина

366. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора для купирования приступа удушья при бронхиальной астме является

- ☒ беродуал
- ☐ эуфиллин
- ☐ супрастин
- ☐ преднизолон

367. Выберите правильный ответ

При бронхообструктивном синдроме противопоказаны

- ☐ диуретики
- ☐ нитропрепараты
- ☐ антагонисты кальция
- ☒ бета-адреноблокаторы

368. Выберите правильный ответ

Антигистаминные препараты при астматическом статусе вызывают

- ☐ тахикардию и мышечную дрожь
- ☐ усиление кашлевого рефлекса
- ☐ резкое угнетение дыхания центрального генеза
- ☒ сгущение мокроты с затруднением ее эвакуации

369. Выберите правильный ответ

Гипогликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже меньше

- ☐ 8,2 ммоль/литр
- ☐ 5,5 ммоль/литр
- ☒ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 2,6 ммоль/литр

370. Выберите правильный ответ

Гипергликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже больше

- ☐ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 5,0 ммоль/литр
- ☒ 7,0 ммоль/литр
- ☐ 8,2 ммоль/литр

371. Выберите правильный ответ

Для лечения гипогликемической комы на догоспитальном этапе внутривенно вводится

- ☒ тиамин 100 мг, затем 40 мл 40% раствора глюкозы
- ☐ налоксон 0,4-0,8 мг
- ☐ 40 мл 40% раствора глюкозы вместе с 6-8 ЕД инсулина

- ☐ 200 мл 5% раствора глюкозы со скоростью 60 капель в минуту

372. Выберите правильный ответ

Зубец Р на ЭКГ отражает

- ☐ возбуждение желудочков
- ☒ возбуждение предсердий
- ☐ время распространения импульса от синусового узла до миокарда желудочков
- ☐ метаболические процессы в миокарде

373. Выберите правильный ответ

Комплекс QRS отражает на ЭКГ

- ☐ реполяризацию предсердий
- ☒ возбуждение желудочков
- ☐ электрическую систолу желудочков
- ☐ электрическую систолу сердца

374. Выберите правильный ответ

Зубец Q на ЭКГ характеризует

- ☐ возбуждение предсердий
- ☒ возбуждение межжелудочковой перегородки
- ☐ процессы реполяризации
- ☐ атриовентрикулярную проводимость

375. Выберите правильный ответ

В норме амплитуда зубца Q соответствует

- ☐ 1/3 Р
- ☐ 1/4 Р
- ☒ 1/4 R
- ☐ 1/3 R

376. Выберите правильный ответ

Форма нормального зубца Q

- ☐ овал
- ☒ треугольник
- ☐ овал с зазубриной
- ☐ треугольник с зазубриной

377. Выберите правильный ответ

Интервал PQ на ЭКГ соответствует

- ☐ возбуждению миокарда желудочков
- ☐ возбуждению миокарда предсердий
- ☒ атриовентрикулярной проводимости
- ☐ процессу выхода из возбуждения основания желудочков

378. Выберите правильный ответ

Признаки синусового ритма на ЭКГ

- ☐ RR не равны RR, зубец Р перед QRS отсутствует, ЧСС 56 ударов в минуту
- ☐ RR = RR равны, зубец P(-) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(+) перед QRS, ЧСС 74 удара в минуту
- ☒ RR = RR равны, зубец P(+) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(-) перед QRS, ЧСС 80 ударов в минуту
- ☐ RR = RR, зубец P(-) после QRS во II отведении, ЧСС 50 ударов в минуту

379. Выберите правильный ответ

При правильном синусовом ритме частота сердечных сокращений на ЭКГ определяется по формуле

- ☐ 600: R-R
- ☐ R-R: 60
- ☒ 60: R-R
- ☐ 60: P-P

380. Выберите правильный ответ

Горизонтальное смещение сегмента ST на ЭКГ более чем на 1 мм от изолинии характерно для

- ☒ ишемии миокарда
- ☐ передозировки сердечных гликозидов
- ☐ гипокалиемии
- ☐ перикардита

381. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 500 Дж
- ☒ 360 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☐ 50 Дж

382. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию бифазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 300 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☒ 150 Дж
- ☐ 50 Дж

383. Выберите правильный ответ

Перед проведением первого разряда электрической дефибрилляции необходимо

- ☐ проводить непрямой массаж сердца в течение 7 минут

☒ выявить картину крупноволновой фибрилляции желудочков на мониторе электрического дефибриллятора

- ☐ ввести лидокаин
- ☐ ввести гидрокарбонат натрия

384. Выберите правильный ответ

Энергия второго и последующих разрядов (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ не проводится
- ☐ проводится с увеличивающейся энергией 200-300-360 Дж
- ☐ проводится с постоянной энергией 200-200-200 Дж
- ☒ проводится с постоянной энергией 360-360-360 Дж

385. Выберите правильный ответ

Если остановка кровообращения развилась без свидетелей и на мониторе электрического

дефибриллятора выявляется крупноволновая фибрилляция желудочков, необходимо

- ☐ внутривенно или эндотрахеально ввести лидокаин в дозе 1 мг/кг
- ☐ нанести удар по груди
- ☒ провести электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом разрядом 360 Дж
- ☐ ввести 1 мг адреналина внутрисердечно и начать непрямой массаж сердца

386. Выберите правильный ответ

Если на мониторе электрического дефибриллятора регистрируется асистолия, следует

- ☐ начать закрытый массаж сердца, внутривенно или внутрисердечно ввести лидокаин, адреналин и кальция хлорид
- ☒ начать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, ввести внутривенно или эндотрахеально адреналин
- ☐ провести электрическую дефибрилляцию
- ☐ отказаться от проведения реанимационных мероприятий

387. Выберите правильный ответ

Альтернативой интубации трахеи на догоспитальном этапе для поддержания проходимости дыхательных путей и защиты их от аспирации желудочного содержимого является

- ☐ орофарингеальный воздуховод
- ☐ выполнение тройного приема Сафара
- ☒ ларингеальная трубка
- ☐ желудочный зонд

388. Выберите правильный ответ

Укажите фактор, не влияющий на точность пульсоксиметрии

- ☐ темный лак для ногтей
- ☒ темный цвет кожи
- ☐ аномальные формы гемоглобина
- ☐ плохая тканевая перфузия

389. Выберите правильный ответ

Норма SpO₂

- ☐ 90-95%
- ☒ >95%
- ☐ 80-90%
- ☐ >80%

390. Выберите правильный ответ

К противопоказанию для использования combitube не относятся

- ☐ пациенты ростом меньше 122 см
- ☐ пациенты с ненарушенным глоточным рефлексом
- ☐ пациенты, проглотившие едкие вещества
- ☒ пациенты с оценкой по шкале ком Глазго 5 баллов

Специальность «Лечебное дело»

Первая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите правильный ответ

Медицинская деонтология

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента
- ☒ учение о профессиональном долге

2. Выберите правильный ответ

Преувеличение больным имеющихся симптомов, субъективных жалоб

- ☐ симуляция
- ☒ аггравация
- ☐ диссимуляция
- ☐ ипохондрия

3. Выберите правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

4. Выберите правильный ответ

Ятрогенные заболевания

- ☐ обусловленные вредными факторами производства
- ☒ вызванные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболевания с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболевания наследственного генеза

5. Выберите два правильных ответа

Термин «деловая субординация» – это

- ☒ распоряжения старшего по должности, являются обязательными для подчиненных
- ☐ демократизм в отношениях коллег
- ☒ уважение к старшим по должности
- ☐ панибратство

6. Выберите два правильных ответа

Профессиональная тайна – это

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

7. Выберите три правильных ответа

Основные задачи медицинской этики

- ☒ добросовестный труд
- ☒ внимательное и заботливое отношение к пациенту
- ☒ готовность всегда и при всех условиях оказать помощь пациенту
- ☐ социально-психологическая помощь
- ☐ чувство коллегиальности
- ☐ соблюдение дисциплины

8. Выберите правильный ответ

Уровень общения медицинского персонала с пациентом

- ☐ доверительный
- ☐ социальный
- ☐ внушительно-убеждающий
- ☒ межличностный

9. Выберите правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс
- ☐ медицинский этикет
- ☐ медицинская деонтология
- ☒ медицинская этика

10. Выберите правильный ответ

Эвтаназия в России

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

11. Установите соответствие между дистанциями при общении

интимная	от 15 до 45 см.
личная	45–120 см
социальная	120 до 400 см
	от 400 см и более

12. Установите соответствие между типами отношения к болезни (А. Е. Личко, Н. Л. Иванов, 1980)

правильная, трезвая оценка состояния, нежелание обременять других тяготами ухода за собой	гармонический
"уход от болезни в работу", желание сохранить работоспособность	эргопатический
активное отбрасывание мысли о болезни	анизогностический
	тревожный

13. Установите соответствие между типами отношения к болезни (А. Е. Личко, Н. Л. Иванов, 1980)

крайняя сосредоточенность на субъективных ощущениях и преувеличение их значения, боязнь побочного действия лекарств, процедур	ипохондрический
"уход от болезни в работу", желание сохранить работоспособность	неврастенический
поведение по типу "раздражительной слабости". Нетерпеливость и вспышки раздражения на окружающих (особенно при болях), затем — сожаление вплоть до слез и раскаяния	меланхолический
	тревожный

14. Установите соответствие между уровнями обработки рук

перед приемом пищи, при любом загрязнении	социальный
перед и после выполнения инвазивных процедур	гигиенический
перед любым хирургическим вмешательством	хирургический

15. Установите соответствие между путями распространения ВБИ

экзогенный	аэрозольный, контактный
эндогенный	артифициальный, гематогенный, лимфогенный
	фекально-оральный, контактный

16. Установите соответствие между методами дезинфекции

встряхивание, мытьё, протира-ние, влажная уборка	механиче-ский
кипячение, пастеризация, УФ облучение, воздействие горячего воздуха	физиче-ский
орошение, протираание, погруже-ние в дезинфектанты	химиче-ский
антагонистическое действие микроорганизмов	биологи-ческий

17. Установите соответствие между катего-риями опасности отходов

отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов	класс А (не-опасные от-ходы)
потенциально инфицирован-ные отходы	класс Б (опасные)
материалы, контактирующие с больными ООИ, отходы фтизиатрических, микологи-ческих стационаров	класс В (чрезвычайно опасные)
просроченные лекарственные средства, отходы от лекарст-	класс Г (близкие к

венных и диагностических препаратов, ртутьсодержа-щие предметы	промышлен-ным)
отходы содержащие радиоак-тивные компоненты	

18. Установите соответствие между опре-делениями

фармакокинетика	изучает распределение ЛС в организме
фармакодинамика	изучает механизмы дей-ствия ЛС
	изучает безопасность ис-пользования ЛС

19. Установите соответствие формы тубер-кулеза внутригрудных лимфатических узлов и рентгенологической картины корня легкого

инфильтративная	широкий, средней интен-сивности, нечеткие кон-туры
туморозная	широкий, высокой интен-сивности, полициклические контуры
	неструктурный с включе-ниями высокой интен-сивности (кальцинатами)

20. Установите соответствие между форма-ми туберкулеза внутригрудных лимфатиче-ских узлов и их клинических проявлений

инфильтративная	симптомы интоксика-ции выражены умерен-но
туморозная	симптомы интоксика-ции выражены значи-тельно
	симптомы интоксика-ции отсутствуют

21. Установите соответствие формы тубер-кулеза внутригрудных лимфатических узлов и ее клинических проявлений

инфильтративная	кашель редкий сухой
туморозная	кашель приступообраз-ный, коклюшеподобный
	кашель с гнойной мок-ротой

22. Установите соответствие между мето-дами

дезинфекция	метод уничтожения услов-но-патогенных и патоген-ных форм микроорганиз-мов
стерилизация	процесс уничтожения на изделиях медицинского назначения всех форм жиз-недеятельности микроор-ганизмов
	процесс уничтожения ви-русов и простейших

23. Выберите правильный ответ

После использования фонендоскоп протирается раствором

- ☐ перекиси водорода 3-процентного
- ☐ лизафина 2-процентного
- ☐ хлорамина 3-процентного
- ☒ этилового спирта 70-процентного

24. Выберите два правильных ответа

Для защиты медицинского персонала от воздушно-капельных инфекций

- ☐ ватно-марлевые повязки
- ☒ одноразовые маски
- ☐ защитные экраны
- ☒ респираторы
- ☐ защитные очки

25. Выберите два правильных ответа

При выполнении инвазивных процедур используются перчатки

- ☒ нестерильные смотровые
- ☒ хирургические стерильные
- ☐ промышленные
- ☐ хозяйственные
- ☐ использование перчаток не обязательно

26. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обширными травмами используются перчатки

- ☐ промышленные
- ☐ хозяйственные
- ☐ смотровые нестерильные
- ☒ хирургические стерильные

27. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обильным наружным кровотечением используют

- ☐ одну пару перчаток
- ☒ две пары перчаток
- ☐ три пары перчаток
- ☐ использование перчаток не обязательно

28. Выберите правильный ответ

Число этапов обработки клинка ларингоскопа

- ☐ один
- ☐ два
- ☒ три
- ☐ четыре

29. Выберите правильный ответ

Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких обрабатываются

- ☐ после окончания смены
- ☒ после каждого пациента
- ☐ не обрабатываются
- ☐ раз в 3 дня

30. Выберите правильный ответ

К индивидуальным средствам защиты от внутрибольничных инфекций не относятся

- ☐ халаты, фартуки, хлопчатобумажные костюмы

- ☐ медицинские шапочки
- ☒ индивидуальные шприцы
- ☐ лицевые маски, респираторы

31. Выберите правильный ответ

Частота смены респиратора при эпидемиологическом неблагополучии по гриппу каждые

- ☐ шесть часов
- ☒ два часа
- ☐ три часа
- ☐ восемь часов

32. Выберите правильный ответ

Выбор режима дезинфекции машин скорой медицинской помощи после госпитализации инфекционного больного зависит

- ☒ от стойкости возбудителя во внешней среде
- ☐ от тяжести болезни пациента
- ☐ от путей передачи инфекции
- ☐ от сроков заболевания

33. Выберите правильный ответ

После проведения инвазивных манипуляций шприцы с иглами, шарики, салфетки

- ☐ оставляют на месте оказания медицинской помощи
- ☐ собирают в полиэтиленовый пакет
- ☒ собирают в контейнер
- ☐ в лоток

34. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы обеззараживают

- ☐ сразу после использования, погружая в емкость с дезинфицирующим раствором
- ☒ в отделе обеспечения на станции скорой помощи
- ☐ не обеззараживают
- ☐ в комнате временного хранения отходов

35. Выберите два правильных ответа

К отходам класса Б относят

- ☐ ватные шарики от больного лихорадкой Денге
- ☒ салфетки, загрязненные выделениями пациента, в т.ч. кровью
- ☐ отходы, не контактирующие с биологическими жидкостями пациента
- ☒ пищевые отходы из инфекционного отделения
- ☐ мусор из административных помещений

36. Выберите правильный ответ

Правила снятия перчаток с рук после манипуляции

- ☒ перчатки снимают и дезинфицируют в дезрастворе
- ☐ перчатки моют под краном и снимают
- ☐ перчатки обрабатывают салфеткой, не снимая, затем моют под краном и снимают
- ☐ перчатки обрабатывают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, не снимая, моют проточной водой, снимают и дезинфицируют в дезрастворе

37. Выберите правильный ответ

Обработка одноразовых изделий медицинского назначения

- ☒ дезинфекция и утилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка
☐ предстерилизационная очистка, стерилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка, утилизация

38. Установите соответствие между названием категории и предметами относящихся к ним

критические предметы (высокий риск инфицирования)	хирургические инструменты, иглы, сосудистые катетеры, мочевые катетеры
полукритические (средний риск инфицирования)	гибкие эндоскопы, ларингоскопы, ингаляционное оборудование
	фонендоскопы, термометры, поверхности столов

39. Установите соответствие между лекарственными формами

твёрдые	таблетки, капсулы, драже
мягкие	свечи, мази
жидкие	растворы, отвары, настойки
	аэрозоли

40. Установите соответствие между токсикологическими группами

список А	морфин, омнопон, фентанил, промедол
список Б	клофелин, барбитал
	анальгин, аспирин

41. Установите соответствие путями применения лекарственных средств

внутренний	перорально, сублингвально, ректально
парентеральный	сосуды, полости, мозговые оболочки
	кожные покровы, глаза, уши

42. Установите соответствие между типами растворов (по электролитному балансу)

изотонические	концентрация соответствует средам организма (0,9% раствор натрия хлорида)
гипертонические	концентрация солей выше жидких сред организма (10% раствор натрия хлорида)
	концентрация солей ниже нормальных жидких сред организма

43. Установите соответствие между осложнениями инъекций и их проявлениями

инфильтрат	уплотнение, гиперемия, болезненность в месте инъекции
абсцесс	гиперемия, боль при пальпации, лихорадка
эмболия	удушье, кашель, цианоз

44. Установите соответствие между видами дезинфекции

профилактическая	предупредительная мера при отсутствии источника инфекции
очаговая	противоэпидемическая мера, в случае возникновения инфекции
	противоэпидемическая мера, в случае отсутствия очага инфекции

45. Установите соответствие между определениями

пиурия	гной в моче
гематурия	кровь в моче
протеинурия	белок в моче
	бактерии в моче

46. Установите соответствие между терминами и определениями

поллакиурия	учащенное мочеиспускание
ишурия	острая задержка мочи из-за невозможности самостоятельного мочеиспускания
странгурия	болезненное затрудненное мочеиспускание
	уменьшение суточного диуреза

47. Установите соответствие между терминами и определениями

анурия	отсутствие, непоступление мочи в мочевой пузырь
полиурия	увеличение суточного диуреза более 2 литров
никтурия	ночное преобладание мочи над дневным

48. Установите соответствие между видами мочевых катетеров

катетер Нелатона	прямой со слепым концом и овальным отверстием сбоку
катетер Фолея	с надувным баллоном для наполнения стерильной жидкостью
	прямой со слепым концом в виде изогнутого клюва и овальным отверстием сбоку

49. Установите соответствие между видами стом

еюностома	выведение участка тощей кишки
илеостома	выведение участка подвздошной кишки
колостома	выведение участка толстой кишки

50. Установите соответствие между классификацией лихорадочных состояний

субфебрильная	37,1-38,00 С
фебрильная	38,1-39,00 С
пиретическая	39,1- 41,00 С
	выше 41,00 С

51. Установите соответствие между температурными кривыми

постоянная	суточные колебания в пределах 1оС
гектическая	суточные колебания 3-5оС
извращенная	утренняя температура выше вечерней

52. Выберите правильный ответ

Туберкулез – это заболевание

- ☐ наследственное
- ☒ социальное
- ☐ зоонозное
- ☐ соматическое

53. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза

- ☐ вирус
- ☐ бактерия
- ☒ микобактерия
- ☐ кокк

54. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев

55. Выберите три правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный
- ☒ африканский
- ☐ свиной

56. Выберите правильный ответ

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☐ больное животное

57. Выберите правильный ответ

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

58. Выберите правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

59. Выберите правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

60. Выберите правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ в общественном транспорте
- ☐ случайный

61. Выберите два правильных ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска

62. Выберите два правильных ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

63. Выберите правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

64. Выберите правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

65. Выберите правильный ответ

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней

☐ 21 дня

66. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза

☒ вакцинация и ревакцинация против туберкулеза

☐ химиопрофилактика контактными лицами

☐ проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге

☒ раннее выявление больных туберкулезом

67. Выберите правильный ответ

Массовая туберкулинодиагностика проводится

☐ с 1 месяца

☐ с 3 месяцев

☐ с 6 месяцев

☒ с 12 месяцев

68. Выберите правильный ответ

Пробу Манту проводят 1 раз в год

☐ до 14 лет

☐ до 15 лет

☒ до 18 лет

☐ до 30 лет

69. Выберите правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

☐ бактерия

☐ микобактерия

☒ вирус

☐ кокк

70. Выберите правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

☐ вспышка

☐ эпидемия

☒ пандемия

☐ групповые заболевания

71. Выберите правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

☒ нагревание при 56°C в течение 30 минут

☐ ультрафиолетовое облучение

☐ нагревание при 56°C в течение 1 минуты

☐ воздействие радиации

72. Выберите правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

☐ больной человек

☐ больное животное

☐ вирусоноситель

☒ человек с момента заражения

73. Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

☐ слюна

☐ слезная жидкость

☒ кровь

☐ спинномозговая жидкость

74. Выберите правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

☒ искусственный

☐ фекально-оральный

☐ воздушно-капельный

☐ трансмиссивный

75. Выберите правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

☒ парентеральный, половой, вертикальный

☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный

☐ вертикальный, контактный, пищевой

☐ половой, водный, контактно-бытовой

76. Выберите три правильных ответа

ВИЧ не передается

☒ через рукопожатия

☒ через укусы насекомых

☐ при половых контактах

☐ во время беременности

☒ при разговоре

77. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

☒ кровь

☐ секрет потовых желез

☐ моча

☒ сперма

☒ грудное молоко

☐ слюна

78. Выберите правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

☐ 3–6 месяцев

☐ 3–6 недель

☒ 2–3 недели

☐ 2–3 месяца

79. Выберите правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

☐ до 8 месяцев

☒ до 12 месяцев

☐ до 2 лет

☐ 5–10 лет

80. Выберите правильный ответ

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

☐ Уголовный кодекс

☐ Конституция РФ

☐ Трудовой кодекс

☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

81. Выберите правильный ответ

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

☐ близкий родственник

☐ дежурный (лечащий) врач или родственник

☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач

☐ законный представитель

82. Выберите правильный ответ

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- ☐ паспорт
- ☒ страховой медицинский полис
- ☐ медицинская карта амбулаторного пациента
- ☐ история болезни

83. Выберите правильный ответ

Обязательное медицинское страхование в РФ

- ☐ имущественное
- ☐ личное
- ☒ всеобщее
- ☐ групповое

84. Выберите правильный ответ

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- ☒ обязательно
- ☐ желательно
- ☐ необязательно
- ☐ по согласованию

85. Выберите два правильных ответа

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное
- ☐ коллективное

86. Выберите правильный ответ

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
- ☒ 15-ти летнего возраста
- ☐ 16-ти летнего возраста
- ☐ 17-ти летнего возраста

87. Выберите правильный ответ

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- ☐ обязательного
- ☒ добровольного
- ☐ любого
- ☐ всеобщего

88. Выберите два правильных ответа

Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается

- ☐ при плановом проведении медицинского вмешательства
- ☒ в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- ☒ если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
- ☐ для устранения угрозы жизни человека
- ☐ не допускаются

89. Выберите правильный ответ

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения в настоящее время

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом от населения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

90. Установите соответствие признаков смерти

клиническая	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая	кошачий глаз
	пульс аритмичный
	дыхание стридорозное

91. Установите соответствие признаков ком при диабете

гипогликемическая	диплопия, головокружение
гипергликемическая	полиурия, жажда, сухость кожи
	повышение температуры
	розовая, пенистая мокрота

92. Установите соответствие причин развития ком при диабете

гипогликемическая	передозировка инсулина
гипергликемическая	ошибочно снижена доза инсулина
	курение
	прием алкоголя

93. Установите соответствие факторов риска для развития шоков

травматический	кровопотеря, охлаждение
гемолитический	переливание несовместимой крови
	аллергия
	сепсис

94. Установите соответствие признаков фаз травматического шока

эректильная	гиперемия лица, пульс учащен, напряженный
торпидная	кожа бледная, АД снижается
	брадикардия, повышение АД
	пульс и АД в пределах нормы

95. Установите соответствие глазных симптомов терминальному состоянию

клиническая смерть	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая смерть	«кошачий глаз»
	узкий зрачок
	анизокория

96. Установите соответствие между видом обследования и его значением

аускультация	выслушивание
перкуссия	выстукивание
пальпация	ощупывание
	измерение роста и массы тела

97. Установите соответствие пути и способа введения лекарственных средств

парентеральный	в вену
энтеральный	в прямую кишку
	через дыхательные пути

98. Установите соответствие между термином и определением

кризис	быстрое снижение температуры
лизис	постепенное снижение температуры
	повышение температуры тела до 37,5°C

99. Установите соответствие сестринских вмешательств от периода лихорадки

первый период лихорадки	согреть, укрыть теплом
второй период лихорадки	холод к голове
	провести ножные ванны

100. Установите соответствие сестринских вмешательств при следующих состояниях

обмороке	к носу вату, смоченную нашатырным спиртом
коллапсе	обеспечить приток свежего воздуха, грелку к ногам
	придать положение с возвышенным изголовьем

101. Установите соответствие места наложения жгута по отношению к ране при

венозном кровотечении	ниже раны
артериальном кровотечении	выше раны
	место не имеет значения

102. Выберите два правильных ответа

Основными причинами развития инфекционно-токсического шока при менингококковой инфекции являются

- ☐ потеря жидкости
- ☐ повышение гематокрита
- ☐ потеря плазмы и форменных элементов крови
- ☒ бактериемия
- ☒ эндотоксемия

103. Выберите правильный ответ

Патогномоничный признак отравления окисью углерода у детей

- ☐ глубокий сон
- ☐ приступ апноэ
- ☒ карминно-розовая окраска кожи
- ☐ тяжелая гипотония мышц

- ☐ синюшность кожных покровов

104. Выберите правильный ответ

Количество промывной жидкости

- ☒ 1 литр на год жизни
- ☐ 0,5 литра на год жизни
- ☐ 1,5 литра на год жизни
- ☐ 0,1 литра на год жизни

105. Выберите правильный ответ

Промывать желудок можно

- ☐ раствором гидрокарбоната-натрия
- ☐ раствором кислоты
- ☐ водой с добавлением перманганата калия
- ☒ чистой водой

106. Выберите правильный ответ

Токсическое действие угарного газа вызывает

- ☒ образование карбоксигемоглобина
- ☐ образование метгемоглобина
- ☐ гемолиз эритроцитов
- ☐ образование оксигемоглобина

107. Выберите правильный ответ

Пути попадания отравляющих веществ в организм ребенка

- ☐ через рот
- ☐ через кожу
- ☐ через дыхательные пути
- ☒ через рот, через кожу, через дыхательные пути

108. Выберите правильный ответ

Скрытый период отсутствует при проникновении яда через

- ☐ желудок
- ☐ кожу
- ☐ легкие
- ☒ местном воздействии прижигающих ядов

109. Выберите правильный ответ

Острый аппендицит у детей чаще всего встречается

- ☐ у детей до 1-го года
- ☐ с 1 до 3-х лет
- ☐ 4-7 лет
- ☒ старше 8-ми лет

110. Выберите правильный ответ

Какие симптомы характерны для начальных проявлений острого аппендицита у детей раннего возраста

- ☒ боли в области пупка
- ☐ многократная рвота
- ☐ боли в правой подвздошной области
- ☐ жидкий стул

111. Выберите правильный ответ

Наиболее часто встречаемая форма непроходимости у детей

- ☒ инвагинация кишечника
- ☐ спаечная непроходимость
- ☐ странгуляционная непроходимость
- ☐ обтурационная непроходимость

112. Установите соответствие между признаками биологической смерти

ранние	пятка Лярше, симптом Белоглазова
поздние	трупное окоченение, трупное разложение
	отсутствие сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса

113. Установите соответствие между признаками биологической смерти и временем их возникновения

симптом Белоглазова	15-20 минут
трупные пятна	30 минут
трупное окоченение	2-4 часа
	более 24 часов

114. Установите соответствие между ритмами ЭКГ при остановке кровообращения

недефибрилируемые	электрическая активность без пульса (ЭМД), асистолия
дефибрилируемые	фибриляция желудочков, желудочковая тахикардия без пульса
	синусовая тахикардия, синусовая брадикардия

115. Установите соответствие между методикой дефибрилляции при первом разряде

монофазный импульс	360 Дж
бифазный импульс	150 Дж
	450 Дж

116. Установите соответствие между соотношениями компрессий к искусственным вдохам при проведении СЛР

взрослые	30:2 вне зависимости от количества реаниматоров
дети	15:2 если двое реаниматоров, 30:2 если один реаниматор
новорожденные	3:1
	5:1 если двое реаниматоров, 15:2 если один реаниматор

117. Установите соответствие между этапами СЛР

Этап А (airways)	восстановление проходимости дыхательных путей
Этап В (breathing)	поддержание дыхания
Этап С (circulation)	поддержание кровообращения
	введение лекарств и жидкостей

118. Установите соответствие между симптомами обменных судорог при спазмофилии у детей

симптом Хвостека	сокращение мышц лица при поколачивании в области скуловой дуги
симптом Люста	непроизвольное тыльное сгибание, отведение и ротация стопы при сдавливании голени в верх-

	ней трети
симптом Труссо	«рука акушера» при сдавливании верхней трети плеча
	кратковременная остановка дыхания на вдохе в ответ на болевой раздражитель

119. Выберите правильный ответ

Чаще всего инвагинация кишечника встречается в возрасте

- ☐ 1-6 месяцев
- ☒ 6-18 месяцев
- ☐ старше 3-х лет
- ☐ младший школьный

120. Выберите два правильных ответа

Какие препараты чаще всего используются для купирования судорог у детей

- ☒ сибазон
- ☐ аминазин
- ☐ дроперидол
- ☐ гексенал
- ☒ оксибутират-натрия

121. Выберите три правильных ответа

Характерные симптомы при инвагинации кишечника

- ☒ схваткообразные боли
- ☒ выделение крови из прямой кишки
- ☒ определение инвагината при пальпации
- ☐ рвота кофейной гущей
- ☐ судороги
- ☐ повышение температуры

122. Выберите три правильных ответа

Признаки гипокальциемических судорог у детей

- ☐ очаговый характер
- ☒ ларингоспазм
- ☐ положительный эффект введения седуксена
- ☒ положительный симптом Хвостека
- ☒ карпопедальный спазм
- ☐ положительная менингеальная симптоматика

123. Выберите правильный ответ

Какое осложнение чаще всего возникает при высокой лихорадке у детей раннего возраста

- ☐ острая почечная недостаточность
- ☐ недостаточность кровообращения
- ☒ судороги
- ☐ отек легких

124. Выберите правильный ответ

Для острого стенозирующего ларинготрахеита нехарактерно

- ☒ обилие влажных хрипов в легких
- ☐ инспираторной одышки
- ☐ отрывистого кашля
- ☐ измененного голоса

125. Выберите правильный ответ

Для острого эпиглоттита нехарактерно

- ☐ подъем температуры

- ☐ интоксикация
☐ быстрое начало
☒ наличие «лающего» кашля

126. Выберите два правильных ответа

Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется

- ☒ появлением одышки при нагрузке
☐ появлением одышки в покое
☒ втяжением яремной ямки при вдохе
☐ втяжением всех уступчивых мест грудной клетки
☐ спутанностью сознания

127. Выберите правильный ответ

Чаше острый стенозирующий ларинготрахеит развивается

- ☐ летом
☐ зимой
☐ независимо от времени года
☒ зимой и весной

128. Выберите правильный ответ

Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей развивается в возрасте

- ☒ от 6 мес до 3 лет
☐ от 3 до 5 лет
☐ старше 5 лет
☐ в период новорожденности

129. Выберите два правильных ответа

Для стеноза гортани 2 стадии характерно

- ☒ участие вспомогательной мускулатуры при вдохе в покое
☒ акроцианоз в покое
☐ сопор
☐ участие вспомогательной дыхательной мускулатуры при беспокойстве
☐ экспираторная одышка в покое

130. Установите соответствие названия заболевания его рентгенологическим данным

Очаговая пневмония	очаг затемнения с четкими границами
Крупозная пневмония	очаг затемнения с нечеткими границами
	полость с уровнем жидкости

131. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов дыхания

Преходящий синдром обструкции	ХОБЛ
Постоянный синдром обструкции	бронхиальная астма
	пневмония

132. Установите соответствие рентгенологических данных названию заболевания

Повышенная воздушность легочной ткани, снижение высоты стояния диафрагмы	эмфизема легких
Усиление легочного рисунка по всем полям	пневмоклетка

	роз
	ХОБЛ

133. Установите соответствие физикальных данных заболеваниям органов дыхания

Небольшое притупление легочного звука, жесткое дыхание	долевая пневмония
Выраженное притупление легочного звука, бронхиальное дыхание, крепитация	очаговая пневмония
	абсцесс

134. Установите соответствие данных исследования мокроты заболеваниям органов дыхания

Спираль Куршмана, кристаллы Шарко - Лейдена	абсцесс легкого
Эластические волокна	бронхиальная астма
	бронхит

135. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов кровообращения

Систолический шум на верхушке	митральный стеноз
Диастолический шум на верхушке	митральная недостаточность
	аортальный стеноз

136. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов кровообращения

Систолический шум на аорте	аортальный стеноз
Диастолический шум на аорте	аортальная недостаточность
	митральный стеноз

137. Установите соответствие клинических проявлений названию заболеваний

Поражение крупных суставов, симметричность, летучесть	ревматический полиартрит
Поражение мелких суставов кистей, плавники «моржа»	ревматоидный полиартрит
	артрозы

138. Установите соответствие факторов риска ИБС

Эндогенные	курение, гиподинамия, стрессы
Экзогенные	пол, возраст, ожирение
	экология

139. Установите соответствие клинических проявлений названию заболеваний

Экспираторная одышка, сухие хрипы	сердечная астма
Инспираторная одышка, влажные хрипы	бронхиальная астма
	бронхит

140. Установите соответствие клинических проявлений названию гипертонического криза

Тахикардия, повышение преимущественно систолического АД	гипертонический криз 1-го типа
Брадикардия, повышение преимущественно диастолического АД	гипертонический криз 2-го типа
	феохромоцитома

141. Установите соответствие клинических проявлений названию вида сердечной недостаточности

Отеки на ногах, асцит, увеличение печени	хроническая левожелудочковая недостаточность
Ночная одышка, влажные хрипы в легких, акцент 2-го тона на легочной артерии	хроническая правожелудочковая недостаточность
	отёк лёгких

142. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов кровообращения

Шум трения перикарда	сухой перикардит
Тоны сердца глухие	экссудативный перикардит
	плеврит

143. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов кровообращения

Боли за грудиной, длительно, купировавшиеся нитроглицерином	Инфаркт миокарда
Боли за грудиной, длительно, более 30 минут, не купирующиеся нитроглицерином	Стенокардия
	шок

144. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов кровообращения

Симптомы сердечной недостаточности есть	пороки сердца в стадии компенсации
Симптомов сердечной недостаточности нет	пороки сердца в стадии декомпенсации
	миокардит

145. Установите соответствие названия заболевания и его этиологии

Хронический гастрит типа А	хеликобактерная инфекция
Хронический гастрит типа В	аутоиммунный процесс
Хронический холецистит	описторхоз

	лямблиоз
--	----------

146. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов пищеварительной системы

Хронический панкреатит	жирный кал
Механическая желтуха	мелена
Желудочно – кишечное кровотечение	обесцвеченный кал
	кал обычного цвета

147. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов пищеварительной системы

Паренхиматозная желтуха	гемолитическая анемия
Механическая желтуха	желчнокаменная болезнь
Гемолитическая желтуха	гепатит
	гастрит

148. Выберите правильный ответ

Профилактика лекарственной аллергии фельдшером заключается в

- ☒ сборе аллергоанамнеза
- ☐ сборе анамнеза заболевания
- ☐ сборе анамнеза жизни
- ☐ назначении антигистаминного препарата

149. Выберите правильный ответ

Возможное осложнение при отеке Квинке

- ☒ асфиксия
- ☐ кожный зуд
- ☐ судороги
- ☐ непроизвольное мочеиспускание

150. Выберите правильный ответ

Ведущая группа препаратов при анафилактическом шоке

- ☐ плазмозамещающие
- ☐ мочегонные
- ☒ глюкокортикостероиды
- ☐ бронхолитики

151. Установите соответствие типа аллергической реакции и клинического диагноза

Аллергическая реакция немедленного типа	реакция отторжения трансплантата
Аллергическая реакция замедленного типа	отек Квинке
	коллапс

152. Установите соответствие видов аллергенов

Экзоаллергены	лекарственные, пищевые
Эндоаллергены	токсины паразитов
	анемия

153. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при почечной колике

- ☐ промедол, анальгин
☒ но-шпа, платифиллин
☐ преднизолон, кофеин
☐ супрастин, димедрол

154. Установите соответствие названия заболевания и клинических проявлений

Острый гломерулонефрит	лейкоцитурия, бактериурия
Острый пиелонефрит	гематурия, протеинурия
ХПН	азотемия, гиперкалиемия
	микрогематурия

155. Установите соответствие данных общего анализа мочи и диагноза

Колебания относительной плотности мочи 1010 - 1026	гипоизостенурия
Колебания относительной плотности мочи 1026 - 1036	норма
Колебания относительной плотности мочи 1007 – 1010	гиперизостенурия
	гипостенурия

156. Установите соответствие клинического диагноза и патоморфологии

Острый гломерулонефрит	острое воспалительное заболевание почечных клубочков
Острый цистит	острое воспалительное заболевание почечных канальцев
Острый пиелонефрит	острое воспалительное заболевание стенки мочевого пузыря
	цистит

157. Выберите правильный ответ

Обработка одноразовых изделий медицинского назначения

- ☒ дезинфекция и утилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка
☐ предстерилизационная очистка, стерилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка, утилизация

158. Установите соответствие между методами диагностики и приёмами обследования

субъективный	выявление жалоб и анамнез
объективный	визуальный осмотр
	биохимическое исследование крови
	определение онкомаркеров

159. Установите соответствие между способом временного гемостаза и видом кровотечения

наложение жгута	артериальное
давящая повязка	венозное
	паренхиматозное

160. Установите соответствие между методами диагностики и приёмами обследования

субъективный	выявление жалоб и анамнез
объективный	визуальный осмотр
	биохимическое исследование крови
	определение онкомаркеров

161. Установите соответствие между симптомами и методикой их определения

Ортнера	поколачивание ребром ладони по реберной дуге
Ситковского	усиление боли в положении на левом боку
	надавливание в надключичной ямке слева и справа

162. Установите соответствие между болевым синдромом и периодом перитонита

Боли локализованные	реактивный
Боли по всему животу	токсический
	терминальный

163. Выберите правильный ответ

Через какое время при инвагинации кишечника возникает задержка стула и газов

- ☐ 1-2 часа
☐ 3-5 часов
☒ 6-10 часов
☐ 12-24 часа

164. Выберите правильный ответ

Признаки начала первого периода родов

- ☐ излитие околоплодных вод
☐ наличие зрелой шейки матки
☒ появление регулярных схваток
☐ вставление головки во вход в малый таз

165. Выберите правильный ответ

Продолжительность первого периода родов у первородящих составляет (часов)

- ☐ 5-7
☒ 8-12
☐ 11-13
☐ 14-16

166. Выберите правильный ответ

Удлинение безводного промежутка не допустимо более (часов)

- ☐ 6
☐ 9
☒ 18
☐ 16

167. Выберите правильный ответ

Продолжительность второго периода родов у повторнородящих (часов)

- ☐ 0,5
☒ 0,5-1
☐ 1-1,5
☐ 1,5-2

168. Выберите правильный ответ

Период изгнания плода начинается с момента

- ☐ отхождения околоплодных вод
- ☒ полного открытия шейки матки
- ☐ начала потуг
- ☐ опущения головки на тазовое дно

169. Выберите правильный ответ

Продолжительность послеродового периода

- ☐ 1-2 недели
- ☐ 2-4 недели
- ☐ 4-6 недель
- ☒ 6-8 недель

170. Выберите два правильных ответа

Признаками тяжелой преэклампсии являются

- ☐ нормотония
- ☐ зрение ясное
- ☒ боль в эпигастральной области, рвота
- ☒ мелькание мушек перед глазами
- ☐ фибриллярные подергивания мышц лица

171. Выберите два правильных ответа

Осложнения беременности при сахарном диабете

- ☐ маловодие
- ☐ гипотрофия плода
- ☒ многоводие
- ☒ преэклампсия
- ☐ олигурия

172. Выберите два правильных ответа

Симптомами клинически узкого таза являются

- ☒ отсутствие поступательного движения головки плода
- ☒ положительный признак Вастена
- ☐ слабость родовой деятельности
- ☐ отрицательный признак Вастена
- ☐ свободное мочеиспускание

173. Выберите два правильных ответа

Проявлениями геморрагического шока являются

- ☒ гипотония
- ☒ тахикардия
- ☐ протеинурия
- ☐ брадикардия
- ☐ полиурия

174. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

175. Выберите правильный ответ

Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза

- ☐ резко повышено
- ☒ понижено
- ☐ незначительно повышено
- ☐ нормальное

176. Выберите правильный ответ

Повышение внутриглазного давления

- ☐ конъюнктивит
- ☐ ячмень

☐ нистагм

☒ глаукома

177. Выберите правильный ответ

Профилактика глаукомы

- ☐ назначение контактных линз
- ☐ проведение носо-слёзных проб
- ☒ регулярная тонометрия
- ☐ закапывания за веки витаминных препаратов

178. Выберите два правильных ответа

Необходимые правила при обработке при чесотке

- ☒ обработка вечером
- ☒ обработка всего кожного покрова
- ☐ обработка в утренние часы
- ☐ обработка поражённых участков кожи
- ☐ экспозиция любого препарата 6 часов

179. Выберите правильный ответ

Пациенты с рожистым воспалением на лице нуждаются

- ☒ в срочной госпитализации
- ☐ госпитализация не показана
- ☐ срочная изоляция
- ☐ срочное лабораторное исследование

180. Выберите правильный ответ

Морфологический элемент крапивницы

- ☒ волдырь
- ☐ пузырь
- ☐ бугорок
- ☐ узел

181. Выберите два правильных ответа

Признаки первичного периода сифилиса

- ☒ эрозия, язва
- ☒ увеличение регионарных лимфоузлов
- ☐ сгруппированные бугорки
- ☐ розеола, папулы
- ☐ мелкоочаговое облысение

182. Выберите два правильных ответа

Типичная локализация высыпаний при чесотке у взрослого человека

- ☒ кисти
- ☒ живот
- ☐ весь кожный покров
- ☐ волосистая часть головы
- ☐ лицо

183. Выберите правильный ответ

Самый контагиозный период сифилиса

- ☒ вторичный период
- ☐ первичный период
- ☐ третичный период
- ☐ инкубационный период

184. Выберите два правильных ответа

Возможные пути передачи чесотки

- ☒ использование белья больного
- ☒ половой контакт
- ☐ употребление недоброкачественной пищи
- ☐ укусы насекомых
- ☐ переливание крови

185. Выберите правильный ответ

Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является

- ☒ отсутствие пульса на сонных артериях
- ☐ отсутствие самостоятельного дыхания
- ☐ широкие зрачки
- ☐ отсутствие сознания

186. Выберите правильный ответ

При потере сознания у пациента, в первую очередь, необходимо проверить

- ☐ реакцию зрачков на свет
- ☐ наличие самостоятельного дыхания
- ☐ пульс на лучевой артерии
- ☒ пульс на сонных артериях

187. Выберите правильный ответ

Наиболее часто при клинической смерти остановка кровообращения проявляется на ЭКГ

- ☐ полной атриовентрикулярной блокадой
- ☐ асистолией
- ☒ фибрилляцией желудочков
- ☐ синусовой тахикардией

188. Выберите правильный ответ

Продолжительность клинической смерти (без проведения реанимационных мероприятий) при обычных условиях окружающей среды составляет

- ☐ 1 минуту
- ☐ 3 минуты
- ☒ 5 минут
- ☐ 15 минут

189. Выберите правильный ответ

Ранним признаком биологической смерти является

- ☐ отсутствие сознания
- ☐ трупное окоченение
- ☒ положительный симптом «кошачьего зрачка»
- ☐ асистолия

190. Выберите правильный ответ

Преимуществом масочной вентиляции легких является

- ☒ техническая простота подсоединения аппарата к больному
- ☐ надежность поддержания герметичности дыхательных путей
- ☐ предупреждение асфиксии вследствие западения корня языка
- ☐ предупреждение аспирации рвотных масс

191. Выберите правильный ответ

К преимуществам искусственной вентиляции через интубационную трубку не относятся

- ☐ обеспечение стабильной проходимости дыхательных путей
- ☒ предупреждение бронхоспазма
- ☐ профилактика аспирации желудочного содержимого
- ☐ герметичность дыхательных путей

192. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения искусственного дыхания свидетельствует

- ☐ видимое выбухание в эпигастрии
- ☒ наличие экскурсии грудной клетки
- ☐ парадоксальный пульс на сонных артериях
- ☐ видимое набухание шейных вен

193. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения непрямого массажа сердца свидетельствует

- ☐ видимое набухание шейных вен
- ☒ наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий грудной клетки
- ☐ перелом ребер
- ☐ наличие пульса на лучевой артерии

194. Выберите правильный ответ

Компрессия грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых выполняется с частотой

- ☐ 40-50 в минуту
- ☐ 60-70 в минуту
- ☒ 100 в минуту
- ☐ 110-120 в минуту

195. Выберите правильный ответ

При проведении реанимационного пособия не прямой массаж сердца и искусственное дыхание проводится в соотношении (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☒ 30:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 только при оказании помощи одним реаниматором
- ☐ 5:1 при оказании помощи двумя реаниматорами

196. Выберите правильный ответ

Суммарная доза адреналина при проведении СЛР взрослому

- ☐ составляет 1 мл 0,1 % раствора
- ☐ составляет 3 мл 0,1% раствора
- ☐ составляет 5 мл 0,1% раствора
- ☒ не ограничена

197. Выберите правильный ответ

Экспираторный характер одышки отмечается при

- ☐ абсцессе легкого, туберкулезе
- ☒ бронхиальной астме, ХОБЛ
- ☐ очаговой и долевой пневмониях
- ☐ отеке легких, сердечной астме

198. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки приступа бронхиальной астмы

- ☐ крепитация
- ☒ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☐ шум трения плевры

199. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки астматического статуса во II стадии

- ☐ крепитация
- ☐ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☒ «немое лёгкое»

200. Выберите правильный ответ

Инфаркт миокарда характеризуется болью

- ☐ колющая боль в области сердца
- ☐ ноющая боль в области сердца
- ☐ сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином
- ☒ сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином

2. Современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности

201. Выберите правильный ответ

Шина при переломе костей голени накладывается от кончиков пальцев до

- ☐ коленного сустава
- ☐ до нижней трети бедра
- ☐ до тазобедренного сустава
- ☒ до верхней трети бедра

202. Выберите правильный ответ

Открытый метод лечения ожогов показан при ожогах

- ☒ лица
- ☐ кистей
- ☐ стоп
- ☐ живота

203. Выберите правильный ответ

Термоизолирующая повязка применяется при

- ☐ ожогах
- ☒ отморожении
- ☐ общем замерзании
- ☐ озноблении

204. Выберите правильный ответ

Признак ушиба мягких тканей

- ☐ деформация
- ☒ боль, кровоподтёк
- ☐ крепитация
- ☐ гиперемия

205. Выберите правильный ответ

Дренирование раны обеспечивает

- ☒ отток содержимого
- ☐ заживление первичным натяжением
- ☐ образование грануляций
- ☐ ускорение регенерации

206. Выберите правильный ответ

Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей применяют

- ☐ сразу после травмы
- ☐ в ближайшие часы
- ☒ на 2–3 сутки
- ☐ через неделю

207. Выберите правильный ответ

Конечность иммобилизуется в том положении в котором оказалась после

- ☐ ушиба
- ☐ перелома
- ☐ растяжения

- ☒ вывиха

208. Выберите правильный ответ

Иммобилизации шейного отдела позвоночника проводится

- ☐ ватно-марлевым кругом
- ☒ воротником Шанца
- ☐ крестообразной повязкой
- ☐ кольцами Дельбе

209. Выберите правильный ответ

Окклюзионная повязка применяется при ранении

- ☐ живота
- ☐ головы
- ☐ шеи
- ☒ грудной клетки

210. Выберите правильный ответ

Транспортная иммобилизация обеспечивает

- ☐ профилактику кровотечения
- ☐ ускорение регенерации тканей
- ☐ психо-эмоциональный покой пациента
- ☒ профилактику травматического шока

211. Установите соответствие между наименованием заболеваний и возможными осложнениями

облитерирующие заболевания артерий	гангрена
варикозная болезнь	кровотечение
	флегмона

212. Установите соответствие между наименованием заболеваний и признаками онкозаболеваний

рак желудка	отвращение к мясной пище
рак молочной железы	симптом «площадки»
	постоянный субфебрилитет
	симптом флюктуации

213. Установите соответствие между видами повязок и повреждениями

термоизолирующая	при отморожении
герметичная	при ранении грудной клетки
иммобилизирующая	вывихе плеча
	при ушибе

214. Установите соответствие между наименованиями и признаками постинъекционных осложнений

инфильтрат	боль, гиперемия, уплотнение
абсцесс	боль, гиперемия флюктуация
	гиперемия в виде языков пламени

215. Установите соответствие между симптомами и методикой их определения

Ситковского	усиление боли в положении на левом боку
Георгиевского	надавливание в надключичной ямке слева и справа
	лёгкий толчок в левой подвздошной области

216. Установите соответствие между классификацией и видами опухолей

злокачественные	карцинома
доброкачественные	фиброаденома
	флегмона
	абсцесс

217. Задание {{ 217 }} ТЗ 217 Тема 1-2-0

Установите соответствие между причинами клинических синдромов и их проявлениями

повреждение полых органов живота	синдром перитонита
повреждение паренхиматозных органов	синдром внутреннего кровотечения
нарушение перистальтики в результате паралича мышц кишечника	синдром острой кишечной непроходимости
	синдром раздраженного кишечника

218. Установите соответствие между фазами раневого процесса гнойной раны и методами лечения

фаза гидратации	повязки с гипертоническим раствором натрия хлорида, иммобилизация
фаза дегидратации	повязки с левомиколем, ограничение движений
фаза эпителизации	мазевые повязки, снятие иммобилизации, ЛФК
	давящая повязка

219. Выберите правильный ответ

Доскообразный живот является признаком

- ☒ перфоративной язвы желудка
- ☐ острого аппендицита
- ☐ острого холецистита
- ☐ острого панкреатита

220. Выберите два правильных ответа

Пациента с переломом позвоночника транспортируют на твердых носилках

- ☒ лёжа на спине
- ☒ с валиками под физиологическими изгибами
- ☐ на правом боку
- ☐ на левом бок

221. Выберите два правильных ответа

Мероприятия доврачебной помощи при вывихе плеча

- ☒ транспортная иммобилизация
- ☐ вправление вывиха
- ☒ введение анальгетиков
- ☐ окклюзионная повязка

222. Выберите два правильных ответа

Способ транспортировки при переломе костей таза (лёжа)

- ☐ на животе на мягких носилках
- ☒ на твёрдых носилках
- ☒ в положении «лягушки»
- ☐ на боку

223. Выберите два правильных ответа

Укушенным животными пациентам проводится профилактика

- ☒ столбняка
- ☐ газовой гангрены
- ☒ бешенства
- ☐ актиномикоза

224. Выберите два правильных ответа

Транспортная иммобилизация проводится шинами

- ☒ Крамера
- ☒ пневматическими
- ☐ Белера
- ☐ Кузьминского

225. Выберите два правильных ответа

Мероприятия профилактики ожогового шока на догоспитальном этапе

- ☒ введение анальгетика
- ☐ асептической повязки
- ☐ антибиотикотерапия
- ☒ инфузионная терапия

226. Выберите правильный ответ

Синдром рикошета наблюдается при применении

- ☐ В-2 агонистов 3-4 раза в день
- ☐ М-холиноблокаторов
- ☒ В-2-агонистов чаще 6 раз в день
- ☐ глюкокортикостероидов

227. Выберите правильный ответ

Механизм действия глюкокортикостероидов при купировании приступов бронхиальной астмы

- ☐ противокашлевой
- ☒ противовоспалительный
- ☐ противоаллергический
- ☐ противошоковый

228. Выберите правильный ответ

Побочное действие эуфиллина

- ☐ повышение АД
- ☐ брадикардия
- ☐ сонливость
- ☒ тахикардия

229. Выберите правильный ответ

Длительность действия В-2 агонистов короткого действия

- ☐ 2-4 часа
- ☒ 4-6 часов
- ☐ 6-8 часов
- ☐ 8-10 часов

230. Выберите правильный ответ

Тахикардия - это побочное явление

- ☐ атровента
- ☒ сальбутамола
- ☐ беродуала
- ☐ спирива

231. Выберите правильный ответ

Побочное явление ингаляционных ГКС

- ☐ повышение АД
- ☒ кандидоз полости рта
- ☐ синдром «Кушингоида»
- ☐ повышение массы тела

232. Выберите правильный ответ

Механизм действия беротека

- ☐ блокада М холинорецепторов
- ☒ стимуляция В-2 адренорецепторов
- ☐ стимуляция М холинорецепторов
- ☐ блокада гистаминорецепторов

233. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при инфаркте миокарда

- ☐ валидол, лазикс
- ☐ корвалол, пентамин
- ☒ морфин, актилизе
- ☐ но- шпа, атропин

234. Выберите правильный ответ

Отек легких - это форма острой недостаточности

- ☐ коронарной
- ☒ левожелудочковой
- ☐ правожелудочковой
- ☐ сосудистой

235. Выберите правильный ответ

Самое грозное осложнение фибрилляции предсердий

- ☐ приступ стенокардии
- ☐ гипертонический криз
- ☒ тромбоэмболии
- ☐ коллапс

236. Выберите правильный ответ

Аускультативно при гипертоническом кризе

- ☐ ослабление первого тона на верхушке
- ☐ ослабление второго тона на верхушке
- ☒ акцент второго тона на аорте
- ☐ акцент второго тона на легочной артерии

237. Выберите правильный ответ

Удушье и обильная пенная розовая мокрота на фоне гипертонического криза - это

- ☐ долевая пневмония
- ☐ легочное кровотечение
- ☒ отек легких
- ☐ тромбоэмболия легочной артерии

238. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы кардиогенного шока

- ☐ лихорадка, тахикардия
- ☐ кашель, одышка
- ☒ снижение АД, частый нитевидный пульс
- ☐ напряженный пульс

239. Выберите правильный ответ

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец

- ☐ Р
- ☒ Q
- ☐ R
- ☐ S

240. Выберите правильный ответ

Основным симптомом полной А-V блокады является

- ☐ коллапс
- ☐ одышка
- ☒ обморок
- ☐ лихорадка

241. Выберите два правильных ответа

Неотложная догоспитальная помощь при острой потере зрения в результате гипертонического криза

- ☒ 1 таблетка нитроглицерина под язык
- ☒ 2 мл - 2% р-ра папаверина гидрохлорида
- ☐ коррекция зрения очками
- ☐ тонометрия
- ☐ все выше перечисленные варианты

242. Выберите правильный ответ

Расширять зрачок нельзя при

- ☐ офтальмоскопии
- ☐ иридоциклите
- ☐ блефарите
- ☒ глаукоме

243. Выберите правильный ответ

Противопоказано при проникающем ранении глаза

- ☒ заложить за веки мазь
- ☐ промыть конъюнктивальную полость водой
- ☐ закапать 20% раствор сульфацила натрия
- ☐ провести тонометрию

244. Установите соответствие названия заболевания и его этиологии

Хронический гастрит типа А	хеликобактерная инфекция
Хронический гастрит типа Б	аутоиммунный процесс
Хронический холецистит	описторхоз
	лямблиоз

245. Установите соответствие клинических проявлений заболевания органов пищеварительной системы

Хронический панкреатит	жирный кал
Механическая желтуха	мелена
Желудочно – кишечное кровоте-	обесцвеченный кал

чение	
	кал обычного цвета

246. Установите соответствие клинических проявлений заболеваниям органов пищеварительной системы

Паренхиматозная желтуха	гемолитическая анемия
Механическая желтуха	желчнокаменная болезнь
Гемолитическая желтуха	гепатит
	гастрит

247. Установите соответствие типа аллергической реакции и клинического диагноза

Аллергическая реакция немедленного типа	реакция отторжения трансплантата
Аллергическая реакция замедленного типа	отек Квинке
	коллапс

248. Установите соответствие видов аллергенов

Экзоаллергены	лекарственные, пищевые
Эндоаллергены	токсины паразитов
	анемия

249. Выберите правильный ответ

Инородное тело из носа удаляют

- ☒ крючком
- ☐ пинцетом
- ☐ корцангом
- ☐ проволочной петлей

250. Выберите правильный ответ

Беспокойное поведение ребенка при надавливании на козлосок - симптом

- ☒ отита
- ☐ стоматита
- ☐ ангины
- ☐ нарушение прорезывания зубов

251. Выберите правильный ответ

Грязно-серый, трудно снимаемый налет на миндалинах, характерен для

- ☒ дифтерии
- ☐ аденоидов
- ☐ фолликулярной ангины
- ☐ лакунарной ангины

252. Выберите правильный ответ

Симптом «хлопка» характерен для

- ☒ инородного тела трахеи
- ☐ дифтерии гортани
- ☐ травмы гортани
- ☐ острого ларингита

253. Выберите правильный ответ

Признаки лакунарной ангины

- ☒ белый, легко снимающийся налет на миндалинах
- ☐ грязно-серые пленки на миндалинах, дужках, мягком небе трудно снимаются

☐ налетов нет

☐ темно-серый налет, легко снимается

254. Выберите два правильных ответа

Осложнения фурункула носа

- ☒ внутричерепные
- ☒ сепсис
- ☐ повышение АД
- ☐ носовое кровотечение
- ☐ серозные выделения из носа

255. Выберите правильный ответ

Транспортировка пациента при инородном теле в трахее

- ☒ в полусидячем положении
- ☐ лежа на боку
- ☐ лежа на спине
- ☐ лежа на животе

256. Выберите два правильных ответа

Неотложная помощь пациенту с носовым кровотечением

- ☒ голову пациента слегка наклонить вперед
- ☒ ввести в нижнюю треть полости носа гемостатическую губку
- ☐ голову пациента запрокинуть назад
- ☐ грелку на переносицу
- ☐ сосудосуживающие капли в нос

257. Выберите правильный ответ

Симптом натяжения при пояснично-крестцовом радикулите

- ☐ ригидность затылочных мышц
- ☒ симптом Ласега
- ☐ симптом Горнера
- ☐ симптом Брудзинского

258. Выберите правильный ответ

Артериальное давление при геморрагическом инсульте обычно

- ☒ повышено
- ☐ в норме
- ☐ понижено
- ☐ не меняется

259. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

260. Выберите правильный ответ

Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке (недель)

- ☐ 10-12
- ☐ 2-3
- ☒ 5-6
- ☐ 8-9

261. Выберите правильный ответ

Шейка матки при шейной беременности имеет форму

- ☒ бочкообразную
- ☐ цилиндрическую
- ☐ округлую

- ☐ коническую

262. Выберите правильный ответ

Трубный аборт возникает при имплантации плодного яйца в части маточной трубы

- ☐ истмической
☐ интерстициальной
☒ ампулярной
☐ интрамуральной

263. Выберите правильный ответ

Меноррагия - это менструации

- ☐ скудные короткие
☒ длительные обильные
☐ болезненные
☐ редкие

264. Выберите два правильных ответа

Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения чаще встречаются

- ☐ после родов
☒ в перименопаузальном периоде
☐ после аборта
☐ в репродуктивном возрасте
☒ в периоде полового созревания

265. Выберите правильный ответ

Основной клинический симптом подслизистой миомы матки

- ☐ боль внизу живота
☐ железодефицитная анемия
☒ меноррагия (гиперменструальный синдром)
☐ вторичное бесплодие

266. Выберите два правильных ответа

Апоплексия яичника - это

- ☐ воспаление яичников
☒ разрыв яичника
☒ кровоизлияние в яичник
☐ нарушение кровоснабжения яичника
☐ спаечный процесс

267. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод исследования при внематочной беременности

- ☒ пункция заднего свода влагалища
☐ осмотр наружных половых органов
☐ двуручное влагалищное исследование
☐ ректоабдоминальное исследование

268. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод остановки маточного кровотечения

- ☒ лечебно-диагностическое выскабливание
☐ осмотр наружных половых органов
☐ двуручное влагалищное исследование
☐ ректоабдоминальное исследование

269. Установите соответствие степеней тяжести геморрагического шока и шокowym индексом

компенсированный обратимый	0,9
декомпенсированный обратимый	1,2
	1,5

270. Установите соответствие между названиями патологии беременности и их клиникой

предлежание плаценты	отсутствие боли, внезапное кровотечение
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты	постоянная распирающая боль, нарастающая по интенсивности
	приступообразные боли с иррадиацией в бедро и прямую кишку

271. Установите соответствие патологических состояний и их клинических признаков

трубного аборта	кровотечение наружное, скудное, приступообразные боли
маточного аборта	кровотечение наружное, обильное
	постоянные ноющие боли
	кровотечение только внутреннее

272. Установите соответствие патологических состояний и их клинических признаков

апоплексия яичника	внутрибрюшное кровотечение, нет задержки менструации
внематочная беременность по типу разрыва маточной трубы	внутреннее кровотечение, задержка менструации
	мажущие кровянистые выделения, задержка менструации
	обильные кровянистые выделения, задержка менструации

273. Установите соответствие патологических состояний и методов исследования

рождающийся миоматозный узел	осмотр в зеркалах, зондирование матки
внематочная беременность	пункция заднего свода влагалища
	биопсия шейки матки

274. Выберите правильный ответ

При отравлении уксусной эссенцией промывание желудка проводится

- ☐ теплой водой
☐ водой низкой температуры
☒ после обезболивания и введения атропина
☐ слабым раствором соды

275. Выберите правильный ответ

Главный метод удаления невсосавшегося яда, при остром энтеральном отравлении

- ☐ слабительное
☐ дача адсорбента
☒ промывание желудка через зонд
☐ форсированный диурез
☐ антидототерапия

☐ экстракорпоральная детоксикация

276. Выберите три правильных ответа

При отравлении фосфорорганическими соединениями характерны клинические проявления

- ☒ брадикардия
☒ бронхорея
☐ расширение зрачков
☐ сухость кожных покровов
☐ сухость слизистых
☒ обильное потоотделение

277. Установите соответствие между терминами и определениями

трансфузия	переливание компонентов и препаратов крови
агглютиноген	белок плазмы крови, является антителом агглютиногенов, определяет групповую принадлежность крови
агглютинация	склеивание форменных элементов крови с последующим выпадением их в осадок
агглютиноген	белок находящийся на оболочке эритроцитов, определяющий групповую принадлежность крови
	соотношение объема форменных элементов и плазмы

278. Установите соответствие между терминами и определениями

донор	лицо, добровольно предоставляющее часть своей крови для переливания нуждающемуся в этом человеку
реципиент	человек, которому производят переливание крови
гемотрансфузия	введении в кровяное русло пациента цельной крови или ее компонентов и препаратов
гемокон	пластиковый контейнер (пакет) для хранения компонентов и препаратов крови
	склеивание форменных элементов крови с последующим выпадением их в осадок

279. Установите соответствие между видами кровотечений и клиническими признаками

артериальное	пульсирующая, алая струя
венозное	кровь темная, изливается непрерывной струей
капиллярное	кровь по всей поверхности раны виде капелек росы
	кровь темная, изливается непрерывной пульсирующая

	струей
--	--------

280. Установите соответствие между видами кровотечений и клиническими признаками

легочное	кровохарканье
носовое	рвота «кофейной гущей»
желудочное	кровь в носовых путях
геморроидальное	кровь на поверхности каловых масс
	кровь на лице

281. Установите соответствие между терминами и определениями

кровотечение	излияние крови за пределы сосудистого русла в ткани и полости организма или во внешнюю среду
кровопотеря	состояние организма, возникающее при кровотечении в связи со снижением ОЦК
коллапс	острая сосудистая недостаточность
кровоизлияние	равномерное пропитывание кровью тканей
	скопление крови в полости сустава

282. Установите соответствие между терминами и определениями

гемартроз	скопление крови в полости сустава
гематома	скопление крови, ограниченное тканями в виде полости
кровоизлияние	скопление крови в тканях разлитое
	скопление крови в брюшной полости

283. Установите соответствие между терминами и определениями

гемоперитонеум	скопление крови в брюшной полости
гемоторакс	скопление крови в плевральной полости
гемоперикард	скопление крови в сердечной сумке
	скопление крови в тканях разлитое

284. Установите соответствие между терминами и определениями

уретрит	воспаление уретры
стриктура уретры	сужение уретры
цистит	воспаление мочевого пузыря
	ночное недержание мочи

285. Установите соответствие между терминами и определениями

парапроктит	гнойное воспаление околопрямокишечной клетчатки
проктит	воспаление прямой кишки

гемиколэктомия	удаление половины толстой кишки
	полное удаление прямой кишки с анальным каналом

286. Установите соответствие между терминами и определениями

ангиоспазм	сужение просвета сосуда в результате длительного сокращения его круглых мышц
аневризма	расширение кровеносного сосуда или полости сердца на ограниченном участке с истончением стенки
коллатераль	анатомическое образование, соединяющее структуры в обход основного пути
	соустье между кровеносными сосудами или полыми органами

287. Установите соответствие между терминами и определениями

эндартериит облитерирующий	воспаление стенки артерии с нарушением периферического кровообращения
флебит	воспаление стенки вены
тромбофлебит	образование тромба в вене при воспалении её стенки
	воспаление лимфатических сосудов

288. Установите соответствие между терминами и определениями

ампутация	хирургическая операция удаления целого органа
тромбэктомия	хирургическая операция извлечения тромба из кровеносного сосуда
флебэктомия	хирургическая операция удаления поверхностных вен
	исследование пульсовых колебаний кровеносных сосудов

289. Установите соответствие между терминами и определениями

воспаление	местная сосудисто-тканевая реакция организма на токсины гноеродных микробов
грануляции	незрелая соединительная ткань, имеющая зернистую поверхность, богатая капиллярами
интоксикация	общая реакция организма на действие токсинов циркулирующих в крови
	скопление живых и мёртвых лейкоцитов, бактерий, мертвых тканей

290. Установите соответствие между терминами и определениями

аппендицит	воспаление червеобразного отростка слепой кишки
холангит	воспаление желчных протоков
холецистит	воспаление желчного пузыря
	воспаление брюшины

291. Установите соответствие между терминами и определениями

аппендэктомия	операция удаления червеобразного отростка слепой кишки
лапароскопия	операция эндоскопического исследования брюшной полости, осмотр брюшины
холецистэктомия	операция удаления желчного пузыря
	операция удаления половины толстой кишки

292. Установите соответствие между степенями эксикоза у детей

I степень	потеря массы тела 5%, рвота однократная, стул 4-6 раз в сутки, жажда умеренная
II степень	потеря массы тела 5-10%, рвота 3-4 раза, до 10 раз, резко выражена
III степень	потеря массы тела более 10%, рвота многократная, стул более 10 раз, отказ от питья
	потеря массы тела менее 5%, рвота однократная, жидкого стула нет, жажды нет

293. Установите соответствие между стадиями инфекционно-токсического шока

ИТШ I стадия	t тела 38,5-40,5°C, умеренная тахикардия, тахипноэ, диурез несколько снижен, сознание сохранено
ИТШ II стадия	t тела нормальная, выраженная тахикардия, пульс слабый, АД снижено, диурез снижен, заторможенность
ИТШ III стадия	резкая тахикардия, пульс нитевидный, АД очень низкое, анурия, сознание помрачено
	кома, нарушение дыхания, зрачки расширены, тонические судороги

294. Установите соответствие между диагнозами и методами обследования

рак молочной железы	маммография
рак желудка	гастроскопия
рак легкого	бронхоскопия
	биопсия кожи

295. Установите соответствие между диагнозами и методами обследования

рак кожи	биопсия кожи
рак прямой кишки	ректороманоскопия
рак мочевого пузыря	цистоскопия
	УЗИ печени

296. Установите соответствие между терминами и определениями

доброкачественная опухоль из мышечной ткани	миома
доброкачественная опухоль из костной ткани	остеома
злокачественная опухоль из соединительной ткани	саркома
	папиллома

297. Установите соответствие между терминами и определениями

доброкачественная эпителиальная опухоль	папиллома
доброкачественная опухоль из жировой ткани	липома
злокачественная опухоль из пигментной ткани	меланома
	остеосаркома

298. Установите соответствие между терминами и определениями

атипичные клетки	незрелые клетки, отличаются по строению, расположению
инвазивный рост	способность опухолевых клеток врастать в окружающие ткани, разрушать их
метастазирование	образование вторичных опухолей в органах, отдаленных от первичной опухоли
	различные процессы и состояния, закономерно предшествующие злокачественной опухоли

299. Установите соответствие между терминами и определениями

предраковые состояния	различные процессы и состояния, закономерно предшествующие злокачественной опухоли
биопсия	диагностическая процедура забора клеток, ткани для гистологического исследования
синдром "малых" признаков	ранние признаки злокачественных опухолей
	образование вторичных опухолей в органах, отдаленных от первичной опухоли

300. Установите соответствие между терминами и определениями

термический ожог	местное повреждение тканей, вызываемое воздействием высокой температуры
химический ожог	местное повреждение тканей, вызываемое воздействием едких химических веществ
ожоговая болезнь	общая реакция организма, нарушение функций внутренних органов при ожогах
	иссечение нежизнеспособных

	тканей
--	--------

301. Установите соответствие между терминами и определениями

пневмоторакс	скопление воздуха в плевральной полости. в результате повреждения плевры или лёгкого
гемоторакс	скопление крови в плевральной полости, в результате кровотечения в плевральную полость
торакоцентез	прокол грудной стенки с целью её дренирования
	воздух из плевральной полости через рану в пристеночной плевре нагнетается в толщу грудной стенки

302. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую руку накладыва-ется электрод

- ☐ зеленого цвета
☒ желтого цвета
☐ черного цвета
☐ красного цвета

303. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую руку накладыва-ется электрод

- ☐ зеленого цвета
☐ желтого цвета
☐ черного цвета
☒ красного цвета

304. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую ногу накладыва-ется электрод

- ☒ зеленого цвета
☐ желтого цвета
☐ черного цвета
☐ красного цвета

305. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую ногу накладыва-ется электрод

- ☐ зеленого цвета
☐ желтого цвета
☒ черного цвета
☐ красного цвета

306. Выберите правильный ответ

При записи грудной V1 электрод располага-ется

- ☒ у правого края грудины в IV межреберье
☐ у левого края грудины в IV межреберье
☐ между электродами V2 и V4
☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

307. Выберите правильный ответ

При записи грудной V2 электрод располага-ется

- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
☒ у левого края грудины в IV межреберье

- ☐ по правой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

308. Выберите правильный ответ

При записи грудной V3 электрод располагается

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☒ между электродами V2 и V4
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по левой передней подмышечной линии на уровне электрода V4

309. Выберите правильный ответ

При записи грудной V4 электрод располагается

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
- ☒ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по передней подмышечной линии в VI межреберье

310. Выберите правильный ответ

При записи грудной V5 электрод располагается

- ☐ срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☒ передней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☐ средней подмышечной линии на уровне электрода V4

- ☐ задней подмышечной линии на уровне электрода V4

311. Выберите правильный ответ

При записи грудной V6 электрод располагается

- ☐ срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ передней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☒ средней подмышечной линии на уровне электрода V4
- ☐ задней подмышечной линии на уровне электрода V4

312. Выберите правильный ответ

Стандартными отведениями на ЭКГ называются

- ☒ I, II, III
- ☐ aVR, aVL, aVF
- ☐ V1, V2, V3
- ☐ V7-V9

313. Выберите правильный ответ

Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с высоты или ныряния в воду является

- ☐ выполнение тройного приема Сафара
- ☐ интубация трахеи
- ☒ фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника
- ☐ внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

314. Выберите правильный ответ

Пароксизм желудочковой тахикардии купируется:

- ☐ валосердином
- ☐ нитроглицерином
- ☐ панангином
- ☒ кордароном

315. Выберите правильный ответ

Пароксизм узловой тахикардии купируется:

- ☐ лидокаином
- ☐ эуфиллином
- ☐ панангином
- ☒ анаприлином

316. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма трепетания предсердий

- ☐ непрямого массаж сердца
- ☐ задержка дыхания
- ☒ чреспищеводная кардиостимуляция
- ☐ капотен под язык

317. Выберите правильный ответ

Препарат при полной атриовентрикулярной блокаде

- ☐ кордарон
- ☐ верапамил
- ☐ анаприлин
- ☒ атропин

318. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма мерцательной аритмии

- ☐ панангин
- ☒ пропанорм
- ☐ лидокаин
- ☐ верапамил

319. Выберите правильный ответ

Купирование гипертонического криза при кардиостимуляции

- ☐ кордарон
- ☐ лидокаин
- ☒ капотен
- ☐ пропанорм

320. Выберите правильный ответ

Купирование частой желудочковой экстрасистолы при кардиостимуляторе

- ☐ атропин
- ☐ верапамил

- ☐ капотен
☒ кордарон

321. Выберите правильный ответ

Ведущая группа препаратов при гипертоническом кризе с отёком лёгких

- ☐ наркотические анальгетики
☒ мочегонные
☐ нитраты
☐ гипотензивные

322. Выберите правильный ответ

Основным антикоагулянтом при хронической фибрилляции предсердий является

- ☐ аспирин
☐ гепарин
☒ варфарин
☐ кардиомагнил

323. Выберите правильный ответ

"Mednet" - это

- ☐ автоматизированный мониторинг здоровья населения
☒ телекоммуникационная медицинская сеть России

- ☐ автоматизированная система управления
☐ автоматизированное рабочее место
☐ автоматизированный скрининг

324. Выберите правильный ответ

Автоматизированный скрининг - это

- ☐ телекоммуникационная сеть
☐ автоматизированный предварительный медицинский осмотр
☒ автоматизированный целевой медицинский осмотр
☐ автоматизированное рабочее место участкового педиатра
☐ автоматизированная система управления

325. Выберите три правильных ответа

Виды медицинской информации

- ☐ общественная
☐ индивидуальная
☐ коллективная
☒ экономическая
☒ технологическая
☒ статистическая

326. Выберите правильный ответ

Второй этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
☐ обработка статистического материала
☒ сбор материала
☐ определение объема наблюдений
☐ формулирование задач исследования

327. Выберите правильный ответ

Для медицинских исследований достаточной степенью вероятности является [%]

- ☐ 75
☐ 99,9
☒ 95,0
☐ 68

328. Выберите правильный ответ

Основная цель ОАСУ - "Здравоохранение"

- ☐ лечение больных на модели
☐ обработка информации
☒ совершенствование управления здравоохранением, обеспечивающее оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи

- ☐ учет расходования лекарств

329. Выберите правильный ответ

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

- ☐ отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости
☒ отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
☐ экстраполяцию и прогнозирование
☐ анализ деятельности ЛПУ

330. Выберите правильный ответ

Статистика населения - это

- ☐ сведения о здоровье
☐ данные о здравоохранении
☐ показатели деятельности ЛПУ
☒ основные количественные данные о населении на момент времени

331. Выберите правильный ответ

Третий этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
☐ определение стоимости исследования
☒ обработка, шифровка, сводка материала
☐ внедрение результатов

332. Выберите правильный ответ

Четвертый этап медико-статистического исследования

- ☐ статистический анализ собранного материала
☐ определение стоимости исследования
☒ анализ, выводы, внедрение в практику
☐ анализ экономической эффективности
☐ медико-социальный анализ результатов

333. Установите соответствие между видами дыхательной недостаточности

вентиляционная	отёк головного мозга, переломы рёбер
паренхиматозная	отёк лёгких, пневмония
	анемия

334. Установите соответствие между симптомами отравлений

опиаты	сознание угнетено, кожные покровы бледные, влажные, брадикардия, гипотензия, брадипноэ
этанол	возбуждение сменяется угнетением, гиперемия сменяется бледностью, гипертензия сменяется гипотензией
барбиту-	сонливость, кома, пузыри в месте

раты	давления, ЧСС не изменена, гипотония
	кома, повышенное потоотделение, миорелаксация, отёк лёгких

335. Установите соответствие между группами токсических веществ

алкоголь и суррогаты алкоголя	метиловый спирт, этиленгликоль, изопропиловый спирт
органические растворители	дихлорэтан, бензол
прижигающие жидкости	кислоты, щелочи
	фосфорорганические инсектициды, карбаматы

336. Установите соответствие между группами гипотензивных препаратов

ингибиторы АПФ	каптоприл, эналаприл
бета-адреноблокаторы	анаприлин, беталок - ЗОК
блокаторы медленных кальциевых каналов	нифедипин, амлодипин
	клофелин, эбрантил

337. Установите соответствие между гипертоническими кризами

неосложненные	протекает с минимальными субъективными и объективными симптомами на фоне имеющегося существенного повышения АД
осложненные	сопровождается жизнеугрожающими осложнениями, появлением или усугублением поражения органов-мишеней и требует снижения АД
	выраженные объективные и субъективные симптомы на фоне умеренного повышения АД

338. Установите соответствие между противопоказаниями к системному тромболитису

абсолютные	внутричерепные кровоизлияния в анамнезе, нарушения мозгового кровообращения в течение последнего года, кровотечение любой локализации
относительные	прием антикоагулянтов в терапевтических дозах (МНО > 2), геморрагические диатезы, недавняя травма, беременность
	подъем сегмента ST более чем на 0,1 мВ, остро возникшая блокада левой ножки пучка Гиса

339. Установите соответствие между поколениями тромболитических препаратов

первое поколение	стрептокиназа, урокиназа, стрептодеказа, анистрептлаза
второе поколение	альтеплаза, рекомбинантная урокиназа
третье поколение	тенектеплаза, ретеплаза

коление	
	композиции тромболитиков «урокиназа-плазминоген»

340. Установите соответствие между группами инфузионных сред

Кристаллоиды	изотонический раствор NaCl, раствор Рингера, раствор Рингера-Локка, Трисоль
Коллоиды	полиглюкин, реополиглюкин, волювен, ХАЕС-стерил
	гелоплазма, гемопюр

341. Установите соответствие между классификацией шоков по пусковому механизму

гиповолемический	травматический, болевой, ожоговый, геморрагический
вазоплегический (перераспределительный, дистрибутивный)	септический, ожоговый, анафилактический
кардиогенный	следствие острой (энергетической и динамической) сердечной недостаточности
	острое препятствие кровотоку (ТЭЛА)

342. Установите соответствие между заболеванием и временным периодом сохранения очаговых неврологических симптомов

острое нарушение мозгового кровообращения	очаговые симптомы сохраняются более 24 часов
преходящее нарушение мозгового кровообращения	очаговые симптомы сохраняются менее 24 часов
	не развиваются очаговые симптомы

343. Установите соответствие между синдромом и симптомами

очаговый синдром	парезы, параличи, нарушения чувствительности, нарушения речи
общемозговой синдром	головная боль, головокружение, нарушение сознания, тошнота
	симптомы Кернига, Брудзинского

344. Установите соответствие между инсультом и показателем АД, при котором его снижать не следует на догоспитальном этапе (соответственно протоколу)

ишемический инсульт	если АД не превышает 220(200)/110 мм.рт.ст
геморрагический инсульт	если АД не превышает 180(170)/100 мм.рт.ст
	если АД не превышает 140/90 мм.рт.ст

345. Установите соответствие между стадиями стеноза гортани у детей

I стадия (компенсации)	осиплый голос, грубый, лающий кашель и умеренная инспираторная одышка
II стадия (субкомпенсации)	беспокойство ребенка, тахикардия, частый лающий кашель, одышка с участием вспомогательной мускулатуры в покое, пероральный цианоз
III стадия (декомпенсации)	разлитой цианоз кожи, шумное дыхание с выраженной инспираторной, парадоксальный пульс
	пульс нерегулярный, могут быть судороги, гипоксическая кома, затем – полная асфиксия

346. Установите соответствие между стадиями стеноза гортани у детей и неотложной помощью

стадия компенсации и субкомпенсации	ингаляция раствора пульмикорта 0,25 -0,5 мг через небулайзер, преднизолон 2 мг/кг
стадия декомпенсации	экстренная интубация трахеи, преднизолон 5-7 мг/кг в/в, ингаляция раствора пульмикорта 1 мг
терминальная стадия	сердечно-легочная реанимация, интубация трахеи, при невозможности – коникотомия
	супрастин 2% - в/в, беродуал 20 капель через небулайзер

347. Установите соответствие между синкопальными состояниями

Кардиогенные	обусловлены нарушениями ритма или интенсивности сердечной деятельности
Вазодепрессорные	следствие периферической сосудистой недостаточности
Анемические	гипоксия вследствие уменьшения количества эритроцитов и содержания гемоглобина в крови
	снижение содержания глюкозы в крови и недостаточное ее поступление в нервные клетки

348. Установите соответствие между степенями нарушения сознания у детей по шкале ком Глазго

Оглушение	13-14 баллов
Сопор	9-12 баллов
Кома поверхностная	7-8 баллов
	5-6 баллов

349. Выберите два правильных ответа

На догоспитальном этапе в качестве нейропротекторных препаратов используются

- ☐ пирацетам
- ☒ мексидол
- ☒ глицин
- ☐ сибазон
- ☐ метоклопрамид

350. Выберите правильный ответ

Побочным эффектом при внутривенном введении цитиколина (цероксона) возможно развитие

- ☒ транзиторной гипотензии
- ☐ транзиторной гипертензии
- ☐ тахикардии
- ☐ тошнота, рвота

351. Выберите три правильных ответа

Мероприятия проводимые на догоспитальном этапе для предотвращения отека мозга являются

- ☐ внутривенное введение лазикса
- ☒ обеспечение адекватной оксигенации
- ☒ приподнятый головной конец носилок под углом 30°
- ☒ купирование судорог и психомоторного возбуждения
- ☐ введение сосудорасширяющих средств
- ☐ приподнятый ножной конец носилок

352. Выберите три правильных ответа

Синдром вклинивания ствола мозга включает признаки

- ☐ узкие зрачки с сохраненной реакцией на свет
- ☒ судорожный синдром
- ☒ тенденция к брадикардии
- ☒ прогрессирующее угнетение сознания
- ☐ ясное сознание
- ☐ нормальный ритм дыхания и сердечной деятельности

353. Выберите правильный ответ

Оптимальное время для госпитализации в стационар от начала ишемического инсульта с целью проведения тромболизисной терапии

- ☒ первые 5 часов
- ☐ первые 7 часов
- ☐ первые 6 часов
- ☐ первые 8 часов

354. Выберите правильный ответ

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы биполярного аффективного психоза
- ☐ депрессивной фазы биполярного аффективного психоза
- ☐ эпилепсии
- ☐ кататонического синдрома

355. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при передозировке опиатами включает препарат

- ☒ налоксон
- ☐ кеторолак
- ☐ димедрол
- ☐ сибазон

356. Выберите два правильных ответа

Купирование алкогольного абстинентного синдрома проводят при помощи

- ☒ дезинтоксикационных средств
- ☐ психостимуляторов
- ☐ антибиотиков
- ☐ спазмолитиков
- ☒ транквилизаторов

357. Выберите три правильных ответа

Оказание помощи при эпилептическом приступе включают

- ☒ убрать острые и твердые предметы
- ☒ расстегнуть стесняющую одежду
- ☒ повернуть больного на бок
- ☐ попытаться привести пациента в сознание
- ☐ уложить пациента на спину
- ☐ уложить пациента на живот

358. Выберите правильный ответ

Оказание психиатрической помощи службой скорой медицинской помощи обосновано если

- ☒ пациент опасен для себя и окружающих
- ☐ всегда если пациент находится на учёте в психоневрологическом диспансере
- ☐ если пациент страдает соматическим заболеванием
- ☐ если пациент страдает неврологическим заболеванием

359. Установите соответствие названия заболевания и клинических проявлений

Сахарный диабет	тахикардия, тремор.
Диффузно – токсический зоб.	брадикардия, сонливость.
Гипотиреоз.	гипергликемия, глюкозурия.
	артериальная гипертензия

360. Установите соответствие клинического диагноза и лечебных рекомендаций

Эндемический зоб.	L тироксин, эутирокс
Диффузно – токсический зоб.	мерказолил, тирозол.
Гипотиреоз	йодомарин, йодбаланс
	В-блокаторы

361. Выберите правильный ответ

Гипогликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже меньше

- ☐ 8,2 ммоль/литр
- ☐ 5,5 ммоль/литр
- ☒ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 2,6 ммоль/литр

362. Выберите правильный ответ

Гипергликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже больше

- ☐ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 5,0 ммоль/литр
- ☒ 7,0 ммоль/литр
- ☐ 8,2 ммоль/литр

363. Выберите правильный ответ

Для лечения гипогликемической комы на догоспитальном этапе внутривенно вводится

- ☒ тиамин 100 мг, затем 40 мл 40% раствора глюкозы
- ☐ налоксон 0,4-0,8 мг
- ☐ 40 мл 40% раствора глюкозы вместе с 6-8 ЕД инсулина
- ☐ 200 мл 5% раствора глюкозы со скоростью 60 капель в минуту

364. Выберите правильный ответ

Догоспитальная интенсивная терапия гипергликемической комы заключается в

- ☐ инсулинотерапии
- ☒ инфузии кристаллоидных растворов
- ☐ введении глюкокортикоидов
- ☐ введении лазикса

365. Выберите правильный ответ

Для регидратации при диабетическом кетоацидозе на догоспитальном этапе применим раствор

- ☐ 10% глюкозы
- ☒ 0,9% натрия хлорида
- ☐ 4% натрия гидрокарбоната
- ☐ полиглюкина

366. Выберите правильный ответ

Рациональным объемом лечебных мероприятий на догоспитальном этапе у беременных с гестозом тяжелой степени является

- ☒ масочный наркоз закисью азота с кислородом, внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, госпитализация в акушерский стационар, лежа на носилках
- ☐ внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, оксигенотерапия, госпитализация в акушерский стационар, лежа на носилках
- ☐ незамедлительная транспортировка в акушерский стационар без дополнительных лечебных мероприятий
- ☐ масочный наркоз закисью азота с кислородом, внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, вызов «на себя» акушерской бригады

367. Выберите правильный ответ

Рациональная догоспитальная тактика при нарушенной внематочной беременности включает

☐ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара без дополнительных лечебных мероприятий

☒ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

☐ обезбоживание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

☐ введение сокращающих матку средств (окситоцин), госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

368. Выберите правильный ответ

Диаметр внутреннего просвета коникотомической канюли у ребенка до 10 лет должен быть равен

☐ 1 мм

☒ 2 мм

☐ 4 мм

☐ 6 мм

369. Выберите правильный ответ

Какие из препаратов для инфузионной терапии предпочтительно использовать при лечении больных с отеком мозга

☐ Концентрированные растворы глюкозы

☐ Декстраны с молекулярной массой 60 000 дальт

☒ Растворы гидроксиэтилкрахмала с молекулярной массой не менее 130 000 Дальт

☐ Альбумин 10%

370. Выберите правильный ответ

Показанием для тромболитической терапии не является

☐ подъем сегмента ST на 2 и более мм. в двух грудных отведениях

☐ подъем ST на 1 и более мм. в двух смежных стандартных отведениях

☐ длительность болевого синдрома 12 часов

☒ остро возникшие нарушения ритма

371. Выберите правильный ответ

Какой из указанных препаратов наиболее эффективен и рекомендован для эмпирической терапии тахиформ нарушений сердечного ритма

☐ лидокаин

☐ хинидин

☐ нифедипин

☒ кордарон

372. Выберите три правильных ответа

Какие осложнения возможны при проведении тромболитической терапии в остром периоде инфаркта миокарда

☒ анафилактический шок

☒ геморрагический шок

☒ гематурия

☐ артериальная гипертензия

☐ осложнений не бывает

☐ повышение гематокрита

373. Выберите правильный ответ

Какие из побочных эффектов ингибиторов АПФ, как правило, требуют прекращения лечения

☒ ангионевротический отек, кожные реакции в виде эритемы

☐ кашель

☐ потеря вкусовых ощущений

☐ падение АД после первого приема

374. Выберите правильный ответ

Коронарный кровоток осуществляется в фазе

☐ изометрии

☐ изотонической

☒ диастолы

☐ не зависит от фаз сердечного цикла

375. Выберите правильный ответ

В результате ингаляции 100% кислорода может развиваться

☐ гипертензия и брадикардия

☐ гипертензия и снижение пульсового давления

☐ резкая гипертензия и апноэ

☒ гипотензия и апноэ

376. Выберите правильный ответ

Через сколько часов (минут) у пациентов с инфарктом миокарда начинает увеличиваться уровень тропонина

☐ через 24 часа после появления симптомов

☐ через 30 минут после появления симптомов

☒ через 3 часа после появления симптомов

☐ сразу после появления болевого синдрома

377. Выберите правильный ответ

Реперфузионная (ЧКВ или тромболизис) терапия показана всем больным с болью/дискомфортом и персистирующим подъемом сегмента ST или новой блокадой ЛНПГ длительностью не более

☐ 24 часов

☐ 6 часов

☒ 12 часов

☐ 3 часов

378. Выберите правильный ответ

Тромболитическая терапия проводится, если ЧКВ невозможно выполнить в течение

☐ 24 часов

☒ 120 минут от момента первого контакта с медработником

☐ 12 часов

☐ 3 часов

379. Выберите правильный ответ

После тромболитической терапии больного направляют

☐ кардиологическое отделение

☒ в центр с возможностью выполнения ЧТВ

- ☐ реанимационное отделение общего профиля
- ☐ оставляют дома под наблюдения участкового терапевта

380. Выберите правильный ответ

Препараты для тромболиза

- ☒ алтеплаза, тенектеплаза
- ☐ клопидогрел, прасугрель
- ☐ эноксипарин, фраксипарин
- ☐ метопролол, бисопролол

381. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе без повышения симпатической активности показан

- ☒ урапидил (эбрантил)
- ☐ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

382. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе с высокой симпатической активностью показан

- ☐ урапидил (эбрантил)
- ☒ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

383. Выберите правильный ответ

Центр автоматизма I порядка

- ☒ синусовый узел
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в правом предсердии
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в левом предсердии
- ☐ атриовентрикулярное соединение

384. Выберите правильный ответ

Зубец Р на ЭКГ отражает

- ☐ возбуждение желудочков
- ☒ возбуждение предсердий
- ☐ время распространения импульса от синусового узла до миокарда желудочков
- ☐ метаболические процессы в миокарде

385. Выберите правильный ответ

Комплекс QRS отражает на ЭКГ

- ☐ реполяризацию предсердий
- ☒ возбуждение желудочков
- ☐ электрическую систолу желудочков
- ☐ электрическую систолу сердца

386. Выберите правильный ответ

Зубец Q на ЭКГ характеризует

- ☐ возбуждение предсердий
- ☒ возбуждение межжелудочковой перегородки
- ☐ процессы реполяризации
- ☐ атриовентрикулярную проводимость

387. Выберите правильный ответ

В норме амплитуда зубца Q соответствует

- ☐ 1/3 Р
- ☐ 1/4 Р
- ☒ 1/4 R
- ☐ 1/3 R

388. Выберите правильный ответ

Форма нормального зубца Q

- ☐ овал
- ☒ треугольник
- ☐ овал с зазубриной
- ☐ треугольник с зазубриной

389. Выберите правильный ответ

Интервал PQ на ЭКГ соответствует

- ☐ возбуждению миокарда желудочков
- ☐ возбуждению миокарда предсердий
- ☒ атриовентрикулярной проводимости
- ☐ процессу выхода из возбуждения основания желудочков

390. Выберите правильный ответ

Признаки синусового ритма на ЭКГ

- ☐ RR не равны RR, зубец Р перед QRS отсутствует, ЧСС 56 ударов в минуту
- ☐ RR = RR равны, зубец P(-) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(+) перед QRS, ЧСС 74 удара в минуту
- ☒ RR = RR равны, зубец P(+) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(-) перед QRS, ЧСС 80 ударов в минуту
- ☐ RR = RR, зубец P(-) после QRS во II отведении, ЧСС 50 ударов в минуту

391. Выберите правильный ответ

При правильном синусовом ритме частота сердечных сокращений на ЭКГ определяется по формуле

- ☐ 600:R-R
- ☐ R-R:60
- ☒ 60:R-R
- ☐ 60:P-P

392. Выберите правильный ответ

Горизонтальное смещение сегмента ST на ЭКГ более чем на 1 мм от изолинии характерно для

- ☒ ишемии миокарда
- ☐ передозировки сердечных гликозидов
- ☐ гипокалиемии
- ☐ перикардита

393. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 500 Дж
- ☒ 360 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☐ 50 Дж

394. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию бифазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 300 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☒ 150 Дж

☐ 50 Дж

395. Выберите правильный ответ

Перед проведением первого разряда электрической дефибрилляции необходимо

☐ проводить непрямой массаж сердца в течение 7 минут

☒ выявить картину крупноволновой фибрилляции желудочков на мониторе электрического дефибриллятора

☐ ввести лидокаин

☐ ввести гидрокарбонат натрия

396. Выберите правильный ответ

Энергия второго и последующих разрядов (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

☐ не проводится

☐ проводится с увеличивающейся энергией 200-300-360 Дж

☐ проводится с постоянной энергией 200-200-200 Дж

☒ проводится с постоянной энергией 360-360-360 Дж

397. Выберите правильный ответ

Если остановка кровообращения развилась без свидетелей и на мониторе электрического дефибриллятора выявляется крупноволновая фибрилляция желудочков, необходимо

☐ внутривенно или эндотрахеально ввести лидокаин в дозе 1 мг/кг

☐ нанести удар по груди

☒ провести электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом разрядом 360 Дж

☐ ввести 1 мг адреналина внутрисердечно и начать непрямой массаж сердца

398. Выберите правильный ответ

Если на мониторе электрического дефибриллятора регистрируется асистолия, следует

☐ начать закрытый массаж сердца, внутривенно или внутрисердечно ввести лидокаин, адреналин и кальция хлорид

☒ начать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, ввести внутривенно или эндотрахеально адреналин

☐ провести электрическую дефибрилляцию

☐ отказаться от проведения реанимационных мероприятий

399. Выберите правильный ответ

Альтернативой интубации трахеи на догоспитальном этапе для поддержания проходимости дыхательных путей и защиты их от аспирации желудочного содержимого является

☐ орофарингеальный воздуховод

☐ выполнение тройного приема Сафара

☒ ларингеальная трубка

☐ желудочный зонд

400. Выберите правильный ответ

Укажите фактор, не влияющий на точность пульсоксиметрии

☐ темный лак для ногтей

☒ темный цвет кожи

☐ аномальные формы гемоглобина

☐ плохая тканевая перфузия

401. Выберите правильный ответ

Норма SpO₂

☐ 90-95%

☒ >95%

☐ 80-90%

☐ >80%

402. Выберите правильный ответ

К противопоказанию для использования combitube не относятся

☐ пациенты ростом меньше 122 см

☐ пациенты с ненарушенным глоточным рефлексом

☐ пациенты с установленным заболеванием пищевода (включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы)

☐ пациенты, проглотившие едкие вещества

☒ пациенты с оценкой по шкале ком Глазго 5 баллов

Специальность «Лечебное дело»
Высшая квалификационная категория

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный ответ

Медицинская деонтология

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента
- ☒ учение о профессиональном долге

2. Выберите правильный ответ

Субъективно-психологическая сторона любого заболевания на основе переживаний, ощущений, представлений больного

- ☐ фрустрация
- ☐ апатия
- ☒ внутренняя картина болезни
- ☐ депрессия

3. Выберите правильный ответ

Преувеличение больным имеющихся симптомов, субъективных жалоб

- ☐ симуляция
- ☒ аггравация
- ☐ диссимуляция
- ☐ ипохондрия

4. Выберите правильный ответ

Тип реакции на болезнь, характеризующийся поиском информации, тревожностью, беспокойством, угнетенным настроением

- ☐ невротический
- ☐ ипохондрический
- ☐ сенситивный
- ☒ тревожный

5. Выберите правильный ответ

Угнетенно - подавленное настроение, с пессимистическими взглядами в будущее

- ☐ ипохондрия
- ☐ апатия
- ☒ депрессия
- ☐ стресс

6. Выберите правильный ответ

Тип реакции на болезнь, характеризующийся концентрацией внимания на различных субъективных ощущениях, желанием рассказать о них окружающим

- ☐ невротический
- ☒ ипохондрический
- ☐ меланхолический
- ☐ тревожный

7. Выберите правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

8. Выберите правильный ответ

Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из окружающей среды

- ☐ невроз
- ☐ лихорадка
- ☐ фобии
- ☒ стресс

9. Выберите правильный ответ

Эвтаназия в России

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

10. Выберите правильный ответ

Патологический страх перед существующим или несуществующим устрашающим объектом

- ☐ паранойя
- ☐ депрессия
- ☒ фобии
- ☐ апатия

11. Выберите правильный ответ

Формы проявления страха и тревоги у пациента зависят

- ☐ от диагноза заболевания
- ☐ от тяжести и течения болезни
- ☒ от особенностей личности, возраста, половой принадлежности
- ☐ от половой принадлежности

12. Выберите правильный ответ

Ятрогенные заболевания

- ☐ обусловленные вредными факторами производства
- ☒ вызванные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболевания с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболевания наследственного генеза

13. Выберите два правильных ответа

Термин «деловая субординация» – это

- ☒ распоряжения старшего по должности, являются обязательными для подчиненных
- ☐ демократизм в отношениях коллег
- ☒ уважение к старшим по должности
- ☐ панибратство

14. Выберите два правильных ответа

Профессиональная тайна – это

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

15. Выберите три правильных ответа

Основные задачи медицинской этики

- ☒ добросовестный труд
- ☒ внимательное и заботливое отношение к пациенту
- ☒ готовность всегда и при всех условиях оказать помощь пациенту
- ☐ социально-психологическая помощь
- ☐ чувство коллегиальности
- ☐ соблюдение дисциплины

16. Выберите правильный ответ

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- ☐ 0–45 см
- ☒ 45–120 см
- ☐ 120–400 см
- ☐ 400–500 см

17. Выберите три правильных ответа

Агрессивность пациента может вызываться

- ☒ психическими заболеваниями
- ☒ болью и стрессом
- ☐ изменением климатических условий
- ☒ страхом
- ☐ внимательным и заботливым отношением
- ☐ сменой рациона питания

18. Выберите правильный ответ

Психосоматические заболевания

- ☐ соматические заболевания или нарушения, причиной которых являются физические факторы
- ☐ психические заболевания, причиной которых являются физические факторы
- ☒ соматические заболевания, причиной которых являются психотравмирующие переживания острого или затяжного характера
- ☐ соматические заболевания, причиной которых являются психофизические факторы

19. Выберите правильный ответ

Уровень общения медицинского персонала с пациентом

- ☐ доверительный
- ☐ социальный
- ☐ внушительно - убеждающий
- ☒ межличностный

20. Выберите правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс

- ☐ медицинский этикет
- ☐ медицинская деонтология
- ☒ медицинская этика

21. Выберите правильный ответ

Эффективному общению с пациентами и их обучению способствует

- ☒ положительная обратная связь
- ☐ суждение о нем
- ☐ замечания
- ☐ выполнение их требований

22. Выберите правильный ответ

Отсутствие волевой активности, или каких-либо побуждений к действию

- ☒ абulia
- ☐ астения
- ☐ ипохондрия
- ☐ депрессия

23. Выберите правильный ответ

Взаимоотношения в коллективе не основываются

- ☐ на взаимном уважении
- ☒ на подчинении старшему по возрасту независимо от должности
- ☐ на четком выполнении своих профессиональных обязанностей
- ☐ на субординации

24. Выберите правильный ответ

Дезинфекция – метод уничтожения форм микроорганизмов

- ☐ патогенных
- ☒ условно-патогенных и патогенных
- ☐ всех форм жизнедеятельности
- ☐ не патогенных

25. Выберите правильный ответ

Стерилизация – процесс уничтожения на изделиях медицинского назначения

- ☐ патогенных микроорганизмов
- ☒ всех форм жизнедеятельности микроорганизмов
- ☐ патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
- ☐ не патогенных

26. Выберите правильный ответ

Гигиеническая обработка рук предусматривает

- ☐ мытье рук двукратным намыливанием
- ☒ обработку рук кожным антисептиком
- ☐ мытье рук однократным намыливанием
- ☐ мытье рук двукратным намыливанием с последующей двукратной обработкой кожным антисептиком

27. Выберите два правильных ответа

Для защиты медицинского персонала от воздушно - капельных инфекций

- ☐ ватно - марлевые повязки
- ☒ одноразовые маски
- ☐ защитные экраны
- ☒ респираторы

- ☐ защитные очки

28. Выберите два правильных ответа

При выполнении инвазивных процедур используются перчатки

- ☒ нестерильные смотровые
☒ хирургические стерильные
☐ промышленные
☐ хозяйственные
☐ использование перчаток не обязательно

29. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обширными травмами используются перчатки

- ☐ промышленные
☐ хозяйственные
☐ смотровые нестерильные
☒ хирургические стерильные

30. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациентам с обильным наружным кровотечением используют

- ☐ одну пару перчаток
☒ две пары перчаток
☐ использование перчаток не обязательно

31. Выберите правильный ответ

Число этапов обработки клинка ларингоскопа

- ☐ один
☐ два
☒ три
☐ четыре

32. Выберите правильный ответ

Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких обрабатываются

- ☐ после окончания смены
☒ после каждого пациента
☐ не обрабатываются
☐ раз в 3 дня

33. Выберите правильный ответ

Для обработки места инъекций и пункций используется

- ☐ 96 % этиловый спирт
☐ метиловый спирт
☐ 70 % раствор этилового спирта
☒ спиртосодержащие кожные антисептики

34. Выберите правильный ответ

К индивидуальным средствам защиты от внутрибольничных инфекций не относятся

- ☐ халаты, фартуки, хлопчатобумажные костюмы
☐ медицинские шапочки
☒ индивидуальные шприцы
☐ лицевые маски, респираторы

35. Выберите правильный ответ

Частота смены респиратора при эпидемиологическом неблагополучии по гриппу каждые

- ☐ шесть часов
☒ два часа
☐ три часа

- ☐ восемь часов

36. Выберите правильный ответ

Уровень дезинфекции рук медицинского персонала перед и после осмотра пациента

- ☐ профилактический
☒ гигиенический
☐ хирургический
☐ социальный

37. Выберите два правильных ответа

На гигиеническом уровне обработку рук проводят

- ☐ при бытовом загрязнении
☒ перед инвазивными процедурами
☒ до и после снятия перчаток
☐ перед приемом пищи
☐ при любом загрязнении рук

38. Выберите правильный ответ

После проведения инвазивных манипуляций шприцы с иглами, шарики, салфетки

- ☐ оставляют на месте оказания медицинской помощи
☐ собирают в полиэтиленовый пакет
☒ собирают в контейнер
☐ в лоток

39. Выберите правильный ответ

К отходам класса Б относят

- ☐ ватные шарики от больного лихорадкой
Денге
☒ салфетки, загрязненные выделениями пациента, в т.ч. кровью
☐ отходы, не контактирующие с биологическими жидкостями пациента
☐ мусор из административных помещений

40. Выберите правильный ответ

Правила снятия перчаток с рук после манипуляции

- ☒ перчатки снимают и дезинфицируют в дезрастворе
☐ перчатки моют под краном и снимают
☐ перчатки обрабатывают салфеткой, не снимая, затем моют под краном и снимают
☐ перчатки обрабатывают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, не снимая, моют проточной водой, снимают и дезинфицируют в дезрастворе

41. Выберите правильный ответ

Обработка одноразовых изделий медицинского назначения

- ☒ дезинфекция и утилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка
☐ предстерилизационная очистка, стерилизация
☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка, утилизация

42. Выберите правильный ответ

Туберкулез – это заболевание

- ☐ наследственное

- ☒ социальное
- ☐ зоонозное
- ☐ соматическое

43. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза

- ☐ вирус
- ☐ бактерия
- ☒ микобактерия
- ☐ кокк

44. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев

45. Выберите три правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный
- ☒ африканский
- ☐ свиной

46. Выберите правильный ответ

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☐ больное животное

47. Выберите правильный ответ

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта
- ☐ слизистые оболочки и поврежденная кожа

48. Выберите правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

49. Выберите правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

50. Выберите правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ в общественном транспорте
- ☐ случайный

51. Выберите два правильных ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска

52. Выберите два правильных ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

53. Выберите правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

54. Выберите правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

55. Выберите правильный ответ

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 дня

56. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза

- ☒ вакцинация и ревакцинация против туберкулеза
- ☐ химиопрофилактика контактными лицам
- ☐ проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

57. Выберите правильный ответ

Массовая туберкулинодиагностика проводится

- ☐ с 1 месяца
- ☐ с 3 месяцев
- ☐ с 6 месяцев
- ☒ с 12 месяцев

58. Выберите правильный ответ

Цель постановки пробы Манту

- ☐ лечение туберкулеза
- ☒ диагностика туберкулеза
- ☐ профилактика туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных
- ☒ отбор на ревакцинацию

59. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д

60. Выберите правильный ответ

Пробу Манту проводят 1 раз в год

- ☐ до 14 лет
- ☐ до 15 лет
- ☒ до 18 лет
- ☐ до 30 лет

61. Выберите правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ бактерия
- ☐ микобактерия
- ☒ вирус
- ☐ кокк

62. Выберите правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

- ☐ вспышка
- ☐ эпидемия
- ☒ пандемия
- ☐ групповые заболевания

63. Выберите правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56°C в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ нагревание при 56°C в течение 1 минуты
- ☐ воздействие радиации

64. Выберите правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- ☐ больной человек
- ☐ больное животное
- ☐ вирусоноситель
- ☒ человек с момента заражения

65. Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- ☐ слюна
- ☐ слезная жидкость
- ☒ кровь
- ☐ спинномозговая жидкость

66. Выберите правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

- ☒ артифициальный
- ☐ фекально-оральный

☐ воздушно-капельный

☐ трансмиссивный

67. Выберите правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

68. Выберите три правильных ответа

ВИЧ не передается

- ☒ через рукопожатия
- ☒ через укусы насекомых
- ☐ при половых контактах
- ☐ во время беременности
- ☒ при разговоре

69. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

- ☒ кровь
- ☐ секрет потовых желез
- ☐ моча
- ☒ сперма
- ☒ грудное молоко
- ☐ слюна

70. Выберите правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

71. Выберите правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

72. Выберите правильный ответ

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- ☐ Уголовный кодекс
- ☐ Конституция РФ
- ☐ Трудовой кодекс
- ☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

73. Выберите правильный ответ

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- ☐ близкий родственник
- ☐ дежурный (лечащий) врач или родственник
- ☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач
- ☐ законный представитель

74. Выберите правильный ответ

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- ☐ паспорт
- ☒ страховой медицинский полис
- ☐ медицинская карта амбулаторного пациента
- ☐ история болезни

75. Выберите правильный ответ

Обязательное медицинское страхование в РФ

- ☐ имущественное
- ☐ личное
- ☒ всеобщее
- ☐ групповое

76. Выберите правильный ответ

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- ☒ обязательно
- ☐ желательно
- ☐ необязательно
- ☐ по согласованию

77. Выберите два правильных ответа

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное
- ☐ коллективное

78. Выберите правильный ответ

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
- ☒ 15-ти летнего возраста
- ☐ 16-ти летнего возраста
- ☐ 17-ти летнего возраста

79. Выберите правильный ответ

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программой медицинского страхования

- ☐ обязательного
- ☒ добровольного
- ☐ любого
- ☐ всеобщего

80. Выберите два правильных ответа

Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается

- ☐ при плановом проведении медицинского вмешательства
- ☒ в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- ☒ если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
- ☐ для устранения угрозы жизни человека
- ☐ не допускаются

81. Выберите правильный ответ

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения в настоящее время

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом от населения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

82. Выберите правильный ответ

Шина при переломе костей голени накладывается от кончиков пальцев до

- ☐ коленного сустава
- ☐ до нижней трети бедра
- ☐ до тазобедренного сустава
- ☒ до верхней трети бедра

83. Выберите правильный ответ

Открытый метод лечения ожогов показан при ожогах

- ☒ лица
- ☐ кистей
- ☐ стоп
- ☐ живота

84. Выберите правильный ответ

Термоизолирующая повязка применяется при

- ☐ ожогах
- ☒ отморожении
- ☐ общем замерзании
- ☐ озноблении;

85. Выберите правильный ответ

Признак ушиба мягких тканей

- ☐ деформация
- ☒ боль, кровоподтёк
- ☐ крепитация
- ☐ гиперемия

86. Выберите правильный ответ

Дренирование раны обеспечивает

- ☒ отток содержимого
- ☐ заживление первичным натяжением
- ☐ образование грануляций
- ☐ ускорение регенерации

87. Выберите правильный ответ

Конечность иммобилизуется в том положении в котором оказалась после

- ☐ ушиба
- ☐ перелома
- ☐ растяжения
- ☒ вывиха

88. Выберите правильный ответ

Иммобилизации шейного отдела позвоночника проводится

- ☐ ватно-марлевым кругом
- ☒ воротником Шанца
- ☐ крестообразной повязкой
- ☐ кольцами Дельбе

89. Выберите правильный ответ

Окклюзионная повязка применяется при ранении

- ☐ живота
- ☐ головы
- ☐ шеи
- ☒ грудной клетки

90. Выберите правильный ответ

Транспортная иммобилизация обеспечивает

- ☐ профилактику кровотечения
- ☐ ускорение регенерации тканей
- ☐ психо-эмоциональный покой пациента
- ☒ профилактику травматического шока

91. Выберите правильный ответ

Доскообразный живот является признаком

- ☒ перфоративной язвы желудка
- ☐ острого аппендицита
- ☐ острого холецистита
- ☐ острого панкреатита

92. Выберите два правильных ответа

Пациента с переломом позвоночника транспортируют на твердых носилках

- ☒ лёжа на спине
- ☒ с валиками под физиологическими изгибами
- ☐ на правом боку
- ☐ на левом бок

93. Выберите два правильных ответа

Мероприятия доврачебной помощи при вывихе плеча

- ☒ транспортная иммобилизация
- ☐ вправление вывиха
- ☒ введение анальгетиков
- ☐ окклюзионная повязка

94. Выберите два правильных ответа

Способ транспортировки при переломе костей таза (лёжа)

- ☐ на животе на мягких носилках
- ☒ на твёрдых носилках
- ☒ в положении «лягушки»
- ☐ на боку
- ☐ на животе

95. Выберите два правильных ответа

Укушенным животными пациентам проводится профилактика

- ☒ столбняка
- ☐ газовой гангрены
- ☒ бешенства
- ☐ актиномикоза

96. Выберите два правильных ответа

Транспортная иммобилизация проводится шинами

- ☒ Крамера
- ☒ пневматическими
- ☐ Белера
- ☐ Кузьминского

97. Выберите два правильных ответа

Мероприятия профилактики ожогового шока на догоспитальном этапе

- ☒ введение анальгетика
- ☐ асептической повязки
- ☐ антибиотикотерапия
- ☒ инфузионная терапия

98. Выберите правильный ответ

Синдром рикошета наблюдается при применении

- ☐ В-2 агонистов 3-4 раза в день
- ☐ М-холиноблокаторов
- ☒ В-2-агонистов чаще 6 раз в день
- ☐ глюкокортикостероидов

99. Выберите правильный ответ

Механизм действия глюкокортикостероидов при купировании приступов бронхиальной астмы

- ☐ противокашлевой
- ☒ противовоспалительный
- ☐ противоаллергический
- ☐ противошоковый

100. Выберите правильный ответ

Побочное действие эуфиллина

- ☐ повышение АД
- ☐ брадикардия
- ☐ сонливость
- ☒ тахикардия

2. Современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности

101. Выберите правильный ответ

Длительность действия В-2 агонистов короткого действия

- ☐ 2–4 часа
- ☒ 4–6 часов
- ☐ 6–8 часов
- ☐ 8–10 часов

102. Выберите правильный ответ

Тахикардия - это побочное явление

- ☐ атровента
- ☒ сальбутамола
- ☐ беродуала
- ☐ спирива

103. Выберите правильный ответ

Побочное явление ингаляционных ГКС

- ☐ повышение АД
- ☒ кандидоз полости рта
- ☐ синдром «Кушингоида»
- ☐ повышение массы тела

104. Выберите правильный ответ

Механизм действия беротека

- ☐ блокада М холинорецепторов
- ☒ стимуляция В-2 адренорецепторов
- ☐ стимуляция М холинорецепторов
- ☐ блокада гистаминорецепторов

105. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при инфаркте миокарда

- ☐ валидол, лазикс
- ☐ корвалол, пентамин
- ☒ морфин, актилизе
- ☐ но-шпа, атропин

106. Выберите правильный ответ

Отек легких - это форма острой недостаточности

- ☐ коронарной
- ☒ левожелудочковой
- ☐ правожелудочковой
- ☐ сосудистой

107. Выберите правильный ответ

Самое грозное осложнение фибрилляции предсердий

- ☐ приступ стенокардии
- ☐ гипертонический криз
- ☒ тромбоэмболии
- ☐ коллапс

108. Выберите правильный ответ

Аускультативно при гипертоническом кризе

- ☐ ослабление первого тона на верхушке
- ☐ ослабление второго тона на верхушке
- ☒ акцент второго тона на аорте
- ☐ акцент второго тона на легочной артерии

109. Выберите правильный ответ

Удушье и обильная пенная розовая мокрота на фоне гипертонического криза - это

- ☐ долевая пневмония

- ☐ легочное кровотечение

- ☒ отек легких

- ☐ тромбоэмболия легочной артерии

110. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы кардиогенного шока

- ☐ лихорадка, тахикардия
- ☐ кашель, одышка
- ☒ снижение АД, частый нитевидный пульс
- ☐ напряженный пульс

111. Выберите правильный ответ

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец

- ☐ Р
- ☒ Q
- ☐ R
- ☐ S

112. Выберите правильный ответ

Основным симптомом полной А-V блокады является

- ☐ коллапс
- ☐ одышка
- ☒ обморок
- ☐ лихорадка

113. Выберите два правильных ответа

Неотложная догоспитальная помощь при острой потере зрения в результате гипертонического криза

- ☒ 1 таблетка нитроглицерина под язык
- ☒ 2 мл - 2% р-ра папаверина гидрохлорида
- ☐ коррекция зрения очками
- ☐ тонометрия
- ☐ все выше перечисленные варианты верны

114. Выберите правильный ответ

Расширять зрачок нельзя при

- ☐ офтальмоскопии
- ☐ иридоциклите
- ☐ блефарите
- ☒ глаукоме

115. Выберите правильный ответ

Противопоказано при проникающем ранении глаза

- ☒ заложить за веки мазь
- ☐ промыть конъюнктивальную полость водой
- ☐ закапать 20% раствор сульфацила натрия
- ☐ провести тонометрию

116. Выберите правильный ответ

Инородное тело из носа удаляют

- ☒ крючком
- ☐ пинцетом
- ☐ корцангом
- ☐ проволочной петлей

117. Выберите правильный ответ

Беспокойное поведение ребенка при надавливании на козелок - симптом

- ☒ отита
- ☐ стоматита
- ☐ ангины
- ☐ нарушение прорезывания зубов

118. Выберите правильный ответ

Грязно-серый, трудно снимаемый налет на миндалине, характерен для

- ☒ дифтерии
- ☐ аденоидов
- ☐ фолликулярной ангины
- ☐ лакунарной ангины

119. Выберите правильный ответ

Симптом «хлопка» характерен для

- ☒ инородного тела трахеи
- ☐ дифтерии гортани
- ☐ травмы гортани
- ☐ острого ларингита

120. Выберите правильный ответ

Признаки лакунарной ангины

- ☒ белый, легко снимающийся налет на миндалинах
- ☐ грязно-серые пленки на миндалинах, дужках, мягком небе трудно снимаются
- ☐ налетов нет
- ☐ темно-серый налет, легко снимается

121. Выберите два правильных ответа

Осложнения фурункула носа

- ☒ внутричерепные
- ☒ сепсис
- ☐ повышение АД
- ☐ носовое кровотечение
- ☐ серозные выделения из носа

122. Выберите правильный ответ

Транспортировка пациента при инородном теле в трахее

- ☒ в полусидячем положении
- ☐ лежа на боку
- ☐ лежа на спине
- ☐ лежа на животе

123. Выберите два правильных ответа

Неотложная помощь пациенту с носовым кровотечением

- ☒ голову пациента слегка наклонить вперед
- ☒ ввести в нижнюю треть полости носа гемостатическую губку
- ☐ голову пациента запрокинуть назад
- ☐ грелку на переносицу
- ☐ сосудосуживающие капли в нос

124. Выберите правильный ответ

Симптом натяжения при пояснично-крестцовом радикулите

- ☐ ригидность затылочных мышц
- ☒ симптом Ласега
- ☐ симптом Горнера
- ☐ симптом Брудзинского

125. Выберите правильный ответ

Артериальное давление при геморрагическом инсульте обычно

- ☒ повышено
- ☐ в норме
- ☐ понижено
- ☐ не меняется

126. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

127. Выберите правильный ответ

Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке (недель)

- ☐ 10-12
- ☐ 2-3
- ☒ 5-6
- ☐ 8-9

128. Выберите правильный ответ

Шейка матки при шейечной беременности имеет форму

- ☒ бочкообразную
- ☐ цилиндрическую
- ☐ округлую
- ☐ коническую

129. Выберите правильный ответ

Трубный аборт возникает при имплантации плодного яйца в части маточной трубы

- ☐ истмической
- ☐ интерстициальной
- ☒ ампулярной
- ☐ интрамуральной

130. Выберите правильный ответ

Меноррагия - это менструации

- ☐ скудные короткие
- ☒ длительные обильные
- ☐ болезненные
- ☐ редкие

131. Выберите два правильных ответа

Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения чаще встречаются

- ☐ после родов
- ☒ в перименопаузальном периоде
- ☐ после аборта
- ☐ в репродуктивном возрасте
- ☒ в периоде полового созревания

132. Выберите правильный ответ

Основной клинический симптом подслизистой миомы матки

- ☐ боль внизу живота
- ☐ железодефицитная анемия
- ☒ меноррагия (гиперменструальный синдром)
- ☐ вторичное бесплодие

133. Выберите два правильных ответа

Апоплексия яичника - это

- ☐ воспаление яичников
- ☒ разрыв яичника
- ☒ кровоизлияние в яичник

- ☐ нарушение кровоснабжения яичника
- ☐ спаечный процесс

134. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод исследования при внематочной беременности

- ☒ пункция заднего свода влагалища
- ☐ осмотр наружных половых органов
- ☐ двуручное влагалищное исследование
- ☐ ректоабдоминальное исследование

135. Выберите правильный ответ

Дополнительный метод остановки маточного кровотечения

- ☒ лечебно-диагностическое выскабливание
- ☐ осмотр наружных половых органов
- ☐ двуручное влагалищное исследование
- ☐ ректоабдоминальное исследование

136. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую руку накладыва-
ется электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☒ желтого цвета
- ☐ черного цвета
- ☐ красного цвета

137. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую руку накладыва-
ется электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☐ черного цвета
- ☒ красного цвета

138. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на левую ногу накладыва-
ется электрод

- ☒ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☐ черного цвета
- ☐ красного цвета

139. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую ногу накладыва-
ется электрод

- ☐ зеленого цвета
- ☐ желтого цвета
- ☒ черного цвета
- ☐ красного цвета

140. Выберите правильный ответ

При записи грудной V1 электрод располагается

- ☒ у правого края грудины в IV межреберье
- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ между электродами V2 и V4
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

141. Выберите правильный ответ

При записи грудной V2 электрод располага-
ется

- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
- ☒ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ по правой срединно-ключичной линии в V межреберье

- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье

142. Выберите правильный ответ

При записи грудной V3 электрод располага-
ется

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☒ между электродами V2 и V4
- ☐ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по левой передней подмышечной линии на уровне электрода V4

143. Выберите правильный ответ

При записи грудной V4 электрод располага-
ется

- ☐ у левого края грудины в IV межреберье
- ☐ у правого края грудины в IV межреберье
- ☒ по левой срединно-ключичной линии в V межреберье
- ☐ по передней подмышечной линии в VI межреберье

144. Выберите правильный ответ

При записи грудной V5 электрод располага-
ется

- ☐ срединно-ключичной линии в V межребе-
рье
- ☒ передней подмышечной линии на уровне
электрода V4
- ☐ средней подмышечной линии на уровне
электрода V4
- ☐ задней подмышечной линии на уровне
электрода V4

145. Выберите правильный ответ

При записи грудной V6 электрод располага-
ется

- ☐ срединно-ключичной линии в V межребе-
рье
- ☐ передней подмышечной линии на уровне
электрода V4
- ☒ средней подмышечной линии на уровне
электрода V4
- ☐ задней подмышечной линии на уровне
электрода V4

146. Выберите правильный ответ

Стандартными отведениями на ЭКГ называ-
ются

- ☒ I, II, III
- ☐ aVR, aVL, aVF
- ☐ V1, V2, V3
- ☐ V7-V9

147. Выберите правильный ответ

Первоочередными мероприятием у постра-
давшего без сознания после падения с высо-
ты или ныряния в воду является

- ☐ выполнение тройного приема Сафара
- ☐ интубация трахеи
- ☒ фиксация шейного отдела позвоночника с
помощью шины-воротника

☐ внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов

148. Выберите правильный ответ

Шкала Глазго используется для оценки

- ☒ уровня угнетения сознания
- ☐ степени тяжести шока
- ☐ выраженности дыхательных расстройств при коме
- ☐ состояния новорожденного

149. Выберите правильный ответ

Диаметр зрачка в норме при обычном освещении примерно равен

- ☐ 0,5 мм
- ☐ 1-1,5 мм
- ☐ 2-2,5 мм
- ☒ 3-4 мм

150. Выберите правильный ответ

Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку

- ☐ 1-2 см
- ☒ 5 см
- ☐ 7-8 см
- ☐ 9-10 см

151. Выберите правильный ответ

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- ☐ повернута набок
- ☒ запрокинута назад
- ☐ согнута вперед
- ☐ в исходном положении

152. Выберите правильный ответ

Признаки клинической смерти

- ☒ потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях
- ☐ спутанность сознания и возбуждение
- ☐ нитевидный пульс на сонных артериях
- ☐ дыхание не нарушено

153. Выберите правильный ответ

Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца

- ☐ перелом ключицы
- ☒ перелом ребер
- ☐ повреждение трахеи
- ☐ перелом позвоночника

154. Выберите правильный ответ

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- ☒ центр грудной клетки
- ☐ на границе верхней и средней третей грудины
- ☐ на границе средней и нижней третей грудины
- ☐ в пятом межреберном промежутке слева

155. Выберите правильный ответ

Правило укладывания больного при сердечно-легочной реанимации

- ☐ приподнять ножной конец
- ☐ приподнять головной конец
- ☒ положить на твердую ровную поверхность
- ☐ опустить головной конец

156. Выберите правильный ответ

К недостатку кислорода наиболее чувствительны клетки

- ☒ мозга
- ☐ сердца
- ☐ легких
- ☐ почек

157. Выберите три правильных ответа

Противопоказания к проведению реанимационных мероприятий

- ☒ явная биологическая смерть
- ☐ необоснованная смерть
- ☐ злокачественная опухоль
- ☒ безуспешность реанимационных мероприятий в течение 20-30 мин
- ☒ терминальная стадия неизлечимого заболевания

158. Выберите правильный ответ

Мраморный цвет кожи является признаком:

- ☐ нарушения обмена веществ с накоплением кислых продуктов
- ☒ нарушения периферического кровообращения
- ☐ шока
- ☐ спазма мелких сосудов кожи

159. Выберите правильный ответ

Зонд в желудок взрослого человека вводится

- ☐ на расстояние 30-35 см
- ☐ до второй отметки
- ☒ на расстояние от крыльев носа до мочки уха, умноженное на 3
- ☐ до появления рвоты

160. Выберите два правильных ответа

Основное осложнение коматозных состояний

- ☒ аспирация желудочного содержимого
- ☒ синдром позиционного сдавления
- ☐ тромбоэмболия легочной артерии
- ☐ острый инфаркт миокарда

161. Выберите правильный ответ

Общий объем жидкости для промывания желудка у детей определяется из расчета

- ☐ 1 л на 1 кг веса
- ☒ 1 л на 1 год жизни
- ☐ 1 л на кв.м площади тела
- ☐ 10 л минус вес ребенка

162. Выберите правильный ответ

Шок – это

- ☐ острая сердечная недостаточность
- ☐ острая сердечно-сосудистая недостаточность
- ☒ острое нарушение периферического кровообращения

☐ острая сердечно-легочная недостаточность

163. Выберите правильный ответ

Максимальным повреждающим действием на стенку вены обладает препарат

- ☐ тиопентал натрия
- ☐ промедол
- ☐ физиологический раствор NaCl
- ☒ 10% раствор хлористого калия

164. Выберите правильный ответ

Постуральный дренаж предполагает

- ☐ дренирование плевральной полости под-водным дренажом
- ☐ дренирование плевральной полости труб-кой с клапаном
- ☐ дренирование плевральной полости с ак-тивной аспирацией
- ☒ особые положения больного, обеспечи-вающие отток мокроты из трахеобронхиаль-ного дерева

165. Выберите правильный ответ

Укажите концентрацию изотонического рас-твора глюкозы

- ☐ 0,85%
- ☐ 3%
- ☐ 10%
- ☒ 5%

166. Выберите правильный ответ

Признак ожога 2-ой степени

- ☐ гиперемия кожи
- ☒ отслойка эпидермиса с образованием пу-зырей
- ☐ омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосных луковиц, потовых и сальных желез
- ☐ некроз всех слоев

167. Выберите три правильных ответа

Правила установки желудочного зонда у но-ворожденных

- ☒ вводить желудочный зонд через нос, либо через рот
- ☒ определить глубину введения зонда: ото рта до мечевидного отростка, либо 2-х крат-ное расстояние от уха до носа
- ☒ обрабатывать всю вводимую часть
- ☐ вводить желудочный зонд только через нос
- ☐ вводить желудочный зонд только через рот
- ☐ менять зонд как можно реже

168. Выберите правильный ответ

Пути введения адреналина при проведении первичной реанимации новорожденного

- ☐ внутривенный + подкожный
- ☐ эндотрахеальный + подкожный
- ☐ подкожный + внутримышечный
- ☒ внутривенный + эндотрахеальный

169. Выберите правильный ответ

Прекратить наружный массаж сердца можно при появлении у ребенка ЧСС более (уда-ров/минуту)

- ☐ 50
- ☐ 100
- ☒ 80
- ☐ 140

170. Выберите правильный ответ

Критерием живорождения не является

- ☐ пульсация сосудов пуповины
- ☐ наличие сердечной деятельности
- ☐ наличие спонтанного дыхания
- ☒ разлитой цианоз

171. Выберите правильный ответ

При проведении сердечно-легочной реани-мации новорожденным соотношение ЧД:ЧСС

- ☐ 2:5
- ☐ 1:2
- ☒ 1:3
- ☐ 1:5

172. Выберите правильный ответ

Дошкольный период продолжается

- ☐ с 4 недель до 1 года
- ☒ с 4 до 7 лет
- ☐ от 1 до 3 лет
- ☐ от 7 до 12 лет

173. Выберите правильный ответ

Справка об отсутствии контактов с инфекци-онными больными действительна

- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☒ 3 дня
- ☐ 21 день

174. Выберите правильный ответ

Первая профилактическая прививка в дет-ском учреждении после поступления прово-дится не ранее, чем через

- ☐ 3 месяца
- ☐ 6 месяцев
- ☒ 1 месяц
- ☐ 1 год

175. Выберите два правильных ответа

Антропометрия – это

- ☐ подсчет пульса
- ☐ измерение артериального давления
- ☒ измерение массы тела
- ☐ подсчет частоты дыхания
- ☒ измерение длины тела

176. Выберите правильный ответ

Вакцины хранятся при температуре в граду-сах по Цельсию

- ☐ от +8 до +10
- ☐ от +12 до +14
- ☒ от +2 до +8
- ☐ от +20

177. Выберите два правильных ответа

К проведению профилактических прививок допускается

- ☐ любой сотрудник поликлинического отделения
- ☐ участковая медсестра
- ☒ медсестра с допуском к вакцинации
- ☐ медсестра с катаральными проявлениями
- ☒ медсестра без катаральных проявлений

178. Выберите правильный ответ

Признак внутриутробной гипоксии

- ☐ шум пуповины
- ☒ учащение сердцебиения плода свыше 160 ударов в минуту
- ☐ выслушивание сердцебиения плода ниже пупка
- ☐ отсутствие шевеления плода

179. Выберите правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- ☐ боль в грудной клетке
- ☐ лихорадка
- ☒ одышка
- ☐ слабость

180. Выберите правильный ответ

Основной симптом острого бронхита у детей

- ☐ слабость
- ☐ повышение температуры
- ☐ снижение аппетита
- ☒ кашель

181. Выберите правильный ответ

Бронхиальная астма у ребенка характеризуется

- ☐ лихорадкой
- ☐ судорогами
- ☒ приступами удушья
- ☐ отеками

182. Выберите правильный ответ

К проявлениям недостаточности кровообращения относится

- ☐ увеличение селезенки
- ☐ рвота
- ☒ тахикардия
- ☐ боли в животе

183. Выберите правильный ответ

При обмороке ребенку следует придать положение

- ☐ лежа с приподнятым головным концом
- ☒ лежа с приподнятым ножным концом
- ☐ лежа на боку
- ☐ сидя с опущенными ногами

184. Выберите правильный ответ

Атопический дерматит у детей характеризуется поражением

- ☐ центральной нервной системы
- ☐ сердца
- ☒ кожи
- ☐ почек

185. Выберите правильный ответ

Препараты для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
- ☒ антиретровирусные
- ☐ симптоматические
- ☐ гормональные

186. Выберите правильный ответ

Наиболее ранний срок обнаружения антител с момента заражения

- ☐ 1 неделя
- ☐ 1 месяц
- ☒ 2 недели
- ☐ 2 месяца

187. Выберите правильный ответ

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

188. Выберите правильный ответ

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
- ☐ для выявления ВИЧ
- ☒ для тестирования при аварийных ситуациях
- ☐ для ранней диагностики

189. Выберите правильный ответ

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

190. Выберите правильный ответ

Основные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

- ☒ серологические
- ☐ генетические
- ☐ люминесцентные
- ☐ бактериологические

191. Выберите правильный ответ

Реакция, используемая для диагностики ВИЧ-инфекции в МО

- ☐ иммунный блоттинг (ИБ)
- ☒ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ полимеразная цепная реакция (ПЦР)
- ☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

192. Выберите правильный ответ

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 1 сутки

193. Выберите правильный ответ

Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

194. Выберите правильный ответ

Срок направления экстренного извещения о впервые выявленном онкопроцессе (в днях)

- ☒ 3
- ☐ 7
- ☐ 10
- ☐ 15

195. Выберите правильный ответ

Сустав, в котором чаще происходит вывих

- ☐ локтевой
- ☐ коленный
- ☒ плечевой
- ☐ тазобедренный

196. Выберите правильный ответ

Достоверный признак вывиха

- ☒ пружинящая фиксация
- ☐ патологическая подвижность
- ☐ нарушение функции
- ☐ отёк, боль

197. Выберите правильный ответ

Признак рака желудка IV стадии

- ☐ психическая депрессия
- ☒ наличие уплотнений в левой надключичной области
- ☐ желудочный дискомфорт
- ☐ отказ от мясных блюд

198. Выберите правильный ответ

Опоясывающая боль в эпигастральной области характерна для

- ☒ панкреатита
- ☐ холецистита
- ☐ аппендицита
- ☐ перитонита

199. Выберите два правильных ответа

Признаки рака молочной железы

- ☒ втянутый сосок
- ☒ безболезненное уплотнение
- ☐ болезненное уплотнение
- ☐ симптом флюктуации

200. Выберите два правильных ответа

Доскообразный живот является признаком

- ☒ перфоративной язвы желудка
- ☐ острого аппендицита

- ☐ острого холецистита
- ☒ острого перитонита
- ☐ хронического аднексита

201. Выберите правильный ответ

Потеря сознания через «светлый промежуток» является признаком

- ☐ сотрясения
- ☐ ушиба
- ☒ сдавления
- ☐ перелома основания черепа

202. Выберите два правильных ответа

Осложнения при переломе костей таза

- ☐ вынужденное положение
- ☒ разрыв мочевого пузыря
- ☐ гематурия
- ☒ разрыв уретры

203. Выберите два правильных ответа

Признаки гемотораксов

- ☐ нарастающая одышка, цианоз
- ☐ коробочный звук
- ☒ тупость в нижних отделах грудной клетки
- ☒ одышка и бледность кожных покровов

204. Выберите два правильных ответа

Для определения площади ожоговой поверхности используется правило

- ☒ ладони
- ☒ девяток
- ☐ Безредки
- ☐ Вишневского

205. Выберите правильный ответ

Максимальный срок пребывания жгута Эсмарха на конечности

- ☒ 1,5/2 часа
- ☐ 1 час
- ☐ 30 минут
- ☐ 15/20 минут

206. Выберите правильный ответ

Вид операции, излечивающий от онкопроцесса

- ☐ паллиативная
- ☐ плановая;
- ☐ экстренная
- ☒ радикальная

207. Выберите правильный ответ

Истечение крови и ликвора из ушей и носа при ЧМТ характерно для

- ☐ сдавления
- ☐ ушиба
- ☐ сотрясения
- ☒ перелома основания черепа

208. Выберите правильный ответ

Симптом скрытого желудочного кровотечения

- ☐ боли в эпигастрии
- ☒ дёгтеобразный стул
- ☐ метеоризм
- ☐ желудочный дискомфорт

209. Выберите правильный ответ

Гиперемия с четкими границами - признак

- ☒ рожистого воспаления
- ☐ флегмоны
- ☐ абсцесса
- ☐ лимфангоита

210. Выберите правильный ответ

Репозиция проводится при (переломах)

- ☐ открытых
- ☐ закрытых
- ☐ без смещения
- ☒ со смещением

211. Выберите правильный ответ

Кратковременная потеря сознания вслед за травмой при ЧМТ является признаком

- ☒ сотрясения
- ☐ ушиба
- ☐ сдавления
- ☐ перелома основания черепа

212. Выберите правильный ответ

Методом эндоскопической диагностики является

- ☐ ирригоскопия
- ☒ колоноскопия
- ☐ компьютерная томография
- ☐ урография

213. Выберите правильный ответ

Пальпацию живота начинают с

- ☒ со здоровой стороны живота
- ☐ с больной стороны живота
- ☐ всегда с верхних отделов живота
- ☐ всегда с нижних отделов живота

214. Выберите правильный ответ

Опоясывающая боль в эпигастральной области характерна для

- ☒ панкреатита
- ☐ холецистита
- ☐ аппендицита
- ☐ перитонита

215. Выберите правильный ответ

Наиболее опасный симптом ранения

- ☒ кровотечение
- ☐ боль
- ☐ зияние
- ☐ нарушение функции

216. Выберите правильный ответ

Самое частое осложнение случайных ран

- ☐ столбняк
- ☒ нагноение
- ☐ сепсис
- ☐ газовая гангрена

217. Выберите правильный ответ

Признак дореактивного периода отморожений

- ☒ ткани бледные, холодные
- ☐ пузыри с серозным содержимым
- ☐ пузыри с геморрагическим содержимым
- ☐ струп чёрного цвета

218. Выберите правильный ответ

Достоверный признак разрыва мышц

- ☐ нарушение функции
- ☐ отёк, кровоподтёк
- ☒ дефект по ходу мышц
- ☐ локальная болезненность

219. Выберите правильный ответ

Осложнение в процессе лечения отморожений

- ☒ присоединение простудных заболеваний
- ☐ токсемия
- ☐ некроз тканей
- ☐ появление демаркационной линии

220. Выберите правильный ответ

Позднее осложнение отморожений

- ☐ облитерирующий атеросклероз
- ☐ некроз тканей
- ☒ облитерирующий эндартериит
- ☐ простудные заболевания

221. Выберите правильный ответ

Гематогенный остеомиелит начинается

- ☒ остро с симптомов тяжелой интоксикации
- ☐ остро с признаков местного воспаления
- ☐ постепенно нарастающей интоксикации
- ☐ острой боли в пораженной конечности

222. Выберите правильный ответ

Степень отморожений можно определить

- ☐ сразу после согревания
- ☐ на 2-ой день
- ☐ в дореактивном периоде
- ☒ спустя несколько дней

223. Выберите правильный ответ

Отличительный признаком ожога II степени является - наличие

- ☒ пузырей
- ☐ гиперемии
- ☐ струпа
- ☐ отёка

224. Выберите правильный ответ

Злокачественная опухоль

- ☐ состоит из зрелых клеток
- ☒ рецидивирует, метастазирует
- ☐ имеет четкие границы
- ☐ не прорастает соседние ткани

225. Выберите правильный ответ

Признак желудочного кровотечения

- ☒ рвота кофейной гущей
- ☐ выделение пенистой крови
- ☐ притупление в отлогих местах живота
- ☐ примесь свежей крови в каловых массах

226. Выберите правильный ответ

Самый достоверный метод диагностики онкопроцесса

- ☐ рентгенологический
- ☐ радиоизотопный
- ☒ гистологический
- ☐ ультрозвуковой

227. Выберите правильный ответ

Болезненная осевая нагрузка является признаком

- ☐ вывиха
- ☒ перелома
- ☐ ушиба
- ☐ растяжения связок

228. Выберите два правильных ответа

Основными причинами развития инфекционно-токсического шока при менингококковой инфекции являются

- ☐ потеря жидкости
- ☐ повышение гематокрита
- ☐ потеря плазмы и форменных элементов крови
- ☒ бактериемия
- ☒ эндотоксемия

229. Выберите правильный ответ

Патогномоничный признак отравления окисью углерода у детей

- ☐ приступ апноэ
- ☒ карминно-розовая окраска кожи
- ☐ тяжелая гипотония мышц
- ☐ синюшность кожных покровов

230. Выберите правильный ответ

Количество промывной жидкости

- ☒ 1 литр на год жизни
- ☐ 0,5 литра на год жизни
- ☐ 1,5 литра на год жизни
- ☐ 0,1 литра на год жизни

231. Выберите правильный ответ

Промывать желудок можно

- ☐ раствором гидрокарбоната-натрия
- ☐ раствором кислоты
- ☐ водой с добавлением перманганата калия
- ☒ чистой водой

232. Выберите правильный ответ

Токсическое действие угарного газа вызывает

- ☒ образование карбоксигемоглобина
- ☐ образование метгемоглобина
- ☐ гемолиз эритроцитов
- ☐ образование оксигемоглобина

233. Выберите правильный ответ

Пути попадания отравляющих веществ в организм ребенка

- ☐ через рот
- ☐ через кожу
- ☐ через дыхательные пути
- ☒ через рот, через кожу, через дыхательные пути

234. Выберите правильный ответ

Скрытый период отсутствует при проникновении яда через

- ☐ желудок
- ☐ кожу
- ☐ легкие
- ☒ местном воздействии прижигающих ядов

235. Выберите правильный ответ

Острый аппендицит у детей чаще всего встречается

- ☐ у детей до 1-го года
- ☐ с 1 до 3-х лет
- ☐ 4-7 лет
- ☒ старше 8-ми лет

236. Выберите правильный ответ

Какие симптомы характерны для начальных проявлений острого аппендицита у детей раннего возраста

- ☒ боли в области пупка
- ☐ многократная рвота
- ☐ боли в правой подвздошной области
- ☐ жидкий стул

237. Выберите правильный ответ

Наиболее часто встречаемая форма непроходимости у детей

- ☒ инвагинация кишечника
- ☐ спаечная непроходимость
- ☐ странгуляционная непроходимость
- ☐ обтурационная непроходимость

238. Выберите правильный ответ

Чаще всего инвагинация кишечника встречается в возрасте

- ☐ 1-6 месяцев
- ☒ 6-18 месяцев
- ☐ старше 3-х лет
- ☐ младший школьный

239. Выберите два правильных ответа

Какие препараты чаще всего используются для купирования судорог у детей

- ☒ сибазон
- ☐ аминазин
- ☐ дроперидол
- ☐ гексенал
- ☒ оксibuтират-натрия

240. Выберите три правильных ответа

Характерные симптомы при инвагинации кишечника

- ☒ схваткообразные боли
- ☒ выделение крови из прямой кишки
- ☒ определение инвагината при пальпации
- ☐ рвота кофейной гущей
- ☐ судороги
- ☐ повышение температуры

241. Выберите три правильных ответа

Признаки гипокальциемических судорог у детей

- ☐ очаговый характер
- ☒ ларингоспазм
- ☐ положительный эффект введения седуксена
- ☒ положительный симптом Хвостека
- ☒ карпопедальный спазм
- ☐ положительная менингеальная симптоматика

242. Выберите правильный ответ

Какое осложнение чаще всего возникает при высокой лихорадке у детей раннего возраста

- ☐ острая почечная недостаточность
- ☐ недостаточность кровообращения
- ☒ судороги
- ☐ отек легких

243. Выберите правильный ответ

Для острого стенозирующего ларинготрахеита нехарактерно

- ☒ обилие влажных хрипов в легких
- ☐ инспираторной одышки
- ☐ отрывистого кашля
- ☐ измененного голоса

244. Выберите правильный ответ

Для острого эпиглоттита нехарактерно

- ☐ подъем температуры
- ☐ интоксикация
- ☐ быстрое начало
- ☒ наличие «лающего» кашля

245. Выберите два правильных ответа

Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется

- ☒ появлением одышки при нагрузке
- ☐ появлением одышки в покое
- ☒ втяжением яремной ямки при вдохе
- ☐ втяжением всех уступчивых мест грудной клетки
- ☐ спутанностью сознания

246. Выберите правильный ответ

Чаще острый стенозирующий ларинготрахеит развивается

- ☐ летом
- ☐ зимой
- ☐ независимо от времени года
- ☒ зимой и весной

247. Выберите правильный ответ

Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей развивается в возрасте

- ☒ от 6 мес до 3 лет
- ☐ от 3 до 5 лет
- ☐ старше 5 лет
- ☐ в период новорожденности

248. Выберите два правильных ответа

Для стеноза гортани 2 стадии характерно

- ☒ участие вспомогательной мускулатуры при вдохе в покое
- ☒ акроцианоз в покое
- ☐ сопор
- ☐ участие вспомогательной дыхательной мускулатуры при беспокойстве
- ☐ экспираторная одышка в покое

249. Выберите правильный ответ

Для купирования острого стенозирующего ларинготрахеита проводят ингаляции

- ☒ пульмикортом
- ☐ преднизолоном
- ☐ дексаметазоном
- ☐ беродуала

250. Выберите три правильных ответа

При остром эпиглоттите противопоказано применение

- ☐ глюкокортикостероидов
- ☐ ингаляции увлажненного кислорода
- ☒ седативных препаратов
- ☒ спазмолитиков
- ☒ антигистаминных препаратов

251. Выберите правильный ответ

Клиническая триада менингита

- ☐ головная боль, боли в животе, рвота
- ☐ головная боль, боли в животе, лихорадка
- ☒ головная боль, рвота, лихорадка
- ☐ боли в животе, рвота, лихорадка

252. Выберите правильный ответ

Сыпь, наиболее характерная для менингококковой инфекции

- ☐ мелкоточечная
- ☐ мелкопятнистая
- ☐ папулезная
- ☒ геморрагическая

253. Выберите правильный ответ

Наиболее важный диагностический признак менингококцемии

- ☐ острейшее начало с ознобом и температурой тела 39-41 °C
- ☐ бледность и цианоз кожных покровов
- ☒ геморрагическая сыпь
- ☐ увеличение печени и селезенки

254. Выберите правильный ответ

Наиболее часто применяемый на этапе скорой помощи антибиотик для лечения менингококковой инфекции

- ☐ пенициллин
- ☐ ампициллин
- ☒ цефтриаксон
- ☐ оксациллин

255. Выберите правильный ответ

Основными симптомами менингококкового менингита являются

- ☒ лихорадка, рвота, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига
- ☐ парез конечностей
- ☐ везикулезная сыпь в сочетании с очаговой неврологической симптоматикой
- ☐ парез мягкого неба

256. Выберите правильный ответ

Характер стула при остром аппендиците у детей младшего возраста может быть

- ☐ только нормальный
- ☐ чаще жидкий
- ☒ может быть как нормальный, так и жидкий
- ☐ чаще запоры

257. Выберите правильный ответ

Через какое время при инвагинации кишечника возникает задержка стула и газов

- ☐ 1-2 часа

- ☐ 3-5 часов
- ☒ 6-10 часов
- ☐ 12-24 часа

258. Выберите правильный ответ

Признаки начала первого периода родов

- ☐ излитие околоплодных вод
- ☐ наличие зрелой шейки матки
- ☒ появление регулярных схваток
- ☐ вставление головки во вход в малый таз

259. Выберите правильный ответ

Продолжительность первого периода родов у первородящих составляет (часов)

- ☐ 5-7
- ☒ 8-12
- ☐ 11-13
- ☐ 14-16

260. Выберите правильный ответ

Удлинение безводного промежутка не допустимо более (часов)

- ☐ 6
- ☐ 9
- ☒ 18
- ☐ 16

261. Выберите правильный ответ

Продолжительность второго периода родов у повторнородящих (часов)

- ☐ 0,5
- ☒ 0,5-1
- ☐ 1-1,5
- ☐ 1,5-2

262. Выберите правильный ответ

Период изгнания плода начинается с момента

- ☐ отхождения околоплодных вод
- ☒ полного открытия шейки матки
- ☐ начала потуг
- ☐ опущения головки на тазовое дно

263. Выберите правильный ответ

Продолжительность послеродового периода

- ☐ 1-2 недели
- ☐ 2-4 недели
- ☐ 4-6 недель
- ☒ 6-8 недель

264. Выберите два правильных ответа

Признаками тяжелой преэклампсии являются

- ☐ нормотония
- ☐ зрение ясное
- ☒ боль в эпигастральной области, рвота
- ☒ мелькание мушек перед глазами
- ☐ фибриллярные подергивания мышц лица

265. Выберите два правильных ответа

Осложнения беременности при сахарном диабете

- ☐ маловодие
- ☐ гипотрофия плода
- ☒ многоводие
- ☒ преэклампсия
- ☐ олигурия

266. Выберите два правильных ответа

Симптомами клинически узкого таза являются

- ☒ отсутствие поступательного движения головки плода
- ☒ положительный признак Вастена
- ☐ слабость родовой деятельности
- ☐ отрицательный признак Вастена
- ☐ свободное мочеиспускание

267. Выберите два правильных ответа

Проявлениями геморрагического шока являются

- ☒ гипотония
- ☒ тахикардия
- ☐ протеинурия
- ☐ брадикардия
- ☐ полиурия

268. Выберите правильный ответ

Менструации при трубной беременности

- ☒ отсутствуют
- ☐ циклические
- ☐ ациклические
- ☐ нерегулярные

269. Выберите правильный ответ

Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза

- ☐ резко повышено
- ☒ понижено
- ☐ незначительно повышено
- ☐ нормальное

270. Выберите правильный ответ

Повышение внутриглазного давления

- ☐ конъюнктивит
- ☐ ячмень
- ☐ нистагм
- ☒ глаукома

271. Выберите правильный ответ

Профилактика глаукомы

- ☐ назначение контактных линз
- ☐ проведение носо-слёзных проб
- ☒ регулярная тонометрия
- ☐ закапывания за веки витаминных препаратов

272. Выберите два правильных ответа

Необходимые правила при обработке при чесотке

- ☒ обработка вечером
- ☒ обработка всего кожного покрова
- ☐ обработка в утренние часы
- ☐ обработка поражённых участков кожи
- ☐ экспозиция любого препарата 6 часов

273. Выберите правильный ответ

Пациенты с рожистым воспалением на лице нуждаются

- ☒ в срочной госпитализации
- ☐ госпитализация не показана
- ☐ срочная изоляция
- ☐ срочное лабораторное исследование

274. Выберите правильный ответ

Морфологический элемент крапивницы

- ☒ волдырь
- ☐ пузырь
- ☐ бугорок
- ☐ узел

275. Выберите два правильных ответа

Признаки первичного периода сифилиса

- ☒ эрозия, язва
- ☒ увеличение регионарных лимфоузлов
- ☐ сгруппированные бугорки
- ☐ розеола, папулы
- ☐ мелкоочаговое облысение

276. Выберите два правильных ответа

Типичная локализация высыпаний при чесотке у взрослого человека

- ☒ кисти
- ☒ живот
- ☐ весь кожный покров
- ☐ волосистая часть головы
- ☐ лицо

277. Выберите правильный ответ

Самый контагиозный период сифилиса

- ☒ вторичный период
- ☐ первичный период
- ☐ третичный период
- ☐ инкубационный период

278. Выберите два правильных ответа

Возможные пути передачи чесотки

- ☒ использование белья больного
- ☒ половой контакт
- ☐ употребление недоброкачественной пищи
- ☐ укусы насекомых
- ☐ переливание крови

279. Выберите правильный ответ

Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является

- ☒ отсутствие пульса на сонных артериях
- ☐ отсутствие самостоятельного дыхания
- ☐ широкие зрачки
- ☐ отсутствие сознания

280. Выберите правильный ответ

При потере сознания у пациента, в первую очередь, необходимо проверить

- ☐ реакцию зрачков на свет
- ☐ наличие самостоятельного дыхания
- ☐ пульс на лучевой артерии
- ☒ пульс на сонных артериях

281. Выберите правильный ответ

Наиболее часто при клинической смерти остановка кровообращения проявляется на ЭКГ

- ☐ полной атриовентрикулярной блокадой
- ☐ асистолией
- ☒ фибрилляцией желудочков
- ☐ синусовой тахикардией

282. Выберите правильный ответ

Продолжительность клинической смерти (без проведения РМ при обычных условиях окружающей среды составляет

- ☐ 1 минуту
- ☐ 3 минуты
- ☒ 5 минут
- ☐ 15 минут

283. Выберите правильный ответ

Ранним признаком биологической смерти является

- ☐ отсутствие сознания
- ☐ трупное окоченение
- ☒ положительный симптом «кошачьего зрачка»
- ☐ асистолия

284. Выберите правильный ответ

Преимуществом масочной вентиляции легких является

- ☒ техническая простота подсоединения аппарата к больному
- ☐ надежность поддержания герметичности дыхательных путей
- ☐ предупреждение асфиксии вследствие западения корня языка
- ☐ предупреждение аспирации рвотных масс

285. Выберите правильный ответ

К преимуществам искусственной вентиляции через интубационную трубку не относится

- ☐ обеспечение стабильной проходимости дыхательных путей
- ☒ предупреждение бронхоспазма
- ☐ профилактика аспирации желудочного содержимого
- ☐ герметичность дыхательных путей

286. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения искусственного дыхания свидетельствует

- ☐ видимое взбухание в эпигастрии
- ☒ наличие экскурсии грудной клетки
- ☐ парадоксальный пульс на сонных артериях
- ☐ видимое набухание шейных вен

287. Выберите правильный ответ

О правильности выполнения непрямого массажа сердца свидетельствует

- ☐ видимое набухание шейных вен
- ☒ наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий грудной клетки
- ☐ перелом ребер
- ☐ наличие пульса на лучевой артерии

288. Выберите правильный ответ

Компрессия грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых выполняется с частотой

- ☐ 40-50 в минуту
- ☐ 60-70 в минуту
- ☒ 100 в минуту
- ☐ 110-120 в минуту

289. Выберите правильный ответ

При проведении реанимационного пособия непрямой массаж сердца и искусственное дыхание проводится в соотношении (согласно рекомендациям ЕС по реанимации, 2015)

- ☒ 30:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 при любом количестве реаниматоров
- ☐ 15:2 только при оказании помощи одним реаниматором
- ☐ 5:1 при оказании помощи двумя реаниматорами

290. Выберите правильный ответ

Суммарная доза адреналина при проведении СЛР взрослому

- ☐ составляет 1 мл 0,1 % раствора
- ☐ составляет 3 мл 0,1% раствора
- ☐ составляет 5 мл 0,1% раствора
- ☒ не ограничена

291. Выберите правильный ответ

Экспираторный характер одышки отмечается при

- ☐ абсцессе легкого, туберкулёзе
- ☒ бронхиальной астме, ХОБЛ
- ☐ очаговой и долевой пневмониях

- ☐ отёке легких, сердечной астме

292. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки приступа бронхиальной астмы

- ☐ крепитация
- ☒ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☐ шум трения плевры

293. Выберите правильный ответ

Аускультативные признаки астматического статуса во II стадии

- ☐ крепитация
- ☐ сухие, свистящие хрипы
- ☐ влажные хрипы
- ☒ «немое лёгкое»

294. Выберите правильный ответ

Инфаркт миокарда характеризуется болью

- ☐ колющая боль в области сердца
- ☐ ноющая боль в области сердца
- ☐ сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином
- ☒ сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

295. Выберите правильный ответ

Пароксизм желудочковой тахикардии купируется

- ☐ валосердином
- ☐ нитроглицерином
- ☐ панангином
- ☒ кордарон

296. Выберите правильный ответ

Пароксизм узловой тахикардии купируется

- ☐ лидокаином
- ☐ эуфиллином
- ☐ панангином
- ☒ анаприлином

297. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма трепетания предсердий

- ☐ непрямой массаж сердца
- ☐ задержка дыхания
- ☒ чреспищеводная кардиостимуляция
- ☐ капотен под язык

298. Выберите правильный ответ

Препарат при полной атриовентрикулярной блокаде

- ☐ кордарон
- ☐ верапамил
- ☐ анаприлин
- ☒ атропин

299. Выберите правильный ответ

Купирование пароксизма мерцательной аритмии

- ☐ панангин
- ☒ пропанорм
- ☐ лидокаин
- ☐ верапамил

300. Выберите правильный ответ

Купирование гипертонического криза при кардиостимуляции

- ☐ кордарон
- ☐ лидокаин
- ☒ капотен
- ☐ пропанорм

301. Выберите правильный ответ

Купирование частой желудочковой экстрасистолы при кардиостимуляторе

- ☐ атропин
- ☐ верапамил
- ☐ капотен
- ☒ кордарон

302. Выберите правильный ответ

Ведущая группа препаратов при гипертоническом кризе с отёком лёгких

- ☐ наркотические анальгетики
- ☒ мочегонные
- ☐ нитраты
- ☐ гипотензивные

303. Выберите правильный ответ

Основным антикоагулянтом при хронической фибрилляции предсердий является

- ☐ аспирин
- ☐ гепарин

- ☒ варфарин
- ☐ кардиомагнит

304. Выберите правильный ответ

"Mednet" - это

- ☒ телекоммуникационная медицинская сеть России
- ☐ автоматизированная система управления
- ☐ автоматизированное рабочее место
- ☐ автоматизированный скрининг

305. Выберите правильный ответ

Автоматизированный скрининг - это

- ☐ телекоммуникационная сеть
- ☐ автоматизированный предварительный медицинский осмотр
- ☒ автоматизированный целевой медицинский осмотр
- ☐ автоматизированная система управления

306. Задание {{ 306 }} ТЗ 306 Тема 1-3-0

Выберите 3 правильных варианта ответа

Виды медицинской информации

- ☐ общественная
- ☐ индивидуальная
- ☐ коллективная
- ☒ экономическая
- ☒ технологическая
- ☒ статистическая

307. Выберите правильный ответ

Второй этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
- ☒ сбор материала
- ☐ определение объема наблюдений
- ☐ формулирование задач исследования

308. Выберите правильный ответ

Для медицинских исследований достаточной степенью вероятности является [%]

- ☐ 75
- ☐ 99,9
- ☒ 95,0
- ☐ 68

309. Выберите правильный ответ

Основная цель ОАСУ - "Здравоохранение"

- ☐ лечение больных на модели
- ☐ обработка информации
- ☒ совершенствование управления здравоох., обеспечивающее оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
- ☐ учет расходования лекарств

310. Выберите правильный ответ

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

- ☐ отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости
- ☒ отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- ☐ экстраполяцию и прогнозирование

- ☐ анализ деятельности МО

311. Выберите правильный ответ

Статистика населения - это

- ☐ сведения о здоровье
- ☐ данные о здравоохранении
- ☒ основные количественные данные о населении на момент времени
- ☐ данные о рождаемости и смертности

312. Выберите правильный ответ

Третий этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
- ☐ определение стоимости исследования
- ☒ обработка, шифровка, сводка материала
- ☐ внедрение результатов

313. Выберите правильный ответ

Четвертый этап медико-статистического исследования

- ☐ статистический анализ собранного материала
- ☐ определение стоимости исследования
- ☒ анализ, выводы, внедрение в практику
- ☐ анализ экономической эффективности

314. Выберите правильный ответ

Судорожный припадок на догоспитальном этапе купируется применением

- ☒ сибазона
- ☐ кофеина
- ☐ димедрола
- ☐ кеторолака

315. Выберите два правильных ответа

На догоспитальном этапе в качестве нейропротекторных препаратов используются

- ☐ пирацетам
- ☒ мексидол
- ☒ глицин
- ☐ сибазон
- ☐ метоклопрамид

316. Выберите правильный ответ

Побочным эффектом при внутривенном введении цитиколина (цероксона) возможно развитие

- ☒ транзиторной гипотензии
- ☐ транзиторной гипертензии
- ☐ тахикардии
- ☐ тошнота, рвота

317. Выберите три правильных ответа

Мероприятия проводимые на догоспитальном этапе для предотвращения отёка мозга являются

- ☐ внутривенное введение лазикса
- ☒ обеспечение адекватной оксигенации
- ☒ приподнятый головной конец носилок под углом 300
- ☒ купирование судорог и психомоторного возбуждения
- ☐ введение сосудорасширяющих средств
- ☐ приподнятый ножной конец носилок

318. Выберите три правильных ответа

Синдром вклинивания ствола мозга включает признаки

- ☐ узкие зрачки с сохраненной реакцией на свет
- ☒ судорожный синдром
- ☒ тенденция к брадикардии
- ☒ прогрессирующее угнетение сознания
- ☐ ясное сознание
- ☐ нормальный ритм дыхания и сердечной деятельности

319. Выберите правильный ответ

Оптимальное время для госпитализации в стационар от начала ишемического инсульта с целью проведения тромболизисной терапии

- ☒ первые 5 часа
- ☐ первые 7 часов
- ☐ первые 6 часов
- ☐ первые 8 часов

320. Выберите правильный ответ

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы биполярного аффективного психоза
- ☐ депрессивной фазы биполярного аффективного психоза
- ☐ эпилепсии
- ☐ кататонического синдрома

321. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при передозировке опиатами включает препарат

- ☒ налоксон
- ☐ кеторолак
- ☐ димедрол
- ☐ сибазон

322. Выберите два правильных ответа

Купирование алкогольного абстинентного синдрома проводят при помощи

- ☒ дезинтоксикационных средств
- ☐ психостимуляторов
- ☐ антибиотиков
- ☐ спазмолитиков
- ☒ транквилизаторов

323. Выберите три правильных ответа

Оказание помощи при эпилептическом приступе включают

- ☒ убрать острые и твёрдые предметы
- ☒ расстегнуть стесняющую одежду
- ☒ повернуть больного на бок
- ☐ попытаться привести пациента в сознание
- ☐ уложить пациента на спину
- ☐ уложить пациента на живот

324. Выберите правильный ответ

Оказание психиатрической помощи службой скорой медицинской помощи обосновано если

- ☒ пациент опасен для себя и окружающих

- ☐ всегда если пациент находится на учёте в психоневрологическом диспансере
- ☐ если пациент страдает соматическим заболеванием
- ☐ если пациент страдает неврологическим заболеванием

325. Выберите два правильных ответа

Недобровольная госпитализация в психиатрический стационар службой СМП проводится при наличии у пациента

- ☒ расстройства сознания с психомоторным возбуждением
- ☐ хронического психического расстройства вне обострения по требованию родственников
- ☒ суицидальных проявлений или тенденций
- ☐ хронического психического расстройства вне обострения по требованию соседей
- ☐ хроническое психическое расстройство, когда пациент не опасен для себя и окружающих

326. Выберите правильный ответ

Противопоказанием для применения дроперида является

- ☐ высокое внутричерепное давление
- ☐ глаукома
- ☒ низкое АД
- ☐ все перечисленное верно

327. Выберите правильный ответ

Дофамин увеличивает сократимость миокарда без значительной вазоконстрикции в дозе

- ☒ до 10 мг/кг/мин
- ☐ до 20 мг/кг/мин
- ☐ до 30 мг/кг/мин
- ☐ до 40 мг/кг/мин

328. Выберите правильный ответ

Длительность действия адреналина при внутривенном введении составляет

- ☒ 5 мин
- ☐ 10 мин
- ☐ 15 мин
- ☐ 20 мин

329. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии истинного кардиогенного шока при остром ИМ левого желудочка является применение

- ☐ нитратов и глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ кардиотоников (дофамин), нитратов на фоне поддерживающей инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ сердечных гликозидов и глюкокортикоидов на фоне инфузии поляризующей смеси, ингаляция кислорода
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и мочегонных препаратов

330. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии первой фазы инфекционно-токсического (септического) шока является применение

- ☐ глюкокортикоидов и нитратов на фоне массивной инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ бактериостатических антибиотиков, глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и лазикса на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ глюкокортикоидов и вазопрессоров (норадреналин) на фоне инфузионной терапии, ингаляция кислорода

331. Выберите правильный ответ

Обязательным комплексом интенсивной терапии при анафилактическом шоке на догоспитальном этапе является

- ☒ внутривенное введение адреналина и глюкокортикоидов на фоне инфузионной терапии, при бронхоспазме - эуфиллин, адекватная респираторная поддержка
- ☐ внутривенное введение глюконата кальция и супрастина
- ☐ внутримышечная инъекция адреналина, супрастина и кордиамина
- ☐ внутривенное введение глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии, при бронхоспазме - интубация трахеи и искусственная вентиляция легких

332. Выберите правильный ответ

При аллергическом ангионевротическом отеке без затруднения дыхания рациональной тактикой на догоспитальном этапе является введение

- ☐ только антигистаминных препаратов
- ☐ только глюкокортикоидных препаратов
- ☒ глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
- ☐ адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов

333. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке I степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 20 мл /мин
- ☒ 50-99 мл/мин
- ☐ 100-199 мл/мин
- ☐ 200-300 мл/мин

334. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке II степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 20 мл/мин
- ☐ 50-99 мл/мин

☒ 100-199 мл/мин

☐ 200-300 мл/мин

335. Выберите правильный ответ

Скорость инфузии при травматическом шоке III степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее

- ☐ 100-199 мл/мин
- ☒ 200-300 мл/мин
- ☐ 20 мл /мин
- ☐ 50-99 мл/мин

336. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) объемное соотношение переливаемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☒ 2:1
- ☐ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

337. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере более 2 литров (шок III степени) объемное соотношение переливаемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☐ 2:1
- ☒ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

338. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) на догоспитальном этапе препаратом выбора из коллоидных инфузионных растворов является

- ☐ альбумин
- ☐ реополиглюкин
- ☒ 6% раствор гидроксиэтилкрахмала
- ☐ 10% раствор гидроксиэтилкрахмала

339. Выберите правильный ответ

В рациональный объем терапии фельдшерской бригады скорой медицинской помощи при нестабильной стенокардии с отсутствием артериальной гипотензии входит

- ☐ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты (в спрее или внутривенно капельно), при купировании боли - «актив» в поликлинику
- ☐ экстренная госпитализация без дополнительных лечебных мероприятий
- ☒ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты, гепарин, морфин при продолжающейся боли, обязательная госпитализация
- ☐ ацетилсалициловая кислота, нитропрепараты, гепарин, морфин, вызов бригады интенсивной терапии или специализированной кардиологической бригады скорой медицинской помощи

340. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной энцефалопатией, является

- ☐ пропранолол
- ☒ эналаприлат
- ☐ дибазол
- ☐ нитропрепарат

341. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном острым коронарным синдромом, является

- ☐ эналаприлат
- ☒ нитропрепарат
- ☐ магния сульфат
- ☐ пропранолол

342. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном расслаивающей аневризмой аорты, является

- ☐ нитропрепарат
- ☐ эналаприлат
- ☐ магния сульфат
- ☒ эсмолол

343. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном отеком легких, является

- ☒ фуросемид
- ☐ дибазол
- ☐ магния сульфат
- ☐ пропранолол

344. Выберите правильный ответ

Оптимальным способом купирования приступа бронхиальной астмы на догоспитальном этапе является

- ☐ внутривенное введение эуфиллина
- ☐ ингаляция кислорода
- ☒ ингаляционное введение бета-2 адрено-стимуляторов через небулайзер
- ☐ внутривенное введение адреналина

345. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора для купирования приступа удушья при бронхиальной астме является

- ☒ беродуал
- ☐ эуфиллин
- ☐ супрастин
- ☐ преднизолон

346. Выберите правильный ответ

При бронхообструктивном синдроме противопоказаны

- ☐ диуретики
- ☐ нитропрепараты
- ☐ антагонисты кальция
- ☒ бета-адреноблокаторы

347. Выберите правильный ответ

Антигистаминные препараты при астматическом статусе вызывают

- ☐ тахикардию и мышечную дрожь

- ☐ усиление кашлевого рефлекса
- ☐ резкое угнетение дыхания центрального генеза

- ☒ сгущение мокроты с затруднением ее эвакуации

348. Выберите правильный ответ

Гипогликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже меньше

- ☐ 8,2 ммоль/литр
- ☐ 5,5 ммоль/литр
- ☒ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 2,6 ммоль/литр

349. Выберите правильный ответ

Гипергликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста) при содержании глюкозы в крови уже больше

- ☐ 3,3 ммоль/литр
- ☐ 5,0 ммоль/литр
- ☒ 7,0 ммоль/литр
- ☐ 8,2 ммоль/литр

350. Выберите правильный ответ

Для лечения гипогликемической комы на догоспитальном этапе внутривенно вводится

- ☒ тиамин 100 мг, затем 40 мл 40% раствора глюкозы
- ☐ налоксон 0,4-0,8 мг
- ☐ 40 мл 40% раствора глюкозы вместе с 6-8 ЕД инсулина
- ☐ 200 мл 5% раствора глюкозы со скоростью 60 капель в минуту

351. Выберите правильный ответ

Догоспитальная интенсивная терапия гипергликемической комы заключается в

- ☐ инсулинотерапии
- ☒ инфузии кристаллоидных растворов
- ☐ введении глюкокортикоидов
- ☐ введении лазикса

352. Выберите правильный ответ

Для регидратации при диабетическом кетоацидозе на догоспитальном этапе применим раствор

- ☐ 10% глюкозы
- ☒ 0,9% натрия хлорида
- ☐ 4% натрия гидрокарбоната
- ☐ полиглюкина

353. Выберите правильный ответ

Рациональным объемом лечебных мероприятий на догоспитальном этапе у беременных с гестозом тяжелой степени является

- ☒ масочный наркоз закистью азота с кислородом, в/в дроперидол, реланиум и магния сульфат, госпитализация в акушерский стационар, лежа на носилках
- ☐ внутривенное введение дроперидола, реланиума и магния сульфата, оксигенотерапия, госпитализация в акушерский стационар, лежа на носилках

- ☐ незамедлительная транспортировка в акушерский стационар без дополнительных лечебных мероприятий
- ☐ масочный наркоз закистью азота с кислородом, в/в дроперидол, реланиум и магния сульфат, вызов «на себя» акушерской бригады

354. Выберите правильный ответ

Рациональная догоспитальная тактика при нарушенной внематочной беременности включает

- ☐ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара без дополнительных лечебных мероприятий
- ☒ экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- ☐ обезболивание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
- ☐ введение сокращающих матку средств (окситоцин), госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии

355. Выберите правильный ответ

Диаметр внутреннего просвета коникотомической канюли у ребенка до 10 лет должен быть равен

- ☐ 1 мм
- ☒ 2 мм
- ☐ 4 мм
- ☐ 6 мм

356. Выберите правильный ответ

Какие из препаратов для инфузионной терапии предпочтительно использовать при лечении больных с отеком мозга

- ☐ концентрированные растворы глюкозы
- ☐ декстраны с молекулярной массой 60 000 дальт.
- ☒ растворы гидроксиэтилкрахмала с молекулярной массой не менее 130 000 Дальт
- ☐ альбумин 10%

357. Выберите правильный ответ

Показанием для тромболитической терапии не является

- ☐ подъем сегмента ST на 2 и более мм. в двух грудных отведениях
- ☐ подъем ST на 1 и более мм. в двух смежных стандартных отведениях
- ☐ длительность болевого синдрома 12 часов
- ☒ остро возникшие нарушения ритма

358. Выберите правильный ответ

Какой из указанных препаратов наиболее эффективен и рекомендован для эмпирической терапии тахиформ нарушений сердечного ритма

- ☐ лидокаин

- ☐ хинидин
- ☒ кордарон
- ☐ раствор магния сульфат

359. Выберите три правильных ответа

Какие осложнения возможны при проведении тромболитической терапии в остром периоде инфаркта миокарда

- ☒ анафилактический шок
- ☒ геморрагический шок
- ☒ гематурия
- ☐ артериальная гипертензия
- ☐ осложнений не бывает
- ☐ повышение гематокрита

360. Выберите правильный ответ

Какие из побочных эффектов ингибиторов АПФ, как правило, требуют прекращения лечения

- ☒ ангионевротический отек, кожные реакции в виде эритемы
- ☐ кашель
- ☐ потеря вкусовых ощущений
- ☐ падение АД после первого приема

361. Выберите правильный ответ

Коронарный кровоток осуществляется в фазе

- ☐ Изометрии
- ☐ Изотонической
- ☒ Диастолы
- ☐ Не зависит от фаз сердечного цикла

362. Выберите правильный ответ

В результате ингаляции 100% кислорода может развиваться

- ☐ гипертензия и брадикардия
- ☐ гипертензия и снижение пульсового давления
- ☐ резкая гипертензия и апноэ
- ☒ гипотензия и апноэ

363. Выберите правильный ответ

Через сколько часов (минут) у пациентов с инфарктом миокарда начинает увеличиваться уровень тропонина

- ☐ через 24 часа после появления симптомов
- ☐ через 30 минут после появления симптомов
- ☒ через 3 часа после появления симптомов
- ☐ сразу после появления болевого синдрома

364. Выберите правильный ответ

Реперфузионная (ЧКВ или тромболизис) терапия показана всем больным с болью/дискомфортом и персистирующим подъемом сегмента ST или новой блокадой ЛНПГ длительностью не более

- ☐ 24 часов
- ☐ 6 часов
- ☒ 12 часов
- ☐ 3 часов

365. Выберите правильный ответ

Тромболитическая терапия проводится, если ЧКВ невозможно выполнить в течение

- ☐ 24 часов
- ☒ 120 минут от момента первого контакта с медработником
- ☐ 12 часов
- ☐ 3 часов

366. Выберите правильный ответ

После тромболитической терапии больного направляют

- ☐ кардиологическое отделение
- ☒ в центр с возможностью выполнения ЧТВ
- ☐ реанимационное отделение общего профиля
- ☐ оставляют дома под наблюдения участкового терапевта

367. Выберите правильный ответ

Препараты для тромболиза

- ☒ алтеплаза, тенектеплаза
- ☐ клопидогрел, прасугрель
- ☐ эноксипарин, фраксипарин
- ☐ метопролол, бисопролол

368. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе без повышения симпатической активности показан

- ☒ урапидил (эбрантил)
- ☐ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

369. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе с высокой симпатической активностью показан

- ☐ урапидил (эбрантил)
- ☒ клонидин
- ☐ моксонидин (физиотенз)
- ☐ нитроглицерин

370. Выберите правильный ответ

Центр автоматизма I порядка

- ☒ синусовый узел
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в правом предсердии
- ☐ скопления клеток, способных к автоматизму, в левом предсердии
- ☐ атриовентрикулярное соединение

371. Выберите правильный ответ

Зубец Р на ЭКГ отражает

- ☐ возбуждение желудочков
- ☒ возбуждение предсердий
- ☐ время распространения импульса от синусового узла до миокарда желудочков
- ☐ метаболические процессы в миокарде

372. Выберите правильный ответ

Комплекс QRS отражает на ЭКГ

- ☐ реполяризацию предсердий
- ☒ возбуждение желудочков
- ☐ электрическую систолу желудочков
- ☐ электрическую систолу сердца

373. Выберите правильный ответ

Зубец Q на ЭКГ характеризует

- ☐ возбуждение предсердий

- ☒ возбуждение межжелудочковой перегородки

- ☐ процессы реполяризации
- ☐ атриовентрикулярную проводимость

374. Выберите правильный ответ

В норме амплитуда зубца Q соответствует

- ☐ 1/3 Р
- ☐ 1/4 Р
- ☒ 1/4 R
- ☐ 1/3 R
- ☐ 1/4 S

375. Выберите правильный ответ

Форма нормального зубца Q

- ☐ овал
- ☒ треугольник
- ☐ овал с зазубриной
- ☐ треугольник с зазубриной

376. Выберите правильный ответ

Интервал PQ на ЭКГ соответствует

- ☐ возбуждению миокарда желудочков
- ☐ возбуждению миокарда предсердий
- ☒ атриовентрикулярной проводимости
- ☐ процессу выхода из возбуждения основания желудочков

377. Выберите правильный ответ

Признаки синусового ритма на ЭКГ

- ☐ RR не равны RR, зубец Р перед QRS отсутствует, ЧСС 56 ударов в минуту
- ☐ RR = RR равны, зубец P(-) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(+) перед QRS, ЧСС 74 удара в минуту
- ☒ RR = RR равны, зубец P(+) перед QRS в отведении II, в отведении aVR зубец P(-) перед QRS, ЧСС 80 ударов в минуту
- ☐ RR = RR, зубец P(-) после QRS во II отведении, ЧСС 50 ударов в минуту

378. Выберите правильный ответ

При правильном синусовом ритме частота сердечных сокращений на ЭКГ определяется по формуле

- ☐ 600:R-R
- ☐ R-R:60
- ☒ 60:R-R
- ☐ 60:P-P

379. Выберите правильный ответ

Горизонтальное смещение сегмента ST на ЭКГ более чем на 1 мм от изолинии характерно для

- ☒ ишемии миокарда
- ☐ передозировки сердечных гликозидов
- ☐ гипокалиемии
- ☐ перикардита

380. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 500 Дж

- ☒ 360 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☐ 50 Дж

381. Выберите правильный ответ

Электрическую дефибрилляцию бифазным импульсом у взрослого начинают с разряда (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ 300 Дж
- ☐ 200 Дж
- ☒ 150 Дж
- ☐ 50 Дж

382. Выберите правильный ответ

Перед проведением первого разряда электрической дефибрилляции необходимо

- ☐ проводить непрямой массаж сердца в течение 7 минут
- ☒ выявить картину крупноволновой фибрилляции желудочков на мониторе электрического дефибриллятора
- ☐ ввести лидокаин
- ☐ ввести гидрокарбонат натрия

383. Выберите правильный ответ

Энергия второго и последующих разрядов (согласно рекомендациям европейского совета по реанимации, 2015)

- ☐ не проводится
- ☐ проводится с увеличивающейся энергией 200-300-360 Дж
- ☐ проводится с постоянной энергией 200-200-200 Дж
- ☒ проводится с постоянной энергией 360-360-360 Дж

384. Выберите правильный ответ

Если остановка кровообращения развилась без свидетелей и на мониторе электрического дефибриллятора выявляется крупноволновая фибрилляция желудочков, необходимо

- ☐ внутривенно или эндотрахеально ввести лидокаин в дозе 1 мг/кг
- ☐ нанести удар по груди
- ☒ провести электрическую дефибрилляцию монофазным импульсом разрядом 360 Дж
- ☐ ввести 1 мг адреналина внутрисердечно и начать непрямой массаж сердца

385. Выберите правильный ответ

Если на мониторе электрического дефибриллятора регистрируется асистолия, следует

- ☐ начать закрытый массаж сердца, внутривенно или внутрисердечно ввести лидокаин, адреналин и кальция хлорид
- ☒ начать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, ввести внутривенно или эндотрахеально адреналин
- ☐ провести электрическую дефибрилляцию
- ☐ отказаться от проведения реанимационных мероприятий

386. Выберите правильный ответ

Альтернативой интубации трахеи на догоспитальном этапе для поддержания проходимости дыхательных путей и защиты их от аспирации желудочного содержимого является

- ☐ орофарингеальный воздуховод
- ☐ выполнение тройного приема Сафара
- ☒ ларингеальная трубка
- ☐ желудочный зонд

387. Выберите правильный ответ

Укажите фактор, не влияющий на точность пульсоксиметрии

- ☐ темный лак для ногтей
- ☒ темный цвет кожи
- ☐ аномальные формы гемоглобина
- ☐ плохая тканевая перфузия

388. Выберите правильный ответ

Норма SpO₂

- ☐ 90-95%
- ☒ >95%
- ☐ 80-90%
- ☐ >80%

389. Выберите правильный ответ

К противопоказанию для использования combitube не относятся

- ☐ пациенты ростом меньше 122 см
- ☐ пациенты с ненарушенным глоточным рефлексом
- ☐ пациенты, проглотившие едкие вещества
- ☒ пациенты с оценкой по шкале ком Глазго 5 баллов

4. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

390. Выберите правильный ответ

Мальчику 13 лет назначено явиться в процедурный кабинет утром натощак для взятия крови на биохимическое исследование. При взятии крови мальчик побледнел и начал медленно опускаться на пол. Какое неотложное состояние описано

- ☐ гипогликемическая кома
- ☐ коллапс
- ☐ гипергликемическая кома
- ☒ обморок
- ☐ анафилактический шок

391. Выберите правильный ответ

У больной 46 лет, страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей внезапно развилась за грудиной боль, одышка смешанного характера, свистящие хрипы, падение АД. Какое из нижеперечисленных заболеваний может обусловить приведенную клиническую картину

- ☐ артериальная гипотония
- ☐ спонтанный пневмоторакс
- ☐ бронхиальная астма
- ☒ тромбоэмболия легочной артерии

392. Выберите правильный ответ

У больного с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки после двух лет ремиссии возник рецидив заболевания, подтвержденный гастродуоденоскопией. Больному необходимо оказать помощь в связи с обострением заболевания. Какой из перечисленных препаратов вы предпочтете, наряду с диетой и режимом

- ☐ анальгин
- ☐ фестал
- ☐ промедол
- ☒ алмагель

393. Выберите правильный ответ

У больного с артериальной гипертонией 1 степени внезапно наступило ухудшение болезни, резко усилилась головная боль, появилось головокружение, "сетка" перед глазами, боли в сердце. Объективно: больной беспокоен, раздражителен. Отмечается чувства жара, на кожных покровах лица - красные пятна. АД 210/110 мм рт. ст. Предполагаемый диагноз

- ☐ инфаркт миокарда
- ☐ стенокардия
- ☐ крапивница
- ☒ гипертонический криз

394. Выберите правильный ответ

Пациент 30 лет, страдает сахарным диабетом, жаловался на выраженную слабость, вялость,

жажду, боли в эпигастральной области и потерял сознание. Ухудшение состояния после перенесенного ОРВИ. Объективно: сознание отсутствует, запах ацетона изо рта, кожа сухая, язык обложен белым налетом. Пульс - 100 уд. В мин., АД - 100/60 мм.рт.ст. Какое состояние у больного

- ☐ гипогликемическая кома
- ☐ пневмония
- ☐ артериальная гипотония
- ☒ гипергликемическая кома

395. Выберите правильный ответ

Мужчина 32 лет, страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в течение 6 лет. Последнюю неделю интенсивные голодные и ночные боли. Внезапно на рабочем месте развилась резкая слабость, холодный пот, исчезновение болей. Пальпаторно: резкая болезненность в области эпигастрия, АД 90/60 мм.рт.ст. Какое осложнение возникло у больного

- ☐ острый панкреатит
- ☐ острый аппендицит
- ☐ инфаркт миокарда
- ☒ желудочно-кишечное кровотечение

396. Выберите правильный ответ

Больному 45 лет, заболел остро сегодня, повысилась температура до 39,5°C, жалуется на недомогание, слабость, чувство "разбитости", головную боль. Отмечается болезненность при движении глазных яблок. Аппетит резко снижен, носовое дыхание затруднено, в зеве разлитая гиперемия. Предполагаемый диагноз

- ☐ иерсиниоз
- ☐ менингит
- ☐ вирусный гепатит
- ☒ грипп

397. Выберите правильный ответ

Больная 32-х лет, жалуется на выраженную слабость, недомогание, вялость в течение последних 3 недель. Температуры, катаральных явлений нет. Периодически беспокоят боли в крупных суставах. Объективно: болезненность в правой эпигастральной области, печень у края реберной дуги. Из анамнеза стало известно, что приблизительно 4 месяца назад женщина лечилась у стоматолога. Предполагаемый диагноз

- ☐ бруцеллез
- ☐ иерсиниоз
- ☐ вирусный гепатит E
- ☒ вирусный гепатит B

398. Выберите правильный ответ

Мужчина 60-ти лет, страдающий сахарным диабетом, жалуется на боль в области шеи, припухлость. На задней поверхности шеи гиперемия, отек, резкая болезненность, множественные некротические стержни. Предполагаемый диагноз

- ☐ экзема шеи
- ☐ отек Квинке
- ☐ рожистое воспаление
- ☒ карбункул шеи

399. Выберите правильный ответ

Больной 48 лет, зоотехник предъявляет жалобы на жар, слабость, головную боль, боль в груди, одышку. Объективно: состояние тяжелое, $t - 39^{\circ}\text{C}$, инъекция сосудов склер, лицо одутловатое. Тоны сердца глухие. В легких в левой верхней доле влажные мелкопузырчатые хрипы. Выделяется пенистая мокрота с кровью. Из анамнеза: больной помог соседу забить больного верблюда. Предполагаемый диагноз

- ☐ туляризм
- ☐ чума
- ☐ пневмония
- ☒ бруцеллез

400. Выберите правильный ответ

Для апоплексии яичника I степени тяжести характерно

- ☒ боль
- ☐ острый живот
- ☐ признак внутрибрюшного кровотечения
- ☐ признаки пельвиоперитонита

401. Выберите правильный ответ

Приступ болей внизу живота с иррадиацией в прямую кишку при апоплексии яичника возникает

- ☐ во вторую фазу менструального цикла
- ☒ в середине менструального цикла
- ☐ в первую фазу менструального цикла
- ☐ во время менструации

402. Выберите два правильных ответа

Для прервавшейся внематочной беременности характерны

- ☒ нарушение гемодинамики (снижение артериального давления, частый слабый пульс, бледность)
- ☒ Френикус-симптом
- ☐ боли в эпигастральной области
- ☐ боли в поясничной области
- ☐ боли в крестце

403. Выберите правильный ответ

Причиной внутреннего кровотечения в гинекологии может быть

- ☐ шеечная беременность
- ☐ рождающийся субмукозный узел
- ☒ апоплексия яичника

- ☐ дисфункциональное маточное кровотечение

404. Выберите правильный ответ

Ведущий механизм развития ожогового шока

- ☐ снижение сократительной способности миокарда
- ☐ первичное снижение сосудистого тонуса
- ☒ первичное уменьшение объема циркулирующей крови
- ☐ гипертермия

405. Выберите правильный ответ

Ожог верхних дыхательных путей соответствует ожогу поверхности тела

- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☒ 15%
- ☐ 25%

406. Выберите правильный ответ

Глубокие ожоги

- ☐ первой степени
- ☐ второй степени
- ☐ третьей "А" степени
- ☒ третьей "Б" степени

407. Выберите правильный ответ

Признак ожога 2-ой степени

- ☐ гиперемия кожи
- ☒ отслойка эпидермиса с образованием пузырей
- ☐ омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосных луковиц, потовых и сальных желез
- ☐ некроз всех слоев

408. Выберите три правильных ответа

Правила установки желудочного зонда у новорожденных

- ☒ вводить желудочный зонд через нос, либо через рот
- ☒ определить глубину введения зонда: от рта до мечевидного отростка, либо 2-х кратное расстояние от уха до носа
- ☒ обрабатывать всю вводимую часть
- ☐ вводить желудочный зонд через нос
- ☐ вводить желудочный зонд через рот
- : менять зонд как можно реже

409. Выберите правильный ответ

Пути введения адреналина при проведении первичной реанимации новорожденного

- ☐ внутривенный + подкожный
- ☐ эндотрахеальный + подкожный
- ☐ подкожный + внутримышечный
- ☒ внутривенный + эндотрахеальный

410. Выберите правильный ответ

"Mednet" - это

- ☐ автоматизированный мониторинг здоровья населения
- ☒ телекоммуникационная медицинская сеть России
- ☐ автоматизированная система управления

- ☐ автоматизированное рабочее место

411. Выберите правильный ответ

Автоматизированный скрининг - это

- ☐ телекоммуникационная сеть
☐ автоматизированный предварительный медицинский осмотр
☒ автоматизированный целевой медицинский осмотр
☐ автоматизированное рабочее место участкового педиатра

412. Выберите три правильных ответа

Виды медицинской информации

- ☐ общественная
☐ индивидуальная
☐ коллективная
☒ экономическая
☒ технологическая
☒ статистическая

413. Выберите правильный ответ

Второй этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
☐ обработка статистического материала
☒ сбор материала
☐ определение объема наблюдений

414. Выберите правильный ответ

Для медицинских исследований достаточной степенью вероятности является [%]

- ☐ 75
☐ 99,9
☒ 95,0
☐ 68

415. Выберите правильный ответ

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

- ☐ отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости
☒ отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
☐ экстраполяцию и прогнозирование
☐ анализ деятельности ЛПУ

416. Выберите правильный ответ

Статистика населения - это

- ☐ сведения о здоровье
☐ данные о здравоохранении
☒ основные количественные данные о населении на момент времени
☐ данные о рождаемости и смертности

417. Выберите правильный ответ

Третий этап медико-статистического исследования

- ☐ составление плана исследования
☐ определение стоимости исследования
☒ обработка, шифровка, сводка материала
☐ внедрение результатов

418. Выберите правильный ответ

Четвертый этап медико-статистического исследования

- ☐ определение стоимости исследования
☒ анализ, выводы, внедрение в практику
☐ анализ экономической эффективности
☐ медико-социальный анализ результатов

419. Выберите правильный ответ

Норма SpO₂

- ☐ 90-95%
☒ >95%
☐ 80-90%
☐ >80%

420. Выберите правильный ответ

К противопоказанию для использования combitube не относятся

- ☐ пациенты ростом меньше 122 см
☐ пациенты с ненарушенным глоточным рефлексом
☐ пациенты, проглотившие едкие вещества
☒ пациенты с оценкой по шкале ком Глазго 5 баллов

421. Выберите правильный ответ

Перед проведением первого разряда электрической дефибрилляции необходимо

- ☐ проводить непрямой массаж сердца в течение 7 минут
☒ выявить картину крупноволновой фибрилляции желудочков на мониторе электрического дефибриллятора
☐ ввести лидокаин
☐ ввести гидрокарбонат натрия

422. Выберите правильный ответ

Закаись азота является

- ☐ сильным наркотиком со слабым анальгезирующим действием
☒ слабым наркотиком с выраженным анальгезирующим действием
☐ сильным наркотиком и анальгетиком
☐ слабым наркотиком и анальгетиком

423. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ со скоростью 25 мм в секунду 1 мм на бумажной ленте соответствует времени

- ☐ 0,02 секунды
☒ 0,04 секунды
☐ 0,05 секунды
☐ 0,2 секунды

424. Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ со скоростью 50 мм в секунду 1 мм на бумажной ленте соответствует времени

- ☒ 0,02 секунды
☐ 0,05 секунды
☐ 0,1 секунды
☐ 0,2 секунды

425. Выберите правильный ответ

Дофамин увеличивает сократимость миокарда без значительной вазоконстрикции в дозе

- ☒ до 10 мг/кг/мин
- ☐ до 20 мг/кг/мин
- ☐ до 30 мг/кг/мин
- ☐ до 40 мг/кг/мин

426. Выберите правильный ответ

Длительность действия адреналина при внутривенном введении составляет

- ☒ 5 мин
- ☐ 10 мин
- ☐ 15 мин
- ☐ 20 мин

427. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии истинного кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда левого желудочка является применение

- ☐ нитратов и глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ кардиотоников (дофамин), нитратов на фоне поддерживающей инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ сердечных гликозидов и глюкокортикоидов на фоне инфузии поляризующей смеси, ингаляция кислорода
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и мочегонных препаратов

428. Выберите правильный ответ

Рациональным догоспитальным объемом терапии первой фазы инфекционно-токсического (септического) шока является применение

- ☐ глюкокортикоидов и нитратов на фоне массивной инфузионной терапии, ингаляция кислорода
- ☐ бактериостатических антибиотиков, глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов
- ☐ вазопрессоров (норадреналин) и лазикса на фоне массивной инфузионной терапии
- ☒ глюкокортикоидов и вазопрессоров (норадреналин) на фоне инфузионной терапии, ингаляция кислорода

429. Выберите правильный ответ

При аллергическом ангионевротическом отеке без затруднения дыхания рациональной тактикой на догоспитальном этапе является введение

- ☐ только антигистаминных препаратов
- ☐ только глюкокортикоидных препаратов
- ☒ глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
- ☐ адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов

430. Выберите правильный ответ

На какой технологии основана Всемирная паутина

- ☒ Гипертекста
- ☐ Промышленной
- ☐ Социальной
- ☐ Научной

431. Выберите правильный ответ

Что послужило точкой отсчёта появления сети интернет

- ☐ зарождение письменности
- ☐ изобретение шариковой ручки
- ☐ появление первой школы журналистики
- ☒ изобретение всемирной паутины

432. Выберите правильный ответ

Что не является основой формирования информационной культуры

- ☐ знания об информационной среде
- ☒ принцип узкой специализации
- ☐ знания о законах функционирования информационной среды
- ☐ умение ориентироваться в информационных потоках

433. Выберите правильный ответ

Что не может являться носителем научнотехнической информации

- ☐ книги (учебники, учебные пособия, монографии, брошюры)
- ☐ нормативные документы (стандарты, инструкции)
- ☐ каталоги и прейскуранты
- ☒ художественная литература (романы, биографии)

434. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) объемное соотношение переливаемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☒ 2:1
- ☐ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

435. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере более 2 литров (шок III степени) объемное соотношение переливаемых кристаллоидных и коллоидных растворов должно составлять

- ☐ 2:1
- ☒ 1:1
- ☐ 1:2
- ☐ коллоидные препараты не применяются

436. Выберите правильный ответ

При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени) на догоспитальном этапе препаратом выбора из коллоидных инфузионных растворов является

- ☐ альбумин
- ☐ реополиглюкин

- ☒ 6% раствор гидроксиэтилкрахмала
☐ 10% раствор гидроксиэтилкрахмала

437. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном острым коронарным синдромом, является

- ☐ эналаприлат
☒ нитропрепарат
☐ магния сульфат
☐ пропранолол

438. Выберите правильный ответ

Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном расслаивающей аневризмой аорты, является

- ☐ нитропрепарат
☐ эналаприлат
☐ магния сульфат
☒ эсмолол

439. Выберите правильный ответ

Через сколько часов (минут) у пациентов с инфарктом миокарда начинает увеличиваться уровень тропонина

- ☐ через 24 часа после появления симптомов
☐ через 30 минут после появления симптомов
☒ через 3 часа после появления симптомов
☐ сразу после появления болевого синдрома

440. Выберите правильный ответ

Реперфузионная (ЧКВ или тромболизис) терапия показана всем больным с болью/дискомфортом и персистирующим подъемом сегмента ST или новой блокадой ЛНПГ длительностью не более

- ☐ 24 часов
☐ 6 часов
☒ 12 часов
☐ 3 часов

441. Выберите правильный ответ

Тромболитическая терапия проводится, если ЧКВ невозможно выполнить в течение

- ☐ 24 часов
☒ 120 минут от момента первого контакта с медработником
☐ 12 часов
☐ 3 часов

442. Выберите правильный ответ

После тромболитической терапии больного направляют

- ☐ кардиологическое отделение
☒ в центр с возможностью выполнения ЧТВ
☐ реанимационное отделение общего профиля
☐ оставляют дома под наблюдения участкового терапевта

443. Выберите правильный ответ

Препараты для тромболизиса

- ☒ алтеплаза, тенектеплаза
☐ клопидогрел, прасугрель

- ☐ эноксипарин, фраксипарин
☐ метопролол, бисопролол

444. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе без повышения симпатической активности показан

- ☒ урапидил (эбрантил)
☐ клонидин
☐ моксонидин (физиотенз)
☐ нитроглицерин

445. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе с высокой симпатической активностью показан

- ☐ урапидил (эбрантил)
☒ клонидин
☐ моксонидин (физиотенз)
☐ нитроглицерин

446. Установите соответствие между интернет-технологиями и их функциями

веб-страницы	гипертекстовые документы, размещаемые во Всемирной паутине
веб-сайты	несколько веб-страниц объединённых общей темой, дизайном, а также связанных между собой ссылками
браузеры	специальные программы для загрузки и просмотра веб-страниц
	специальные программы для рассылки почты

447. Установите соответствие между видами интернет - сетей и их функциями

Всемирная сеть	система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интернету
Социальная сеть	платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете
	абонентские сети связи, для доступа к которым используются телефонные аппараты, АТСи оборудование передачи данных

448. Установите соответствие между видами сетей передачи данных и их функциями

Телефонные сети	абонентские сети связи, для доступа к которым используются телефонные аппараты, АТСи оборудование передачи дан-
-----------------	---

	ных
Компьютерные сети	сети, конечными устройствами которых являются компьютеры
	несколько веб-страниц объединённых общей темой, дизайном, а также связанных между собой ссылками

449. Установите соответствие между источниками информации и ориентировочной интенсивностью падения их ценности («старения»)

газеты	10% в день
журналы	10% в месяц
книги	10% в год
	10% в столетие

450. Установите соответствие между видами информационного поиска

ручной	по библиографическим карточкам, картотекам и печатным указателям
автоматизированный	на ЭВМ (компьютерах)
	на местности

451. Установите соответствие между понятием, раскрывающим его суть, определением

информационная культура пользователя	умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи информационные технологии
информационная культура общества	способность эффективно использовать информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций; и применять передовые достижения в области развития средств информатизации и информационных технологий
	способность красиво и эффективно одеваться, двигаться

452. Установите соответствие между современными аппаратами для ингаляции и их характеристикой

компрессорные небулайзеры	работают шумно и могут использоваться с любым препаратом
ультразвуковые небулайзеры	работают бесшумно, имеют некоторые лекарственные ограничения
	используют только при поражении верхних дыхательных путей

453. Установите соответствие между современными ингаляторами и механизмом их действия

бехихайлер	спейсер, снабженный односторонним клапаном, препятствующем потере аэрозоля на вдох
турбухайлер	дозированный порошковый ингалятор, не требует синхронизации вдоха
спинхалер	дозированный аэрозольный ингалятор, требует хорошей координации между нажатием и вдохом
	под воздействием потока воздуха препарат разбивается на микрочастицы

454. Установите соответствие между современной группой препарата для лечения атопического дерматита и его представителем

местные глюкокортикостероиды	мометазона фуроат
ингибиторы кальциневрина	пимекролимус
нестероидный препарат широкого спектра действия	активированный пиритион цинка
	клемастин

455. Установите соответствие современным методом диагностики и его механизмом

Компьютерная томография	сканирование органа, позволяющее создать изображение в трех измерениях
Допплеровское сканирование	изучения циркуляции крови в артериях и венах, без использования рентгеновских лучей
Ультразвуковое исследование	отражение пучков, которое может изменяться в зависимости от характера и плотности изучаемой среды
	визуальное исследование, которое помогает выявить поражения толстой кишки

456. Установите соответствие между современным методом диагностики и его механизмом

Магнитно-резонансная томография	исследование внутренних органов с использованием магнитного поля и радиоволн, которые
---------------------------------	---

	действуют на человека и вводят его в резонансное состояние
Эндоскопия	визуальную диагностику при помощи видеокамеры, которая крепится на конце трубки
	отражение пучков, которое может изменяться в зависимости от характера и плотности изучаемой среды

457. Установите соответствие между противопоказаниями к системному тромболизису

абсолютные	внутричерепные кровоизлияния в анамнезе, нарушения мозгового кровообращения в течение последнего года, кровотечение любой локализации
относительные	прием антикоагулянтов в терапевтических дозах (МНО > 2), геморрагические диатезы, недавняя травма, беременность
	подъем сегмента ST более чем на 0,1 мВ, остро возникшая блокада левой ножки пучка Гиса

458. Установите соответствие между поколениями тромболитических препаратов

первое поколение	стрептокиназа, урокиназа, стрептодеказа, анистрептлаза
второе поколение	альтеплаза, рекомбинантная проурокиназа
	тенектеплаза, ретеплаза

459. Установите соответствие между группами инфузионных сред

Кристаллоиды	изотонический раствор NaCl, раствор Рингера, раствор Рингера-Локка, Трисоль
Коллоиды	полиглюкин, реополиглюкин, волювен, ХАЕС-стерил
	гелоплазма, гемопюр,

460. Установите соответствие между классификацией шоков по пусковому механизму

гиповолемический	травматический, болевой, ожоговый, геморрагический
вазоплегический (перераспределительный, дистрибутивный)	септический, ожоговый, анафилактический
	следствие острой (энергетической и динамической) сер-

	дечной недостаточности
--	------------------------

461. Установите соответствие между шоковым индексом и объемом кровопотери

ШИ=1	20%
ШИ=2	30-40%
ШИ=3	более 50%
	менее 10%

462. Установите соответствие между видами дыхательной недостаточности

вентиляционная	отёк головного мозга, переломы рёбер
паренхиматозная	отёк лёгких, пневмония
	анемия

463. Установите соответствие между симптомами отравлений

опиаты	сознание угнетено, кожные покровы бледные, влажные, брадикардия, гипотензия, брадипноэ
этанол	возбуждение сменяется угнетением, гиперемия сменяется бледностью, гипертензия сменяется гипотензией
	сонливость, кома, пузыри в месте давления, ЧСС не изменена, гипотония

464. Установите соответствие между группами токсических веществ

алкоголь и суррогаты алкоголя	метиловый спирт, этиленгликоль, изопропиловый спирт
органические растворители	дихлорэтан, бензол
	кислоты, щелочи

465. Установите соответствие между группами гипотензивных препаратов

ингибиторы АПФ	каптоприл, эналаприл
бета-адреноблокаторы	анаприлин, беталок - ЗОК
блокаторы медленных кальциевых каналов	нифедипин, амлодипин
	клофелин, эбрантил

466. Определите правильную последовательность нарастающей угрозы при нарушениях возбудимости миокарда

- 1: экстрасистолия
- 2: пароксизмальная тахикардия
- 3: трепетание (желудочков)
- 4: фибрилляция (желудочков)

467. Определите правильную последовательность оказания доврачебной помощи при прободном перитоните в гинекологии

- 1: создание покоя
- 2: симптоматическая терапия (сердечные, обезболивающие средства)

3: капельное внутривенное введение кровезаменителей

4: бережная транспортировка в гинекологический стационар на носилках

468. Определите правильную последовательность действий расширенной СЛР при определении ритма поддающегося дефибрилляции

1: начать СЛР 30:2, подключить кардиомонитор

2: наложить электроды на грудь

3: при наличии ФЖ или ЖТ без пульса нанести 1 разряд (360 Дж - при монофазном, 150 Дж - при бифазном)

4: СЛР 30:2 в течение 2-х минут

469. Определите правильную последовательность действий расширенной СЛР при определении ритма не поддающегося дефибрилляции

1: начать СЛР 30:2, подключить кардиомонитор, проверить ритм

2: ввести адреналин

3: СЛР 30:2 в течение 2-х минут

4: проверить ритм по кардиомонитору

470. Определите правильную последовательность проведения этапов базовой СЛР взрослому на основании рекомендаций Европейского совета по реанимации 2015

1: Этап А (airways)

2: Этап С (circulation)

3: Этап В (breathing)

471. Определите правильную последовательность проведения этапов расширенной СЛР взрослому на основании рекомендаций Европейского совета по реанимации 2015

1: восстановление проходимости дыхательных путей

2: поддержание кровообращения

3: поддержание дыхания

4: введение лекарств и жидкостей

472. Определите правильную последовательность введения препаратов при анафилактическом шоке

1: адреналин

2: глюкокортикостероиды

3: кристаллоиды

473. Определите правильную последовательность выполнения тройного приема Сафара

1: запрокидывание головы

2: выдвижение вперед нижней челюсти

3: открывание рта

474. Определите правильную последовательность оказания помощи при геморрагическом шоке

1: остановка кровотечения

2: восполнение ОЦК

3: обезболивание

4: оптимизация газообмена

475. Определите последовательность действий при наложении электродов для ЭКГ записи

1: проверить состояние электродов и кабеля соединения с аппаратом

2: обезжирить места наложения электродов

3: нанести электропроводящий гель на места постановки электродов

4: установить и зафиксировать электроды для записи

476. Определите правильную последовательность операций записи ЭКГ

1: запись отведений от конечностей

2: запись отведений (от конечностей, третье стандартное) на вдохе

3: запись грудных отведений

4: запись дополнительных отведений

477. Определите правильную последовательность действий при выполнении экстренной электрокардиоверсии (дефибрилляции)

1: электроды смазываются электропроводным гелем или используются смоченные водой (физраствором) салфетки

2: электроды плотно прижимаются к грудной клетке (с двух или одной стороны, токопроводящих соприкосновений между ними нет!)

3: отключается аппарат ЭКГ, набирается заряд (150 Дж)

4: по команде выполняется разряд, оценивается эффект

5: при необходимости повторяются разряды с увеличенной энергией