

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием Новосибирской области**
по специальности «Наркология»
**для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа квалификаци-
онного экзамена при проведении аттестации**
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	17
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	23

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы **задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 50%.**

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	31
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	44
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	50

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы **задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 20%, задание на установление правильного порядка - 20%, типовые задачи -10%.**

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	57
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	63
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	70
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	76

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Наркология»
Вторая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ бактерия
- ☐ микобактерия
- ☒ вирус
- ☐ кокк

2. Выберите правильный вариант ответа

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

- ☐ вспышка
- ☐ эпидемия
- ☒ пандемия
- ☐ групповые заболевания

3. Выберите правильный вариант ответа

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ нагревание при 56 °С в течение 1 минуты
- ☐ воздействие радиации

4. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ цитомегаловирус
- ☐ аденовирус
- ☒ ретровирус
- ☐ флавивирус

5. Выберите правильный вариант ответа

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- ☐ больной человек
- ☐ больное животное
- ☐ вирусоноситель
- ☒ человек с момента заражения

6. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- ☐ аденовирусов
- ☒ ретровирусов
- ☐ энтеровирусов
- ☐ пикорнавирусов

7. Выберите правильный вариант ответа

Источник заражения ВИЧ-инфекцией

- ☒ зараженный человек
- ☐ домашнее животное
- ☐ комары
- ☐ обезьяны

8. Выберите правильный вариант ответа

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- ☐ слюна
- ☐ слезная жидкость
- ☒ кровь
- ☐ спинномозговая жидкость

9. Выберите правильный вариант ответа

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

- ☒ искусственный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ трансмиссивный

10. Выберите правильный вариант ответа

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

11. Выберите правильный вариант ответа

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

12. Выберите два правильных варианта ответа

ВИЧ не передается

- ☒ через рукопожатия
- ☒ через укусы насекомых
- ☐ при половых контактах
- ☐ во время беременности
- ☐ через поврежденные слизистые

13. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

14. Выберите правильный вариант ответа

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

15. Выберите правильный вариант ответа

При ВИЧ-инфекции поражается

- ☐ костная система
- ☒ иммунная система
- ☐ мышечная система
- ☐ сердечнососудистая система

16. Выберите правильный вариант ответа

Для диагностики ВИЧ-инфекции у пациента проводится забор

- ☐ кала
- ☐ мочи

- ☒ крови
- ☐ желчи

17. Выберите правильный вариант ответа

При кровотечении из артерии конечности, ее прижимают

- ☒ выше раны
- ☐ ниже раны
- ☐ внутри раны
- ☐ не имеет значение

18. Выберите правильный вариант ответа

Длительность реанимационных мероприятий при их неэффективности

- ☐ 60 минут
- ☒ 30 минут
- ☐ 40 минут
- ☐ 20 минут

19. Выберите правильный вариант ответа

Реанимационные мероприятия начинаются

- ☐ с непрямого массажа сердца
- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей
- ☐ с искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ с укладывания на ровную и твердую поверхность

20. Выберите правильный вариант ответа

При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в области сердца, слева от грудины
- ☒ середина грудины

21. Выберите правильный вариант ответа

Сочетание компрессий и вдуваний при проведении реанимационных мероприятий

- ☐ 10:1
- ☐ 5: 2
- ☒ 30:2
- ☐ 15:2

22. Выберите правильный вариант ответа

При оказании неотложной помощи при обмороке больному придают следующее положение

- ☐ горизонтальное
- ☒ горизонтальное, с опущенной головой и приподнятыми ногами
- ☐ полусидя
- ☐ горизонтальное, с приподнятой головой

23. Выберите правильный вариант ответа

Клинические признаки гипогликемической комы

- ☒ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

24. Выберите правильный вариант ответа

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения

- ☒ 40% раствора глюкозы
- ☐ 10-процентного раствора глюкозы
- ☐ гемохеса
- ☐ 20% раствора глюкозы

25. Выберите два правильных варианта ответа

Пациента с носовым кровотечением следует

- ☒ усадить
- ☐ уложить
- ☐ голову запрокинуть назад
- ☒ голову опустить вперед
- ☐ не менять положение головы

26. Выберите правильный вариант ответа

Тройной прием Сафара применяют

- ☐ для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- ☐ для проведения прекардиального удара
- ☐ для интубации трахеи

27. Выберите правильный вариант ответа

Туберкулез – это заболевание

- ☐ наследственное
- ☒ социальное
- ☐ зоонозное
- ☐ соматическое

28. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза

- ☐ вирус
- ☐ бактерия
- ☒ микобактерия
- ☐ клебсиелла

29. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 6 месяцев

30. Выберите два правильных варианта ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный
- ☐ свиной

31. Выберите два правильных варианта ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное
- ☐ контактный

32. Выберите правильный вариант ответа

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

33. Выберите правильный вариант ответа

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

34. Выберите правильный вариант ответа

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

35. Выберите правильный вариант ответа

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

36. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ в общественном транспорте
- ☐ половой

37. Выберите два правильных варианта ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска
- ☐ вакцинированные и инфицированные

38. Выберите два правильных варианта ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

39. Выберите правильный вариант ответа

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- ☐ Уголовный кодекс
- ☐ Конституция РФ

☐ Трудовой кодекс

☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

40. Выберите правильный вариант ответа

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается

- ☐ гражданину
- ☐ гражданину и членам его семьи
- ☒ гражданину и членам его семьи с его согласия
- ☐ работодателю

41. Выберите правильный вариант ответа

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- ☐ близкий родственник
- ☐ дежурный (лечащий) врач или родственник
- ☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач
- ☐ законный представитель

42. Выберите правильный вариант ответа

Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это

- ☒ эвтаназия
- ☐ танатология
- ☐ деонтология
- ☐ ятрогения

43. Выберите правильный вариант ответа

Медицинскому персоналу в России осуществлять эвтаназию

- ☐ разрешается по просьбе больного
- ☐ допускается в исключительных случаях
- ☒ запрещается законом
- ☐ разрешается по просьбе родственников

44. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании

- ☒ обязательном
- ☐ добровольном
- ☐ возвратном
- ☐ социальном

45. Выберите правильный вариант ответа

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- ☐ паспорт
- ☒ страховой медицинский полис
- ☐ медицинская карта амбулаторного пациента
- ☐ история болезни

46. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное медицинское страхование в РФ

- ☐ имущественное
- ☐ личное
- ☒ всеобщее
- ☐ групповое

47. Выберите правильный вариант ответа

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- ☒ обязательно
- ☐ желательно
- ☐ необязательно
- ☐ по согласованию

48. Выберите 2 правильных варианта ответов

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное
- ☐ групповое

49. Выберите правильный вариант ответа

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи предусмотрены инструкциями

- ☒ по санитарно-противоэпидемическому режиму
- ☐ по лечению нозологических форм болезни
- ☐ по лечебно-охранительному режиму
- ☐ по исследованиям пациента

50. Выберите правильный вариант ответа

Инфекция, которой пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности

- ☐ карантинная
- ☐ особо опасная
- ☐ внутрибольничная (ВБИ)
- ☒ инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП)

51. Выберите правильный вариант ответа

Искусственный путь передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- ☐ воздушно-капельный
- ☐ контактно-бытовой
- ☒ искусственный
- ☐ воздушно-пылевой

52. Выберите правильный вариант ответа

Естественный механизм передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- ☐ трансмиссивный
- ☐ трансфузионный
- ☐ парентеральный
- ☒ фекально-оральный

53. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение

- ☒ микроорганизмов
- ☐ грызунов
- ☐ насекомых
- ☐ членистоногих

54. Выберите правильный вариант ответа

Механический метод дезинфекции

- ☒ проветривание
- ☐ кварцевание
- ☐ кипячение
- ☐ автоклавирование

55. Выберите правильный вариант ответа

УФО – метод

- ☐ стерилизации

- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ дератизации

56. Выберите правильный вариант ответа

Кипячение – метод

- ☐ стерилизации
- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ дератизации

57. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

58. Выберите правильный вариант ответа

После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию

- ☐ текущую
- ☐ профилактическую
- ☐ предварительную
- ☒ заключительную

59. Выберите правильный вариант ответа

Уровень деkontаминации рук медицинского персонала перед и после кормления пациента

- ☐ профилактический
- ☐ терапевтический
- ☒ гигиенический
- ☐ хирургический

60. Выберите правильный вариант ответа

Цель гигиенической деkontаминации рук медицинского персонала

- ☒ обеспечение кратковременной стерильности
- ☐ создание кратковременной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

61. Выберите правильный вариант ответа

На гигиеническом уровне обработку рук проводят

- ☐ перед и после приема пищи
- ☒ перед медицинскими манипуляциями
- ☐ при бытовом загрязнении рук
- ☐ после посещения туалета

62. Выберите правильный вариант ответа

Цель хирургической обработки рук медицинского персонала

- ☐ обеспечение кратковременной стерильности
- ☒ обеспечение продолжительной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

63. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

64. Выберите правильный вариант ответа

Преувеличение больным имеющихся симптомов, субъективных жалоб

- ☐ симуляция
- ☒ аггравация
- ☐ диссимуляция
- ☐ ипохондрия

65. Выберите правильный вариант ответа

Сформированный абстинентный синдром является признаком

- ☐ злоупотребление алкоголем с вредными последствиями
- ☐ I стадии алкоголизма
- ☒ II стадии алкоголизма
- ☐ бытового пьянства

66. Выберите правильный вариант ответа

Для простого алкогольного опьянения не характерно

- ☐ эйфория
- ☐ заторможенность
- ☒ галлюцинации
- ☐ колебания артериального давления

67. Выберите правильный вариант ответа

Признаком состояния алкогольного опьянения не является:

- ☐ эйфоричность
- ☐ состояние сознания
- ☐ запах алкоголя изо рта
- ☒ сужение зрачков

68. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ отказ от употребления алкоголя
- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в традиционных, социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях

69. Выберите правильный вариант ответа

Острые алкогольные психозы включают

- ☐ эйфория
- ☐ спокойный сон
- ☒ параноид
- ☐ бред ревности

70. Выберите правильный вариант ответа

К физиологическим эффектам опиатов относится

- ☐ гиперестезия
- ☐ гипотимия
- ☒ угнетение дыхания
- ☐ бронхоспазм

71. Выберите правильный вариант ответа

В состоянии интоксикации опиатами не характерно

- ☐ миоз
- ☐ снижение температуры тела
- ☐ нарушение координации
- ☒ психо-моторное возбуждение

72. Выберите правильный вариант ответа

К наркотическим средствам и психотропным веществам относятся

- ☐ трихопол
- ☒ героин
- ☐ ардуан
- ☐ наропин

73. Выберите правильный вариант ответа

Галлюциногенные эффекты каннабиноидов обычно проявляются

- ☐ при малых дозах
- ☐ при средних дозах
- ☒ при высоких дозах
- ☐ при смешивании с опилками

74. Выберите правильный вариант ответа

Внешним признаком интоксикации каннабиноидами являются

- ☐ болезненное мочеиспускание
- ☐ нарушение сердечного ритма
- ☒ сухость во рту
- ☐ офтальмоплегия

75. Выберите правильный вариант ответа

Влияние психостимуляторов наркотического ряда на сердечно-сосудистую систему проявляется

- ☒ тахикардией
- ☐ урежение пульса
- ☐ артериальной гипотензией
- ☐ отсутствие зубца Р

76. Выберите правильный вариант ответа

К абстинентным алкогольным психозам не относятся

- ☐ алкогольный делирий
- ☐ алкогольный галлюциноз
- ☐ алкогольный параноид
- ☒ астматический статус

77. Выберите правильный вариант ответа

Клиника алкогольного абстинентного синдрома проявляется

- ☐ повышение интегральных возможностей ЦНС
- ☒ диспептическими расстройствами в виде отсутствия аппетита, тошноты, нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы
- ☐ улучшение сна
- ☐ ничем из перечисленного

78. Выберите правильный вариант ответа

Социальные последствия у больных III стадии заболевания алкоголизма проявляются во всём, кроме

- ☐ неспособности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- ☐ выраженного профессионального снижения с утратой прежней квалификации
- ☐ иждивенческих тенденций
- ☒ стремления к самосовершенствованию

79. Выберите правильный вариант ответа

Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся

- ☐ отсутствием поражения паренхиматозных органов
- ☐ уменьшением влечения к спиртным напиткам

- ☒ формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
 - ☐ повышением сексуальной потенции
- 80. Выберите правильный вариант ответа**
Наркомания – это хроническое заболевание
- ☐ вызванное употреблением анаболических препаратов
 - ☒ характеризующееся развитием психической, физической зависимости
 - ☐ характеризующееся отсутствием развития толерантности к опиатам
 - ☐ характеризующееся повышением социального статуса

81. Выберите правильный вариант ответа

В развитии алкоголизма у женщин наиболее значимый фактор

- ☒ преморбидные характерологические особенности личности
- ☐ семейное благополучие
- ☐ высокий заработок
- ☐ регион проживания

82. Выберите правильный вариант ответа

Одинокое пьянство женщин, страдающих алкоголизмом, объясняется

- ☐ многодетностью
- ☒ стремлением скрыть пьянство (по морально-этическим соображениям)
- ☐ эндокринными изменениями
- ☐ жилищными проблемами

83. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на сведения подэкспертного о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта или утверждение очевидцев
- ☒ провести не менее 2 проб на алкоголь
- ☐ ориентироваться на неврологические расстройства

84. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты – это

- ☐ препараты, содержащие спирт
- ☒ препараты конопли, опия
- ☐ препараты гидроксиэтилового крахмала
- ☐ препараты валерианы

85. Выберите правильный вариант ответа

Средства с ненаркотическим действием

- ☐ гашиш
- ☐ героин
- ☐ морфин
- ☒ атропин

86. Выберите правильный вариант ответа

Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются

- ☐ старшей медсестрой
- ☒ специальной комиссией
- ☐ врачами отделения
- ☐ заведующей аптекой

87. Выберите правильный вариант ответа

Выписывание наркотиков наркоману

- ☒ запрещено
- ☐ возможно врачами наркокабинетов
- ☐ только врачебной комиссией
- ☐ с разрешения родственников

88. Выберите правильный вариант ответа

Абстинентный синдром – это

- ☒ физическая зависимость от наркотиков
- ☐ психическое заболевание
- ☐ недостаток воспитания
- ☐ отказ от лечения

89. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский критерий наркомании – это

- ☒ воздействие на центральную нервную систему
- ☐ использование наркотиков в немедицинских целях
- ☐ рост заболеваемости
- ☐ рост нарушений правил дорожного движения

90. Выберите правильный вариант ответа

Социальный критерий наркомании – это

- ☐ использование наркотиков в медицинских целях
- ☒ социальные проблемы, рост преступности
- ☐ улучшение экономики, благосостояния
- ☐ незаконная вырубка леса

91. Выберите правильный вариант ответа

Вторая стадия наркологического заболевания включает

- ☐ полную деградацию
- ☒ ломку, психозы, изменение личности по алкогольному (наркотическому) типу
- ☐ улучшение общего самочувствия
- ☐ потеря памяти

92. Выберите правильный вариант ответа

Конечная стадия наркомании включает

- ☐ диффузный атеросклероз
- ☐ остеопороз
- ☒ кахексии, полную деградацию, абстиненцию
- ☐ язвенную болезнь желудка

93. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании включает

- ☒ психологическую зависимость
- ☐ ломку
- ☐ абстиненцию
- ☐ нарушение социальной адаптации

94. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость от наркотиков проявляется в стадии

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ не развивается никогда

95. Выберите правильный вариант ответа

«Ломка» – это

- ☒ абстинентный синдром
- ☐ острое психотическое расстройство
- ☐ все перечисленное
- ☐ ничто из перечисленного

96. Выберите правильный вариант ответа

Соматические расстройства у наркоманов возникают

- ☐ в начальной стадии
- ☐ в стадии истощения
- ☒ на всем протяжении употребления психоактивных веществ
- ☐ в развернутой стадии

97. Выберите правильный вариант ответа

Токсикомания – это

- ☐ вредная привычка
- ☐ зависимость от наркотических препаратов
- ☐ прием различных ядовитых веществ
- ☒ злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам и являющимися токсическими веществами

98. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении приема наркотиков

- ☒ абстинентный синдром
- ☐ синдром отдачи
- ☐ синдром рикошета
- ☐ синдром Рейно

99. Выберите правильный вариант ответа

Специальные рецептурные бланки на наркотические средства должны храниться

- ☒ в сейфе
- ☐ в шкафу
- ☐ в реанимационной палате
- ☐ в ящике стола

100. Выберите правильный вариант ответа

К соматическим расстройствам при острой интоксикации галлюциногенами относится все перечисленное, кроме

- ☐ ощущения жара
- ☒ понижения температуры
- ☐ слезо- и слюноотечения
- ☐ тахикардии и подъема артериального давления

101. Выберите правильный вариант ответа

Возникновение точно таких же ощущений и реакций, которые были в период острой интоксикации спустя недели, месяцы после последнего приема наркотика, характерны для наркомании

- ☐ амфетаминами
- ☒ галлюциногенами
- ☐ опиатами
- ☐ барбитуратами

102. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость при приеме галлюциногенов развивается

- ☐ в короткие сроки
- ☐ спустя полгода от начала систематического приема
- ☐ спустя год от начала систематического приема
- ☒ не развивается вообще

103. Выберите правильный вариант ответа

Последствиями злоупотребления галлюциногенами являются все перечисленные, исключая

- ☐ агрессивные действия
- ☐ суициды из-за устрашающих галлюцинаций
- ☐ хромосомные нарушения
- ☒ острые депрессивные реакции

104. Выберите правильный вариант ответа

Случаи ятрогенной наркомании препаратами группы опия не встречаются

- ☐ хирургической практики
- ☒ педиатрической практики
- ☐ онкологической практики
- ☐ терапевтической практики

105. Выберите правильный вариант ответа

Опийные ятрогенные наркомании редко развиваются у пациентов, длительно страдающих

- ☐ болевым синдромом, фантомными болями
- ☐ неблагоприятным исходом оперативного вмешательства
- ☐ хроническими костно-суставными болезнями
- ☒ заболеваниями печени

106. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманы, отказывающиеся от лечения, привлекаются к

- ☐ уголовной ответственности
- ☒ принудительному лечению
- ☐ поддерживающей терапии транквилизаторами
- ☐ замене парентеральных препаратов на пероральные

107. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое привыкание к наркотику при лечении по медицинским показателям:

- ☐ подлежит уголовной ответственности
- ☒ не наказуемо
- ☐ преследуется в административном порядке
- ☐ переводятся на пожизненный прием наркотиков

108. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник при галлюцинировании пациента должен

- ☐ противоречить больному
- ☐ не предпринимать никаких действий
- ☒ доложить дежурному врачу
- ☐ назначить строгий надзор

109. Выберите правильный вариант ответа

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы маниакально - депрессивного психоза
- ☐ депрессивной фазы маниакально - депрессивного психоза
- ☐ эпилепсии
- ☐ кататонического синдрома

110. Выберите правильный вариант ответа

Афазия- это

- ☒ нарушение речи
- ☐ одна из форм мутизма
- ☐ проявление кататонии
- ☐ нарушение глотания

111. Выберите правильный вариант ответа

Психическая ятрогения- это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного поведения медицинского работника в отношении больного

- ☒ поведения медицинского работника в отношении больного
- ☐ медикаментозного лечения заболевания
- ☐ определение диагноза заболевания
- ☐ ухода за больными

112. Выберите правильный вариант ответа

Психогении- заболевания, возникающие под влиянием

- ☒ психической травмы
- ☐ тяжелых травм головного мозга
- ☐ инфекций головного мозга
- ☐ алкогольной интоксикации

113. Выберите правильный вариант ответа

Решающее значение в развитии невротозов имеет

- ☒ психогенный фактор
- ☐ нейроинфекция
- ☐ черепно- мозговая травма
- ☐ сосудистые заболевания головного мозга

114. Выберите правильный вариант ответа

Снотворные противосудорожные

- ☐ настой ромашки
- ☒ люминал
- ☐ кодеин
- ☐ кордиамин

115. Выберите правильный вариант ответа

Стимуляторы центральной нервной системы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

- ☐ дофамин
- ☒ фенамин
- ☐ фенатин
- ☐ аминазин

116. Выберите правильный вариант ответа

Транквилизаторы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

- ☐ дроперидол
- ☒ седуксен
- ☐ люминал
- ☐ веронал

117. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания – это

- ☒ одновременное употребление нескольких наркотиков, в том числе алкоголя
- ☐ одновременное употребление легких и крепких алкогольных напитков
- ☐ аггравация хирургических заболеваний с целью получения наркотика
- ☐ аноксическое повреждение центральной нервной системы

118. Выберите правильный вариант ответа

Антигистаминные препараты, используемые лицами с наркотической зависимостью для усиления эффекта психоактивных веществ

- ☐ преднизолон
- ☒ супрастин
- ☐ тавегил

- ☐ хлористый кальций

119. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

- ☐ больной человек, принимающий наркотические средства
- ☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков
- ☐ любитель кока-колы
- ☐ человек, выращивающий коноплю

120. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании состоит из:

- ☒ психологической зависимости
- ☐ ломки
- ☐ абстиненции
- ☐ асоциальное поведение

121. Выберите правильный вариант ответа

Деградация личности при наркомании развивается:

- ☐ при приеме наркотиков
- ☐ в развернутой стадии
- ☒ в стадии истощения
- ☐ при первом приеме наркотиков

122. Выберите правильный вариант ответа

К летучим наркотически действующим веществам (ЛДНВ) не относится

- ☐ ацетон
- ☐ четыреххлористый углерод
- ☒ глицерин
- ☐ бутан

123. Выберите правильный вариант ответа

Расстройства восприятия- это

- ☒ галлюцинации
- ☐ судороги
- ☐ бред
- ☐ гипербулия

124. Выберите правильный вариант ответа

Дромомания - это расстройство

- ☒ волевой сферы
- ☐ памяти
- ☐ эмоциональной сферы
- ☐ восприятия

125. Выберите правильный вариант ответа

Деменция-это

- ☒ слабоумие, приобретенное в процессе болезни
- ☐ врожденное слабоумие
- ☐ тоскливое настроение
- ☐ легкая степень слабоумие

126. Выберите правильный вариант ответа

Состояния выключения сознания

- ☒ кома
- ☐ делирий
- ☐ сумеречное помрачение сознания
- ☐ онейроид

127. Выберите правильный вариант ответа

Аура встречается при

- ☒ эпилепсии
- ☐ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

128. Выберите правильный вариант ответа

Идиотия встречается при

- ☒ олигофрении
- ☐ психопатии
- ☐ шизофрении
- ☐ эпилепсии

129. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий в народе называют

- ☒ белой горячкой
- ☐ алкоголизмом
- ☐ пьянством
- ☐ тунейдством

130. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий характеризуется

- ☒ зрительными галлюцинациями
- ☐ бредовыми идеями
- ☐ навязчивыми идеями
- ☐ фиксационной амнезией

131. Выберите правильный вариант ответа

Метод исследования для получения информации о наличии галлюцинации у больного

- ☐ электроэнцефалография
- ☐ рентгенограмма черепа
- ☐ эхоэнцефалография
- ☒ наблюдение за поведением пациента

132. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия у пациента постоянно слышащего внутри головы голоса

- ☐ иллюзии
- ☐ гиперестезии
- ☐ ускорение мышления
- ☒ псевдогаллюцинации

133. Выберите правильный вариант ответа

При ипохондрическом бреде больной считает, что

- ☒ у него тяжелая болезнь
- ☐ его обворовывают
- ☐ он преступник
- ☐ его хотят отравить

134. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии - это

- ☒ искаженное восприятие существующего объекта
- ☐ восприятие несуществующего объекта
- ☐ нечеткое восприятие реальности
- ☐ увеличенное восприятие реального объекта

135. Выберите правильный вариант ответа

При навязчивых идеях больной

- ☒ критичен к своим высказываниям
- ☐ формально критичен
- ☐ без критики к патологическим мыслям
- ☐ утрачивает критику на высоте эмоционального аффекта

136. Выберите правильный вариант ответа

Деменция является патологией

- ☐ эмоций
- ☐ воли
- ☐ запоминания
- ☒ интеллекта

137. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

138. Выберите правильный вариант ответа

Пациент с депрессией не высказывает мыслей

- ☐ самоуничижения
- ☒ изобретательности
- ☐ греховности
- ☐ собственной никчемности

139. Выберите правильный вариант ответа

Апатия характеризуется

- ☐ педантичностью
- ☐ беспокойством
- ☒ безразличием
- ☐ тревогой

140. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивный синдром опасен в плане совершения

- ☒ суицида
- ☐ побега
- ☐ нападения на персонал
- ☐ криминальных действий

141. Выберите правильный вариант ответа

Кататонический синдром встречается при

- ☒ шизофрении
- ☐ неврозах
- ☐ эпилепсии
- ☐ умственной отсталости

142. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасным для окружающих является пациент

- ☐ с фиксационной амнезией
- ☒ с кататоническим возбуждением
- ☐ с комментирующими псевдогаллюцинациями
- ☐ с кататоническим ступором

143. Выберите правильный вариант ответа

Патологическая нелепая идея, не поддающаяся разубеждению, называется

- ☒ бредовой
- ☐ навязчивой
- ☐ сверхценной
- ☐ бессмысленной

144. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воспоминаний у больного

- ☐ гипомнезией
- ☐ парамнезией
- ☒ амнезией
- ☐ гипермнезией

145. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивные больные чаще совершают суицид

- ☒ на выходе из депрессии
- ☐ перед выпиской
- ☐ независимо от лечения
- ☐ в любое время суток

146. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий синдром алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
- ☐ астеновегетативный
- ☐ психоорганический
- ☐ расстройство сознания

147. Выберите правильный вариант ответа

Характерный для белой горячки синдром

- ☐ судорожный
- ☒ расстройство сознания
- ☐ слабоумия
- ☐ невротический

148. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространенный способ употребления гашиша

- ☐ жевание
- ☒ курение
- ☐ прием вовнутрь
- ☐ под кожу

149. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее злокачественным алкоголизмом является

- ☒ женский
- ☐ мужской
- ☐ различий нет
- ☐ одинаковый и женский и мужской

150. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для

- ☐ шизофрении
- ☐ сосудистой деменции
- ☒ болезни Альцгеймера
- ☐ депрессии

151. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная, медленная речь присуща больным с

- ☐ кататонией
- ☐ бредом преследования
- ☐ бредом громадности
- ☒ депрессией

152. Выберите правильный вариант ответа

Врач, описавший тотальное слабоумие с распадом речи

- ☐ Г. Вернике
- ☒ А. Альцгеймер
- ☐ А. Пике
- ☐ С. Корсаков

153. Выберите правильный вариант ответа

Стадий алкоголизма

- ☒ три
- ☐ одна
- ☐ четыре
- ☐ две

154. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия при отсутствии объекта это

- ☐ иллюзии
- ☒ галлюцинации
- ☐ амнезия
- ☐ гипотимия

155. Выберите правильный вариант ответа

Врожденное или рано приобретенное снижение интеллекта

- ☒ олигофрения
- ☐ деменция
- ☐ депрессия
- ☐ дромомания

156. Выберите правильный вариант ответа

Количество фаз при судорожном эпилептическом припадке

- ☐ три
- ☐ две
- ☒ четыре
- ☐ пять

157. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение мышления

- ☐ аффект
- ☐ тоска
- ☒ обстоятельность
- ☐ гипермнезия

158. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение воли

- ☒ гипобулия
- ☐ иллюзии
- ☐ гипобулемия
- ☐ эйфория

159. Выберите правильный вариант ответа

Строгий надзор за пациентами

- ☐ соматически ослабленные
- ☒ с агрессивными состояниями
- ☐ с ретроградной амнезией
- ☐ получающие инсулиношоковую терапию

160. Выберите правильный вариант ответа

Усиленное наблюдение за пациентами

- ☒ соматически ослабленные
- ☐ с депрессивным состоянием
- ☐ с агрессивным состоянием
- ☐ с фиксационной амнезией

161. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивый страх воды

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ эйфория
- ☐ амнезия

162. Выберите правильный вариант ответа

Мышление при эпилепсии

- ☐ замедленное
- ☒ вязкое
- ☐ ускоренное
- ☐ наплыв мыслей

163. Выберите правильный вариант ответа

Пограничное расстройство психики

- ☐ депрессия
- ☐ мания
- ☐ психоз
- ☒ невроз

164. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерно

- ☒ аутизм

- ☐ дисфория
- ☐ отвлекаемость
- ☐ раздражительная слабость

165. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти фантастическими событиями

- ☐ псевдореминисценции
- ☒ конфабуляции
- ☐ иллюзии
- ☐ сопор

166. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти событиями, которые в прошлом происходили с больным

- ☒ псевдореминисценции
- ☐ конфабуляции
- ☐ гипотимия
- ☐ эйфория

167. Выберите правильный вариант ответа

Влечение к бродяжничеству называется

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ дромомания
- ☐ иллюзии

168. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воли называется

- ☒ абулия
- ☐ анорексия
- ☐ анестезия
- ☐ амнезия

169. Выберите правильный вариант ответа

Слабоумие, приобретенное в результате болезни

- ☐ олигофрения
- ☒ деменция
- ☐ гипермнезия
- ☐ сумеречное состояние сознания

170. Выберите правильный вариант ответа

Неспособность получать удовольствие

- ☒ ангедония
- ☐ ановуляция
- ☐ анорексия
- ☐ гипотермия

171. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ кататонический
- ☒ судорожный
- ☐ галлюцинаторно- параноидный
- ☐ депрессивный

172. Выберите правильный вариант ответа

Для неврастения характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ раздражительность
- ☒ конфабуляции
- ☐ поверхностный сон
- ☐ гиперестезия

173. Выберите правильный вариант ответа

Разорванное мышление характерно для

- ☐ эпилепсии

- ☒ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

174. Выберите правильный вариант ответа

Эмоциональная тупость характерна для

- ☐ эпилепсии
- ☐ олигофрении
- ☒ шизофрении
- ☐ депрессии

175. Выберите два правильных ответа

Правильная тактика общения с пациентом с болезнью Альцгеймера делающего ошибки в речи

- ☐ грубо исправлять
- ☒ не обращать внимания на ошибки
- ☒ успокаивать пациента для уменьшения волнения
- ☐ не разговаривать с пациентом
- ☐ вызвать врача

176. Выберите два правильных ответа

Правильных два первых действия медработника в ответ на грубость пациентки с психическими расстройствами

- ☒ сообщить врачу
- ☐ немедленно перевести в надзорную палату
- ☒ попытаться отвлечь внимание больного
- ☐ использовать методы механического стеснения
- ☐ ввести лекарственное средство

177. Выберите два правильных ответа

Инструкции пациенту перед электросудорожной терапией

- ☐ вымыть голову
- ☒ сходить в туалет
- ☐ не принимать лекарства
- ☒ не завтракать
- ☐ не бегать по отделению

178. Выберите два правильных ответа

Основными симптомами шизофрении

- ☒ отгороженность
- ☒ отрыв от реальности
- ☐ маниакальное возбуждение
- ☐ отвлекаемость
- ☐ эйфория

179. Выберите два правильных ответа

Расстройства восприятия- это

- ☒ галлюцинации
- ☐ судороги
- ☐ бред
- ☒ иллюзии
- ☐ гипербулия

180. Выберите два правильных ответа

Ведущий симптом алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
- ☒ запой
- ☐ психоорганический
- ☐ маниакальный
- ☐ гипобулия

181. Выберите два правильных ответа

Клинические признаки эпилепсии

- ☒ припадки, расстройства сознания
- ☒ изменение личности
- ☐ аутизм
- ☐ бред воздействия
- ☐ расстройства памяти

182. Выберите два правильных ответа

Навязчивыми страхами называются следующие состояния

- ☐ истерия
- ☐ депрессия
- ☒ гидрофобия
- ☒ клаустрофобия
- ☐ маниакальное возбуждение

183. Выберите два правильных ответа

Расстройства памяти

- ☒ амнезия
- ☒ парамнезия
- ☐ атрофия
- ☐ афазия
- ☐ ятрогения

184. Выберите два правильных ответа

Императивные галлюцинации- это когда

- ☒ голос приказывает покончить с собой
- ☐ больной слышит пояснения своим поступкам
- ☒ слышит голоса, которые приказывают убить
- ☐ больной отдает приказы окружающим
- ☐ больной просит избавить от мыслей о болезни

185. Выберите два правильных ответа

Навязчивые мысли- это когда больной

- ☒ не может избавиться от мыслей, возникающих помимо его желания
- ☒ понимает ненужность своих мыслей
- ☐ не хочет от них избавиться
- ☐ стремиться к их реализации
- ☐ скрывает от врача их наличие

186. Выберите два правильных ответа

Бредовые идеи - это когда больной

- ☐ хочет избавиться от мыслей
- ☐ ищет помощи
- ☒ высказывает нелепые мысли
- ☒ к мыслям нет критики
- ☐ понимает ненужность своих мыслей

187. Выберите два правильных ответа

Больной с ипохондрическим синдромом невротического уровня

- ☐ не контактен
- ☐ не критичен к своим высказываниям
- ☒ говорит, что у него возникли мысли о болезни
- ☒ просит избавить его от мыслей от болезни
- ☐ к мыслям нет критики

188. Выберите два правильных ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☒ гипотимией
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

189. Выберите два правильных ответа

Пациент с депрессией характеризуется следующими клиническими проявлениями

- ☒ сидит в согбенной позе
- ☒ отвечает тихо, односложно
- ☐ включается в жизнь отделения
- ☐ высоким аппетитом
- ☐ эйфорией

190. Выберите два правильных ответа

Наиболее частые причины агрессии душевнобольных

- ☒ самовольное прекращение приема лекарств
- ☒ изменение психического состояния
- ☐ прием лекарств
- ☐ злоупотребление курением
- ☐ прогулки на улице

191. Выберите два правильных ответа

Правильное поведение родственников при агрессии со стороны душевнобольного

- ☒ убрать опасные предметы
- ☒ вызвать скорую психиатрическую помощь
- ☐ уйти из дома
- ☐ насильно заставить принять лекарство
- ☐ оказывать сопротивление

192. Выберите два правильных ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☒ повелительные
- ☒ императивные
- ☐ все перечисленные
- ☐ ничто не верно

193. Выберите два правильных ответа

Депрессия включает

- ☒ двигательную заторможенность
- ☒ мыслительную заторможенность
- ☐ повышенное настроение
- ☐ иллюзорные расстройства
- ☐ двигательную активность

194. Выберите два правильных ответа

Варианты нарушения восприятия

- ☒ истинные галлюцинации
- ☒ псевдогаллюцинации
- ☐ эйфория
- ☐ парамнезия
- ☐ гипотимия

195. Выберите два правильных ответа

Мания включает

- ☒ двигательную активность
- ☒ ускоренное мышление
- ☐ пониженное настроение
- ☐ замедленное мышление
- ☐ двигательную заторможенность

196. Выберите два правильных ответа

Расстройства сознания

- ☒ сопор
- ☒ кома
- ☐ псевдореминисценции
- ☐ истинные галлюцинации

- ☐ псевдогаллюцинации

197. Выберите два правильных ответа

Признаки передозировки опийных препаратов

- ☒ миоз
☒ кома
☐ мидриаз
☐ эйфория
☐ нормальное дыхание

198. Выберите два правильных ответа

Вызывать скорую помощь пациенту с эпилепсией необходимо если

- ☒ припадок длится более 5 минут
☒ припадок следует один за другим
☐ больной пришел в сознание
☐ припадок длится 2 минуты
☐ припадок случился дома

2. Знания современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности

199. Выберите правильный вариант ответа

Латентная стадия ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☐ длительной лихорадкой
☐ увеличением печени, селезенки
☒ увеличением лимфоузлов
☐ вторичными заболеваниями

200. Выберите два варианта ответа

СПИД - маркерные заболевания это

- ☐ саркома Капоши у больных старше 60 лет
☒ пневмоцистная пневмония
☒ кандидоз пищевода, трахеи, бронхов
☐ дизентерия

201. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее ранний срок обнаружения антител с момента заражения

- ☐ 1 месяц
☒ 2 недели
☐ 2 месяца
☐ 3 месяца

202. Выберите правильный вариант ответа

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

203. Выберите правильный вариант ответа

Длительность вирусоносительства при ВИЧ-инфекции

- ☐ от 2 недель до 6 месяцев
☐ до 5 лет
☐ до 15 лет
☒ пожизненно

204. Выберите правильный вариант ответа

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) – это

- ☒ стадия ВИЧ-инфекции
☐ самостоятельное заболевание
☐ синоним ВИЧ-инфекции
☐ осложнение ВИЧ-инфекции

205. Выберите правильный вариант ответа

Препараты для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
☒ антиретровирусные
☐ симптоматические
☐ гормональные

206. Выберите правильный вариант ответа

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
☐ для выявления ВИЧ
☒ для тестирования при аварийных ситуациях
☐ для ранней диагностики

207. Выберите правильный вариант ответа

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
☒ медицинских работников при аварийной ситуации
☐ медицинских работников при медосмотре

208. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

- ☒ серологические
☐ генетические
☐ люминесцентные
☐ бактериологические

209. Выберите правильный вариант ответа

Реакция, используемая для диагностики ВИЧ-инфекции в ЛПУ-иммунный блоттинг (ИБ)

- ☒ иммуноферментный анализ (ИФА)
☐ полимеразная цепная реакция (ПЦР)
☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)
☐ реакция связывания комплемента (РСК)

210. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
☒ 2 часа
☐ 4 часа
☐ 1 сутки

211. Выберите правильный вариант ответа

Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

212. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения в настоящее время

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом от населения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

213. Выберите два правильных варианта ответа

Критерии правильного наложения кровоостанавливающего жгута

- ☒ остановка кровотечения
- ☐ пальпация пульса ниже жгута
- ☐ цианоз конечности
- ☒ бледность конечности
- ☐ покраснение конечности

214. Выберите правильный вариант ответа

Максимальная продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 3 часа
- ☒ 30 минут

215. Выберите правильный вариант ответа

При ранах шеи с повреждением крупной вены повязка накладывается

- ☒ окклюзионная
- ☐ асептическая
- ☐ давящая
- ☐ компрессная

216. Выберите два правильных варианта ответа

При травме позвоночника пострадавшего транспортируют

- ☐ в положении полусидя
- ☒ в положении на спине и на щите
- ☒ на носилках в положении на животе
- ☐ в положении лягушки
- ☐ в положении Фаулера

217. Выберите правильный вариант ответа

При поверхностных ожогах оказание помощи начинают

- ☐ с наложения повязки
- ☒ с охлаждения ожога холодной проточной водой
- ☐ с обработки ожога спиртом
- ☐ с обезболивания

218. Выберите правильный вариант ответа

Первоочередное мероприятие при анафилактическом шоке

- ☐ введение антигистаминных препаратов
- ☒ введение адреналина и глюкокортикоидов
- ☐ наложение жгута выше места инъекции
- ☐ восполнение объема циркулирующей крови

219. Выберите правильный вариант ответа

При переломе костей средней трети голени необходимо зафиксировать

- ☐ 1 сустав
- ☒ 2 сустава
- ☐ 3 сустава
- ☐ не имеет значения

220. Выберите два правильных варианта ответа

Временный гемостаз осуществляется

- ☐ легированием сосуда в ране
- ☐ наложением сосудистого шва
- ☒ давящей повязкой
- ☒ жгутом
- ☐ диатермокоагуляцией

221. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее ранний признак эффективности сердечно-легочной реанимации

- ☒ сужение зрачков
- ☐ появление пульса на сонной артерии
- ☐ повышение артериального давления до 60–70 мм рт. ст
- ☐ появление дыхательных движений

222. Выберите правильный вариант ответа

Профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год

- ☐ ВИЧ-инфицированные
- ☐ военнослужащие
- ☒ больные с язвенной болезнью желудка
- ☐ лица, проживающие в домах престарелых

223. Выберите правильный вариант ответа

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

224. Выберите правильный вариант ответа

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

225. Выберите правильный вариант ответа

Раннему активному выявлению больных туберкулезом среди взрослых способствует

- ☐ массовые осмотры населения
- ☐ рентгеноскопия легких
- ☒ массовое флюорографическое обследование
- ☐ туберкулинодиагностика

226. Выберите правильный вариант ответа

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 дня

227. Выберите правильный вариант ответа

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д
- ☐ Г

228. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

- ☐ отсутствие болезней
- ☐ нормальное функционирование всех систем организма
- ☒ состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- ☐ состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

229. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- ☒ да
- ☐ нет
- ☐ исходя из обстоятельств
- ☐ по согласованию

230. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- ☐ обязательного
- ☒ добровольного
- ☐ любого
- ☐ всеобщего

231. Выберите правильный вариант ответа

Страховые взносы работодателей на обязательное медицинское страхование в ФОМС

- ☐ 2,6 %
- ☐ 3,1 %
- ☒ 5,1 %
- ☐ 14 %

232. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
- ☒ 15-ти летнего возраста
- ☐ 16-ти летнего возраста
- ☐ 17-ти летнего возраста

233. Выберите правильный вариант ответа

Обработка перчаток после применения

- ☐ дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация
- ☐ двукратное протирание дезинфектантом с моющим средством с интервалом в 15 минут, подсушивание

☒ дезинфекция, утилизация

☐ предстерилизационная очистка и стерилизация

234. Выберите правильный вариант ответа

Уборочный инвентарь между уборками хранится

- ☐ в процедурном кабинете
- ☐ в специальном шкафу в процедурном кабинете
- ☒ вне помещений рабочих кабинетов
- ☐ в отдельном помещении

235. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность мытья рук на гигиеническом уровне

- ☐ 5 минут
- ☒ 1 минута
- ☐ 30 секунд
- ☐ 15 секунд

236. Выберите правильный вариант ответа

Химическую дезинфекцию медицинского инструментария проводят

- ☐ паром под давлением
- ☐ сухим горячим воздухом
- ☐ УФО
- ☒ дезинфицирующими средствами

237. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция бактерицидных ламп проводится раствором

- ☐ перекиси водорода 3-процентной
- ☐ перекиси водорода 6-процентной
- ☐ хлорамина 4-процентного
- ☒ этилового спирта 70-процентного

238. Выберите правильный вариант ответа

Одно из обязательных условий лечения алкоголизма психотропными препаратами

- ☐ применение антидепрессантов
- ☐ дифференцированность показаний
- ☐ контроль соматического и неврологического состояния
- ☒ назначение лечения короткими курсами

239. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома используются средства

- ☐ барьерные контрацептивы
- ☒ полиионные растворы, витамины, ноотропы,
- ☐ антибиотики
- ☐ пеногасители

240. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

- ☐ с преобладанием антипсихического эффекта
- ☒ с преобладанием седативного эффекта
- ☐ с преобладанием стимулирующего средства
- ☐ ультракороткого действия

241. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показаниями для назначения транквилизаторов являются

- ☐ когнитивные расстройства
- ☐ низкое артериальное давление
- ☒ актуализация патологического влечения к алкоголю
- ☐ расстройства мочеиспускания

242. Выберите правильный вариант ответа

Диагнозы алкоголизма, наркомании устанавливаются

- ☒ пожизненно
- ☐ на период диспансерного наблюдения
- ☐ на период активного лечения в связи с рецидивом заболевания
- ☐ на период употребления алкоголя, наркотика

243. Выберите правильный вариант ответа

При психотических расстройствах вследствие злоупотребления НС и ПТВ показана госпитализация

- ☒ в недобровольном порядке в психиатрический стационар
- ☐ в экстренном порядке в отделение токсикологии
- ☐ в терапевтическое отделение
- ☐ в хирургическое отделение

244. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

- ☐ с преобладанием антипсихического эффекта
- ☒ с преобладанием седативного эффекта
- ☐ с преобладанием стимулирующего средства
- ☐ с преобладанием экстрапирамидных нарушений

245. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показанием для назначения транквилизаторов не является

- ☐ неврозоподобные и психоподобные расстройства
- ☐ аффективные нарушения
- ☐ актуализация патологического влечения к алкоголю
- ☒ сердечно-сосудистая патология

246. Выберите правильный вариант ответа

Показания для назначения ноотропов у больных алкоголизмом

- ☐ азотемия
- ☒ нарушение памяти и интеллекта
- ☐ пониженный сердечный выброс
- ☐ гипертермия

247. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкоголизма у лиц с язвенной болезнью желудка используются

- ☒ метронидазол (трихопол)
- ☐ аспирин
- ☐ искусственная гипотермия
- ☐ условно-рефлекторная терапия

248. Выберите правильный вариант ответа

К общеукрепляющим и тонизирующим средствам, используемым в наркологической практике, относятся

- ☒ витамины, ноотропы

- ☐ H₂-блокаторы
- ☐ местные анестетики
- ☐ аминогликозиды

249. Выберите правильный вариант ответа

К тиоловым препаратам, используемым в наркологической практике, относятся

- ☐ сульфат магния
- ☒ 5-% унитиол
- ☐ гемодез
- ☐ тироксин

250. Выберите правильный вариант ответа

По медицинским показаниям наркотики не назначаются

- ☐ онкологическим больным
- ☐ в послеоперационном периоде
- ☒ при зубной боли
- ☐ в момент проведения общей внутривенной анестезии

251. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства парентерального и перорального применения хранятся

- ☐ вместе
- ☒ отдельно
- ☐ в рентген-кабинете
- ☐ в приёмной главного врача

252. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния у пациента необходимо

- ☒ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- ☐ направить его на обследование к психиатру
- ☐ провести дезинтоксикацию на месте
- ☐ сделать микроклизму

253. Выберите правильный вариант ответа

При малейших признаках наркотического состояния необходимо

- ☐ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- ☐ направить пациента в поликлинику для обследования
- ☒ направить пациента к наркологу
- ☐ направить на санаторное лечение

254. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты выписываются

- ☒ на латинском языке
- ☐ на русском языке
- ☐ на русском и латинском языках
- ☐ на английском

255. Выберите правильный вариант ответа

Требования на наркотические препараты выписываются

- ☒ на отдельных бланках в 3 экземплярах
- ☐ на общих бланках в 2 экземплярах
- ☐ в журнале назначений
- ☐ в истории болезни

256. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические вещества в лечебно-профилактическом учреждении хранятся

- ☐ в соответствующих наборах по оказанию посиндромной неотложной помощи

☒ в специальных помещениях в соответствии с требованиями

☐ в подвальном помещении

☐ у главного врача

257. Выберите правильный вариант ответа

Места хранения наркотиков необходимо обеспечить

☐ звукоизоляцией

☒ охранной сигнализацией

☐ милицейским постом

☐ свободным доступом

258. Выберите правильный вариант ответа

Пероральный прием наркотических лекарственных средств производится

☒ только в присутствии медицинского персонала

☐ независимо от присутствия медсестры

☐ втайне от окружающих

☐ после приема пищи

259. Выберите правильный вариант ответа

Запас наркотических лекарственных средств в отделениях

☐ не более чем на 12 часов

☒ не должен превышать 3-дневной потребности

☐ не должен превышать недельный запас

☐ не должен превышать 10-дневной потребности

260. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика наркозаболеваний включает

☐ недопущение переохлаждения

☒ психопрофилактику

☐ лечение алкоголизма

☐ лечение кариеза

261. Выберите правильный вариант ответа

Психопрофилактика – это

☒ санитарное просвещение

☐ соблюдение санэпидрежима

☐ посещение музеев

☐ посещение солярия

262. Выберите правильный вариант ответа

Зондовое питание при отказах от пищи назначают через

☒ 3 дня

☐ 3 часа

☐ 7 дней

☐ 10 дней

263. Выберите правильный вариант ответа

Препарат, усиливающий чувство голода

☐ транексам

☐ трихопол

☒ инсулин

☐ юнидокс соллютаб

264. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные средства, основным побочным действием которых является нейролептический синдром

☐ антидепрессанты

☒ нейролептики

☐ транквилизаторы

☐ нормотимики

265. Выберите правильный вариант ответа

Психотерапия – это воздействие

☒ словесное

☐ физическое

☐ тепловое

☐ электрическое

266. Выберите правильный вариант ответа

Купирование возбуждения при психотических расстройствах на догоспитальном этапе осуществляется

☐ транквилизаторы

☒ нейролептики

☐ ноотропы

☐ психостимуляторы

267. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся больному

☐ по назначению любого медицинского работника

☐ по назначению заведующего отделением

☐ комиссионно

☒ строго по назначению врача

268. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся пациенту

☒ в присутствии врача

☐ в присутствии родственников больного

☐ в присутствии средних медицинских работников

☐ самостоятельно самим пациентом

269. Выберите правильный вариант ответа

Рациональная психотерапия называется

☐ оптимальный вариант психофармакотерапии

☐ лечение гипнозом во сне

☐ лечение музыкой

☒ лечение разъяснением

270. Выберите правильный вариант ответа

Аутогенная тренировка – это

☐ система дозированных физических нагрузок

☒ обучение приемам самовнушения с лечебными целями

☐ программа психокоррекции речевых расстройств

☐ лечение у ЛОР – врача

271. Выберите правильный вариант ответа

Гипнотерапия – это

☐ лечение на ипподроме

☐ применение массивных терапевтических доз

☐ использование пониженной температуры

☒ внушение во сне

272. Выберите правильный вариант ответа

При серийных эпилептических приступах пациенту необходимо ввести

☐ аминазин

☐ амитриптилин

☐ стелазин

☒ реланиум

273. Выберите правильный вариант ответа

Неотложные доврачебные мероприятия при отравлении циклодолом

- ☐ искусственная вентиляция лёгких
- ☐ дезинтоксикация
- ☐ внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия
- ☒ промывание желудка

274. Выберите правильный вариант ответа

Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в психиатрическом стационаре

- ☐ фиксировать с помощью медперсонала
- ☐ фиксировать на время не более 6 часов
- ☒ получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
- ☐ сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение смены

275. Выберите правильный вариант ответа

Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является

- ☐ формирование трезвеннической установки на период лечения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни
- ☐ исключение приёма алкоголя при лечении
- ☐ формирование культуры приёма алкогольных напитков

276. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо при ортостатическом коллапсе пациенту, получающему нейролептики,

- ☐ ввести по назначению врача сердечные средства, кислород под кожу
- ☒ поднять нижние конечности, провести ингаляцию кислорода, инфузионную терапию
- ☐ по назначению врача отменить нейролептики, дать обезболивающее
- ☐ сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на область спины

277. Выберите правильный вариант ответа

Особенности наблюдения за больным с депрессивным синдромом с идеями самообвинения, самоуничтожения заключаются в

- ☐ изоляции больного от окружающих
- ☒ предотвращении суицидальных попыток
- ☐ соблюдении строгого постельного режима
- ☐ соблюдении диеты

278. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное условие при промывании желудка больному в коме

- ☐ сохранённый кашлевой рефлекс
- ☐ приподнятый головной конец
- ☒ изоляция дыхательных путей посредством эндотрахеальной интубации
- ☐ высокое артериальное давление

279. Выберите правильный вариант ответа

При передозировке наркотических средств, введённых внутривенным путём, наиболее частым осложнением является

- ☐ снижение артериального давления
- ☐ повышенная чувствительность к адреналину
- ☐ расширение зрачка с вывихом хрусталика

- ☒ остановка дыхания

280. Выберите правильный вариант ответа

Транспортировка пациента, в состоянии комы, при отсутствии возможности проведения искусственной вентиляции путём эндотрахеальной интубации, проводится в положении

- ☐ вниз головой
- ☒ на левом боку с приподнятым головным концом
- ☐ на правом боку
- ☐ на спине, с введённым в рот воздуховодом

281. Выберите правильный вариант ответа

При промывании желудка пациенту с алкогольной интоксикацией используем

- ☐ слабый щелочной раствор
- ☐ слабый раствор уксусной кислоты
- ☒ чистую воду
- ☐ раствор марганцевого калия

282. Выберите правильный вариант ответа

Укажите лекарственное средство, применяемое в случаях угнетения дыхания при передозировке опиатов

- ☐ кетамин
- ☒ налоксон
- ☐ бриетал
- ☐ прозерин

283. Выберите правильный вариант ответа

К методам детоксикации при отравлении алкоголем не относится

- ☐ промывание желудка
- ☐ переливание изотонических растворов внутривенно
- ☐ стимуляция диуреза
- ☒ переливание свежесмороженной плазмы

284. Выберите правильный вариант ответа

Пациентов с опасными тенденциями в психиатрической больнице помещают в палату

- ☒ наблюдательную
- ☐ реанимационную
- ☐ палату интенсивной терапии
- ☐ общую

285. Выберите два правильных варианта ответа

Биологическими методами лечения называют

- ☒ электросудорожная терапия
- ☒ инсулиношоковая терапия
- ☐ медикаментозная терапия
- ☐ психотерапия
- ☐ фотодинамическая терапия

286. Выберите два правильных варианта ответа

Инсулиношоковая терапия возможна

- ☐ во время менструации
- ☒ при наличии галлюцинаций
- ☒ бредовым пациентам с опасными тенденциями
- ☐ сердечно-сосудистой недостаточности
- ☐ при неврозах

287. Выберите два правильных варианта ответа

Электросудорожная терапия возможна

- ☒ при шизофрении
- ☒ при психозах различной этиологии

- ☐ при дыхательной недостаточности
- ☐ при мигрени
- ☐ при паркинсонизме

288. Выберите два правильных варианта ответа
Приготовить во время купирования гипогликемии для предотвращения коллапса следующие препараты

- ☒ 0,1% раствор адреналина
- ☒ 40% раствор глюкозы
- ☐ раствор галоперидола
- ☐ раствор дроперидона гидрохлорида
- ☐ раствор анальгина

289. Выберите два правильных варианта ответа
Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является

- ☒ антиобщественное поведение психически больного
- ☒ поведение опасное для самого больного
- ☐ невроты
- ☐ врожденное слабоумие
- ☐ маниакальное состояние без склонности к агрессии

290. Выберите два правильных варианта ответа
Терапия пограничных состояний включает методы

- ☒ психотерапию
- ☐ нейролептики
- ☒ седативные средства
- ☐ гормоны
- ☐ сердечные гликозиды

291. Выберите два правильных варианта ответа
Лекарственные препараты для лечения маниакального эпизода биполярного аффективного психоза

- ☒ аминазин
- ☐ прзерин
- ☒ галоперидол
- ☐ анальгин
- ☐ инсулин

292. Выберите два правильных варианта ответа
Лечение алкоголизма включает

- ☒ психотерапию
- ☒ фармакотерапию
- ☐ физиотерапию
- ☐ гирудотерапию
- ☐ химиотерапию

293. Выберите два правильных варианта ответа
Лечение шизофрении включает

- ☐ гипноз
- ☒ биологические методы
- ☒ реабилитацию
- ☐ физиотерапию
- ☐ лучевую терапию

294. Выберите два правильных варианта ответа
Препараты, относящиеся к группе антипсихотиков

- ☒ аминазин
- ☒ трифтазин
- ☐ фенозепам
- ☐ цитрамон
- ☐ амоксилав

295. Выберите два правильных варианта ответа
Препараты, относящиеся к группе антидепрессантов

- ☐ курантил
- ☐ сибазон
- ☒ амитриптилин
- ☒ мелипрамин
- ☐ окситоцин

296. Выберите два правильных варианта ответа
Препараты, относящиеся к группе ноотропов

- ☒ глицин
- ☐ реланиум
- ☒ пантогам
- ☐ винпоцетин
- ☐ аминазин

297. Выберите два правильных варианта ответа
Препараты, относящиеся к группе транквилизаторов

- ☒ фенозепам
- ☒ диазепам
- ☐ ригевидон
- ☐ преднизолон
- ☐ клайра

298. Выберите два правильных варианта ответа
Проявления нейролептического синдрома

- ☒ лекарственный паркинсонизм
- ☒ акатизия
- ☐ эйфория
- ☐ обстоятельное мышление
- ☐ психическая анестезия

299. Выберите правильный вариант ответа
Электроэнцефалографию используют для диагностики

- ☐ олигофрении
- ☒ эпилепсии
- ☐ шизофрении
- ☐ неврастении

300. Выберите правильный вариант ответа
Какой метод исследования может дать наибольшую информацию о наличии галлюцинаций у больного

- ☐ электроэнцефалография
- ☐ рентгенограмма черепа
- ☐ эхоэнцефалография
- ☒ наблюдение за поведением пациента

3. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации

301. Выберите правильный вариант ответа
Средства, не обладающие наркотическим действием

- ☐ гашиш
- ☐ героин
- ☐ морфин

- ☒ атропин

302. Выберите правильный вариант ответа

Наркотик - это

- ☐ вещество, вызывающее абстиненцию при однократном приеме
☒ препарат, включенный в список постоянного комитета по контролю наркотиков

☐ вещество, вызывающее абстиненцию при не однократном приеме

☐ обезболивающий препарат

303. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

☐ больной человек, принимающий наркотические средства

☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков

☐ человек, принимающий наркотические средства

☐ народный комиссар

304. Выберите правильный вариант ответа

Ломка - это признак

☒ наркомании

☐ психоза

☐ психиатрии

☐ наркоза

305. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния субъекта необходимо

☒ госпитализировать в ближайшую медицинскую организацию

☐ направить на обследование к психиатру

☐ направить на обследование к наркологу

☐ направить на собеседование к родителям

306. Выберите правильный вариант ответа

Болезнь, вызванная употреблением препаратов, не относящихся к наркотикам называется

☒ токсикоманией

☐ вредной привычкой

☐ наркотической зависимостью

☐ киноманией

307. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное пристрастие к употреблению наркотиков называется

☒ наркоманией

☐ токсикоманией

☐ дромоманией

☐ привычкой

308. Выберите правильный вариант ответа

Злоупотребление средствами, не отнесенными в список наркотических препаратов, называется

☐ наркомания

☒ токсикомания

☐ дромоманией

☐ привычкой

309. Выберите правильный вариант ответа

Кокаинизм - это

☒ кокаиновая наркомания

☐ применение кокаина в лечебных целях

☐ применение кокаина в диагностических целях

☐ добавления кокаина в напитки

310. Выберите правильный вариант ответа

Журнал «Учета наркотических средств» хранится

☒ в сейфе

☐ в шкафу

☐ на посту медицинской сестры

☐ в ординаторской в шкафу

311. Выберите правильный вариант ответа

Чаще ВИЧ-инфекция в РФ возникает

☒ у наркоманов употребляющих наркотик внутривенно

☐ у наркоманов употребляющих наркотик внутрь

☐ не зависит от способа введения

☐ при употреблении наркотика через слизистые

312. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманию вызывают злоупотребления всеми перечисленными веществами, за исключением

☐ препаратами опия

☐ кокаином

☐ галлюциногены (ЛСД)

☒ алкоголем

313. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания - это

☒ одновременное злоупотребление несколькими наркотиками

☐ повышение дозы наркотического вещества

☐ алкоголизм

☐ алкоголь и наркотик

314. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм - это

☒ наркомания препаратами конопли

☐ табакокурение

☐ психическое заболевание, возникающее у наркомана

☐ выращивание конопли

315. Выберите правильный вариант ответа

Наркомания и токсикомания в РФ

☐ снижается

☒ растет

☐ остается стабильной

☐ относительно стабильна

316. Выберите правильный вариант ответа

При парентеральном приеме наркотиков у наркоманов передаются заболевания

☒ ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В

☐ вирусный гепатит А

☐ краснуха

☐ брюшной тиф

317. Выберите правильный вариант ответа

Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

☐ мозжечковая атаксия

☐ мышечная атония, амимия

☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота

☒ гипермимии

318. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях
- ☐ в традиционных эпизодах употребления алкоголя

319. Выберите правильный вариант ответа

Среди женщин, больных алкоголизмом преобладают лица, занятые

- ☒ в торговле, сфере услуг
- ☐ в промышленности
- ☐ в здравоохранении
- ☐ в образовании

320. Выберите правильный вариант ответа

Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для больных

- ☐ онкологических
- ☒ наркоманией
- ☐ алкоголизмом
- ☐ шизофренией

321. Выберите правильный вариант ответа

К числу особенностей современного алкоголизма относится

- ☐ стабилизация распространённости алкогольных психозов
- ☐ увеличение числа типичных алкогольных психозов
- ☒ увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
- ☐ соматические осложнения

322. Выберите правильный вариант ответа

Основные расстройства восприятия

- ☐ амнезия, абулия, афазия
- ☒ иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
- ☐ резонерство, навязчивость
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

323. Выберите правильный вариант ответа

Нарушения памяти

- ☒ амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции
- ☐ ментизм, шперрунг, обстоятельность
- ☐ резонерство, разорванность мышления
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

324. Выберите правильный вариант ответа

К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся

- ☐ бессонница, раздражительность, депрессия
- ☒ корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике
- ☐ алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
- ☐ деменция, амнезия, афазия

325. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками астенического синдрома является

- ☐ абулия, афазия, амнезия

- ☐ бессонница, бродяжничество, беспокойство
- ☒ утомляемость, раздражительность, бессонница
- ☐ анорексия, негативизм, сонливость

326. Выберите правильный вариант ответа

Делирий относится к расстройствам

- ☒ сознания
- ☐ памяти
- ☐ воли
- ☐ мышления

327. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☐ контрастирующие
- ☒ императивные
- ☐ аказмы

328. Выберите правильный вариант ответа

Корсаковский синдром относится к расстройствам

- ☒ памяти
- ☐ сознания
- ☐ мышления
- ☐ эмоций

329. Выберите правильный вариант ответа

Эпилептический статус

- ☐ оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией
- ☒ серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- ☐ речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией
- ☐ невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией

330. Выберите правильный вариант ответа

Под невменяемостью понимают

- ☐ неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы
- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ высокую степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

331. Выберите правильный вариант ответа

Проявление острого алкогольного психоза

- ☐ речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия
- ☐ лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства
- ☒ делирий, галлюциноз, паранойя
- ☐ длительный сон

332. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольная абстиненция – это

- ☐ присутствие алкоголя в крови
- ☒ психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
- ☐ алкогольное поражение печени
- ☐ алкогольная эпилепсия

333. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии – это

- ☒ искаженное восприятие реально существующего предмета
- ☐ действия иллюзиониста
- ☐ голоса, носящие «приказной» императивный характер
- ☐ выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности

334. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам интеллекта относятся

- ☒ деменция, умственная отсталость
- ☐ нарушение сна, астения
- ☐ амнезия, конфабуляции
- ☐ эйфория, аффективные расстройства

335. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация
- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет
- ☐ прикусывание языка

336. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти
- ☒ средства, применяемые при психических расстройствах
- ☐ препараты, вызывающие галлюцинации
- ☐ наркотики

337. Выберите правильный вариант ответа

При астеническом синдроме отмечается

- ☐ абулия, афазия, амнезия
- ☒ утомляемость, раздражительность, бессонница
- ☐ анорексия, негативизм
- ☐ психический автоматизм, псевдогаллюцинации

338. Выберите правильный вариант ответа

Коматозное состояние – это

- ☒ полное выключение сознания
- ☐ частые приступы с потерей сознания
- ☐ снижение памяти
- ☐ оглушение, вялость, сонливость

339. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивые состояния называются

- ☐ онейроид
- ☐ конфабуляции
- ☒ obsessions
- ☐ псевдореминисценции

340. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю характерно для

- ☐ второй стадии алкоголизма
- ☒ первой стадии алкоголизма
- ☐ третьей стадии алкоголизма
- ☐ бытового пьянства

341. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к наркотику ярко выражено

- ☒ на первой стадии наркомании
- ☐ на второй стадии наркомании
- ☐ на третьей стадии наркомании
- ☐ при абстинентном синдроме

342. Выберите правильный вариант ответа

Снижение толерантности к наркотику отмечается

- ☐ на первой стадии наркомании
- ☐ на второй стадии наркомании
- ☒ на третьей стадии наркомании
- ☐ при абстинентном синдроме

343. Выберите правильный вариант ответа

Помрачение сознания отмечается при

- ☒ алкогольном делирии
- ☐ алкогольном галлюцинозе
- ☐ алкогольном бреде ревности
- ☐ болезни Корсакова

344. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое опьянение развивается

- ☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя
- ☐ при запоях
- ☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
- ☒ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя

345. Выберите правильный вариант ответа

К каннабиноидам относится

- ☐ морфин
- ☒ гашиш
- ☐ амфетамин
- ☐ ЛСД

346. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий развивается

- ☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя при запоях
- ☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
- ☐ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- ☒ у трезвого пациента в период прерывания запоя

347. Выберите правильный вариант ответа

К психостимуляторам относится наркотик

- ☐ морфин
- ☐ гашиш
- ☒ амфетамин
- ☐ ЛСД

348. Выберите правильный вариант ответа

К галлюциногенам относится наркотик

- ☐ морфин
- ☐ гашиш
- ☐ амфетамин
- ☒ ЛСД

349. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует, относятся

- ☒ галлюцинации

- ☐ иллюзии
- ☐ сенестопатии
- ☐ синестезии

350. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном, ошибочном виде, относятся

- ☐ галлюцинации
- ☒ иллюзии
- ☐ сенестопатии
- ☐ синестезии

351. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная медленная речь присуща пациентам с

- ☐ кататонией
- ☐ бредом преследования
- ☐ бредом громадности
- ☒ депрессией

352. Выберите правильный вариант ответа

Основное правило ухода за депрессивным больным

- ☐ режим нестеснения
- ☐ постельный режим
- ☒ усиленное наблюдение
- ☐ проведение медико-педагогических мероприятий

353. Выберите правильный вариант ответа

В процессе развития патологического влечения к алкоголю не происходит

- ☐ изменений суждений больного
- ☐ поведенческих нарушений
- ☐ формирования позитивного мировоззрения
- ☒ сохранения критики к своему состоянию и окружающему

354. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм является

- ☒ наркоманией препаратами конопли
- ☐ табакокурением
- ☐ психическим заболеванием, возникающее у наркомана
- ☐ выращиванием конопли

355. Выберите правильный вариант ответа

Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

- ☐ мозжечковая атаксия
- ☐ мышечная атония, амимия
- ☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
- ☒ гипермимии

356. Выберите правильный вариант ответа

Сужение зрачков характерно для

- ☒ опийной интоксикации
- ☐ гашишной интоксикации
- ☐ эфедриновой интоксикации
- ☐ опийного абстинентного синдрома

357. Выберите правильный вариант ответа

Эфедрон чаще всего употребляется

- ☒ внутривенно
- ☐ внутримышечно

- ☐ перорально
- ☐ путем курения

358. Выберите правильный вариант ответа

Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является

- ☐ заявление испытуемого об употреблении наркотика
- ☒ обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- ☐ обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
- ☐ выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь

359. Выберите правильный вариант ответа

К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся

- ☐ повышенное настроение
- ☒ страх, тревога, бред преследования
- ☐ галлюцинации
- ☐ судорожные припадки

360. Выберите правильный вариант ответа

Проявление сумеречного состояния сознания

- ☒ транс
- ☐ дурашливость
- ☐ ступор
- ☐ мания

361. Выберите правильный вариант ответа

Показаниями для назначения ноотропов у больных алкоголизмом является

- ☐ атипичная форма опьянения
- ☒ нарушение памяти и интеллекта
- ☐ наличие депрессивных расстройств
- ☐ выраженные соматические осложнения

362. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
- ☒ провести не менее 2-х проб на алкоголь
- ☐ ориентироваться на утверждение очевидцев

363. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме

- ☐ 1 год
- ☒ 3 года
- ☐ 5 лет
- ☐ пожизненно

364. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома

- ☐ отвращение к алкоголю
- ☐ сонливость
- ☒ влечение к опохмелению, тремор
- ☐ тремор, отвращение к алкоголю

365. Выберите правильный вариант ответа

При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести

- ☐ мажепгил
- ☒ аминазин
- ☐ сомбревин
- ☐ модиген – депо

366. Выберите правильный вариант ответа

Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается через

- ☐ сутки после последнего приема наркотика
- ☒ 8-12 часов после последнего приема наркотика
- ☐ 48-72 часа после последнего приема наркотика
- ☐ 5 суток после последнего приема наркотика

367. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко
- ☐ носят тотальный характер
- ☒ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

368. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко
- ☒ носят тотальный характер
- ☐ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

369. Выберите правильный вариант ответа

Биотрансформация алкоголя происходит в

- ☒ печени
- ☐ почках
- ☐ центральной нервной системе
- ☐ желудке

370. Выберите правильный вариант ответа

Путем биотрансформации из организма удаляется

- ☐ 50% введенного алкоголя
- ☐ 75% введенного алкоголя
- ☒ 80-95% введенного алкоголя
- ☐ 100% введенного алкоголя

371. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома ? степени тяжести

- ☒ до суток
- ☐ 2-5 суток
- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

372. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести

- ☐ до суток
- ☒ 2-5 суток
- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

373. Выберите правильный вариант ответа

Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период

- ☒ до 18 лет

- ☐ до 25 лет

- ☐ до 30 лет

- ☐ внутриутробного развития плода

374. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю проявляется

- ☒ необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
- ☐ достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя
- ☐ более редким желанием употреблять алкоголь
- ☐ более частым желанием употреблять алкоголь

375. Выберите правильный вариант ответа

О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно свидетельствует следующий показатель

- ☐ рождаемость
- ☐ смертность
- ☒ количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- ☐ количество состоящих на учете больных алкоголизмом

376. Выберите правильный вариант ответа

Воздействие опиатов на желудочно-кишечный тракт не

- ☐ угнетение перистальтики
- ☐ кишечные колики
- ☐ запоры
- ☒ частого стула

377. Выберите правильный вариант ответа

Для опьянения, вызванного употреблением опиатов, характерны

- ☒ сужение зрачка
- ☐ расширение зрачка
- ☐ быстрая речь
- ☐ повышение аппетита

378. Выберите правильный вариант ответа

Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя

- ☒ проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
- ☐ назначение антибиотиков
- ☐ проведение «кодирования»
- ☐ проведение сеансов гипноза

379. Выберите правильный вариант ответа

Невменяемость – это

- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ неспособность говорить и отвечать на вопросы
- ☐ высокая степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

380. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение чувствительности по «типу носков» наблюдается у пациентов с

- ☒ алкогольным полиневритом
- ☐ белой горячкой
- ☐ алкогольным бредом ревности

- ☐ кататоническим ступором

381. Выберите правильный вариант ответа

При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания

- ☐ онейроид
☒ делирий
☐ амнезия
☐ кома

382. Выберите правильный вариант ответа

Для делирия характерны

- ☒ истинные зрительные галлюцинации
☐ зрительные псевдогаллюцинации
☐ конфабуляции
☐ псевдореминисценции

383. Выберите правильный вариант ответа

Психопатия – это

- ☒ стойкая патология характера
☐ хроническое прогрессирующее заболевание
☐ временное психическое заболевание
☐ помрачение сознания

384. Выберите правильный вариант ответа

К основным видам алкогольных психозов относится

- ☐ псевдогаллюциноз
☐ маниакальный психоз
☒ делирий
☐ онейроид

385. Выберите правильный вариант ответа

Истинные зрительные галлюцинации характерны для

- ☐ шизофрении
☒ интоксикационного делирия
☐ инволюционной меланхолии
☐ кататонии

386. Выберите правильный вариант ответа

При эпилептическом припадке

- ☐ сознание сохранено
☒ отмечается прикусывание языка
☐ реакция зрачков на свет сохранена
☐ пациент не наносит себе травм

387. Выберите правильный вариант ответа

Узелки по ходу вен свидетельствуют

- ☒ о наркотической зависимости
☐ о болезненном состоянии
☐ о варикозном расширении вен
☐ об аллергическом заболевании

388. Выберите правильный вариант ответа

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена одним из перечисленных факторов

- ☐ крепостью и качеством алкоголя
☒ активностью фермента алкогольдегидрогеназы
☐ культурно-этическими
☐ поло-возрастными

389. Выберите правильный вариант ответа

К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относится

- ☐ наследственность

- ☒ предменструальное напряжение
☐ ранняя психическая травматизация
☐ соматические заболевания

390. Выберите правильный вариант ответа

Морфинизм – это

- ☐ хроническое отравление морфием
☐ привыкание нервной ткани к яду
☒ вид наркомании
☐ результат лечения бессонницы

391. Выберите правильный вариант ответа

Антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями

- ☐ унитиол
☐ метиленовый синий
☒ атропин
☐ концентрированная глюкоза

392. Выберите правильный вариант ответа

Антидотом при отравлении метиловым спиртом является

- ☐ метиленовый синий
☒ этиловый спирт
☐ концентрированная глюкоза
☐ унитиол

393. Выберите правильный вариант ответа

Первая доврачебная помощь при пероральных отравлениях наркотиками и алкоголем включает

- ☐ приём слабительного
☐ обёртывание мокрыми простынями
☐ массаж спины
☒ промывание желудка

394. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
☐ отсутствие реакции зрачков на свет
☐ прикусывание языка
☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация

395. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти
☒ средства, применяемые при психических расстройствах
☐ препараты, вызывающие галлюцинации
☐ наркотики

396. Выберите правильный вариант ответа

При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести

- ☐ аминазин
☐ амитриптилин
☐ стелазин
☒ карбомазепим

397. Выберите правильный вариант ответа

Социотерапия – это

- ☐ работа в группе социопатов
☐ решение социальных вопросов
☒ лечение факторами окружающей среды
☐ посещение пациента социальным работником

398. Выберите правильный вариант ответа

В основе сформировавшегося патологического влечения к алкоголю преобладают

- ☐ социальные факторы
- ☐ психологические факторы
- ☒ биологические факторы
- ☐ уровень культуры

399. Выберите правильный вариант ответа

Структура патологического влечения к алкоголю не включает в себя компонент

- ☐ эмоционально-аффективный
- ☐ сомато-вегетативный
- ☐ поведенческий
- ☒ неврологический

400. Выберите правильный вариант ответа

В процессе развития патологического влечения к алкоголю не происходит

- ☐ изменений суждений больного
- ☐ поведенческих нарушений
- ☐ формирования позитивного мировоззрения
- ☒ сохранения критики к своему состоянию и окружающей среде

401. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм является

- ☒ наркоманией препаратами конопли
- ☐ табакокурением
- ☐ психическое заболевание, возникающее у наркомана
- ☐ выращиванием конопли

402. Выберите правильный вариант ответа

Тяжёлая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

- ☐ мозжечковая атаксия
- ☐ мышечная атония, амимия
- ☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
- ☒ гипермимия

403. Выберите правильный вариант ответа

Сужение зрачков характерно для

- ☒ опийной интоксикации
- ☐ гашишной интоксикации
- ☐ эфедриновой интоксикации
- ☐ опийного абстинентного синдрома

404. Выберите правильный вариант ответа

Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является

- ☐ заявление испытуемого об употреблении наркотика
- ☒ обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- ☐ обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
- ☐ выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь

405. Выберите правильный вариант ответа

К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся

- ☐ повышенное настроение
- ☒ страх, тревога, бред преследования
- ☐ галлюцинации
- ☐ судорожные припадки

406. Выберите правильный вариант ответа

Проявление сумеречного состояния сознания

- ☒ транс
- ☐ дурашливость
- ☐ ступор
- ☐ мания

407. Выберите правильный вариант ответа

Показаниями для назначения ноотропов у больных алкоголизмом является

- ☐ атипичная форма опьянения
- ☒ нарушение памяти и интеллекта
- ☐ наличие депрессивных расстройств
- ☐ выраженные соматические осложнения

408. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
- ☒ провести не менее 2-х проб на алкоголь
- ☐ ориентироваться на утверждение очевидцев

409. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме

- ☐ 1 год
- ☒ 3 года
- ☐ 5 лет
- ☐ пожизненно

410. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома

- ☐ отвращение к алкоголю
- ☐ сонливость
- ☒ влечение к опохмелению, тремор
- ☐ тремор, отвращение к алкоголю

411. Выберите правильный вариант ответа

При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести

- ☐ мажептил
- ☒ аминазин
- ☐ сомбревин
- ☐ модитен – депо

412. Выберите правильный вариант ответа

Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается через

- ☐ сутки после последнего приема наркотика
- ☒ 8-12 часов после последнего приема наркотика
- ☐ 48-72 часа после последнего приема наркотика
- ☐ 5 суток после последнего приема наркотика

413. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко

- ☐ носят тотальный характер
- ☒ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

414. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко
- ☒ носят тотальный характер
- ☐ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

415. Выберите правильный вариант ответа

Биотрансформация алкоголя происходит в

- ☒ печени
- ☐ почках
- ☐ центральной нервной системе
- ☐ желудке

416. Выберите правильный вариант ответа

Путем биотрансформации из организма удаляется

- ☐ 50% введенного алкоголя
- ☐ 75% введенного алкоголя
- ☒ 80-95% введенного алкоголя
- ☐ 100% введенного алкоголя

417. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома I степени тяжести

- ☒ до суток
- ☐ 2-5 суток
- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

418. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести

- ☐ до суток
- ☒ 2-5 суток
- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

419. Выберите правильный вариант ответа

Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период

- ☒ до 18 лет
- ☐ до 25 лет
- ☐ до 30 лет
- ☐ внутриутробного развития плода

420. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю проявляется

- ☒ необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
- ☐ достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя

- ☐ более редким желанием употреблять алкоголь
- ☐ более частым желанием употреблять алкоголь

421. Выберите правильный вариант ответа

О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно свидетельствует следующий показатель

- ☐ рождаемость
- ☐ смертность
- ☒ количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- ☐ количество состоящих на учёте больных алкоголизмом

422. Выберите правильный вариант ответа

Воздействие опиатов на желудочно-кишечный тракт не

- ☐ угнетение перистальтики
- ☐ кишечные колики
- ☐ запоры
- ☒ частого стула

423. Выберите правильный вариант ответа

Для опьянения, вызванного употреблением опиатов, характерны

- ☒ сужение зрачка
- ☐ расширение зрачка
- ☐ быстрая речь
- ☐ повышение аппетита

424. Выберите правильный вариант ответа

Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя

- ☒ проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
- ☐ назначение антибиотиков
- ☐ проведение «кодирования»
- ☐ проведение сеансов гипноза

425. Выберите правильный вариант ответа

Невменяемость – это

- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ неспособность говорить и отвечать на вопросы
- ☐ высокая степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

Специальность «Наркология»

Первая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите правильный вариант ответа

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56 С° в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение

- ☐ нагревание при 56 °C в течение 1 минуты
- ☐ воздействие радиации

2. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- ☐ аденовирусов
- ☒ ретровирусов
- ☐ энтеровирусов
- ☐ пикорнавирусов

3. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

4. Выберите правильный вариант ответа

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

5. Выберите два правильных варианта ответа

ВИЧ не передается

- ☒ через рукопожатия
- ☒ через укусы насекомых
- ☐ при половых контактах
- ☐ во время беременности
- ☐ через повреждённые слизистые

6. Выберите два правильных варианта ответа

Клинические признаки развитого шока

- ☐ повышение артериального давления, тахикардия, одышка
- ☒ понижение артериального давления, тахикардия, одышка
- ☒ бледность кожных покровов, снижение диуреза
- ☐ цианоз кожных покровов, полиурия
- ☐ отсутствие сознания, нормальное артериальное давление, сухая кожа

7. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее частая причина развития терминального состояния при электротравме

- ☐ тиганический спазм дыхательной мускулатуры
- ☒ фибрилляция желудочков сердца
- ☐ угнетение ствола головного мозга
- ☐ коллапс

8. Выберите правильный вариант ответа

При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в области сердца, слева от грудины
- ☒ середина грудины

9. Выберите два правильных варианта ответа

Клинические признаки коллапса

- ☐ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание

- ☒ слабый, частый пульс
- ☐ редкий, слабый пульс
- ☐ резкое снижение артериального давления

10. Выберите правильный вариант ответа

Некроз всех слоев кожи характерен для ожога

- ☐ IV степени
- ☒ III Б степени
- ☐ III А степени
- ☐ II степени

11. Выберите два правильных варианта ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска
- ☐ вакцинированные и инфицированные

12. Выберите два правильных варианта ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

13. Выберите два правильных варианта ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное
- ☐ контактный

14. Выберите правильный вариант ответа

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

15. Выберите правильный вариант ответа

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

16. Выберите правильный вариант ответа

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

17. Выберите правильный вариант ответа

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- ☐ близкий родственник
- ☐ дежурный (лечащий) врач или родственник
- ☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач
- ☐ законный представитель

18. Выберите 2 правильных варианта ответов

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное
- ☐ групповое

19. Выберите правильный вариант ответа

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается

- ☐ гражданину
- ☐ гражданину и членам его семьи
- ☒ гражданину и членам его семьи с его согласия
- ☐ работодателю

20. Выберите правильный вариант ответа

Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это

- ☒ эвтаназия
- ☐ танатология
- ☐ деонтология
- ☐ ятрогения

21. Выберите правильный вариант ответа

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- ☐ паспорт
- ☒ страховой медицинский полис
- ☐ медицинская карта амбулаторного пациента
- ☐ история болезни

22. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

23. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

24. Выберите правильный вариант ответа

Цель гигиенической деkontаминации рук медицинского персонала

- ☒ обеспечение кратковременной стерильности
- ☐ создание кратковременной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

25. Выберите правильный вариант ответа

УФО – метод

- ☐ стерилизации

- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ дератизации

26. Выберите правильный вариант ответа

Кипячение – метод

- ☐ стерилизации
- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ кипячение

27. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

28. Выберите правильный вариант ответа

После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию

- ☐ текущую
- ☐ профилактическую
- ☐ предварительную
- ☒ заключительную

29. Соответствие признаков смерти

клиническая	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая	кошачий глаз
	пульс аритмичный
	дыхание стридорозное

30. Соответствие оптимального числа компрессий и вдуваний при проведении СЛР

компрессий на грудину	30
вдуваний	2
	5
	1

31. Соответствие признаков ком при диабете

гипогликемическая	диплопия, головокружение
гипергликемическая	полиурия, жажда, сухость кожи
	повышение температуры
	розовая, пенная мокрота

32. Соответствие причин развития ком при диабете

гипогликемическая	передозировка инсулина
гипергликемическая	ошибочно снижена доза инсулина
	курение
	прием алкоголя

33. Соответствие факторов риска для развития шоков

травматический	кровопотеря, охлаждение
гемолитический	переливание несовместимой крови
	аллергия
	сепсис

34. Соответствие признаков фаз травматического шока

эректильная	гиперемия лица, пульс учащен, напряженный
торпидная	кожа бледная, АД снижается
	брадикардия, повышение АД
	пульс и АД в пределах нормы

35. Соответствие глазных симптомов терминальному состоянию

клиническая смерть	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая смерть	«кошачий глаз»
	узкий зрачок
	анизокория

36. Выберите правильный вариант ответа

Сформированный абстинентный синдром является признаком

- ☐ злоупотребление алкоголем с вредными последствиями
- ☐ I стадии алкоголизма
- ☒ II стадии алкоголизма
- ☐ бытового пьянства

37. Выберите правильный вариант ответа

Для простого алкогольного опьянения не характерно

- ☐ эйфория
- ☐ заторможенность
- ☒ галлюцинации
- ☐ колебания артериального давления

38. Выберите правильный вариант ответа

Признаком состояния алкогольного опьянения не является:

- ☐ эйфоричность
- ☐ состояние сознания
- ☐ запах алкоголя изо рта
- ☒ сужение зрачков

39. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ отказ от употребления алкоголя
- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в традиционных, социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях

40. Выберите правильный вариант ответа

Острые алкогольные психозы включают

- ☐ эйфория
- ☐ спокойный сон
- ☒ параноид
- ☐ бред ревности

41. Выберите правильный вариант ответа

К физиологическим эффектам опиатов относится

- ☐ гиперестезия
- ☐ гипотимия
- ☒ угнетение дыхания
- ☐ бронхоспазм

42. Выберите правильный вариант ответа

В состоянии интоксикации опиатами не характерно

- ☐ миоз
- ☐ снижение температуры тела
- ☐ нарушение координации
- ☒ психо-моторное возбуждение

43. Выберите правильный вариант ответа

К наркотическим средствам и психотропным веществам относятся

- ☐ трихопол
- ☒ героин
- ☐ ардуан
- ☐ наропин

44. Выберите правильный вариант ответа

Галлюциногенные эффекты каннабиноидов обычно проявляются

- ☐ при малых дозах
- ☐ при средних дозах
- ☒ при высоких дозах
- ☐ при смешивании с опилками

45. Выберите правильный вариант ответа

Внешним признаком интоксикации каннабиноидами являются

- ☐ болезненное мочеиспускание
- ☐ нарушение сердечного ритма
- ☒ сухость во рту
- ☐ офтальмоплегия

46. Выберите правильный вариант ответа

Влияние психостимуляторов наркотического ряда на сердечно-сосудистую систему проявляется

- ☒ тахикардией
- ☐ урежение пульса
- ☐ артериальной гипотензией
- ☐ отсутствие зубца Р

47. Выберите правильный вариант ответа

К абстинентным алкогольным психозам не относятся

- ☐ алкогольный делирий
- ☐ алкогольный галлюциноз
- ☐ алкогольный параноид
- ☒ астматический статус

48. Выберите правильный вариант ответа

Клиника алкогольного абстинентного синдрома проявляется

- ☐ повышение интегральных возможностей ЦНС
- ☒ диспептическими расстройствами в виде отсутствия аппетита, тошноты, нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы
- ☐ улучшение сна
- ☐ ничем из перечисленного

49. Выберите правильный вариант ответа

Социальные последствия у больных III стадии заболевания алкоголизма проявляются во всём, кроме

- ☐ неспособности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- ☐ выраженного профессионального снижения с утратой прежней квалификации
- ☐ иждивенческих тенденций
- ☒ стремления к самосовершенствованию

50. Выберите правильный вариант ответа

Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся

- ☐ отсутствием поражения паренхиматозных органов
- ☐ уменьшением влечения к спиртным напиткам
- ☒ формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- ☐ повышением сексуальной потенции

51. Выберите правильный вариант ответа

Наркомания – это хроническое заболевание

- ☐ вызванное употреблением анаболических препаратов
- ☒ характеризующееся развитием психической, физической зависимости
- ☐ характеризующееся отсутствием развития толерантности к опиатам
- ☐ характеризующееся повышением социального статуса

52. Выберите правильный вариант ответа

В развитии алкоголизма у женщин наиболее значимый фактор

- ☒ преморбидные характерологические особенности личности
- ☐ семейное благополучие
- ☐ высокий заработок
- ☐ регион проживания

53. Выберите правильный вариант ответа

Одинокое пьянство женщин, страдающих алкоголизмом, объясняется

- ☐ многодетностью
- ☒ стремлением скрыть пьянство (по морально-этическим соображениям)
- ☐ эндокринными изменениями
- ☐ жилищными проблемами

54. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на сведения подэкспертного о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта или утверждение очевидцев
- ☒ провести не менее 2 проб на алкоголь
- ☐ неврологические расстройства

55. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты – это

- ☐ препараты, содержащие спирт
- ☒ препараты конопли, опия
- ☐ препараты гидроксипропилового крахмала
- ☐ препараты валерианы

56. Выберите правильный вариант ответа

Средства с ненаркотическим действием

- ☐ гашиш
- ☐ героин
- ☐ морфин
- ☒ атропин

57. Выберите правильный вариант ответа

Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются

- ☐ старшей медсестрой
- ☒ специальной комиссией
- ☐ врачами отделения
- ☐ заведующей аптекой

58. Выберите правильный вариант ответа

Выписывание наркотиков наркоману

- ☒ запрещено
- ☐ возможно врачами наркокабинетов
- ☐ только врачебной комиссией
- ☐ с разрешения родственников

59. Выберите правильный вариант ответа

Абстинентный синдром – это

- ☒ физическая зависимость от наркотиков
- ☐ психическое заболевание
- ☐ недостаток воспитания
- ☐ отказ от лечения

60. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский критерий наркомании – это

- ☒ воздействие на центральную нервную систему
- ☐ использование наркотиков в немедицинских целях

☐ рост заболеваемости

☐ рост нарушений правил дорожного движения

61. Выберите правильный вариант ответа

Социальный критерий наркомании – это

- ☐ использование наркотиков в медицинских целях
- ☒ социальные проблемы, рост преступности
- ☐ улучшение экономики, благосостояния
- ☐ незаконная вырубка леса

62. Выберите правильный вариант ответа

Вторая стадия наркологического заболевания включает

- ☐ полную деградацию
- ☒ ломку, психозы, изменение личности по алкогольному (наркотическому) типу
- ☐ улучшение общего самочувствия
- ☐ потеря памяти

63. Выберите правильный вариант ответа

Конечная стадия наркомании включает

- ☐ диффузный атеросклероз
- ☐ остеопороз
- ☒ кахексии, полную деградацию, абстиненцию
- ☐ язвенную болезнь желудка

64. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании включает

- ☒ психологическую зависимость
- ☐ ломку
- ☐ абстиненцию
- ☐ нарушение социальной адаптации

65. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость от наркотиков проявляется в стадии

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ не развивается никогда

66. Выберите правильный вариант ответа

«Ломка» – это

- ☒ абстинентный синдром
- ☐ острое психотическое расстройство
- ☐ все перечисленное
- ☐ ничего из перечисленного

67. Выберите правильный вариант ответа

Соматические расстройства у наркоманов возникают

- ☐ в начальной стадии
- ☐ в стадии истощения
- ☒ на всем протяжении употребления психоактивных веществ
- ☐ в развернутой стадии

68. Выберите правильный вариант ответа

Токсикомания – это

- ☐ вредная привычка
- ☐ зависимость от наркотических препаратов
- ☐ прием различных ядовитых веществ
- ☒ злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам и являющимися токсическими веществами

69. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении приема наркотиков

- ☒ абстинентный синдром
- ☐ синдром отдачи
- ☐ синдром рикошета
- ☐ синдром Рейно

70. Выберите правильный вариант ответа

Специальные рецептурные бланки на наркотические средства должны храниться

- ☒ в сейфе
- ☐ в шкафу
- ☐ в реанимационной палате
- ☐ в ящике стола

71. Выберите правильный вариант ответа

К соматическим расстройствам при острой интоксикации галлюциногенами относится все перечисленное, кроме

- ☐ ощущения жара
- ☒ понижения температуры
- ☐ слезо- и слюноотечения
- ☐ тахикардии и подъема артериального давления

72. Выберите правильный вариант ответа

Возникновение точно таких же ощущений и реакций, которые были в период острой интоксикации спустя недели, месяцы после последнего приема наркотика, характерны для наркомании

- ☐ амфетаминами
- ☒ галлюциногенами
- ☐ опиатами
- ☐ барбитуратами

73. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость при приеме галлюциногенов развивается

- ☐ в короткие сроки
- ☐ спустя полгода от начала систематического приема

- ☐ спустя год от начала систематического приема
- ☒ не развивается вообще

74. Выберите правильный вариант ответа

Последствиями злоупотребления галлюциногенами являются все перечисленные, исключая

- ☐ агрессивные действия
- ☐ суициды из-за устрашающих галлюцинаций
- ☐ хромосомные нарушения
- ☒ острые депрессивные реакции

75. Выберите правильный вариант ответа

Случаи ятрогенной наркомании препаратами группы опия не встречаются

- ☐ хирургической практики
- ☒ педиатрической практики
- ☐ онкологической практики
- ☐ терапевтической практики

76. Выберите правильный вариант ответа

Опийные ятрогенные наркомании редко развиваются у пациентов, длительно страдающих

- ☐ болевым синдромом, фантомными болями
- ☐ неблагоприятным исходом оперативного вмешательства
- ☐ хроническими костно-суставными болезнями
- ☒ заболеваниями печени

77. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманы, отказывающиеся от лечения, привлекаются к

- ☐ уголовной ответственности
- ☒ принудительному лечению
- ☐ поддерживающей терапии транквилизаторами
- ☐ замене парентеральных препаратов на пероральные

78. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое привыкание к наркотику при лечении по медицинским показателям

- ☐ подлежит уголовной ответственности
- ☒ не наказуемо
- ☐ преследуется в административном порядке
- ☐ переводятся на пожизненный приём наркотиков

79. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник при галлюцинировании пациента должен

- ☐ противоречить больному
- ☐ не предпринимать никаких действий
- ☒ доложить дежурному врачу
- ☐ назначить строгий надзор

80. Выберите правильный вариант ответа

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы маниакально - депрессивного психоза
- ☐ депрессивной фазы маниакально - депрессивного психоза
- ☐ эпилепсии
- ☐ кататонического синдрома

81. Выберите правильный вариант ответа

Афазия- это

- ☒ нарушение речи

- ☐ одна из форм мутизма
- ☐ проявление кататонии
- ☐ нарушение глотания

82. Выберите правильный вариант ответа

Психическая ятрогения- это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного

- ☒ поведения медицинского работника в отношении больного

☐ медикаментозного лечения заболевания

☐ определение диагноза заболевания

☐ ухода за больными

83. Выберите правильный вариант ответа

Психогении- заболевания, возникающие под влиянием

- ☒ психической травмы
- ☐ тяжелых травм головного мозга
- ☐ инфекций головного мозга
- ☐ алкогольной интоксикации

84. Выберите правильный вариант ответа

Решающее значение в развитии невротозов имеет

- ☒ психогенный фактор

☐ нейроинфекция

☐ черепно- мозговая травма

☐ сосудистые заболевания головного мозга

85. Выберите правильный вариант ответа

Снотворные прот ивосудорожные

☐ настой ромашки

☒ люминал

☐ кодеин

☐ кордиамин

86. Выберите правильный вариант ответа

Стимуляторы центральной нервной системы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

☐ дофамин

☒ фенамин

☐ фенатин

☐ аминазин

87. Выберите правильный вариант ответа

Транквилизаторы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

☐ дроперидол

☒ седуксен

☐ люминал

☐ веронал

88. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания – это

- ☒ одновременное употребление нескольких наркотиков, в том числе алкоголя

☐ одновременное употребление легких и крепких алкогольных напитков

☐ аггравация хирургических заболеваний с целью получения наркоза

☐ аноксическое повреждение центральной нервной системы

89. Выберите правильный вариант ответа

Антигистаминные препараты, используемые лицами с наркотической зависимостью для усиления эффекта психоактивных веществ

☐ преднизолон

☒ супрастин

☐ тавегил

☐ хлористый кальций

90. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

☐ больной человек, принимающий наркотические средства

☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков

☐ любитель кока-колы

☐ человек, выращивающий коноплю

91. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании состоит из

☒ психологической зависимости

☐ ломки

☐ абстиненции

☐ асоциальное поведение

92. Выберите правильный вариант ответа

Деграция личности при наркомании развивается

☐ при приеме наркотиков

☐ в развернутой стадии

☒ в стадии истощения

☐ при первом приеме наркотиков

93. Выберите правильный вариант ответа

К летучим наркотически действующим веществам (ЛДНВ) не относится

☐ ацетон

☐ четырёххлористый углерод

☒ глицерин

☐ бутан

94. Выберите правильный вариант ответа

Расстройства восприятия- это

☒ галлюцинации

☐ судороги

☐ бред

☐ гипербулия

95. Выберите правильный вариант ответа

Дромомания- это расстройство

☒ волевой сферы

☐ памяти

☐ эмоциональной сферы

☐ восприятия

96. Выберите правильный вариант ответа

Деменция-это

☒ слабоумие, приобретенное в процессе болезни

☐ врожденное слабоумие

☐ тоскливое настроение

☐ легкая степень слабоумие

97. Выберите правильный вариант ответа

Состояния выключения сознания

☒ кома

☐ делирий

☐ сумеречное помрачение сознания

☐ онейроид

98. Выберите правильный вариант ответа

Аура встречается при

- ☒ эпилепсии
- ☐ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

99. Выберите правильный вариант ответа

Идиотия встречается при

- ☒ олигофрении
- ☐ психопатии
- ☐ шизофрении
- ☐ эпилепсии

100. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий в народе называют

- ☒ белой горячкой
- ☐ алкоголизмом
- ☐ пьянством
- ☐ тунеядством

101. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий характеризуется

- ☒ зрительными галлюцинациями
- ☐ бредовыми идеями
- ☐ навязчивыми идеями
- ☐ фиксационной амнезией

102. Выберите правильный вариант ответа

Метод исследования для получения информации о наличии галлюцинации у больного

- ☐ электроэнцефалография
- ☐ рентгенограмма черепа
- ☐ эхоэнцефалография
- ☒ наблюдение за поведением пациента

103. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия у пациента постоянно слышащего внутри головы голоса

- ☐ иллюзии
- ☐ гиперестезии
- ☐ ускорение мышления
- ☒ псевдогаллюцинации

104. Выберите правильный вариант ответа

При ипохондрическом бреде больной считает, что

- ☒ у него тяжелая болезнь
- ☐ его обворовывают
- ☐ он преступник
- ☐ его хотят отравить

105. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии- это

- ☒ искаженное восприятие существующего объекта
- ☐ восприятие несуществующего объекта
- ☐ нечеткое восприятие реальности
- ☐ увеличенное восприятие реального объекта

106. Выберите правильный вариант ответа

При навязчивых идеях больной

- ☒ критичен к своим высказываниям
- ☐ формально критичен
- ☐ без критики к патологическим мыслям
- ☐ утрачивает критику на высоте эмоционального аффекта

107. Выберите правильный вариант ответа

Деменция является патологией

- ☐ эмоций
- ☐ воли
- ☐ запоминания
- ☒ интеллекта

108. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

109. Выберите правильный вариант ответа

Пациент с депрессией не высказывает мыслей

- ☐ самоуничтожения
- ☒ изобретательности
- ☐ греховности
- ☐ собственной никчемности

110. Выберите правильный вариант ответа

Апатия характеризуется

- ☐ педантичностью
- ☐ беспокойством
- ☒ безразличием
- ☐ тревогой

111. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивный синдром опасен в плане совершения

- ☒ суицида
- ☐ побега
- ☐ нападения на персонал
- ☐ криминальных действий

112. Выберите правильный вариант ответа

Кататонический синдром встречается при

- ☒ шизофрении
- ☐ неврозах
- ☐ эпилепсии
- ☐ умственной отсталости

113. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасным для окружающих является пациент

- ☐ с фиксационной амнезией
- ☒ с кататоническим возбуждением
- ☐ с комментирующими псевдогаллюцинациями
- ☐ с кататоническим ступором

114. Выберите правильный вариант ответа

Патологическая нелепая идея, не поддающаяся разубеждению, называется

- ☒ бредовой
- ☐ навязчивой
- ☐ сверхценной
- ☐ бессмысленной

115. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воспоминаний у больного

- ☐ гипомнезией
- ☐ парамнезией
- ☒ амнезией
- ☐ гипермнезией

116. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивные больные чаще совершают суицид

- ☒ на выходе из депрессии
- ☐ перед выпиской
- ☐ независимо от лечения
- ☐ в любое время суток

117. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий синдром алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
- ☐ астеновегетативный
- ☐ психоорганический
- ☐ расстройство сознания

118. Выберите правильный вариант ответа

Характерный для белой горячки синдром

- ☐ судорожный
- ☒ расстройство сознания
- ☐ слабоумия
- ☐ невротический

119. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространенный способ употребления гашиша

- ☐ жевание
- ☒ курение
- ☐ прием вовнутрь
- ☐ под кожу

120. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее злокачественным алкоголизмом является

- ☒ женский
- ☐ мужской
- ☐ различий нет
- ☐ одинаковый и женский и мужской

121. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для

- ☐ шизофрении
- ☐ сосудистой деменции
- ☒ болезни Альцгеймера
- ☐ депрессии

122. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная, медленная речь присуща больным с

- ☐ кататонией
- ☐ бредом преследования
- ☐ бредом громадности
- ☒ депрессией

123. Выберите правильный вариант ответа

Врач, описавший тотальное слабоумие с распадом речи

- ☐ Г. Вернике
- ☒ А. Альцгеймер
- ☐ А. Пике
- ☐ С. Корсаков

124. Выберите правильный вариант ответа

Стадий алкоголизма

- ☒ три
- ☐ одна
- ☐ четыре
- ☐ две

125. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия при отсутствии объекта это

- ☐ иллюзии
- ☒ галлюцинации
- ☐ амнезия
- ☐ гипотимия

126. Выберите правильный вариант ответа

Врожденное или рано приобретенное снижение интеллекта

- ☒ олигофрения
- ☐ деменция
- ☐ депрессия
- ☐ дромомания

127. Выберите правильный вариант ответа

Количество фаз при судорожном эпилептическом припадке

- ☐ три
- ☐ две
- ☒ четыре
- ☐ пять

128. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение мышления

- ☐ аффект
- ☐ тоска
- ☒ обстоятельность
- ☐ гипермнезия

129. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение воли

- ☒ гипобулия
- ☐ иллюзии
- ☐ гипобулемия
- ☐ эйфория

130. Выберите правильный вариант ответа

Строгий надзор за пациентами

- ☐ соматически ослабленные
- ☒ с агрессивными состояниями
- ☐ с ретроградной амнезией
- ☐ получающие инсулиношоковую терапию

131. Выберите правильный вариант ответа

Усиленное наблюдение за пациентами

- ☒ соматически ослабленные
- ☐ с депрессивным состоянием
- ☐ с агрессивным состоянием
- ☐ с фиксационной амнезией

132. Выберите правильный вариант ответа

Повышенное, очень радостное настроение

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ эйфория
- ☐ амнезия

133. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивый страх воды

- ☒ гидрофобия
- ☐ клаустрофобия
- ☐ спидофобия
- ☐ канцерофобия

134. Выберите правильный вариант ответа

Мышление при эпилепсии

- ☐ замедленное
- ☒ вязкое

- ☐ ускоренное
- ☐ наплыв мыслей

135. Выберите правильный вариант ответа

Пограничное расстройство психики

- ☐ депрессия
- ☐ мания
- ☐ психоз
- ☒ невроз

136. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерно

- ☒ аутизм
- ☐ дисфория
- ☐ отвлекаемость
- ☐ раздражительная слабость

137. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти фантастическими событиями

- ☐ псевдореминисценции
- ☒ конфабуляции
- ☐ иллюзии
- ☐ сонор

138. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти событиями, которые в прошлом происходили с больным

- ☒ псевдореминисценции
- ☐ конфабуляции
- ☐ гипотимия
- ☐ эйфория

139. Выберите правильный вариант ответа

Влечение к бродяжничеству называется

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ дромомания
- ☐ иллюзии

140. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воли называется

- ☒ абulia
- ☐ анорексия
- ☐ анестезия
- ☐ амнезия

141. Выберите правильный вариант ответа

Слабоумие, приобретенное в результате болезни

- ☐ олигофрения
- ☒ деменция
- ☐ гипермнезия
- ☐ сумеречное состояние сознания

142. Выберите правильный вариант ответа

Неспособность получать удовольствие

- ☒ ангедония
- ☐ ановуляция
- ☐ анорексия
- ☐ гипотермия

143. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ кататонический
- ☒ судорожный
- ☐ галлюцинаторно- параноидный

- ☐ депрессивный

144. Выберите правильный вариант ответа

Для неврастения характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ раздражительность
- ☒ конфабуляции
- ☐ поверхностный сон
- ☐ гиперестезия

145. Выберите правильный вариант ответа

Разорванное мышление характерно для

- ☐ эпилепсии
- ☒ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

146. Выберите правильный вариант ответа

Эмоциональная тупость характерна для

- ☐ эпилепсии
- ☐ олигофрении
- ☒ шизофрении
- ☐ депрессии

147. Выберите два правильных ответа

Правильная тактика общения с пациентом с болезнью Альцгеймера делающего ошибки в речи

- ☐ грубо исправлять
- ☒ не обращать внимания на ошибки
- ☒ успокаивать пациента для уменьшения волнения
- ☐ не разговаривать с пациентом
- ☐ вызвать врача

148. Выберите два правильных ответа

Правильных два первых действия медработника в ответ на грубость пациентки с психическими расстройствами

- ☒ сообщить врачу
- ☐ немедленно перевести в надзорную палату
- ☒ попытаться отвлечь внимание больного
- ☐ использовать методы механического стеснения
- ☐ ввести лекарственное средство

149. Выберите два правильных ответа

Инструкции пациенту перед электросудорожной терапией

- ☐ вымыть голову
- ☒ сходить в туалет
- ☐ не принимать лекарства
- ☒ не завтракать
- ☐ не бегать по отделению

150. Выберите два правильных ответа

Основными симптомами шизофрении

- ☒ отгороженность
- ☒ отрыв от реальности
- ☐ маниакальное возбуждение
- ☐ отвлекаемость
- ☐ эйфория

151. Выберите два правильных ответа

Расстройства восприятия- это

- ☒ галлюцинации
- ☐ судороги
- ☐ бред

- ☒ иллюзии
- ☐ гипербулия

152. Выберите два правильных ответа

Ведущий симптом алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
- ☒ запой
- ☐ психоорганический
- ☐ маниакальный
- ☐ гипобулия

153. Выберите два правильных ответа

Клинические признаки эпилепсии

- ☒ припадки, расстройства сознания
- ☒ изменение личности
- ☐ аутизм
- ☐ бред воздействия
- ☐ расстройства памяти

154. Выберите два правильных ответа

Навязчивыми страхами называются следующие состояния

- ☐ истерия
- ☐ депрессия
- ☒ гидрофобия
- ☒ клаустрофобия
- ☐ маниакальное возбуждение

155. Выберите два правильных ответа

Расстройства памяти

- ☒ амнезия
- ☒ парамнезия
- ☐ атрофия
- ☐ афазия
- ☐ ятрогения

156. Выберите два правильных ответа

Императивные галлюцинации - это когда

- ☒ голос приказывает покончить с собой
- ☐ больной слышит пояснения своим поступкам
- ☒ слышит голоса, которые приказывают убить
- ☐ больной отдает приказы окружающим
- ☐ больной просит избавить от мыслей о болезни

157. Выберите два правильных ответа

Навязчивые мысли - это когда больной

- ☒ не может избавиться от мыслей, возникающих помимо его желания
- ☒ понимает ненужность своих мыслей
- ☐ не хочет от них избавиться
- ☐ стремиться к их реализации
- ☐ скрывает от врача их наличие

158. Выберите два правильных ответа

Бредовые идеи - это когда больной

- ☐ хочет избавиться от мыслей
- ☐ ищет помощи
- ☒ высказывает нелепые мысли
- ☒ к мыслям нет критики
- ☐ понимает ненужность своих мыслей

159. Выберите два правильных ответа

Больной с ипохондрическим синдромом невротического уровня

- ☐ не контактен
- ☐ не критичен к своим высказываниям

- ☒ говорит, что у него возникли мысли о болезни
- ☒ просит избавить его от мыслей о болезни
- ☐ к мыслям нет критики

160. Выберите два правильных ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☒ гипотимией
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

161. Выберите два правильных ответа

Пациент с депрессией характеризуется следующими клиническими проявлениями

- ☒ сидит в согбенной позе
- ☒ отвечает тихо, односложно
- ☐ включается в жизнь отделения
- ☐ высоким аппетитом
- ☐ эйфорией

162. Выберите два правильных ответа

Наиболее частые причины агрессии душевнобольных

- ☒ самовольное прекращение приема лекарств
- ☒ изменение психического состояния
- ☐ прием лекарств
- ☐ злоупотребление курением
- ☐ прогулки на улице

163. Выберите два правильных ответа

Правильное поведение родственников при агрессии со стороны душевнобольного

- ☒ убрать опасные предметы
- ☒ вызвать скорую психиатрическую помощь
- ☐ уйти из дома
- ☐ насильно заставить принять лекарство
- ☐ оказывать сопротивление

164. Выберите два правильных ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☒ повелительные
- ☒ императивные
- ☐ все перечисленные
- ☐ ничто не верно

165. Выберите два правильных ответа

Депрессия включает

- ☒ двигательную заторможенность
- ☒ мыслительную заторможенность
- ☐ повышенное настроение
- ☐ иллюзорные расстройства
- ☐ двигательную активность

166. Выберите два правильных ответа

Варианты нарушения восприятия

- ☒ истинные галлюцинации
- ☒ псевдогаллюцинации
- ☐ эйфория
- ☐ парамнезия
- ☐ гипотимия

167. Выберите два правильных ответа

Мания включает

- ☒ двигательную активность
- ☒ ускоренное мышление
- ☐ пониженное настроение
- ☐ замедленное мышление
- ☐ двигательную заторможенность

168. Выберите два правильных ответа

Расстройства сознания

- ☒ сопор
- ☒ кома
- ☐ псевдореминисценции
- ☐ истинные галлюцинации
- ☐ псевдогаллюцинации

169. Выберите два правильных ответа

Признаки передозировки опийных препаратов

- ☒ миоз
- ☒ кома
- ☐ мидриаз
- ☐ эйфория
- ☐ нормальное дыхание

170. Выберите два правильных ответа

Вызывать скорую помощь пациенту с эпилепсией необходимо если

- ☒ припадок длится более 5 минут
- ☒ припадок следует один за другим
- ☐ больной пришел в сознание
- ☐ припадок длится 2 минуты
- ☐ припадок случился дома

171. Выберите правильный вариант ответа

Средства не обладающие наркотическим действием:

- ☐ гашиш
- ☐ героин
- ☐ морфин
- ☒ атропин

172. Выберите правильный вариант ответа

Наркотик - это

- ☐ вещество, вызывающее абстиненцию при однократном приеме
- ☒ препарат, включенный в список постоянного комитета по контролю наркотиков
- ☐ вещество, вызывающее абстиненцию при не однократном приеме
- ☐ обезболивающий препарат

173. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

- ☐ больной человек, принимающий наркотические средства
- ☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков
- ☐ человек, принимающий наркотические средства
- ☐ народный комиссар

174. Выберите правильный вариант ответа

Ломка - это признак

- ☒ наркомании
- ☐ психоза
- ☐ психиатрии
- ☐ наркоза

175. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния субъекта необходимо

- ☒ госпитализировать в ближайшую медицинскую организацию
- ☐ направить на обследование к психиатру
- ☐ направить на обследование к наркологу
- ☐ направить на собеседование к родителям

176. Выберите правильный вариант ответа

Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не относящихся к наркотикам называется

- ☒ токсикоманией
- ☐ вредной привычкой
- ☐ наркотической зависимостью
- ☐ киноманией

177. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное пристрастие к употреблению наркотиков называется

- ☒ наркоманией
- ☐ токсикоманией
- ☐ дромоманией
- ☐ привычкой

178. Выберите правильный вариант ответа

Злоупотребление средствами, не отнесенными в список наркотических препаратов называется

- ☐ наркомания
- ☒ токсикомания
- ☐ дромоманией
- ☐ привычкой

179. Выберите правильный вариант ответа

Кокаинизм - это

- ☒ кокаиновая наркомания
- ☐ применение кокаина в лечебных целях
- ☐ применение кокаина в диагностических целях
- ☐ добавления кокаина в напитки

180. Выберите правильный вариант ответа

Журнал учета наркотических средств хранится

- ☒ в сейфе
- ☐ в шкафу
- ☐ на посту медицинской сестры
- ☐ в ординаторской в шкафу

181. Выберите правильный вариант ответа

Чаще ВИЧ-инфекция в РФ возникает

- ☒ у наркоманов употребляющих наркотик внутривенно
- ☐ у наркоманов употребляющих наркотик внутрь
- ☐ не зависит от способа введения
- ☐ при употреблении наркотика через слизистые

182. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманию вызывают злоупотребления всеми перечисленными веществами, за исключением

- ☐ препаратами опия
- ☐ кокаином
- ☐ галлюциногенами (ЛСД)
- ☒ алкоголем

183. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания - это:

- ☒ одновременное злоупотребление несколькими наркотиками

- ☐ повышение дозы наркотического вещества
- ☐ алкоголизм
- ☐ алкоголь и наркотик

184. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм - это

- ☒ наркомания препаратами конопли
- ☐ табакокурение
- ☐ психическое заболевание, возникающее у наркомана
- ☐ выращивание конопли

185. Выберите правильный вариант ответа

Наркомания и токсикомания в РФ

- ☐ снижается
- ☒ растет
- ☐ остается стабильной
- ☐ относительно стабильна

186. Выберите правильный вариант ответа

При парентеральном приеме наркотиков у наркоманов передаются заболевания

- ☒ ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В
- ☐ вирусный гепатит А
- ☐ краснуха
- ☐ брюшной тиф

187. Выберите правильный вариант ответа

Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

- ☐ мозжечковая атаксия
- ☐ мышечная атония, амимия
- ☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
- ☒ гипермимии

188. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях
- ☐ в традиционных эпизодах употребления алкоголя

189. Выберите правильный вариант ответа

Среди женщин, больных алкоголизмом преобладают лица, занятые

- ☒ в торговле, сфере услуг
- ☐ в промышленности
- ☐ в здравоохранении
- ☐ в образовании

190. Выберите правильный вариант ответа

Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для больных

- ☐ онкологических
- ☒ наркоманией
- ☐ алкоголизмом
- ☐ шизофренией

191. Выберите правильный вариант ответа

К числу особенностей современного алкоголизма относится

- ☐ стабилизация распространённости алкогольных психозов
- ☐ увеличение числа типичных алкогольных психозов
- ☒ увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
- ☐ соматические осложнения

192. Соответствие триады фаз биполярного аффективного расстройства

маниакальная фаза	повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная деятельность
депрессивная фаза	пониженное настроение, замедленный темп мышления, понижение активности
	пониженное настроение, ускоренный темп мышления, понижение активности

193. Соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение восприятия	иллюзии, галлюцинации
нарушения мышления	обстоятельность, ускорение
	парамнезия, амнезия

194. Соответствие выраженности абстинентного синдрома в зависимости от наркотика

значительная	опиаты
незначительная	препараты конопли
	тетурам

195. Соответствие фобий и их значений

канцерофобия	навязчивый страх заболеть раковой опухолью
гидрофобия	навязчивый страх воды
	навязчивый страх крови

196. Соответствие заболеванию характерной патологии мышления

эпилепсия	вязкость, обстоятельность
депрессия	замедленность
	ускоренное мышление

197. Соответствие заболеванию клинических проявлений

эпилепсия	сумеречное состояние
шизофрения	аутизм, отрыв от реальности
	раздражительная слабость

198. Соответствие реакции зрачков на опьянение психоактивными веществами

узкие зрачки	героин
широкие зрачки	гашиш, анаша
	LSD

199. Соответствие группы препаратов и вещества

снотворные, седативные	фенобарбитал
препараты конопли	анаша, план
	героин

200. Соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение памяти	амнезия, гипермнезия
нарушение мышления	бредовые идеи
	галлюцинации, иллюзии

нарушение эмоций	тоска, гипотимия
нарушение восприятия	галлюцинации, иллюзии
	обстоятельность

201. Соответствие психических нарушений и их симптомов

2. Знания современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

202. Выберите два варианта ответа

СПИД-маркерные заболевания

- ☐ саркома Капоши у больных старше 60 лет
- ☒ пневмоцистная пневмония
- ☒ кандидоз пищевода, трахеи, бронхов
- ☐ дизентерия

203. Выберите правильный вариант ответа

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

204. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 1 сутки

205. Выберите правильный вариант ответа

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

206. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

- ☒ серологические
- ☐ генетические
- ☐ люминесцентные
- ☐ бактериологические

207. Выберите правильный вариант ответа

Шоковый индекс Альговера – это соотношение

- ☒ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению систолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к артериальному давлению систолическому

208. Выберите правильный вариант ответа

Нижняя граница систолического артериального давления для назначения нитроглицерина

- ☐ 100 мм рт. ст.
- ☒ 90 мм рт. ст.
- ☐ 110 мм рт. ст.
- ☐ 80 мм рт. ст.

209. Выберите правильный вариант ответа

Для купирования анафилактического шока адреналин разводят физиологическим раствором в следующем соотношении

- ☐ 1: 5
- ☐ 1: 1
- ☐ 1: 20
- ☒ 1: 10

210. Выберите правильный вариант ответа

Купирование анафилактического шока начинается с введения

- ☒ адреналина
- ☐ полиглюкина
- ☐ димедрола
- ☐ преднизолона

211. Выберите правильный вариант ответа

Клинические признаки гипергликемической комы

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная холодная, одышка, зрачки различной величины
- ☒ сознание отсутствует, кожа сухая, гиперемированная, дыхание шумное типа Куссмауля
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

212. Выберите правильный вариант ответа

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
☐ 7 дней
☐ 14 дней
☐ 21 дня

213. Выберите правильный вариант ответа

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
☐ Б
☒ В
☐ Д

214. Выберите правильный вариант ответа

Профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год

- ☐ ВИЧ-инфицированные
☐ военнослужащие
☒ больные с язвенной болезнью желудка
☐ лица, проживающие в домах престарелых

215. Выберите правильный вариант ответа

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
☐ диагностика туберкулеза
☐ предупреждение туберкулеза
☒ раннее выявление больных туберкулезом

216. Выберите правильный вариант ответа

Площадь ожога правой нижней и верхней конечностей по правилу «девятки», составляет

- ☐ 39 %
☐ 45 %
☒ 27 %
☐ 36 %

217. Выберите правильный вариант ответа

Страховые взносы работодателей на обязательное медицинское страхование в ФОМС

- ☐ 2,6 %
☐ 3,1 %
☒ 5,1 %
☐ 14 %

218. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
☒ 15-ти летнего возраста
☐ 16-ти летнего возраста
☐ 17-ти летнего возраста

219. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- ☒ да
☐ нет
☐ исходя из обстоятельств
☐ по согласованию

220. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- ☐ обязательного
☒ добровольного
☐ любого
☐ всеобщего

221. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

- ☐ отсутствие болезней
☐ нормальное функционирование всех систем организма
☒ состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
☐ состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

222. Выберите правильный вариант ответа

Химическую дезинфекцию медицинского инструментария проводят

- ☐ паром под давлением
☐ сухим горячим воздухом
☐ УФО
☒ дезинфицирующими средствами

223. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция бактерицидных ламп проводится раствором

- ☐ перекиси водорода 3-процентной
☐ перекиси водорода 6-процентной
☐ хлорамина 4-процентного
☒ этилового спирта 70-процентного

224. Выберите правильный вариант ответа

Уборочный инвентарь между уборками хранится

- ☐ в процедурном кабинете
☐ в специальном шкафу в процедурном кабинете
☒ вне помещений рабочих кабинетов
☐ в отдельном помещении

225. Установить соответствие между видом обследования и его значением

аускультация	выслушивание
перкуссия	выстукивание
пальпация	ощупывание
	измерение роста и массы тела

226. Установить соответствие между методом дезинфекции и способом

химический	применение моющих и дез.растворов
физический	кипячение
	мытьё, выхлapyвание

227. Установить соответствие между № приказа и его названием

ОСТ 42-21-2-85	"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"
приказ № 408	"О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране"
	"О борьбе с педикулезом"

228. Установить соответствие пути и способа введения лекарственных средств

парентеральный	в вену
энтеральный	в прямую кишку
	через дыхательные пути

229. Установить соответствие между термином и определением

кризис	быстрое снижение температуры
лизис	постепенное снижение температуры
	повышение температуры тела до 37 С0

230. Установить соответствие между названием запора и температурой воды для клизмы

атонический запор	12-20 С0
спастический запор	37-42 С0
	20-25 С0

231. Определите соответствие между дистанциями при общении

интимная	от 15 до 45 см
личная	45–120 см
социальная	120 до 400 см
	от 400 см и более

232. Установите соответствие между методами дезинфекции

встряхивание, мытьё, протираание, влажная уборка	механический
кипячение, пастеризация, УФ облучение, воздействие горячего воздуха	физический
орошение, протираание, погружение в дезинфектанты	химический
антагонистическое действие микроорганизмов	биологический
	комбинированный

233. Установить соответствие между анализом мочи и целью исследования

по Нечипоренко	количественное определение форменных элементов в моче
на диастазу	определение функционального состояния поджелудочной железы
	определение функционального состояния печени

234. Установить соответствие между этапом сестринского процесса и видом деятельности

сестринское обследование	сбор и оценка данных о состоянии пациента
сестринская диагностика	выявление потребностей (проблем) пациента
планирование	определение целей и ожидаемые результаты
реализация	выполнение плана сестринского ухода
	определение степени достижения целей

235. Определите соответствие сестринских вмешательств от периода лихорадки

первый период лихорадки	согреть, укрыть теп-
-------------------------	----------------------

ки	лом
второй период лихорадки	холод к голове
	провести ножные ванны

236. Определите соответствие сестринских вмешательств при следующих состояниях

обмороке	к носу вату, смоченную нашатырным спиртом
коллапсе	обеспечить приток свежего воздуха, грелку к ногам
	придать положение с возвышенным изголовьем

237. Определите место наложение жгута по отношению к ране при

венозном кровотечении	ниже раны
артериальном кровотечении	выше раны
	место не имеет значение

238. Выберите правильный вариант ответа

Одно из обязательных условий лечения алкоголизма психотропными препаратами

- ☐ применение антидепрессантов
- ☐ дифференцированность показаний
- ☐ контроль соматического и неврологического состояния

☒ назначение лечения короткими курсами

239. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома используются средства

- ☐ барьерные контрацептивы
- ☒ полиионные растворы, витамины, ноотропы,
- ☐ антибиотики
- ☐ пеногасители

240. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

- ☐ с преобладанием антипсихического эффекта
- ☒ с преобладанием седативного эффекта
- ☐ с преобладанием стимулирующего средства
- ☐ ультракороткого действия

241. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показаниями для назначения транквилизаторов являются

- ☐ когнитивные расстройства
- ☐ низкое артериальное давление
- ☒ актуализация патологического влечения к алкоголю

☐ расстройства мочеиспускания

242. Выберите правильный вариант ответа

Диагнозы алкоголизма, наркомании устанавливаются

- ☒ пожизненно
- ☐ на период диспансерного наблюдения
- ☐ на период активного лечения в связи с рецидивом заболевания
- ☐ на период употребления алкоголя, наркотика

243. Выберите правильный вариант ответа

При психотических расстройствах вследствие злоупотребления НС и ПТВ показана госпитализация

- ☒ в недобровольном порядке в психиатрический стационар
- ☐ в экстренном порядке в отделение токсикологии
- ☐ в терапевтическое отделение
- ☐ в хирургическое отделение

244. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

- ☐ с преобладанием антипсихического эффекта
- ☒ с преобладанием седативного эффекта
- ☐ с преобладанием стимулирующего средства
- ☐ с преобладанием экстрапирамидных нарушений

245. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показанием для назначения транквилизаторов не является

- ☐ неврозоподобные и психоподобные расстройства
- ☐ аффективные нарушения
- ☐ актуализация патологического влечения к алкоголю
- ☒ сердечно-сосудистая патология

246. Выберите правильный вариант ответа

Показания для назначения ноотропов у больных алкоголизмом

- ☐ азотемия
- ☒ нарушение памяти и интеллекта
- ☐ пониженный сердечный выброс
- ☐ гипертермия

247. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкоголизма у лиц с язвенной болезнью желудка используются

- ☒ метронидазол (трихопол)
- ☐ аспирин
- ☐ искусственная гипотермия
- ☐ условно-рефлекторная терапия

248. Выберите правильный вариант ответа

К общеукрепляющим и тонизирующим средствам, используемым в наркологической практике, относятся

- ☒ витамины, ноотропы
- ☐ H₂-блокаторы
- ☐ местные анестетики
- ☐ аминогликозиды

249. Выберите правильный вариант ответа

К тиоловым препаратам, используемым в наркологической практике, относятся

- ☐ сульфат магния
- ☒ 5-% унитиол
- ☐ гемодез
- ☐ тироксин

250. Выберите правильный вариант ответа

По медицинским показаниям наркотики не назначаются

- ☐ онкологическим больным
- ☐ в послеоперационном периоде
- ☒ при зубной боли

- ☐ в момент проведения общей внутривенной анестезии

251. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства парентерального и перорального применения хранятся

- ☐ вместе
- ☒ раздельно
- ☐ в рентген-кабинете
- ☐ в приёмной главного врача

252. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния у пациента необходимо

- ☒ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- ☐ направить его на обследование к психиатру
- ☐ провести дезинтоксикацию на месте
- ☐ сделать микроклизму

253. Выберите правильный вариант ответа

При малейших признаках наркотического состояния необходимо

- ☐ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- ☐ направить пациента в поликлинику для обследования
- ☒ направить пациента к наркологу
- ☐ направить на санаторное лечение

254. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты выписываются

- ☒ на латинском языке
- ☐ на русском языке
- ☐ на русском и латинском языках
- ☐ на английском

255. Выберите правильный вариант ответа

Требования на наркотические препараты выписываются

- ☒ на отдельных бланках в 3 экземплярах
- ☐ на общих бланках в 2 экземплярах
- ☐ в журнале назначений
- ☐ в истории болезни

256. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические вещества в лечебно-профилактическом учреждении хранятся

- ☐ в соответствующих наборах по оказанию посиндромной неотложной помощи
- ☒ в специальных помещениях в соответствии с требованиями
- ☐ в подвальном помещении
- ☐ у главного врача

257. Выберите правильный вариант ответа

Места хранения наркотиков необходимо обеспечить

- ☐ звукоизоляции
- ☒ охранной сигнализацией
- ☐ милицейским постом
- ☐ свободным доступом

258. Выберите правильный вариант ответа

Пероральный прием наркотических лекарственных средств производится

- ☒ только в присутствии медицинского персонала
- ☐ независимо от присутствия медсестры

- ☐ втайне от окружающих
- ☐ после приёма пищи

259. Выберите правильный вариант ответа

Запас наркотических лекарственных средств в отделениях

- ☐ не более, чем на 12 часов
- ☒ не должен превышать 3-дневной потребности
- ☐ не должен превышать недельный запас
- ☐ не должен превышать 10-дневной потребности

260. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика наркозаболеваний включает

- ☐ недопущение переохлаждения
- ☒ психопрофилактику
- ☐ лечение алкоголизма
- ☐ лечение кариеса

261. Выберите правильный вариант ответа

Психопрофилактика – это

- ☒ санитарное просвещение
- ☐ соблюдение санэпидрежима
- ☐ посещение музеев
- ☐ посещение солярия

262. Выберите правильный вариант ответа

Зондовое питание при отказах от пищи назначают через

- ☒ 3 дня
- ☐ 3 часа
- ☐ 7 дней
- ☐ 10 дней

263. Выберите правильный вариант ответа

Препарат, усиливающий чувство голода

- ☐ транексам
- ☐ трихопол
- ☒ инсулин
- ☐ юнидокс солютаб

264. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные средства, основным побочным действием которых является нейролептический синдром

- ☐ антидепрессанты
- ☒ нейролептики
- ☐ транквилизаторы
- ☐ нормотимики

265. Выберите правильный вариант ответа

Психотерапия – это воздействие

- ☒ словесное
- ☐ физическое
- ☐ тепловое
- ☐ электрическое

266. Выберите правильный вариант ответа

Купирование возбуждения при психотических расстройствах на догоспитальном этапе осуществляется

- ☐ транквилизаторы
- ☒ нейролептики
- ☐ ноотропы
- ☐ психостимуляторы

267. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся больному:

- ☐ по назначению любого медицинского работника
- ☐ по назначению заведующего отделением
- ☐ комиссионно
- ☒ строго по назначению врача

268. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся пациенту:

- ☒ в присутствии врача
- ☐ в присутствии родственников больного
- ☐ в присутствии средних медицинских работников
- ☐ самостоятельно самим пациентом

269. Выберите правильный вариант ответа

Рациональная психотерапия называется

- ☐ оптимальный вариант психофармакотерапии
- ☐ лечение гипнозом во сне
- ☐ лечение музыкой
- ☒ лечение разъяснением

270. Выберите правильный вариант ответа

Аутогенная тренировка – это

- ☐ система дозированных физических нагрузок
- ☒ обучение приемам самовнушения с лечебными целями
- ☐ программа психокоррекции речевых расстройств
- ☐ лечение у ЛОР – врача

271. Выберите правильный вариант ответа

Гипнотерапия – это

- ☐ лечение на ипподроме
- ☐ применение массивных терапевтических доз
- ☐ использование пониженной температуры
- ☒ внушение во сне

272. Выберите правильный вариант ответа

При серийных эпилептических приступах пациенту необходимо ввести

- ☐ аминазин
- ☐ амитриптилин
- ☐ стелазин
- ☒ реланиум

273. Выберите правильный вариант ответа

Неотложные доврачебные мероприятия при отравлении циклодолом

- ☐ искусственная вентиляция лёгких
- ☐ дезинтоксикация
- ☐ внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия
- ☒ промывание желудка

274. Выберите правильный вариант ответа

Основные правила по применению методов физического стеснения пациента в психиатрическом стационаре

- ☐ фиксировать с помощью медперсонала
- ☐ фиксировать на время не более 6 часов
- ☒ получить письменное разрешение врача на фиксацию с указанием времени фиксации
- ☐ сообщить дежурному врачу о необходимости фиксации в течение смены

275. Выберите правильный вариант ответа

Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является

- ☐ формирование трезвеннической установки на период лечения
- ☒ пропаганда здорового образа жизни
- ☐ исключение приёма алкоголя при лечении
- ☐ формирование культуры приёма алкогольных напитков

276. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо при ортостатическом коллапсе пациенту, получающему нейролептики,

- ☐ ввести по назначению врача сердечные средства, кислород под кожу
- ☒ поднять нижние конечности, провести ингаляцию кислорода, инфузионную терапию
- ☐ по назначению врача отменить нейролептики, дать обезболивающее
- ☐ сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на область спины

277. Выберите правильный вариант ответа

Особенности наблюдения за больным с депрессивным синдромом с идеями самообвинения, самоуничтожения заключаются в

- ☐ изоляции больного от окружающих
- ☒ предотвращении суицидальных попыток
- ☐ соблюдении строгого постельного режима
- ☐ соблюдении диеты

278. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное условие при промывании желудка больному в коме

- ☐ сохранённый кашлевой рефлекс
- ☐ приподнятый головной конец
- ☒ изоляция дыхательных путей посредством эндотрахеальной интубации
- ☐ высокое артериальное давление

279. Выберите правильный вариант ответа

При передозировке наркотических средств, введённых внутривенным путём, наиболее частым осложнением является

- ☐ снижение артериального давления
- ☐ повышенная чувствительность к адреналину
- ☐ расширение зрачка с вывихом хрусталика
- ☒ остановка дыхания

280. Выберите правильный вариант ответа

Транспортировка пациента, в состоянии комы, при отсутствии возможности проведения искусственной вентиляции путём эндотрахеальной интубации, проводится в положении

- ☐ вниз головой
- ☒ на левом боку с приподнятым головным концом
- ☐ на правом боку
- ☐ на спине, с введённым в рот воздуховодом

281. Выберите правильный вариант ответа

При промывании желудка пациенту с алкогольной интоксикацией используем

- ☐ слабый щелочной раствор
- ☐ слабый раствор уксусной кислоты
- ☒ чистую воду

- ☐ раствор марганцевого калия

282. Выберите правильный вариант ответа

Укажите лекарственное средство, применяемое в случаях угнетения дыхания при передозировке опиатов

- ☐ кетамин
- ☒ налоксон
- ☐ бриетал
- ☐ прозерин

283. Выберите правильный вариант ответа

К методам детоксикации при отравлении алкоголем не относится

- ☐ промывание желудка
- ☐ переливание изотонических растворов внутривенно
- ☐ стимуляция диуреза
- ☒ переливание свежезамороженной плазмы

284. Выберите правильный вариант ответа

Пациентов с опасными тенденциями в психиатрической больнице помещают в палату

- ☒ наблюдательную
- ☐ реанимационную
- ☐ палату интенсивной терапии
- ☐ общую

285. Выберите два правильных варианта ответа

Биологическими методами лечения называют

- ☒ электросудорожная терапия
- ☒ инсулиношоковая терапия
- ☐ медикаментозная терапия
- ☐ психотерапия
- ☐ фотодинамическая терапия

286. Выберите два правильных варианта ответа

Инсулиношоковая терапия возможна

- ☐ во время менструации
- ☒ при наличии галлюцинаций
- ☒ бредовым пациентам с опасными тенденциями
- ☐ сердечно-сосудистой недостаточности
- ☐ при неврозах

287. Выберите два правильных варианта ответа

Электросудорожная терапия возможна

- ☒ при шизофрении
- ☒ при психозах различной этиологии
- ☐ при дыхательной недостаточности
- ☐ при мигрени
- ☐ при паркинсонизме

288. Выберите два правильных варианта ответа

Приготовить во время купирования гипогликемии для предотвращения коллапса следующие препараты

- ☒ 0,1% раствор адреналина
- ☒ 40% раствор глюкозы
- ☐ раствор галоперидола
- ☐ раствор дроперидона гидрохлорида
- ☐ раствор анальгина

289. Выберите два правильных варианта ответа

Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является

- ☒ антиобщественное поведение психически больного
- ☒ поведение опасное для самого больного
- ☐ неврозы
- ☐ врожденное слабоумие
- ☐ маниакальное состояние без склонности к агрессии

290. Выберите два правильных варианта ответа

Терапия пограничных состояний включает методы

- ☒ психотерапию
- ☐ нейролептики
- ☒ седативные средства
- ☐ гормоны
- ☐ сердечные гликозиды

291. Выберите два правильных варианта ответа

Лекарственные препараты для лечения маниакального эпизода биполярного аффективного психоза

- ☒ аминазин
- ☐ прзерин
- ☒ галоперидол
- ☐ анальгин
- ☐ инсулин

292. Выберите два правильных варианта ответа

Лечение алкоголизма включает

- ☒ психотерапию
- ☒ фармакотерапию
- ☐ физиотерапию
- ☐ гирудотерапию
- ☐ химиотерапию

293. Выберите два правильных варианта ответа

Лечение шизофрении включает

- ☐ гипноз
- ☒ биологические методы
- ☒ реабилитацию
- ☐ физиотерапию
- ☐ лучевую терапию

294. Выберите два правильных варианта ответа

Препараты, относящиеся к группе антипсихотиков

- ☒ аминазин
- ☒ трифтазин
- ☐ фенотепам
- ☐ цитрамон
- ☐ амоксилав

295. Выберите два правильных варианта ответа

Препараты, относящиеся к группе антидепрессантов

- ☐ курантил
- ☐ сибазон
- ☒ амитриптилин

- ☒ мелипрамин

- ☐ окситоцин

296. Выберите два правильных варианта ответа

Препараты, относящиеся к группе ноотропов

- ☒ глицин
- ☐ реланиум
- ☒ пантогам
- ☐ винпоцетин
- ☐ аминазин

297. Выберите два правильных варианта ответа

Препараты, относящиеся к группе транквилизаторов

- ☒ фенотепам
- ☒ диазепам
- ☐ ригевидон
- ☐ преднизолон
- ☐ клайра

298. Выберите два правильных варианта ответа

Проявления нейролептического синдрома

- ☒ лекарственный паркинсонизм
- ☒ акатизия
- ☐ эйфория
- ☐ обстоятельное мышление
- ☐ психическая анестезия

299. Выберите правильный вариант ответа

Электрэнцефалографию используют для диагностики

- ☐ олигофрении
- ☒ эпилепсии
- ☐ шизофрении
- ☐ неврастении

300. Установить соответствие между видом наблюдения и проблемами пациента

строгий надзор	агрессия
усиленное наблюдение	соматическая ослабленность
	повышенная общительность
	нарушение речи

301. Установить соответствие между видом надзора за пациентами и психическим состоянием

строгий надзор	с депрессивными состояниями
усиленное наблюдение	получающие инсулиношоковую терапию
	пациенты с ретроградной амнезией
	маниакальное состояние без склонности к агрессии

3. Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации

302. Установите соответствие фазе туберкулеза и патологического процесса

активная	распад
неактивная	рубцевание
	склеивание

303. Установите соответствие цели проведения и манипуляции

диагностическая	проба Манту
лечебная	введение стрептомицина
профилактическая	вакцинация БЦЖ

ская	
	обсеменение

304. Выберите правильный вариант ответа

К числу особенностей современного алкоголизма относится

- ☐ стабилизация распространённости алкогольных психозов
- ☐ увеличение числа типичных алкогольных психозов
- ☒ увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
- ☐ соматические осложнения

305. Выберите правильный вариант ответа

Основные расстройства восприятия

- ☐ амнезия, абулия, афазия
- ☒ иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
- ☐ резонерство, навязчивость
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

306. Выберите правильный вариант ответа

Нарушения памяти

- ☒ амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции
- ☐ ментизм, шперрунг, обстоятельность
- ☐ резонерство, разорванность мышления
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

307. Выберите правильный вариант ответа

К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся

- ☐ бессонница, раздражительность, депрессия
- ☒ корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике
- ☐ алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
- ☐ деменция, амнезия, афазия

308. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками астенического синдрома является

- ☐ абулия, афазия, амнезия
- ☐ бессонница, бродяжничество, беспокойство
- ☒ утомляемость, раздражительность, бессонница
- ☐ анорексия, негативизм, сонливость

309. Выберите правильный вариант ответа

Делирий относится к расстройствам

- ☒ сознания
- ☐ памяти
- ☐ воли
- ☐ мышления

310. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☐ контрастирующие
- ☒ императивные
- ☐ акоазмы

311. Выберите правильный вариант ответа

Корсаковский синдром относится к расстройствам

- ☒ памяти
- ☐ сознания
- ☐ мышления
- ☐ эмоций

312. Выберите правильный вариант ответа

Эпилептический статус

- ☐ оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией
- ☒ серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- ☐ речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией
- ☐ невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией

313. Выберите правильный вариант ответа

Под невменяемостью понимают

- ☐ неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы
- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ высокую степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

314. Выберите правильный вариант ответа

Проявление острого алкогольного психоза

- ☐ речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия
- ☐ лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства
- ☒ делирий, галлюциноз, паранойя
- ☐ длительный сон

315. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольная абстиненция – это

- ☐ присутствие алкоголя в крови
- ☒ психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
- ☐ алкогольное поражение печени
- ☐ алкогольная эпилепсия

316. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии – это

- ☒ искаженное восприятие реально существующего предмета
- ☐ действия иллюзиониста
- ☐ голоса, носящие «приказной» императивный характер
- ☐ выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности

317. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам интеллекта относятся

- ☒ деменция, умственная отсталость
- ☐ нарушение сна, астения
- ☐ амнезия, конфабуляции
- ☐ эйфория, аффективные расстройства

318. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет
- ☐ прикусывание языка
- ☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация

319. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти

☒ средства, применяемые при психических расстройствах

☐ препараты, вызывающие галлюцинации

☐ наркотики

320. Выберите правильный вариант ответа

При астеническом синдроме отмечается

☐ абулия, афазия, амнезия

☒ утомляемость, раздражительность, бессонница

☐ анорексия, негативизм

☐ психический автоматизм, псевдогаллюцинации

321. Выберите правильный вариант ответа

Коматозное состояние – это

☒ полное выключение сознания

☐ частые приступы с потерей сознания

☐ снижение памяти

☐ оглушение, вялость, сонливость

322. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивые состояния называются

☐ онейроид

☐ конфабуляции

☒ обсессии

☐ псевдореминисценции

323. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю характерно для

☐ второй стадии алкоголизма

☒ первой стадии алкоголизма

☐ третьей стадии алкоголизма

☐ бытового пьянства

324. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к наркотику ярко выражено

☒ на первой стадии наркомании

☐ на второй стадии наркомании

☐ на третьей стадии наркомании

☐ при абстинентном синдроме

325. Выберите правильный вариант ответа

Снижение толерантности к наркотику отмечается

☐ на первой стадии наркомании

☐ на второй стадии наркомании

☒ на третьей стадии наркомании

☐ при абстинентном синдроме

326. Выберите правильный вариант ответа

Помрачение сознания отмечается при

☒ алкогольном делирии

☐ алкогольном галлюцинозе

☐ алкогольном бреде ревности

☐ болезни Корсакова

327. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое опьянение развивается

☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя

☐ при запоях

☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома

☒ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя

328. Выберите правильный вариант ответа

К каннабиноидам относится

☐ морфин

☒ гашиш

☐ амфетамин

☐ ЛСД

329. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий развивается

☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя при запоях

☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома

☐ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя

☒ у трезвого пациента в период прерывания запоя

330. Выберите правильный вариант ответа

К психостимуляторам относится наркотик

☐ морфин

☐ гашиш

☒ амфетамин

☐ ЛСД

331. Выберите правильный вариант ответа

К галлюциногенам относится наркотик

☐ морфин

☐ гашиш

☐ амфетамин

☒ ЛСД

332. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует, относятся

☒ галлюцинации

☐ иллюзии

☐ сенестопатии

☐ синестезии

333. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном, ошибочном виде, относятся

☐ галлюцинации

☒ иллюзии

☐ сенестопатии

☐ синестезии

334. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная медленная речь присуща пациентам с

☐ кататонией

☐ бредом преследования

☐ бредом громадности

☒ депрессией

335. Выберите правильный вариант ответа

Основное правило ухода за депрессивным больным

- ☐ режим нестеснения
- ☐ постельный режим
- ☒ усиленное наблюдение
- ☐ проведение медико–педагогических мероприятий

336. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение чувствительности по «типу носков» наблюдается у пациентов с

- ☒ алкогольным полиневритом
- ☐ белой горячкой
- ☐ алкогольным бредом ревности
- ☐ кататоническим ступором

337. Выберите правильный вариант ответа

При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания

- ☐ онейроид
- ☒ делирий
- ☐ амнезия
- ☐ кома

338. Выберите правильный вариант ответа

Для делирия характерны

- ☒ истинные зрительные галлюцинации
- ☐ зрительные псевдогаллюцинации
- ☐ конфабуляции
- ☐ псевдореминисценции

339. Выберите правильный вариант ответа

Психопатия – это

- ☒ стойкая патология характера
- ☐ хроническое прогрессирующее заболевание
- ☐ временное психическое заболевание
- ☐ помрачение сознания

340. Выберите правильный вариант ответа

К основным видам алкогольных психозов относится

- ☐ псевдогаллюциноз
- ☐ маниакальный психоз
- ☒ делирий
- ☐ онейроид

341. Выберите правильный вариант ответа

Истинные зрительные галлюцинации характерны для

- ☐ шизофрении
- ☒ интоксикационного делирия
- ☐ инволюционной меланхолии
- ☐ кататонии

342. Выберите правильный вариант ответа

При эпилептическом припадке

- ☐ сознание сохранено
- ☒ отмечается прикусывание языка
- ☐ реакция зрачков на свет сохранена
- ☐ пациент не наносит себе травм

343. Выберите правильный вариант ответа

Узелки по ходу вен свидетельствуют

- ☒ о наркотической зависимости
- ☐ о болезненном состоянии
- ☐ о варикозном расширении вен
- ☐ об аллергическом заболевании

344. Выберите правильный вариант ответа

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена одним из перечисленных факторов

- ☐ крепостью и качеством алкоголя
- ☒ активностью фермента алкогольдегидрогеназы
- ☐ культурно–этическими
- ☐ поло–возрастными

345. Выберите правильный вариант ответа

К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относится

- ☐ наследственность
- ☒ предменструальное напряжение
- ☐ ранняя психическая травматизация
- ☐ соматические заболевания

346. Выберите правильный вариант ответа

Морфинизм – это

- ☐ хроническое отравление морфием
- ☐ привыкание нервной ткани к яду
- ☒ вид наркомании
- ☐ результат лечения бессонницы

347. Выберите правильный вариант ответа

Антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями

- ☐ унит иол
- ☐ метиленовый синий
- ☒ атропин
- ☐ концентрированная глюкоза

348. Выберите правильный вариант ответа

Антидотом при отравлении метиловым спиртом является

- ☐ унит иол
- ☐ метиленовый синий
- ☒ этиловый спирт
- ☐ концентрированная глюкоза

349. Выберите правильный вариант ответа

Первая доврачебная помощь при пероральных отравлениях наркотиками и алкоголем включает

- ☐ приём слабительного
- ☐ обёртывание мокрыми простынями
- ☐ массаж спины
- ☒ промывание желудка

350. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет
- ☐ прикусывание языка
- ☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация

351. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти
- ☒ средства, применяемые при психических расстройствах
- ☐ препараты, вызывающие галлюцинации
- ☐ наркотики

352. Выберите правильный вариант ответа

При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести

- ☐ аминазин

- ☐ амитриптилин
- ☐ стелазин
- ☒ карбомазепим

353. Выберите правильный вариант ответа

Социотерапия – это

- ☐ работа в группе социопатов
- ☐ решение социальных вопросов
- ☒ лечение факторами окружающей среды
- ☐ посещение пациента социальным работником

354. Выберите правильный вариант ответа

Запой это

- ☐ обливание холодной водой
- ☐ передозировка алкоголя
- ☐ стремление уменьшить количество приёма алкоголя
- ☒ периодическое продолжительное пьянство, вследствие болезненного пристрастия к алкоголю

355. Выберите правильный вариант ответа

В основе сформировавшегося патологического влечения к алкоголю преобладают

- ☐ социальные факторы
- ☐ психологические факторы
- ☒ биологические факторы
- ☐ уровень культуры

356. Выберите правильный вариант ответа

Структура патологического влечения к алкоголю не включает в себя компонент

- ☐ эмоционально-аффективный
- ☐ сомато-вегетативный
- ☐ поведенческий
- ☒ неврологический

357. Выберите правильный вариант ответа

В процессе развития патологического влечения к алкоголю не происходит

- ☐ изменений суждений больного
- ☐ поведенческих нарушений
- ☐ формирования позитивного мировоззрения
- ☒ сохранения критики к своему состоянию и окружающей среде

358. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм является

- ☒ наркоманией препаратами конопли
- ☐ табакокурением
- ☐ психическим заболеванием, возникающее у наркомана
- ☐ выращиванием конопли

359. Выберите правильный вариант ответа

Тяжёлая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

- ☐ мозжечковая атаксия
- ☐ мышечная атония, амимия
- ☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
- ☒ гипермимии

360. Выберите правильный вариант ответа

Сужение зрачков характерно для

- ☒ опийной интоксикации
- ☐ гашишной интоксикации

- ☐ эфедроновой интоксикации
- ☐ опийного абстинентного синдрома

361. Выберите правильный вариант ответа

Эфедрон чаще всего употребляется

- ☒ внутривенно
- ☐ внутримышечно
- ☐ перорально
- ☐ путем курения

362. Выберите правильный вариант ответа

Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества при проведении экспертизы обязательным является

- ☐ заявление испытуемого об употреблении наркотика
- ☒ обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- ☐ обнаружение в вещах (одежде) наркотического вещества
- ☐ выявление клиники опьянения (одурманивания) в сочетании с отрицательной химической реакцией на алкоголь

363. Выберите правильный вариант ответа

К основным клиническим признакам алкогольного параноида относятся

- ☐ повышенное настроение
- ☒ страх, тревога, бред преследования
- ☐ галлюцинации
- ☐ судорожные припадки

364. Выберите правильный вариант ответа

Проявление сумеречного состояния сознания

- ☒ транс
- ☐ дурашливость
- ☐ ступор
- ☐ мания

365. Выберите правильный вариант ответа

Показаниями для назначения ноотропов у больных алкоголизмом является

- ☐ атипичная форма опьянения
- ☒ нарушение памяти и интеллекта
- ☐ наличие депрессивных расстройств
- ☐ выраженные соматические осложнения

366. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на собственные признания испытуемого о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта испытуемого
- ☒ провести не менее 2-х проб на алкоголь
- ☐ ориентироваться на утверждение очевидцев

367. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуемая длительность диспансерного наблюдения при алкоголизме

- ☐ 1 год
- ☒ 3 года
- ☐ 5 лет
- ☐ пожизненно

368. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома

- ☐ отвращение к алкоголю
- ☐ сонливость
- ☒ влечение к опохмелению, тремор
- ☐ тремор, отвращение к алкоголю

369. Выберите правильный вариант ответа

При психомоторном возбуждении больному необходимо ввести

- ☐ мажепгил
- ☒ аминазин
- ☐ сомбревин
- ☐ модиген – депо

370. Выберите правильный вариант ответа

Первая фаза абстинентного синдрома при опиоидной наркомании развивается через

- ☐ сутки после последнего приема наркотика
- ☒ 8-12 часов после последнего приема наркотика
- ☐ 48-72 часа после последнего приема наркотика
- ☐ 5 суток после последнего приема наркотика

371. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных во второй стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко
- ☐ носят тотальный характер
- ☒ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

372. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольные амнезии у больных в третьей стадии алкоголизма

- ☐ встречаются крайне редко
- ☒ носят тотальный характер
- ☐ носят систематический характер
- ☐ отсутствуют

373. Выберите правильный вариант ответа

Биотрансформация алкоголя происходит в

- ☒ печени
- ☐ почках
- ☐ центральной нервной системе
- ☐ желудке

374. Выберите правильный вариант ответа

Путем биотрансформации из организма удаляется

- ☐ 50% введенного алкоголя
- ☐ 75% введенного алкоголя
- ☒ 80-95% введенного алкоголя
- ☐ 100% введенного алкоголя

375. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома 1 степени тяжести

- ☒ до суток
- ☐ 2-5 суток
- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

376. Выберите правильный вариант ответа

Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома 2 степени тяжести

- ☐ до суток
- ☒ 2-5 суток

- ☐ 6-7 суток
- ☐ до 10 суток

377. Выберите правильный вариант ответа

Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период

- ☒ до 18 лет
- ☐ до 25 лет
- ☐ до 30 лет
- ☐ внутриутробного развития плода

378. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю проявляется

- ☒ необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории
- ☐ достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя
- ☐ более редким желанием употреблять алкоголь
- ☐ более частым желанием употреблять алкоголь

379. Выберите правильный вариант ответа

О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее объективно свидетельствует следующий показатель

- ☐ рождаемость
- ☐ смертность
- ☒ количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- ☐ количество состоящих на учете больных алкоголизмом

380. Выберите правильный вариант ответа

Воздействие опиатов на желудочно-кишечный тракт не

- ☐ угнетение перистальтики
- ☐ кишечные колики
- ☐ запоры
- ☒ частого стула

381. Выберите правильный вариант ответа

Для опьянения, вызванного употреблением опиатов, характерны

- ☒ сужение зрачка
- ☐ расширение зрачка
- ☐ быстрая речь
- ☐ повышение аппетита

382. Выберите правильный вариант ответа

Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя

- ☒ проведение длительной индивидуальной терапии, лечение соматических и неврологических нарушений
- ☐ назначение антибиотиков
- ☐ проведение «кодирования»
- ☐ проведение сеансов гипноза

383. Выберите правильный вариант ответа

Невменяемость – это

- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ неспособность говорить и отвечать на вопросы
- ☐ высокая степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

384. Выберите правильный вариант ответа

Решающее значение в развитии неврозов имеет

- ☐ нейроинфекция
- ☐ черепно-мозговая травма
- ☐ сосудистые заболевания головного мозга
- ☒ психогенный фактор

385. Выберите правильный вариант ответа

Какой метод исследования может дать наибольшую информацию о наличии галлюцинаций у больного

- ☐ электроэнцефалография
- ☐ рентгенограмма черепа
- ☐ эхоэнцефалография
- ☒ наблюдение за поведением пациента

386. Выберите правильный вариант ответа

Имбецильность встречается при

- ☐ шизофрении
- ☒ олигофрении
- ☐ эпилепсии
- ☐ психопатии

387. Выберите правильный вариант ответа

При ипохондрическом бреде больной считает, что

- ☒ у него тяжелая болезнь
- ☐ его обворовывают
- ☐ он преступник
- ☐ его хотят отравить

388. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее общий синдром шизофрении

- ☒ отгороженность, отрыв от реальности
- ☐ маниакальное возбуждение
- ☐ гипестезия
- ☐ амнезия

389. Выберите правильный вариант ответа

Болезненная бесчувственность характерна для

- ☐ старческого слабоумия
- ☒ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ эпилепсии

390. Выберите правильный вариант ответа

Основой слабоумия является

- ☒ грубые органические изменения клеток головного мозга
- ☐ функциональные расстройства высшей нервной деятельности
- ☐ стойкая дисгармония эмоционально-волевых сторон психики
- ☐ хроническая соматическая патология

391. Выберите правильный вариант ответа

Признаки сумеречного помрачения сознания

- ☐ кататоническая заторможенность
- ☒ неадекватность поведения и мимики
- ☐ чрезмерная сонливость
- ☐ слабая реакция на окружающие раздражители

392. Выберите правильный вариант ответа

Пациент постоянно слышит внутри головы «голоса», возникающие непроизвольно, у пациента отмечаются

- ☐ иллюзии

- ☐ гиперестезии
- ☐ ускорение мышления
- ☒ псевдогаллюцинации

393. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивые мысли – это, когда больной

- ☒ не может избавиться от мыслей, возникающих помимо его желания
- ☐ не хочет от них избавиться
- ☐ стремиться к их реализации
- ☐ скрывает от врача их наличие

394. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

395. Выберите правильный вариант ответа

Ранние психические нарушения при атеросклерозе головного мозга

- ☒ снижение памяти на текущие события
- ☐ утрата критики к собственному состоянию
- ☐ снижение круга интересов
- ☐ раздражительная слабость

396. Установить соответствие понятий слабоумия

деменция	слабоумие, приобретенное в результате болезни
олигофрения	врожденное слабоумие
	лёгкая степень слабоумия

397. Установить соответствие определений клинических симптомов

галлюцинации	чувственное восприятие при отсутствии объекта
иллюзии	искажённое восприятие
	окружающие предметы видятся удвоенными

398. Установить соответствие синдромов заболеванию

шизофрения	кататонический синдром
маниакально-депрессивный психоз	маниакальный синдром
	судорожный синдром

399. Установить соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение воли	гипербулия, абулия
нарушение внимания	отвлекаемость
	псевдогаллюцинации

400. Установить соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение мышления	навязчивые мысли
нарушение эмоций	гипертимия, тоска
	гиперестезии, анестезия

401. Установить соответствие фобий и их значение

спидофобия	навязчивый страх заболеть СПИДом
------------	----------------------------------

клаустрофобия	навязчивый страх замкнутых пространств
	навязчивый страх воды

Специальность «Наркология» Высшая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин.

1. Выберите правильный вариант ответа

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ нагревание при 56 °С в течение 1 минуты
- ☐ воздействие радиации

2. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- ☐ аденовирусов
- ☒ ретровирусов
- ☐ энтеровирусов
- ☐ пикорнавирусов

3. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

4. Выберите правильный вариант ответа

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

5. Выберите два правильных варианта ответа

ВИЧ не передается

- ☒ через рукопожатия
- ☒ через укусы насекомых
- ☐ при половых контактах
- ☐ во время беременности
- ☐ через повреждённые слизистые

6. Выберите два правильных варианта ответа

Клинические признаки развитого шока

- ☐ повышение артериального давления, тахикардия, одышка
- ☒ понижение артериального давления, тахикардия, одышка
- ☒ бледность кожных покровов, снижение диуреза
- ☐ цианоз кожных покровов, полиурия
- ☐ отсутствие сознания, нормальное артериальное давление, сухая кожа

7. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее частая причина развития терминального состояния при электротравме

- ☐ титанический спазм дыхательной мускулатуры

- ☒ фибрилляция желудочков сердца
- ☐ угнетение ствола головного мозга
- ☐ коллапс

8. Выберите правильный вариант ответа

При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в области сердца, слева от грудины
- ☒ середина грудины

9. Выберите два правильных варианта ответа

Клинические признаки коллапса

- ☐ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание
- ☒ слабый, частый пульс
- ☐ редкий, слабый пульс
- ☐ резкое снижение артериального давления

10. Выберите правильный вариант ответа

Некроз всех слоев кожи характерен для ожога

- ☐ IV степени
- ☒ III Б степени
- ☐ III А степени
- ☐ II степени

11. Выберите два правильных варианта ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- ☐ вакцинированные БЦЖ
- ☐ инфицированные туберкулезом
- ☒ не вакцинированные и не инфицированные
- ☒ лица из групп риска
- ☐ вакцинированные и инфицированные

12. Выберите два правильных варианта ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- ☐ гепатита
- ☒ сахарного диабета
- ☐ колита
- ☐ острого бронхита
- ☒ гломерулонефрита

13. Выберите два правильных варианта ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель

☒ больное животное

☐ контактный

14. Выберите правильный вариант ответа

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

☐ свиньи

☒ крупный рогатый скот

☐ лошади

☐ собаки

15. Выберите правильный вариант ответа

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

☒ воздух

☐ пища

☐ вода

☐ предметы быта

16. Выберите правильный вариант ответа

Основной путь заражения туберкулезом

☐ контактный

☐ алиментарный

☒ аэрогенный

☐ внутриутробный

17. Выберите правильный вариант ответа

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

☐ близкий родственник

☐ дежурный (лечащий) врач или родственник

☒ консилиум или дежурный (лечащий) врач

☐ законный представитель

18. Выберите два правильных варианта ответа

Виды медицинского страхования

☒ обязательное

☒ добровольное

☐ индивидуальное

☐ общественное

☐ групповое

19. Выберите правильный вариант ответа

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается

☐ гражданину

☐ гражданину и членам его семьи

☒ гражданину и членам его семьи с его согласия

☐ работодателю

20. Выберите правильный вариант ответа

Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это

☒ эвтаназия

☐ танатология

☐ деонтология

☐ ятрогения

21. Выберите правильный вариант ответа

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

☐ паспорт

☒ страховой медицинский полис

☐ медицинская карта амбулаторного пациента

☐ история болезни

22. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

☐ вокруг больного

☐ вокруг носителя

☐ после выздоровления больного

☒ для предупреждения распространения инфекции

23. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

☐ вокруг больного

☐ вокруг носителя

☐ после выздоровления больного

☒ для предупреждения распространения инфекции

24. Выберите правильный вариант ответа

Цель гигиенической деконтаминации рук медицинского персонала

☒ обеспечение кратковременной стерильности

☐ создание кратковременной стерильности

☐ профилактика профессионального заражения

☐ удаление бытового загрязнения

25. Выберите правильный вариант ответа

УФО – метод

☐ стерилизации

☒ дезинфекции

☐ дезинсекции

☐ дератизации

26. Выберите правильный вариант ответа

Кипячение – метод

☐ стерилизации

☒ дезинфекции

☐ дезинсекции

☐ дератизации

☐ кипячение

27. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическую дезинфекцию проводят

☐ вокруг больного

☐ вокруг носителя

☐ после выздоровления больного

☒ для предупреждения распространения инфекции

28. Выберите правильный вариант ответа

После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию

☐ текущую

☐ профилактическую

☐ предварительную

☒ заключительную

29. Соответствие признаков смерти

клиническая	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая	кошачий глаз
	пульс аритмичный
	дыхание стридорозное

30. Установите соответствие оптимального числа компрессий и вдуваний при проведении СЛР

компрессий на грудину	30
вдуваний	2
	5
	1

31. Соответствие признаков ком при диабете

гипогликемическая	диплопия, головокружение
гипергликемическая	полиурия, жажда, сухость кожи
	повышение температуры
	розовая, пенная мокрота

32. Установите соответствие причин развития ком при диабете

гипогликемическая	передозировка инсулина
гипергликемическая	ошибочно снижена доза инсулина
	курение
	прием алкоголя

33. Установите соответствие факторов риска для развития шоков

травматический	кровопотеря, охлаждение
гемолитический	переливание несовместимой крови
	аллергия
	сепсис

34. Установите соответствие признаков фаз травматического шока

эректильная	гиперемия лица, пульс учащен, напряженный
торпидная	кожа бледная, АД снижается
	брадикардия, повышение АД
	пульс и АД в пределах нормы

35. Установите соответствие глазных симптомов терминальному состоянию

клиническая смерть	зрачок широкий без реакции на свет
биологическая смерть	«кошачий глаз»
	узкий зрачок
	анизокория

36. Выберите правильный вариант ответа

Сформированный абстинентный синдром является признаком

- ☐ злоупотребление алкоголем с вредными последствиями
- ☐ I стадии алкоголизма
- ☒ II стадии алкоголизма
- ☐ бытового пьянства

37. Выберите правильный вариант ответа

Для простого алкогольного опьянения не характерно

- ☐ эйфория

- ☐ заторможенность
- ☒ галлюцинации
- ☐ колебания артериального давления

38. Выберите правильный вариант ответа

Признаком состояния алкогольного опьянения не является:

- ☐ эйфоричность
- ☐ состояние сознания
- ☐ запах алкоголя изо рта
- ☒ сужение зрачков

39. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ отказ от употребления алкоголя
- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в традиционных, социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях

40. Выберите правильный вариант ответа

Острые алкогольные психозы включают

- ☐ эйфория
- ☐ спокойный сон
- ☒ паранойя
- ☐ бред ревности

41. Выберите правильный вариант ответа

К физиологическим эффектам опиатов относится

- ☐ гиперестезия
- ☐ гипотимия
- ☒ угнетение дыхания
- ☐ бронхоспазм

42. Выберите правильный вариант ответа

В состоянии интоксикации опиатами не характерно

- ☐ миоз
- ☐ снижение температуры тела
- ☐ нарушение координации
- ☒ психо-моторное возбуждение

43. Выберите правильный вариант ответа

К наркотическим средствам и психотропным веществам относятся

- ☐ трихопол
- ☒ героин
- ☐ ардуан
- ☐ нарופן

44. Выберите правильный вариант ответа

Галлюциногенные эффекты каннабиноидов обычно проявляются

- ☐ при малых дозах
- ☐ при средних дозах
- ☒ при высоких дозах
- ☐ при смешивании с опилками

45. Выберите правильный вариант ответа

Внешним признаком интоксикации каннабиноидами являются

- ☐ болезненное мочеиспускание
- ☐ нарушение сердечного ритма
- ☒ сухость во рту
- ☐ офтальмоплегия

46. Выберите правильный вариант ответа

Влияние психостимуляторов наркотического ряда на сердечно-сосудистую систему проявляется

- ☒ тахикардией
- ☐ урежение пульса
- ☐ артериальной гипотензией
- ☐ отсутствие зубца Р

47. Выберите правильный вариант ответа

К абстинентным алкогольным психозам не относятся

- ☐ алкогольный делирий
- ☐ алкогольный галлюциноз
- ☐ алкогольный параноид
- ☒ астматический статус

48. Выберите правильный вариант ответа

Клиника алкогольного абстинентного синдрома проявляется

- ☐ повышение интегральных возможностей ЦНС
- ☒ диспептическими расстройствами в виде отсутствия аппетита, тошноты, нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы
- ☐ улучшение сна
- ☐ ничем из перечисленного

49. Выберите правильный вариант ответа

Социальные последствия у больных III стадии заболевания алкоголизма проявляются во всем, кроме

- ☐ неспособности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- ☐ выраженного профессионального снижения с утратой прежней квалификации
- ☐ иждивенческих тенденций
- ☒ стремления к самосовершенствованию

50. Выберите правильный вариант ответа

Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся

- ☐ отсутствием поражения паренхиматозных органов
- ☐ уменьшением влечения к спиртным напиткам
- ☒ формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- ☐ повышением сексуальной потенции

51. Выберите правильный вариант ответа

Наркомания – это хроническое заболевание

- ☐ вызванное употреблением анаболических препаратов
- ☒ характеризующееся развитием психической, физической зависимости
- ☐ характеризующееся отсутствием развития толерантности к опиатам
- ☐ характеризующееся повышением социального статуса

52. Выберите правильный вариант ответа

В развитии алкоголизма у женщин наиболее значимый фактор

- ☒ преморбидные характерологические особенности личности
- ☐ семейное благополучие

- ☐ высокий заработок
- ☐ регион проживания

53. Выберите правильный вариант ответа

Одинокое пьянство женщин, страдающих алкоголизмом, объясняется

- ☐ многодетностью
- ☒ стремлением скрыть пьянство (по морально-этическим соображениям)
- ☐ эндокринными изменениями
- ☐ жилищными проблемами

54. Выберите правильный вариант ответа

В сомнительных случаях картины алкогольного опьянения следует

- ☐ опираться на сведения подэкспертного о приеме алкоголя
- ☐ ориентироваться на запах алкоголя изо рта или утверждение очевидцев
- ☒ провести не менее 2 проб на алкоголь
- ☐ неврологические расстройства

55. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты – это

- ☐ препараты, содержащие спирт
- ☒ препараты конопли, опия
- ☐ препараты гидроксизилового крахмала
- ☐ препараты валерианы

56. Выберите правильный вариант ответа

Средства с ненаркотическим действием

- ☐ гашиш
- ☐ героин
- ☐ морфин
- ☒ атропин

57. Выберите правильный вариант ответа

Пустые ампулы из-под наркотиков уничтожаются

- ☐ старшей медсестрой
- ☒ специальной комиссией
- ☐ врачами отделения
- ☐ заведующей аптекой

58. Выберите правильный вариант ответа

Выписывание наркотиков наркоману

- ☒ запрещено
- ☐ возможно врачами наркокабинетов
- ☐ только врачебной комиссией
- ☐ с разрешения родственников

59. Выберите правильный вариант ответа

Абстинентный синдром – это

- ☒ физическая зависимость от наркотиков
- ☐ психическое заболевание
- ☐ недостаток воспитания
- ☐ отказ от лечения

60. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский критерий наркомании – это

- ☒ воздействие на центральную нервную систему
- ☐ использование наркотиков в немедицинских целях
- ☐ рост заболеваемости
- ☐ рост нарушений правил дорожного движения

61. Выберите правильный вариант ответа

Социальный критерий наркомании – это

- ☐ использование наркотиков в медицинских целях
- ☒ социальные проблемы, рост преступности
- ☐ улучшение экономики, благосостояния
- ☐ незаконная вырубка леса

62. Выберите правильный вариант ответа

Вторая стадия наркологического заболевания включает

- ☐ полную деградацию
- ☒ ломку, психозы, изменение личности по алкогольному (наркотическому) типу
- ☐ улучшение общего самочувствия
- ☐ потеря памяти

63. Выберите правильный вариант ответа

Конечная стадия наркомании включает

- ☐ диффузный атеросклероз
- ☐ остеопороз
- ☒ кахексии, полную деградацию, абстиненцию
- ☐ язвенную болезнь желудка

64. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании включает

- ☒ психологическую зависимость
- ☐ ломку
- ☐ абстиненцию
- ☐ нарушение социальной адаптации

65. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость от наркотиков проявляется в стадии

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ не развивается никогда

66. Выберите правильный вариант ответа

«Ломка» – это

- ☒ абстинентный синдром
- ☐ острое психотическое расстройство
- ☐ все перечисленное
- ☐ ничто из перечисленного

67. Выберите правильный вариант ответа

Соматические расстройства у наркоманов возникают

- ☐ в начальной стадии
- ☐ в стадии истощения
- ☒ на всем протяжении употребления психоактивных веществ
- ☐ в развернутой стадии

68. Выберите правильный вариант ответа

Токсикомания – это

- ☐ вредная привычка
- ☐ зависимость от наркотических препаратов
- ☐ прием различных ядовитых веществ
- ☒ злоупотребление средствами, не относящимися к наркотикам и являющимися токсическими веществами

69. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении приема наркотиков

- ☒ абстинентный синдром

- ☐ синдром отдачи
- ☐ синдром рикошета
- ☐ синдром Рейно

70. Выберите правильный вариант ответа

Специальные рецептурные бланки на наркотические средства должны храниться

- ☒ в сейфе
- ☐ в шкафу
- ☐ в реанимационной палате
- ☐ в ящике стола

71. Выберите правильный вариант ответа

К соматическим расстройствам при острой интоксикации галлюциногенами относится все перечисленное, кроме

- ☐ ощущения жара
- ☒ понижения температуры
- ☐ слезо- и слюнотечения
- ☐ тахикардии и подъема артериального давления

72. Выберите правильный вариант ответа

Возникновение точно таких же ощущений и реакций, которые были в период острой интоксикации спустя недели, месяцы после последнего приема наркотика, характерны для наркомании

- ☐ амфетаминами
- ☒ галлюциногенами
- ☐ опиатами
- ☐ барбитуратами

73. Выберите два правильных ответа

Правильная тактика общения с пациентом с болезнью Альцгеймера делающего ошибки в речи

- ☐ грубо исправлять
- ☒ не обращать внимания на ошибки
- ☒ успокаивать пациента для уменьшения волнения
- ☐ не разговаривать с пациентом
- ☐ вызвать врача

74. Выберите два правильных ответа

Правильных два первых действия медработника в ответ на грубость пациентки с психическими расстройствами

- ☒ сообщить врачу
- ☐ немедленно перевести в надзорную палату
- ☒ попытаться отвлечь внимание больного
- ☐ использовать методы механического стеснения
- ☐ ввести лекарственное средство

75. Выберите два правильных ответа

Инструкции пациенту перед электросудорожной терапией

- ☐ вымыть голову
- ☒ сходить в туалет
- ☐ не принимать лекарства
- ☒ не завтракать
- ☐ не бегать по отделению

76. Выберите два правильных ответа

Основными симптомами шизофрении

- ☒ отгороженность
- ☒ отрыв от реальности
- ☐ маниакальное возбуждение

- ☐ отвлекаемость
- ☐ эйфория

77. Выберите два правильных ответа

Расстройства восприятия- это

- ☒ галлюцинации
- ☐ судороги
- ☐ бред
- ☒ иллюзии
- ☐ гипербулия

78. Выберите два правильных ответа

Ведущий симптом алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
- ☒ запой
- ☐ психоорганический
- ☐ маниакальный
- ☐ гипобулия

79. Выберите два правильных ответа

Клинические признаки эпилепсии

- ☒ припадки, расстройства сознания
- ☒ изменение личности
- ☐ аутизм
- ☐ бред воздействия
- ☐ расстройства памяти

80. Выберите два правильных ответа

Навязчивыми страхами называются следующие состояния

- ☐ истерия
- ☐ депрессия
- ☒ гидрофобия
- ☒ клаустрофобия
- ☐ маниакальное возбуждение

81. Выберите два правильных ответа

Расстройства памяти

- ☒ амнезия
- ☒ парамнезия
- ☐ атрофия
- ☐ афазия
- ☐ ятрогения

82. Выберите два правильных ответа

Императивные галлюцинации- это когда

- ☒ голос приказывает покончить с собой
- ☐ больной слышит пояснения своим поступкам
- ☒ слышит голоса, которые приказывают убить
- ☐ больной отдает приказы окружающим
- ☐ больной просит избавить от мыслей о болезни

83. Выберите два правильных ответа

Навязчивые мысли- это когда больной

- ☒ не может избавиться от мыслей, возникающих помимо его желания
- ☒ понимает ненужность своих мыслей
- ☐ не хочет от них избавиться
- ☐ стремиться к их реализации
- ☐ скрывает от врача их наличие

84. Выберите два правильных ответа

Бредовые идеи- это когда больной

- ☐ хочет избавиться от мыслей
- ☐ ищет помощи
- ☒ высказывает нелепые мысли

- ☒ к мыслям нет критики
- ☐ понимает ненужность своих мыслей

85. Выберите два правильных ответа

Больной с ипохондрическим синдромом невротического уровня

- ☐ не контактен
- ☐ не критичен к своим высказываниям
- ☒ говорит, что у него возникли мысли о болезни
- ☒ просит избавить его от мыслей от болезни
- ☐ к мыслям нет критики

86. Выберите два правильных ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
- ☒ гипотимией
- ☐ агрессивностью
- ☐ злобой
- ☐ назойливостью

87. Выберите два правильных ответа

Пациент с депрессией характеризуется следующими клиническими проявлениями

- ☒ сидит в согбенной позе
- ☒ отвечает тихо, односложно
- ☐ включается в жизнь отделения
- ☐ высоким аппетитом
- ☐ эйфорией

88. Выберите два правильных ответа

Наиболее частые причины агрессии душевнобольных

- ☒ самовольное прекращение приема лекарств
- ☒ изменение психического состояния
- ☐ прием лекарств
- ☐ злоупотребление курением
- ☐ прогулки на улице

89. Выберите два правильных ответа

Правильное поведение родственников при агрессии со стороны душевнобольного

- ☒ убрать опасные предметы
- ☒ вызвать скорую психиатрическую помощь
- ☐ уйти из дома
- ☐ насильно заставить принять лекарство
- ☐ оказывать сопротивление

90. Выберите два правильных ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☒ повелительные
- ☒ императивные
- ☐ все перечисленные
- ☐ ничто не верно

91. Выберите два правильных ответа

Депрессия включает

- ☒ двигательную заторможенность
- ☒ мыслительную заторможенность
- ☐ повышенное настроение
- ☐ иллюзорные расстройства
- ☐ двигательную активность

92. Установите соответствие триады фаз биполярного аффективного расстройства

маниакаль- ная фаза	повышенное настроение, ускорен- ный темп мышления, повышенная деятельность
депрессив- ная фаза	пониженное настроение, замедлен- ный темп мышления, понижение активности
	пониженное настроение, ускоре- нный темп мышления, понижение активности
	повышенное настроение, замедлен- ный темп мышления, повышенная деятельность

**93. Установите соответствие психических на-
рушений и их симптомов**

нарушение воспри- ятия	иллюзии, галлюцинации
нарушения мышления	обстоятельность, ускоре- ние
	парамнезия, амнезия
	эйфория, аффект

**94. Соответствие выраженности абстинентного
синдрома в зависимости от наркотика**

значительная	опиаты
незначитель- ная	препараты конопли
	тетурам
	налоксон

**95. Установите соответствие фобий и их значе-
ний**

канцерофо- бия	навязчивый страх заболеть рако- вой опухолью
гидрофобия	навязчивый страх воды
	навязчивый страх крови
	навязчивый страх заболеть СПИ- Дом

**96. Соответствие заболеванию характерной па-
тологии мышления**

эпилепсия	вязкость, обстоятельность
депрессия	замедленность

	ускоренное мышление
	наплыв мыслей

**97. Установите соответствие заболеванию кли-
нических проявлений**

эпилепсия	сумеречное состояние
шизофрения	аутизм, отрыв от реальности
	раздражительная слабость
	быстрая переключаемость

**98. Соответствие реакции зрачков на опьянение
психоактивными веществами**

узкие зрачки	героин
широкие зрачки	гашиш, анаша
	LSD
	галлюциногенные грибы

**99. Установите соответствие группы препара-
тов и вещества**

снотворные, седативные	фенобарбитал
препараты ко- нопли	анаша, план
	героин
	маковая соломка

**100. Установите соответствие психических на-
рушений и их симптомов**

нарушение па- мяти	амнезия, гипермнезия
нарушение мышления	бредовые идеи
	галлюцинации, иллюзии
	эйфория, аффект

**101. Установите соответствие психических на-
рушений и их симптомов**

нарушение эмоций	тоска, гипотимия
нарушение восприятия	галлюцинации, иллюзии
	обстоятельность
	гипербулия, дромомания

**2. Знания современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и
владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой
профессиональной деятельности**

102. Выберите два варианта ответа

СПИД-маркерные заболевания

- ☐ саркома Капоши у больных старше 60 лет
☒ пневмоцистная пневмония
☒ кандидоз пищевода, трахеи, бронхов
☐ дизентерия

103. Выберите правильный вариант ответа

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характе-
ризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при от-
сутствии антител в крови

- ☐ наличием вируса в организме пациента при оп-
ределении антител в крови

- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при
наличии антител в крови

- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при
отсутствии антител в крови

104. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный срок для начала приема антиретро-
вирусных препаратов медицинским работником
после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
☒ 2 часа

- ☐ 4 часа
- ☐ 1 сутки
- ☐ 3 суток

105. Выберите правильный вариант ответа

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

106. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции

- ☒ серологические
- ☐ генетические
- ☐ люминесцентные
- ☐ бактериологические

107. Выберите правильный вариант ответа

Шоковый индекс Альговера – это соотношение

- ☒ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению систолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к артериальному давлению систолическому

108. Выберите правильный вариант ответа

Нижняя граница систолического артериального давления для назначения нитроглицерина

- ☐ 100 мм рт. ст.
- ☒ 90 мм рт. ст.
- ☐ 110 мм рт. ст.
- ☐ 80 мм рт. ст.

109. Выберите правильный вариант ответа

Для купирования анафилактического шока адреналин разводят физиологическим раствором в следующем соотношении

- ☐ 1 : 5
- ☐ 1 : 1
- ☐ 1 : 20
- ☒ 1 : 10
- ☐ 1 : 2

110. Выберите правильный вариант ответа

Купирование анафилактического шока начинается с введения

- ☒ адреналина
- ☐ полиглюкина
- ☐ димедрола
- ☐ преднизолона

111. Выберите правильный вариант ответа

Клинические признаки гипергликемической комы

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная холодная, одышка, зрачки различной величины

- ☒ сознание отсутствует, кожа сухая, гиперемированная, дыхание шумное типа Куссмауля
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

112. Выберите правильный вариант ответа

При обнаружении признаков заболевания туберкулезом больного направляют в противотуберкулезный диспансер в течение

- ☒ 3 дней
- ☐ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 дня

113. Выберите правильный вариант ответа

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д

114. Выберите правильный вариант ответа

Профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год

- ☐ ВИЧ-инфицированные
- ☐ военнослужащие
- ☒ больные с язвенной болезнью желудка
- ☐ лица, проживающие в домах престарелых

115. Выберите правильный вариант ответа

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

116. Выберите правильный вариант ответа

Площадь ожога правой нижней и верхней конечностей по правилу «девятки», составляет

- ☐ 39 %
- ☐ 45 %
- ☒ 27 %
- ☐ 36 %

117. Выберите правильный вариант ответа

Страховые взносы работодателей на обязательное медицинское страхование в ФОМС

- ☐ 2,6 %
- ☐ 3,1 %
- ☒ 5,1 %
- ☐ 14 %

118. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- ☐ 14-ти летнего возраста
- ☒ 15-ти летнего возраста
- ☐ 16-ти летнего возраста
- ☐ 17-ти летнего возраста

119. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- ☒ да
- ☐ нет
- ☐ исходя из обстоятельств
- ☐ по согласованию

120. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- ☐ обязательного
- ☒ добровольного
- ☐ любого
- ☐ всеобщего

121. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

- ☐ отсутствие болезней
- ☐ нормальное функционирование всех систем организма
- ☒ состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- ☐ состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

122. Выберите правильный вариант ответа

Химическую дезинфекцию медицинского инструментария проводят

- ☐ паром под давлением
- ☐ сухим горячим воздухом
- ☐ УФО
- ☒ дезинфицирующими средствами

123. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция бактерицидных ламп проводится раствором

- ☐ перекиси водорода 3-процентной
- ☐ перекиси водорода 6-процентной
- ☐ хлорамина 4-процентного
- ☒ этилового спирта 70-процентного

124. Выберите правильный вариант ответа

Уборочный инвентарь между уборками хранится

- ☐ в процедурном кабинете
- ☐ в специальном шкафу в процедурном кабинете
- ☒ вне помещений рабочих кабинетов
- ☐ в отдельном помещении

125. Определите последовательность действий, если кровь или другой биологический материал попал на одежду

- 1: кожу под загрязнённой одеждой протереть салфеткой, пропитанной 70% спиртом
- 2: загрязнённую одежду снять
- 3: загрязнённую одежду замочить в дезсредстве
- 4: полоскать в воде загрязнённую одежду
- 5: стирать загрязнённую одежду

126. Определите последовательность действий, если кровь или другой биологический материал попал на открытые части тела

1: обработать салфеткой, пропитанной 70% спиртом

2: вымыть водой с мылом

3: повторно обработать салфеткой, пропитанной 70% спиртом

127. Определите последовательность действий, если кровь или другой биологический материал попал на слизистые оболочки глаза

1: промыть струей воды

2: немедленно закапать раствор сульфацила натрия или 1% раствор борной кислоты (или 1% азотно-кислого серебра)

128. Определите последовательность действий, при определении кожных покровов (укол, порез и т.д.)

1: перчатки обработать дезраствором

2: снять перчатки

3: выдавить кровь

4: обработать руки салфеткой, пропитанной 70% спиртом

5: тщательно вымыть руки водой с мылом

6: обработать рану 5% раствором йода

129. Выберите правильный ответ

В России принят специальный закон о ВИЧ «О предупреждении распространения на территории РФ заболевания, вызываемого ВИЧ»

☒ № 38-ФЗ

☐ № 323-ФЗ

☐ № 124-ФЗ

☐ № 326-ФЗ

130. Выберите правильный ответ

Опportunистическое заболевание самое распространённое в России

☒ туберкулёз

☐ саркома Капоши

☐ цитомегаловирус

☐ пневмония

131. Выберите правильный ответ

Статья 122 УК «Заражение ВИЧ-инфекцией» предусматривает наказания в следующем случае

☒ если человек знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и заразил другого человека

☐ если человек не знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и заразил другого человека

☐ если человек знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и сообщил об этом другому человеку

☐ если сексуальный партнёр добровольно согласился на действия опасные в плане заражения ВИЧ-инфекции

132. Последовательность оказания помощи при открытом переломе

1: остановка кровотечения

2: повязка на рану

3: обезболивание

4: иммобилизация

133. Определите последовательность появления симптомов пролежня

1: очаг побледнения кожи

2: гиперемия кожи

3: отёк кожи

4: отслаивание эпидермиса

134. Определите последовательность действий при промывании желудка зондовым способом

1: держать воронку на уровне желудка

2: налить в воронку жидкости для промывания

3: поднять воронку выше уровня желудка пока вода не дойдёт до устья воронки

4: опустить воронку ниже уровня желудка и вылить содержимое

135. Определите соответствие сестринских вмешательств от периода лихорадки

первый период лихорадки	согреть, укрыть теплом
второй период лихорадки	холод к голове
	провести ножные ванны

136. Определите соответствие сестринских вмешательств при следующих состояниях

обмороке	к носу вату, смоченную нашатырным спиртом
коллапсе	обеспечить приток свежего воздуха, грелку к ногам
	придать положение с возвышенным изголовьем

137. Определите место наложение жгута по отношению к ране при

венозном кровотечении	ниже раны
артериальном кровотечении	выше раны
	место не имеет значение

138. Определите последовательность этапов сестринского процесса

1: обследование

2: диагностика

3: планирование

4: реализация

5: оценка

139. Установите соответствие между видом обследования и его значением

аускультация	выслушивание
перкуссия	выстукивание
пальпация	ощупывание
	измерение роста и массы тела

140. Установите соответствие между методом дезинфекции и способом

химический	применение моющих и дез.растворов
физический	кипячение
	мытьё, выхлапывание

141. Установите соответствие между № приказа и его названием

ОСТ 42-21-2-85	"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"
приказ № 408	"О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стра-

	не"
	"О борьбе с педикулезом"

142. Установите соответствие пути и способа введения лекарственных средств

парентеральный	в вену
энтеральный	в прямую кишку
	через дыхательные пути

143. Установите соответствие между термином и определением

кризис	быстрое снижение температуры
лизис	постепенное снижение температуры
	повышение температуры тела до 37 С0

144. Установите соответствие между названием запора и температурой воды для клизмы

атонический запор	12-20 С0
спастический запор	37-42 С0
	20-25 С0

145. Определите соответствие между дистанциями при общении

интимная	от 15 до 45 см
личная	45–120 см
социальная	120 до 400 см
	от 400 см и более

146. Установите соответствие между методами дезинфекции

встряхивание, мытьё, протираание, влажная уборка	механический
кипячение, пастеризация, УФ облучение, воздействие горячего воздуха	физический
орошение, протираание, погружение в дезинфектанты	химический
антагонистическое действие микроорганизмов	биологический
	комбинированный

147. Установите соответствие между анализом мочи и целью исследования

по Нечипоренко	количественное определение форменных элементов в моче
на диастазу	определение функционального состояния поджелудочной железы
	определение функционального состояния печени

148. Установите соответствие между этапом сестринского процесса и видом деятельности

сестринское обследование	сбор и оценка данных о состоянии пациента
сестринская диагностика	выявление потребностей (проблем) пациента
планирование	определение целей и ожидаемые результаты
реализация	выполнение плана сестринского ухода
	определение степени достижения целей

149. Определите последовательность этапов генеральной уборки в медицинских организациях

1: дезинфекция и мытье (включить бактерицидные лампы)

2: обработка поверхностей сухой стерильной ветошью или смывание дезраствора водой

3: включение бактерицидной лампы на время согласно инструкции по эксплуатации данного типа лампы

4: проветривание помещения в течение 15-30 минут

150. Выберите правильный вариант ответа

Одно из обязательных условий лечения алкоголизма психотропными препаратами

☐ применение антидепрессантов

☐ дифференцированность показаний

☐ контроль соматического и неврологического состояния

☒ назначение лечения короткими курсами

151. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома используются средства

☐ барьерные контрацептивы

☒ полиионные растворы, витамины, ноотропы,

☐ антибиотики

☐ пеногасители

152. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

☐ с преобладанием антипсихического эффекта

☒ с преобладанием седативного эффекта

☐ с преобладанием стимулирующего средства

☐ ультракороткого действия

153. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показаниями для назначения транквилизаторов являются

☐ когнитивные расстройства

☐ низкое артериальное давление

☒ актуализация патологического влечения к алкоголю

☐ расстройства мочеиспускания

154. Выберите правильный вариант ответа

Диагнозы алкоголизма, наркомании устанавливаются

☒ пожизненно

☐ на период диспансерного наблюдения

☐ на период активного лечения в связи с рецидивом заболевания

☐ на период употребления алкоголя, наркотика

155. Выберите правильный вариант ответа

При психотических расстройствах вследствие злоупотребления НС и ПТВ показана госпитализация

☒ в недобровольном порядке в психиатрический стационар

☐ в экстренном порядке в отделение токсикологии

☐ в терапевтическое отделение

☐ в хирургическое отделение

156. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкогольного абстинентного синдрома чаще используются нейролептики

☐ с преобладанием антипсихического эффекта

☒ с преобладанием седативного эффекта

☐ с преобладанием стимулирующего средства

☐ с преобладанием экстрапирамидных нарушений

157. Выберите правильный вариант ответа

При лечении больных алкоголизмом показанием для назначения транквилизаторов не является

☐ неврозоподобные и психоподобные расстройства

☐ аффективные нарушения

☐ актуализация патологического влечения к алкоголю

☒ сердечно-сосудистая патология

158. Выберите правильный вариант ответа

Показания для назначения ноотропов у больных алкоголизмом

☐ азотемия

☒ нарушение памяти и интеллекта

☐ пониженный сердечный выброс

☐ гипертермия

159. Выберите правильный вариант ответа

При лечении алкоголизма у лиц с язвенной болезнью желудка используются

☒ метронидазол (трихопол)

☐ аспирин

☐ искусственная гипотермия

☐ условно-рефлекторная терапия

160. Выберите правильный вариант ответа

К общеукрепляющим и тонизирующим средствам, используемым в наркологической практике, относятся

☒ витамины, ноотропы

☐ H₂-блокаторы

☐ местные анестетики

☐ аминокликозиды

161. Выберите правильный вариант ответа

К тиоловым препаратам, используемым в наркологической практике, относятся

☐ сульфат магния

☒ 5-процентный унитиол

☐ гемодез

☐ тироксин

162. Выберите правильный вариант ответа

По медицинским показаниям наркотики не назначаются

☐ онкологическим больным

☐ в послеоперационном периоде

☒ при зубной боли

☐ в момент проведения общей внутривенной анестезии

163. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства парентерального и перорального применения хранятся

☐ вместе

☒ отдельно

☐ в рентген-кабинете

- ☐ в приёмной главного врача

164. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния у пациента необходимо

- ☒ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
☐ направить его на обследование к психиатру
☐ провести дезинтоксикацию на месте
☐ сделать микроклизму

165. Выберите правильный вариант ответа

При малейших признаках наркотического состояния необходимо

- ☐ вызвать бригаду скорой медицинской помощи
☐ направить пациента в поликлинику для обследования
☒ направить пациента к наркологу
☐ направить на санаторное лечение

166. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические препараты выписываются

- ☒ на латинском языке
☐ на русском языке
☐ на русском и латинском языках
☐ на английском

167. Выберите правильный вариант ответа

Требования на наркотические препараты выписываются

- ☒ на отдельных бланках в 3 экземплярах
☐ на общих бланках в 2 экземплярах
☐ в журнале назначений
☐ в истории болезни

168. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические вещества в лечебно-профилактическом учреждении хранятся

- ☐ в соответствующих наборах по оказанию посиндромной неотложной помощи
☒ в специальных помещениях в соответствии с требованиями
☐ в подвальном помещении
☐ у главного врача

169. Выберите правильный вариант ответа

Места хранения наркотиков необходимо обеспечить

- ☐ звукоизоляцией
☒ охранной сигнализацией
☐ милицейским постом
☐ свободным доступом

170. Выберите правильный вариант ответа

Пероральный прием наркотических лекарственных средств производится

- ☒ только в присутствии медицинского персонала
☐ независимо от присутствия медсестры
☐ втайне от окружающих
☐ после приёма пищи

171. Выберите правильный вариант ответа

Запас наркотических лекарственных средств в отделениях

- ☐ не более, чем на 12 часов
☒ не должен превышать 3-дневной потребности
☐ не должен превышать недельный запас

- ☐ не должен превышать 10-дневной потребности

172. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика наркозаболеваний включает

- ☐ недопущение переохлаждения
☒ психопрофилактику
☐ лечение алкоголизма
☐ лечение кариеса

173. Выберите правильный вариант ответа

Психопрофилактика – это

- ☒ санитарное просвещение
☐ соблюдение санэпидрежима
☐ посещение музеев
☐ посещение солярия

174. Выберите правильный вариант ответа

Зондовое питание при отказах от пищи назначают через

- ☒ 3 дня
☐ 3 часа
☐ 7 дней
☐ 10 дней

175. Выберите правильный вариант ответа

Препарат, усиливающий чувство голода

- ☐ транексам
☐ трихопол
☒ инсулин
☐ юнидокс солютаб

176. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные средства, основным побочным действием которых является нейролептический синдром

- ☐ антидепрессанты
☒ нейролептики
☐ транквилизаторы
☐ нормотимики

177. Выберите правильный вариант ответа

Психотерапия – это воздействие

- ☒ словесное
☐ физическое
☐ тепловое
☐ электрическое

178. Выберите правильный вариант ответа

Купирование возбуждения при психотических расстройствах на догоспитальном этапе осуществляется

- ☐ транквилизаторы
☒ нейролептики
☐ ноотропы
☐ психостимуляторы

179. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся больному:

- ☐ по назначению любого медицинского работника
☐ по назначению заведующего отделением
☐ комиссионно
☒ строго по назначению врача

180. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства вводятся пациенту:

- ☒ в присутствии врача

- ☐ в присутствии родственников больного
- ☐ в присутствии средних медицинских работников
- ☐ самостоятельно самим пациентом

181. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо при ортостатическом коллапсе пациенту, получающему нейрелептики,

- ☐ ввести по назначению врача сердечные средства, кислород под кожу
- ☒ поднять нижние конечности, провести ингаляцию кислорода, инфузионную терапию
- ☐ по назначению врача отменить нейрелептики, дать обезболивающее
- ☐ сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на область спины

182. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное условие при промывании желудка больному в коме

- ☐ сохранённый кашлевой рефлекс
- ☐ приподнятый головной конец
- ☒ изоляция дыхательных путей посредством эндотрахеальной интубации
- ☐ высокое артериальное давление

183. Выберите правильный вариант ответа

При передозировке наркотических средств, введённых внутривенным путём, наиболее частым осложнением является

- ☐ снижение артериального давления
- ☐ повышенная чувствительность к адреналину
- ☐ расширение зрачка с вывихом хрусталика
- ☒ остановка дыхания

184. Выберите правильный вариант ответа

Транспортировка пациента, в состоянии комы, при отсутствии возможности проведения искусственной вентиляции путём эндотрахеальной интубации, проводится в положении

- ☐ вниз головой
- ☒ на левом боку с приподнятым головным концом
- ☐ на правом боку
- ☐ на спине, с введённым в рот воздуховодом

185. Выберите правильный вариант ответа

При промывании желудка пациенту с алкогольной интоксикацией используем

- ☐ слабый щелочной раствор
- ☐ слабый раствор уксусной кислоты
- ☒ чистую воду
- ☐ раствор марганцевого калия

186. Выберите правильный вариант ответа

Укажите лекарственное средство, применяемое в случаях угнетения дыхания при передозировке опиатов

- ☐ кетамин
- ☒ налоксон
- ☐ бриетал
- ☐ прозерин

187. Выберите правильный вариант ответа

К методам детоксикации при отравлении алкоголем не относится

- ☐ промывание желудка
- ☐ переливание изотонических растворов внутривенно
- ☐ стимуляция диуреза
- ☒ переливание свежесмороженной плазмы

188. Выберите правильный вариант ответа

Женщина во время ссоры с мужем громко кричит, медленно оседает на пол, выгибается дугой, отмечаются размашистые движения руками, мотает головой, через некоторое время обмякает, начинает плакать, данное состояние называется

- ☐ кататонического возбуждения
- ☒ истерического припадка
- ☐ психопатоподобного возбуждения
- ☐ эпилептического припадка

189. Выберите два правильных варианта ответа

Биологическими методами лечения называют

- ☒ электросудорожная терапия
- ☒ инсулиношочковая терапия
- ☐ медикаментозная терапия
- ☐ психотерапия
- ☐ фотодинамическая терапия

190. Выберите правильный вариант ответа

Пациент неподвижно сидит в вычурной позе с полусогнутыми руками, мышцы напряжены, не позволяет себя уложить, не встает, иногда совершает однообразные движения кистями рук, инструкции врача не выполняет или делает наоборот, данное состояние

- ☐ эпилептиформного синдрома
- ☐ неврозоподобного синдрома
- ☐ психоорганического синдрома
- ☒ кататонический синдром

191. Определите последовательность действий при проведении электросудорожной терапии

- 1: уложить пациента
- 2: освободить от стесняющей одежды
- 3: смочить височные области изотоническим раствором NaCl
- 4: наложить на височные области электроды

192. Последовательность действий при проведении инсулиношочковой терапии

- 1: уложить пациента на кушетку
- 2: ввести пациенту под наблюдением врача инсулин
- 3: проводить наблюдение за пациентом
- 4: ввести пациенту по назначению врача глюкозу, если пациента не удалось накормить

193. Определите последовательность действий при фиксации пациента

- 1: изолировать пациента, удалив всех из помещения
- 2: подойти к пациенту сзади
- 3: фиксировать ноги и руки
- 4: удерживать голову, положив на лоб полотенце и прижав его
- 5: ввести препараты по назначению врача

194. Последовательность кормления пациента при отказе от еды

- 1: попытаться выяснить мотивы отказа
- 2: попытаться уговорить принять пищу добровольно
- 3: ввести подкожно инсулин по назначению врача
- 4: ввести раствор глюкозы по назначению врача
- 5: кормить пациента через зонд

195. Определите последовательность оказания помощи при эпилептическом приступе

- 1: убрать острые и твердые предметы
- 2: расстегнуть стесняющую одежду
- 3: повернуть больного на бок
- 4: наблюдать за состоянием пациента

196. Определите последовательность действий при злокачественном нейролептическом синдроме

- 1: отмена нейролептической терапии
- 2: постоянный мониторинг жизненных функций
- 3: устранение гипертермии
- 4: ликвидация экстрапирамидных нарушений

197. Установите соответствие между видом наблюдения и проблемами пациента

строгий надзор	агрессия
усиленное наблюдение	соматическая ослабленность
	повышенная общительность
	нарушение речи

198. Установите соответствие между видом надзора за пациентами и психическим состоянием

строгий надзор	с депрессивными состояниями
усиленное наблюдение	получающие инсулиношоковую терапию
	пациенты с ретроградной амнезией
	маниакальное состояние без склонности к агрессии

199. Выберите правильный вариант ответа

Классифицируйте состояние подростка, который Выкурил подряд 5 сигарет, появилось ощущение сжатия в горле, животе, многократная рвота, головная боль, лицо бледное, зрачки сужены, развился ступор, судороги, расширились зрачки, пульс интенсивный, АД резко снизилось

- ☐ легкая степень никотиновой интоксикации
- ☐ средняя степень никотиновой интоксикации

- ☒ тяжелая степень никотиновой интоксикации
- ☐ состояние абстиненции

200. Выберите правильный вариант ответа

Определите наркотик который принимает мужчина, 28 лет, у него тревога, страх, растерянность, видит страшные лица, при осмотре обнаружены хронический ринит, изъязвления слизистой носа, некроз носовой перегородки

- ☐ героин
- ☐ гашиш
- ☐ амфетамин
- ☒ кокаин

201. Выберите правильный вариант ответа

Определите тактику в отношении мужчины, 42 лет, который поступил в хирургическое отделение с обострением хронического панкреатита, злоупотребляет алкоголем с 22 лет, на вторые сутки в больнице развился алкогольный делирий

- ☐ срочно транспортировать в психиатрическую больницу
- ☐ срочно транспортировать в наркологическую больницу
- ☐ отправить на консультацию в наркологический диспансер
- ☒ купировать возбуждение на месте и продолжить лечение панкреатита

202. Выберите правильный вариант ответа

Определите, наркотик который употребляет девушка 15 лет приготовленный из противостудных лекарств «эффект» и «флюколд», после пяти инъекций появилась зависимость, через полгода речь у неё замедленная, движения неловкие, почерк грубо нарушен, ухудшились память

- ☐ кокаин
- ☒ эфедрон
- ☐ первитин
- ☐ амфетамин

203. Выберите правильный вариант ответа

После употребления героина внутривенно пациент длительно находился в положении на корточках в подъезде дома, у него возможно осложнения

- ☐ аспирационная пневмония
- ☐ переломы лодыжек
- ☒ синдром длительного сдавления нижних конечностей
- ☐ пролежни области ягодиц

3. Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления сестринского диагноза

204. Выберите правильный ответ

Мужчина 42 лет, хочет стать донором, после обследования у него выявлено следующее относительное противопоказание к донорству

- ☐ вирусный гепатит С и В
- ☐ ВИЧ-инфекция
- ☐ наркомания
- ☒ хронический гепатит

205. Выберите правильный ответ

Медицинской сестре на семинаре по проблемам ВИЧ/СПИДа были заданы вопросы, об следующих оппортунистических инфекциях, сопровождающих ВИЧ инфекцию, за исключением

- ☐ кандидоза
- ☐ туберкулёза
- ☐ герпетической инфекции

- ☒ панкреатита

206. Выберите правильный ответ

О положительном результате теста на ВИЧ медицинский работник без согласия пациента может сообщить

- ☒ не должен никому сообщать из перечисленных
☐ родственникам
☐ друзьям
☐ по месту работы

207. Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему с синдромом

1: длительного сдавления

2: наложение жгута

3: обезболивание

4: освобождение сдавленной конечности

5: наложение асептической повязки

6: наружное охлаждение конечности

208. Выберите правильный вариант ответа

Физическая зависимость при приеме галлюциногенов развивается

- ☐ в короткие сроки
☐ спустя полгода от начала систематического приема
☐ спустя год от начала систематического приема
☒ не развивается вообще

209. Выберите правильный вариант ответа

Последствиями злоупотребления галлюциногенами являются все перечисленные, исключая

- ☐ агрессивные действия
☐ суициды из-за устрашающих галлюцинаций
☐ хромосомные нарушения
☒ острые депрессивные реакции

210. Выберите правильный вариант ответа

Случаи ятрогенной наркомании препаратами группы опия не встречаются

- ☐ хирургической практики
☒ педиатрической практики
☐ онкологической практики
☐ терапевтической практики

211. Выберите правильный вариант ответа

Опийные ятрогенные наркомании редко развиваются у пациентов, длительно страдающих

- ☐ болевым синдромом, фантомными болями
☐ неблагоприятным исходом оперативного вмешательства
☐ хроническими костно-суставными болезнями
☒ заболеваниями печени

212. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманы, отказывающиеся от лечения, привлекаются к

- ☐ уголовной ответственности
☒ принудительному лечению
☐ поддерживающей терапии транквилизаторами
☐ замене парентеральных препаратов на пероральные

213. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое привыкание к наркотику при лечении по медицинским показателям

- ☐ подлежит уголовной ответственности

- ☒ не наказуемо

- ☐ преследуется в административном порядке

- ☐ переводятся на пожизненный приём наркотиков

214. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник при галлюцинировании пациента должен

- ☐ противоречить больному
☐ не предпринимать никаких действий
☒ доложить дежурному врачу
☐ назначить строгий надзор

215. Выберите правильный вариант ответа

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- ☒ маниакальной фазы маниакально - депрессивного психоза
☐ депрессивной фазы маниакально - депрессивного психоза
☐ эпилепсии
☐ кататонического синдрома

216. Выберите правильный вариант ответа

Афазия- это

- ☒ нарушение речи
☐ одна из форм мутизма
☐ проявление кататонии
☐ нарушение глотания

217. Выберите правильный вариант ответа

Психическая ятрогения- это болезненное состояние, возникающее в результате неправильного

- ☒ поведения медицинского работника в отношении больного
☐ медикаментозного лечения заболевания
☐ определение диагноза заболевания
☐ ухода за больными

218. Выберите правильный вариант ответа

Психогении- заболевания, возникающие под влиянием

- ☒ психической травмы
☐ тяжелых травм головного мозга
☐ инфекций головного мозга
☐ алкогольной интоксикации

219. Выберите правильный вариант ответа

Решающее значение в развитии неврозов имеет

- ☒ психогенный фактор
☐ нейроинфекция
☐ черепно- мозговая травма
☐ сосудистые заболевания головного мозга

220. Выберите правильный вариант ответа

Снотворные противосудорожные

- ☐ настой ромашки
☒ люминал
☐ кодеин
☐ кордамин

221. Выберите правильный вариант ответа

Стимуляторы центральной нервной системы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

- ☐ дофамин

- ☒ фенамин
- ☐ фенатин
- ☐ аминазин

222. Выберите правильный вариант ответа

Транквилизаторы, вызывающие при злоупотреблении психологическую зависимость

- ☐ дроперидол
- ☒ седуксен
- ☐ люминал
- ☐ веронал

223. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания – это

- ☒ одновременное употребление нескольких наркотиков, в том числе алкоголя
- ☐ одновременное употребление легких и крепких алкогольных напитков
- ☐ атравгация хирургических заболеваний с целью получения наркоза
- ☐ аноксическое повреждение центральной нервной системы

224. Выберите правильный вариант ответа

Антигистаминные препараты, используемые лицами с наркотической зависимостью для усиления эффекта психоактивных веществ

- ☐ преднизолон
- ☒ супрастин
- ☐ тавегил
- ☐ хлористый кальций

225. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

- ☐ больной человек, принимающий наркотические средства
- ☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков
- ☐ любитель кока-колы
- ☐ человек, выращивающий коноплю

226. Выберите правильный вариант ответа

Начальная стадия наркомании состоит из

- ☒ психологической зависимости
- ☐ ломки
- ☐ абстиненции
- ☐ асоциальное поведение

227. Выберите правильный вариант ответа

Деграция личности при наркомании развивается

- ☐ при приеме наркотиков
- ☐ в развернутой стадии
- ☒ в стадии истощения
- ☐ при первом приёме наркотиков

228. Выберите правильный вариант ответа

К летучим наркотически действующим веществам (ЛДНВ) не относится

- ☐ ацетон
- ☐ четырёххлористый углерод
- ☒ глицерин
- ☐ бутан

229. Выберите правильный вариант ответа

Расстройства восприятия- это

- ☒ галлюцинации

- ☐ судороги
- ☐ бред
- ☐ гипербулия

230. Выберите правильный вариант ответа

Дромомания- это расстройство

- ☒ волевой сферы
- ☐ памяти
- ☐ эмоциональной сферы
- ☐ восприятия

231. Выберите правильный вариант ответа

Деменция-это

- ☒ слабоумие, приобретенное в процессе болезни
- ☐ врожденное слабоумие
- ☐ тоскливое настроение
- ☐ легкая степень слабоумие

232. Выберите правильный вариант ответа

Состояния выключения сознания

- ☒ кома
- ☐ делирий
- ☐ сумеречное помрачение сознания
- ☐ онейроид

233. Выберите правильный вариант ответа

Аура встречается при

- ☒ эпилепсии
- ☐ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

234. Выберите правильный вариант ответа

Идиотия встречается при

- ☒ олигофрении
- ☐ психопатии
- ☐ шизофрении
- ☐ эпилепсии

235. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий в народе называют

- ☒ белой горячкой
- ☐ алкоголизмом
- ☐ пьянством
- ☐ тунеядством

236. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий характеризуется

- ☒ зрительными галлюцинациями
- ☐ бредовыми идеями
- ☐ навязчивыми идеями
- ☐ фиксационной амнезией

237. Выберите правильный вариант ответа

Метод исследования для получения информации о наличии галлюцинации у больного

- ☐ электроэнцефалография
- ☐ рентгенограмма черепа
- ☐ эхоэнцефалография
- ☒ наблюдение за поведением пациента

238. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия у пациента постоянно слышащего внутри головы голоса

- ☐ иллюзии
- ☐ гиперестезии
- ☐ ускорение мышления

- ☒ псевдогаллюцинации

239. Выберите правильный вариант ответа

При ипохондрическом бреде больной считает, что

- ☒ у него тяжелая болезнь
☐ его обворовывают
☐ он преступник
☐ его хотят отравить

240. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии- это

- ☒ искаженное восприятие существующего объекта
☐ восприятие несуществующего объекта
☐ нечеткое восприятие реальности
☐ увеличенное восприятие реального объекта

241. Выберите правильный вариант ответа

При навязчивых идеях больной

- ☒ критичен к своим высказываниям
☐ формально критичен
☐ без критики к патологическим мыслям
☐ утрачивает критику на высоте эмоционального аффекта

242. Выберите правильный вариант ответа

Деменция является патологией

- ☐ эмоций
☐ воли
☐ запоминания
☒ интеллекта

243. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивное состояние характеризуется

- ☒ тоской
☐ агрессивностью
☐ злобой
☐ назойливостью

244. Выберите правильный вариант ответа

Пациент с депрессией не высказывает мыслей

- ☐ самоуничижения
☒ изобретательности
☐ греховности
☐ собственной никчемности

245. Выберите правильный вариант ответа

Апатия характеризуется

- ☐ педантичностью
☐ беспокойством
☒ безразличием
☐ тревогой

246. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивный синдром опасен в плане совершения

- ☒ суицида
☐ побега
☐ нападения на персонал
☐ криминальных действий

247. Выберите правильный вариант ответа

Кататонический синдром встречается при

- ☒ шизофрении
☐ неврозах
☐ эпилепсии
☐ умственной отсталости

248. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасным для окружающих является пациент

- ☐ с фиксационной амнезией
☒ с кататоническим возбуждением
☐ с комментирующими псевдогаллюцинациями
☐ с кататоническим ступором

249. Выберите правильный вариант ответа

Патологическая нелепая идея, не поддающаяся разубеждению, называется

- ☒ бредовой
☐ навязчивой
☐ сверхценной
☐ бессмысленной

250. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воспоминаний у больного

- ☐ гипомнезией
☐ парамнезией
☒ амнезией
☐ гипермнезией

251. Выберите правильный вариант ответа

Депрессивные больные чаще совершают суицид

- ☒ на выходе из депрессии
☐ перед выпиской
☐ независимо от лечения
☐ в любое время суток

252. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий синдром алкогольной зависимости

- ☒ абстинентный
☐ астеновегетативный
☐ психоорганический
☐ расстройство сознания

253. Выберите правильный вариант ответа

Характерный для белой горячки синдром

- ☐ судорожный
☒ расстройство сознания
☐ слабоумия
☐ невротический

254. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространенный способ употребления гашиша

- ☐ жевание
☒ курение
☐ прием вовнутрь
☐ под кожу

255. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее злокачественным алкоголизмом является

- ☒ женский
☐ мужской
☐ различий нет
☐ одинаковый и женский и мужской

256. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для

- ☐ шизофрении
☐ сосудистой деменции
☒ болезни Альцгеймера
☐ депрессии

257. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная, медленная речь присуща больным с

- ☐ кататонией
- ☐ бредом преследования
- ☐ бредом громадности
- ☒ депрессией

258. Выберите правильный вариант ответа

Врач, описавший тотальное слабоумие с распадом речи

- ☐ Г. Вернике
- ☒ А. Альцгеймер
- ☐ А. Пике
- ☐ С. Корсаков

259. Выберите правильный вариант ответа

Стадий алкоголизма

- ☒ три
- ☐ одна
- ☐ четыре
- ☐ две

260. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение восприятия при отсутствии объекта это

- ☐ иллюзии
- ☒ галлюцинации
- ☐ амнезия
- ☐ гипотимия

261. Выберите правильный вариант ответа

Врожденное или рано приобретенное снижение интеллекта

- ☒ олигофрения
- ☐ деменция
- ☐ депрессия
- ☐ дромомания

262. Выберите правильный вариант ответа

Количество фаз при судорожном эпилептическом припадке

- ☐ три
- ☐ две
- ☒ четыре
- ☐ пять

263. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение мышления

- ☐ аффект
- ☐ тоска
- ☒ обстоятельность
- ☐ гипермнезия

264. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение воли

- ☒ гипобулия
- ☐ иллюзии
- ☐ гипобулемия
- ☐ эйфория

265. Выберите правильный вариант ответа

Строгий надзор за пациентами

- ☐ соматически ослабленные
- ☒ с агрессивными состояниями
- ☐ с ретроградной амнезией
- ☐ получающие инсулиношоковую терапию

266. Выберите правильный вариант ответа

Усиленное наблюдение за пациентами

- ☒ соматически ослабленные
- ☐ с депрессивным состоянием
- ☐ с агрессивным состоянием
- ☐ с фиксационной амнезией

267. Выберите правильный вариант ответа

Повышенное, очень радостное настроение

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ эйфория
- ☐ амнезия

268. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивый страх воды

- ☒ гидрофобия
- ☐ клаустрофобия
- ☐ спидофобия
- ☐ канцерофобия

269. Выберите правильный вариант ответа

Мышление при эпилепсии

- ☐ замедленное
- ☒ вязкое
- ☐ ускоренное
- ☐ наплыв мыслей

270. Выберите правильный вариант ответа

Пограничное расстройство психики

- ☐ депрессия
- ☐ мания
- ☐ психоз
- ☒ невроз

271. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерно

- ☒ аутизм
- ☐ дисфория
- ☐ отвлекаемость
- ☐ раздражительная слабость

272. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти фантастическими событиями

- ☐ псевдореминисценции
- ☒ конфабуляции
- ☐ иллюзии
- ☐ сопор

273. Выберите правильный вариант ответа

Заполнение пробелов памяти событиями, которые в прошлом происходили с больным

- ☒ псевдореминисценции
- ☐ конфабуляции
- ☐ гипотимия
- ☐ эйфория

274. Выберите правильный вариант ответа

Влечение к бродяжничеству называется

- ☐ гипертимия
- ☐ гипобулия
- ☒ дромомания
- ☐ иллюзии

275. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие воли называется

- ☒ абулия

- ☐ анорексия
- ☐ анестезия
- ☐ амнезия

276. Выберите правильный вариант ответа

Слабоумие, приобретенное в результате болезни

- ☐ олигофрения
- ☒ деменция
- ☐ гипермнезия
- ☐ сумеречное состояние сознания

277. Выберите правильный вариант ответа

Неспособность получать удовольствие

- ☒ ангедония
- ☐ ановуляция
- ☐ анорексия
- ☐ гипотермия

278. Выберите правильный вариант ответа

Для шизофрении характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ кататонический
- ☒ судорожный
- ☐ галлюцинаторно- параноидный
- ☐ депрессивный

279. Выберите правильный вариант ответа

Для неврастения характерны следующие синдромы, кроме

- ☐ раздражительность
- ☒ конфабуляции
- ☐ поверхностный сон
- ☐ гиперестезия

280. Выберите правильный вариант ответа

Разорванное мышление характерно для

- ☐ эпилепсии
- ☒ шизофрении
- ☐ неврастении
- ☐ олигофрении

281. Выберите правильный вариант ответа

Эмоциональная тупость характерна для

- ☐ эпилепсии
- ☐ олигофрении
- ☒ шизофрении
- ☐ депрессии

282. Выберите два правильных ответа

Варианты нарушения восприятия

- ☒ истинные галлюцинации
- ☒ псевдогаллюцинации
- ☐ эйфория
- ☐ парамнезия
- ☐ гипотимия

283. Выберите два правильных ответа

Мания включает

- ☒ двигательную активность
- ☒ ускоренное мышление
- ☐ пониженное настроение
- ☐ замедленное мышление
- ☐ двигательную заторможенность

284. Выберите два правильных ответа

Расстройства сознания

- ☒ сопор

- ☒ кома
- ☐ псевдореминисценции
- ☐ истинные галлюцинации
- ☐ псевдогаллюцинации

285. Выберите два правильных ответа

Признаки передозировки опийных препаратов

- ☒ миоз
- ☒ кома
- ☐ мидриаз
- ☐ эйфория
- ☐ нормальное дыхание

286. Выберите два правильных ответа

Вызывать скорую помощь пациенту с эпилепсией необходимо если

- ☒ припадок длится более 5 минут
- ☒ припадок следует один за другим
- ☐ больной пришел в сознание
- ☐ припадок длится 2 минуты
- ☐ припадок случился дома

287. Выберите правильный вариант ответа

Особенности шизофрении у детей является наличие

- ☐ развёрнутого бреда
- ☐ судорожных припадков
- ☒ ночных страхов
- ☐ полная потеря ориентировки

288. Выберите правильный вариант ответа

Решающее значение в развитии невротозов имеет

- ☐ нейроинфекция
- ☐ черепно-мозговая травма
- ☐ сосудистые заболевания головного мозга
- ☒ психогенный фактор

289. Установить соответствие понятий слабоумия

деменция	слабоумие, приобретённое в результате болезни
олигофрения	врождённое слабоумие
	лёгкая степень слабоумия
	тоскливое угнетённое состояние

290. Установить соответствие определений клинических симптомов

галлюцинации	чувственное восприятие при отсутствии объекта
иллюзии	искажённое восприятие
	окружающие предметы видятся удвоенными
	выпадение половины зрения

291. Установить соответствие синдромов заболеванию

шизофрения	кататонический синдром
маниакально-депрессивный психоз	маниакальный синдром
	судорожный синдром
	психоорганический

292. Выберите правильный вариант ответа

1: освободить от стесняющей одежды

2: повернуть больного на бок

3: предупредить травму головы

4: вызвать скорую помощь

293. Выберите правильный вариант ответа

1: стадия психической зависимости

2: стадия физической зависимости

3: энцефалопатическая стадия

4: алкогольный психоз

294. Выберите правильный вариант ответа

Определите форму опьянения мужчине, 27 лет, употребление алкоголя редкое, не испытывает удовольствия при опьянении, наоборот - настроен подавленно, тревога, жалость к себе. Вспоминает неприятные эпизоды своей жизни, возникают суицидальные мысли, о своих переживаниях помнит

☐ патологическое опьянение

☐ дисфорическая форма простого опьянения

☐ параноидная форма простого опьянения

☒ депрессивная форма простого опьянения

295. Выберите правильный вариант ответа

Определите диагноз пациентке, 49 лет, с алкоголизмом третьей стадии два года назад стал слышать «голоса», постепенно стал относиться к этому спокойнее, поведение нормализовалось, работает, «Голоса» отмечает всё реже, но во время запоев они усиливаются

☐ алкогольный делирий

☐ алкогольный параноид

☒ затяжной алкогольный галлюциноз

☐ шизофрения

296. Выберите правильный вариант ответа

Определите диагноз пациенту, 29 лет, злоупотребление алкоголем, после прекращения приёма алкоголя стал беспокоен, жалобы на тревогу, сердцебиение, отсутствие сна, стал видеть мух, пауков. Метался, просил спасти, t 38,5 °C, тремор конечностей

☒ белая горячка

☐ острый алкогольный галлюциноз

☐ травматический психоз

☐ острый алкогольный параноид

297. Выберите правильный вариант ответа

Установите диагноз. Больной, 59 лет. Злоупотребление алкоголем много лет, поступил в хирургический стационар для плановой операции, накануне нарушилась ориентировка, беспокоен, жалобы, что по коже ползут пауки, не узнаёт врача

☐ послеоперационный психоз

☐ алкогольный галлюциноз

☐ острый алкогольный параноид

☒ алкогольный делирий

298. Выберите правильный вариант ответа

Определить форму алкогольного опьянения, пациент, 25 лет, во время опьянения становится злым, учиняет драки, о происшедшем на следующий день не помнит

☐ патологическое опьянение

☒ дисфорическая форма опьянения

☐ депрессивная форма

☐ параноидная форма

299. Выберите правильный вариант ответа

Установите диагноз пациентка 15 лет, часто пропускает школу, с 12 лет курит, несколько месяцев назад ввела себе кустарно изготовленный препарат, содержащий психостимулятор, в последующем применяла во время встреч с друзьями 2-3 раза в месяц, вне компании – не вводила

☐ полинаркомания

☐ первая стадия наркомании

☐ токсикомания

☒ адиктивное поведение

300. Выберите правильный вариант ответа

Определите форму употребления алкоголя пациенту, 19 лет, неуверенный в себе, живёт с родителями, часто меняет место работы, регулярно употребляет алкоголь с 17-ти лет, пьёт почти ежедневно, максимальная доза – 1000 мл вина, употребляет суррогаты, в состоянии абстиненции жалобы на слабость

☐ I-ая стадия алкоголизма

☐ бытовое пьянство

☐ дипсомания

☒ II-ая стадия алкоголизма

301. Выберите правильный вариант ответа

Определите форму алкогольного опьянения пациенту, 21 года. Перенёс пневмонию с последующей астенией, выпил 0,5 водки, быстро опьянел, угрожал всем ножом, на следующий день ничего не помнил о случившемся

☐ средняя степень простого опьянения

☒ патологическое опьянение

☐ дисфорическая форма простого опьянения

☐ параноидальная форма простого опьянения

302. Выберите правильный вариант ответа

Определите форму алкогольной деградации пациентке, 27 лет, с 18 лет принимает алкоголь часто, не заботится о детях и муже, лечиться не хочет, хвастаться о своих амурных приключениях на стороне, не критична

☐ психопатоподобный, с чертами деградации

☒ деградация с хронической эйфорией

☐ деградация с аспонтанностью

☐ психопатоподобный, с чертами истеричности

4. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать её для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

303. Выберите правильный вариант ответа

Эпилептический статус

☐ оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией

- ☒ серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание
- ☐ речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией
- ☐ невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией

304. Выберите правильный вариант ответа

Под невменяемостью понимают

- ☐ неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы
- ☒ неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них
- ☐ высокую степень алкогольного опьянения
- ☐ выраженное слабоумие

305. Выберите правильный вариант ответа

Проявление острого алкогольного психоза

- ☐ речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия
- ☐ лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства
- ☒ делирий, галлюциноз, паранойя
- ☐ длительный сон

306. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольная абстиненция – это

- ☐ присутствие алкоголя в крови
- ☒ психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
- ☐ алкогольное поражение печени
- ☐ алкогольная эпилепсия

307. Выберите правильный вариант ответа

Иллюзии – это

- ☒ искаженное восприятие реально существующего предмета
- ☐ действия иллюзиониста
- ☐ голоса, носящие «приказной» императивный характер
- ☐ выдумки, вымыслы, не соответствующие действительности

308. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам интеллекта относятся

- ☒ деменция, умственная отсталость
- ☐ нарушение сна, астения
- ☐ амнезия, конфабуляции
- ☐ эйфория, аффективные расстройства

309. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет
- ☐ прикусывание языка
- ☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация

310. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти
- ☒ средства, применяемые при психических расстройствах
- ☐ препараты, вызывающие галлюцинации
- ☐ наркотики

311. Выберите правильный вариант ответа

При астеническом синдроме отмечается

- ☐ абулия, афазия, амнезия
- ☒ утомляемость, раздражительность, бессонница
- ☐ анорексия, негативизм
- ☐ психический автоматизм, псевдогаллюцинации

312. Выберите правильный вариант ответа

Коматозное состояние – это

- ☒ полное выключение сознания
- ☐ частые приступы с потерей сознания
- ☐ снижение памяти
- ☐ оглушение, вялость, сонливость

313. Выберите правильный вариант ответа

Навязчивые состояния называются

- ☐ онейроид
- ☐ конфабуляции
- ☒ obsessions
- ☐ псевдореминисценции

314. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к алкоголю характерно для

- ☐ второй стадии алкоголизма
- ☒ первой стадии алкоголизма
- ☐ третьей стадии алкоголизма
- ☐ бытового пьянства

315. Выберите правильный вариант ответа

Повышение толерантности к наркотику ярко выражено

- ☒ на первой стадии наркомании
- ☐ на второй стадии наркомании
- ☐ на третьей стадии наркомании
- ☐ при абстинентном синдроме

316. Выберите правильный вариант ответа

Снижение толерантности к наркотику отмечается

- ☐ на первой стадии наркомании
- ☐ на второй стадии наркомании
- ☒ на третьей стадии наркомании
- ☐ при абстинентном синдроме

317. Выберите правильный вариант ответа

Помрачение сознания отмечается при

- ☒ алкогольном делирии
- ☐ алкогольном галлюцинозе
- ☐ алкогольном бреде ревности
- ☐ болезни Корсакова

318. Выберите правильный вариант ответа

Патологическое опьянение развивается

- ☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя
- ☐ при запоях
- ☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
- ☒ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя

319. Выберите правильный вариант ответа

К каннабиноидам относится

- ☐ морфин

- ☒ гашиш
- ☐ амфетамин
- ☐ ЛСД

320. Выберите правильный вариант ответа

Алкогольный делирий развивается

- ☐ при систематическом употреблении больших доз алкоголя при запоях
- ☐ через несколько дней после массивного употребления алкоголя на фоне абстинентного синдрома
- ☐ как индивидуальная реакция на однократный прием, иногда даже совсем небольшой дозы алкоголя
- ☒ у трезвого пациента в период прерывания запоя

321. Выберите правильный вариант ответа

К психостимуляторам относится наркотик

- ☐ морфин
- ☐ гашиш
- ☒ амфетамин
- ☐ ЛСД

322. Выберите правильный вариант ответа

К галлюциногенам относится наркотик

- ☐ морфин
- ☐ гашиш
- ☐ амфетамин
- ☒ ЛСД

323. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит, слышит, ощущает то, что в реальной действительности не существует, относятся

- ☒ галлюцинации
- ☐ иллюзии
- ☐ сенестопатии
- ☐ синестезии

324. Выберите правильный вариант ответа

К расстройствам восприятия, при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном, ошибочном виде, относятся

- ☐ галлюцинации
- ☒ иллюзии
- ☐ сенестопатии
- ☐ синестезии

325. Выберите правильный вариант ответа

Тихая, монотонная медленная речь присуща пациентам с

- ☐ кататонией
- ☐ бредом преследования
- ☐ бредом громадности
- ☒ депрессией

326. Выберите правильный вариант ответа

Основное правило ухода за депрессивным больным

- ☐ режим нестеснения
- ☐ постельный режим
- ☒ усиленное наблюдение
- ☐ проведение медико-педагогических мероприятий

327. Выберите правильный вариант ответа

Нарушение чувствительности по «типу носков» наблюдается у пациентов с

- ☒ алкогольным полиневритом
- ☐ белой горячкой
- ☐ алкогольным бредом ревности
- ☐ кататоническим ступором

328. Выберите правильный вариант ответа

При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания

- ☐ онейроид
- ☒ делирий
- ☐ амнезия
- ☐ кома

329. Выберите правильный вариант ответа

Для делирия характерны

- ☒ истинные зрительные галлюцинации
- ☐ зрительные псевдогаллюцинации
- ☐ конфабуляции
- ☐ псевдореминисценции

330. Выберите правильный вариант ответа

Психопатия – это

- ☒ стойкая патология характера
- ☐ хроническое прогрессирующее заболевание
- ☐ временное психическое заболевание
- ☐ помрачение сознания

331. Выберите правильный вариант ответа

К основным видам алкогольных психозов относятся

- ☐ псевдогаллюциноз
- ☐ маниакальный психоз
- ☒ делирий
- ☐ онейроид

332. Выберите правильный вариант ответа

Истинные зрительные галлюцинации характерны для

- ☐ шизофрении
- ☒ интоксикационного делирия
- ☐ инволюционной меланхолии
- ☐ кататонии

333. Выберите правильный вариант ответа

При эпилептическом припадке

- ☐ сознание сохранено
- ☒ отмечается прикусывание языка
- ☐ реакция зрачков на свет сохранена
- ☐ пациент не наносит себе травм

334. Выберите правильный вариант ответа

Узелки по ходу вен свидетельствуют

- ☒ о наркотической зависимости
- ☐ о болезненном состоянии
- ☐ о варикозном расширении вен
- ☐ об аллергическом заболевании

335. Выберите правильный вариант ответа

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена одним из перечисленных факторов

- ☐ крепостью и качеством алкоголя
- ☒ активностью фермента алкогольдегидрогеназы
- ☐ культурно-этическими
- ☐ поло-возрастными

336. Выберите правильный вариант ответа

К биологическим особенностям женщин, влияющим на возникновение у них алкоголизма, относятся

- ☐ наследственность
- ☒ предменструальное напряжение
- ☐ ранняя психическая травматизация
- ☐ соматические заболевания

337. Выберите правильный вариант ответа

Морфинизм – это

- ☐ хроническое отравление морфием
- ☐ привыкание нервной ткани к яду
- ☒ вид наркомании
- ☐ результат лечения бессонницы

338. Выберите правильный вариант ответа

Антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями

- ☐ унитиол
- ☐ метиленовый синий
- ☒ атропин
- ☐ концентрированная глюкоза

339. Выберите правильный вариант ответа

Антидотом при отравлении метиловым спиртом является

- ☐ унитиол
- ☐ метиленовый синий
- ☒ этиловый спирт
- ☐ концентрированная глюкоза

340. Выберите правильный вариант ответа

Первая доврачебная помощь при пероральных отравлениях наркотиками и алкоголем включает

- ☐ приём слабительного
- ☐ обёртывание мокрыми простынями
- ☐ массаж спины
- ☒ промывание желудка

341. Выберите правильный вариант ответа

Отмечается при истерическом припадке

- ☒ сохранение реакции зрачков на свет
- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет
- ☐ прикусывание языка
- ☐ непроизвольное мочеиспускание и дефекация

342. Выберите правильный вариант ответа

Психотропные лекарственные средства – это

- ☐ средства для улучшения памяти
- ☒ средства, применяемые при психических расстройствах
- ☐ препараты, вызывающие галлюцинации
- ☐ наркотики

343. Выберите правильный ответ

После незащищенного полового контакта с ВИЧ позитивным партнером пациент должен обследоваться на ВИЧ

- ☒ через 2 недели, 3 месяца и 6 месяцев
- ☐ ежедневно в течение недели после контакта
- ☐ через неделю после контакта
- ☐ однократно на следующий день после контакта

344. Выберите правильный ответ

Ольга И. ранее болела туберкулезом в детском возрасте, сейчас ей 30 лет и у нее обнаружены возбудитель туберкулёза при микроскопии мазка мокроты, значит тип пациентки

- ☒ рецидив
- ☐ хронически больной
- ☐ неблагоприятный исход
- ☐ впервые выявленный

345. Выберите правильный ответ

Игорь А. жалуется на кашель, боли в грудной клетке, похудание, повышение температуры тела до 37,8 С0 к вечеру, при микроскопии мокроты патологии не выявлено, дальнейшая тактика

- ☒ направить на рентген лёгких
- ☐ направить к физиотерапевту
- ☐ успокоить и направить его домой
- ☐ начать лечение туберкулёза

346. Выберите правильный ответ

В ДТП пострадавший с множественными переломами бедра, при осмотре возбужден, лицо гиперемировано, порывается встать, данное состояние называется

- ☒ травматический шок I стадия
- ☐ травматический шок II стадия
- ☐ психоз
- ☐ алкогольное опьянение

347. Выберите правильный ответ

В ДТП пострадавший с обширным ожогом II - III степени, при осмотре сознание сомнолентное, кожа бледная, пульс слабый. АД - 70/50 мм.р.ст., данное состояние называется

- ☒ травматический шок II стадия
- ☐ травматический шок I стадия
- ☐ обморочное состояние
- ☐ сепсис, связанный с инфицированием ран

348. Выберите правильный ответ

У пациента с заболеванием сердца внезапно появилась выраженная одышка, клочущее дыхание, розовые пенные выделения изо рта, вероятнее всего у пациента

- ☒ отёк лёгких
- ☐ анафилактический шок
- ☐ желудочное кровотечение
- ☐ остро развившаяся пневмония

349. Выберите правильный ответ

Мужчина 41 год внезапно почувствовал интенсивные боли за грудиной, чувство страха смерти, ощущение нехватки воздуха, самостоятельно принял пенталгин, внутримышечно сделан анальгин - боли не купируются, предполагаемое развившееся состояние

- ☒ острый инфаркт миокарда
- ☐ приступ панкреатита
- ☐ кишечная колика
- ☐ язва желудка

350. Выберите правильный ответ

Родители ребенка 3-х лет обнаружили у него в руках открытую упаковку анаприлина, выпито ли

лекарство, достоверно неизвестно, самочувствие ребенка хорошее, ваша тактика

☒ промыть желудок до чистых вод, затем госпитализировать

☐ наблюдать в течение 1 часа

☐ направить в поликлинику

☐ ничего предпринимать не нужно

351. Выберите правильный вариант ответа

Средства не обладающие наркотическим действием

☐ гашиш

☐ героин

☐ морфин

☒ атропин

352. Выберите правильный вариант ответа

Наркотик - это

☐ вещество, вызывающее абстиненцию при однократном приеме

☒ препарат, включенный в список постоянного комитета по контролю наркотиков

☐ вещество, вызывающее абстиненцию при не однократном приеме

☐ обезболивающий препарат

353. Выберите правильный вариант ответа

Наркоман - это

☐ больной человек, принимающий наркотические средства

☒ больной человек, имеющий пристрастие к употреблению наркотиков

☐ человек, принимающий наркотические средства

☐ народный комиссар

354. Выберите правильный вариант ответа

Ломка - это признак

☒ наркомании

☐ психоза

☐ психиатрии

☐ наркоза

355. Выберите правильный вариант ответа

При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния субъекта необходимо

☒ госпитализировать в ближайшую медицинскую организацию

☐ направить на обследование к психиатру

☐ направить на обследование к наркологу

☐ направить на собеседование к родителям

356. Выберите правильный вариант ответа

Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не относящихся к наркотикам называется

☒ токсикоманией

☐ вредной привычкой

☐ наркотической зависимостью

☐ киноманией

357. Выберите правильный вариант ответа

Болезненное пристрастие к употреблению наркотиков называется

☒ наркоманией

☐ токсикоманией

☐ дромоманией

☐ привычкой

358. Выберите правильный вариант ответа

Злоупотребление средствами, не отнесенными в список наркотических препаратов называется

☐ наркомания

☒ токсикомания

☐ дромоманией

☐ привычкой

359. Выберите правильный вариант ответа

Кокаинизм - это

☒ кокаиновая наркомания

☐ применение кокаина в лечебных целях

☐ применение кокаина в диагностических целях

☐ добавления кокаина в напитки

360. Выберите правильный вариант ответа

Журнал учета наркотических средств хранится

☒ в сейфе

☐ в шкафу

☐ на посту медицинской сестры

☐ в ординаторской в шкафу

361. Выберите правильный вариант ответа

Чаще ВИЧ-инфекция в РФ возникает

☒ у наркоманов употребляющих наркотик внутривенно

☐ у наркоманов употребляющих наркотик внутрь

☐ не зависит от способа введения

☐ при употреблении наркотика через слизистые

362. Выберите правильный вариант ответа

Наркоманию вызывают злоупотребления всеми перечисленными веществами, за исключением

☐ препаратами опия

☐ кокаином

☐ галлюциногены (ЛСД)

☒ алкоголем

363. Выберите правильный вариант ответа

Полинаркомания - это

☒ одновременное злоупотребление несколькими наркотиками

☐ повышение дозы наркотического вещества

☐ алкоголизм

☐ алкоголь и наркотик

364. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм - это

☒ наркомания препаратами конопли

☐ табакокурение

☐ психическое заболевание, возникающее у наркомана

☐ выращивание конопли

365. Выберите правильный вариант ответа

Наркомания и токсикомания в РФ

☐ снижается

☒ растет

☐ остается стабильной

☐ относительно стабильна

366. Выберите правильный вариант ответа

При парентеральном приеме наркотиков у наркоманов передаются заболевания

☒ ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В

- ☐ вирусный гепатит А
- ☐ краснуха
- ☐ брюшной тиф

367. Выберите правильный вариант ответа

Тяжёлая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме

- ☐ мозжечковая атаксия
- ☐ мышечная атония, амимия
- ☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
- ☒ гипермимии

368. Выберите правильный вариант ответа

Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется

- ☐ в резких, но интенсивных алкогольных опьянениях
- ☐ в социально обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- ☒ в псевдозапоях
- ☐ в традиционных эпизодах употребления алкоголя

369. Выберите правильный вариант ответа

Среди женщин, больных алкоголизмом преобладают лица, занятые

- ☒ в торговле, сфере услуг
- ☐ в промышленности
- ☐ в здравоохранении
- ☐ в образовании

370. Выберите правильный вариант ответа

Узкие зрачки, сухость кожи, следы множественных инъекций на предплечьях, бедрах, деградация личности характерны для больных

- ☐ онкологических
- ☒ наркоманией
- ☐ алкоголизмом
- ☐ шизофренией

371. Выберите правильный вариант ответа

К числу особенностей современного алкоголизма относится

- ☐ стабилизация распространённости алкогольных психозов
- ☐ увеличение числа типичных алкогольных психозов
- ☒ увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов
- ☐ соматические осложнения

372. Выберите правильный вариант ответа

Основные расстройства восприятия

- ☐ амнезия, абулия, афазия
- ☒ иллюзии, галлюцинации, сенестопатии
- ☐ резонерство, навязчивость
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

373. Выберите правильный вариант ответа

Нарушения памяти

- ☒ амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции
- ☐ ментизм, шперрунг, обстоятельность
- ☐ резонерство, разорванность мышления
- ☐ амбивалентность, амбигуальность

374. Выберите правильный вариант ответа

К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся

- ☐ бессонница, раздражительность, депрессия
- ☒ корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике
- ☐ алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит
- ☐ деменция, амнезия, афазия

375. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками астенического синдрома является

- ☐ абулия, афазия, амнезия
- ☐ бессонница, бродяжничества, беспокойство
- ☒ утомляемость, раздражительность, бессонница
- ☐ анорексия, негативизм, сонливость

376. Выберите правильный вариант ответа

Делирий относится к расстройствам

- ☒ сознания
- ☐ памяти
- ☐ воли
- ☐ мышления

377. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

- ☐ комментирующие
- ☐ контрастирующие
- ☒ императивные
- ☐ акаозмы

378. Выберите правильный вариант ответа

Корсаковский синдром относится к расстройствам

- ☒ памяти
- ☐ сознания
- ☐ мышления
- ☐ эмоций

379. Выберите правильный вариант ответа

При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести

- ☐ аминазин
- ☐ амитриптилин
- ☐ стелазин
- ☒ карбомазепим

380. Выберите правильный вариант ответа

Социотерапия – это

- ☐ работа в группе социопатов
- ☐ решение социальных вопросов
- ☒ лечение факторами окружающей среды
- ☐ посещение пациента социальным работником

381. Выберите правильный вариант ответа

В основе сформировавшегося патологического влечения к алкоголю преобладают

- ☐ социальные факторы
- ☐ психологические факторы
- ☒ биологические факторы
- ☐ уровень культуры

382. Выберите правильный вариант ответа

Структура патологического влечения к алкоголю не включает в себя компонент

- ☐ эмоционально-аффективный

- ☐ сомато-вегетативный
☐ поведенческий
☒ неврологический

383. Выберите правильный вариант ответа

В процессе развития патологического влечения к алкоголю не происходит

- ☐ изменений суждений больного
☐ поведенческих нарушений
☐ формирования позитивного мировоззрения
☒ сохранения критики к своему состоянию и окружающей среде

384. Выберите правильный вариант ответа

Гашишизм является

- ☒ наркоманией препаратами конопли
☐ табакокурением
☐ психическим заболеванием, возникающее у наркомана
☐ выращиванием конопли

385. Выберите правильный вариант ответа

Тяжелая степень алкогольного опьянения определяется всем перечисленным, кроме:

- ☐ мозжечковая атаксия
☐ мышечная атония, амимия
☐ вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота
☒ гипермимия

386. Определите последовательность фаз генерализованного судорожного припадка при эпилепсии

- 1: аура
 2: тоническая фаза
 3: клоническая фаза
 4: послеэпилептическое состояние

387. Определите последовательность действий медработника при гневе и агрессивных высказываниях пациента при болезни Альцгеймера

- 1: отойти на 2 м. от пациента
 2: продемонстрировать доброжелательность
 3: принять не агрессивную позу
 4: пригласить другого медработника себе на замену

388. Определите последовательность стадий при употреблении больших доз барбитуратов

- 1: эйфория
 2: сонливость
 3: оглушение
 4: кома

389. Установите соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение воли	гипербулия, абулия
нарушение внимания	отвлекаемость
	псевдогаллюцинации
	ускорения мышления

390. Установите соответствие психических нарушений и их симптомов

нарушение мышления	навязчивые мысли
нарушение	гипертимия, тоска

эмоций	
	гиперестезии, анестезия
	иллюзии

391. Установите соответствие фобий и их значение

спидофобия	навязчивый страх заболеть СПИДом
клаустрофобия	навязчивый страх замкнутых пространств
	навязчивый страх воды
	навязчивый страх крови

392. Выберите правильный вариант ответа

Укажите фазу токсического опьянения, приятный шум в голове, подъем настроения, ощущение тепла, расслабленность конечностей, сознание его сужено, но не помрачено

- ☐ кома
☒ первая фаза
☐ вторая фаза
☐ фаза выхода

393. Выберите правильный вариант ответа

Больной алкоголизмом прекратил принимать алкоголь около 3 дней назад, к вечеру стал беспокойным, испуганно оглядывается, утверждает, вокруг бегают мыши, данное состояние типично для

- ☐ кататонического синдрома
☒ делирия
☐ психопатоподобного синдрома
☐ неврозоподобного синдрома

394. Выберите правильный вариант ответа

Больной без сознания, отсутствуют реакции на окружающее, включая болевые раздражители, данное состояние

- ☐ фиксационную амнезию
☐ оглушенность
☒ кому
☐ ничего из перечисленного

395. Выберите правильный вариант ответа

Больной напуган, считает, что окружающие преследуют его, уверен, что за ним ведется слежка, ищет в палате подслушивающие устройства, не поддается переубеждению, это состояние

- ☐ астенический синдром
☐ психопатоподобный синдром
☒ бред преследования
☐ навязчивую идею

396. Выберите правильный вариант ответа

У больного отмечается страх поездок в лифте, предпочитает ходить по лестнице, понимает, что реальной опасности нет, пытается перебороть свой страх, это состояние

- ☐ бреда преследования
☐ истерии
☐ кататонии
☒ навязчивостей

397. Выберите правильный вариант ответа

Больной неподвижно сидит в вычурной позе с полусогнутыми руками, мышцы напряжены, не по-

зволяет себя уложить, не встает. Время от времени совершает однообразные движения инструкции врача не выполняет или делает наоборот, это характерно для

- ☐ эпилептиформного синдрома
- ☐ неврозоподобного синдрома
- ☐ психоорганического синдрома
- ☒ кататонического синдрома

398. Выберите правильный вариант ответа

Больной неожиданно падает на пол, отмечается напряжение всех мышц, затем сильная дрожь, прикус языка, состояние длится 2 – 3 минуты, после сон, данное состояние характерно для

- ☐ кататонического возбуждения
- ☐ навязчивостей
- ☒ эпилептического припадка
- ☐ кататонического синдрома

399. Выберите правильный вариант ответа

Больная во время ссоры с мужем громко кричит, медленно оседает на пол, выгибается дугой, отмечаются размашистые движения руками, через некоторое время обмякает, начинает плакать, это характерно для

- ☐ кататонического возбуждения
- ☒ истерического припадка
- ☐ психопатоподобного возбуждения
- ☐ эпилептического припадка

400. Выберите правильный вариант ответа

Определите состояние, мужчине, 51 год, злоупотребляет спиртными напитками более 20 лет, пьет запоями, начались судорожные припадки с потерей сознания. Груб и не критичен к себе

- ☐ травматическая эпилепсия
- ☐ дипсомания
- ☐ бытовое пьянство
- ☒ алкогольная эпилепсия

401. Выберите правильный вариант ответа

Определите форму опьянения, женщине, 22 года, после того, как выпила стакан вина, стала громко говорить, начала исполнять индийский танец, затем громко разрыдалась, жалуясь на то, что ее не понимают

- ☐ маниакальная
- ☐ депрессивная
- ☐ параноидная
- ☒ истерическая