

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием Новосибирской области
по специальности «Операционное дело»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа
квалификационного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- описания Трудовых функций, которые содержатся в проекте профессионального стандарта «Медицинская сестра» (код № 85.14.1);
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	21
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	26

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 50%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	33
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	48
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	54

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 20%, задание на установление правильного порядка - 20%, типовые задачи -10%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	62
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	77
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	84
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	91

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

**Содержание тестовых материалов
Специальность « Операционное дело»
Вторая квалификационная категория.**

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите единственно правильный ответ

Применение лазера в хирургии относится к антисептике

- механической
- физической
- биологической
- химической

2. Выберите единственно правильный ответ

Для контроля качества предоперационной обработки рук используют

- термоиндикаторы
- бактериологический контроль
- фенолфталеиновую пробу
- амидопириновую пробу

3. Выберите единственно правильный ответ

Нарушение асептики может привести к осложнению

- воздушной эмболии
- аллергической реакции
- абсцессу
- липодистрофии

4. Выберите единственно правильный ответ

После обработки рук дезраствором они становятся

- стерильными
- дезинфицированными
- чистыми
- подготовленными к операции

5. Выберите единственно правильный ответ

Физическим методом антисептики является

- применение антибиотиков
- применение ферментов
- дренирование ран
- удаление инородных тел

6. Выберите единственно правильный ответ

Способ транспортировки при внутреннем кровотечении

- с приподнятым головным концом
- с опущенным головным концом
- в горизонтальном положении
- горизонтально на боку
- придать положение полусидя

7. Выберите единственно правильный ответ

Физический метод окончательной остановки кровотечения

- переливание плазмы
- протезирование сосуда
- электрокоагуляция
- наложения шва на сосуд

8. Выберите единственно правильный ответ

Вытекание крови непрерывной струей темно-вишневого цвета характеризует кровотечение

- капиллярное
- смешанное
- венозное
- артериальное

9. Выберите единственно правильный ответ

Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из

- пищевода
- вен голени
- крупных вен шеи
- плечевой артерии

10. Выберите единственно правильный ответ

Механический способ окончательной остановки кровотечения

- применение фибриногена
- наложение артериального жгута
- наложение сосудистого шва
- применение гемостатической вискозы

11. Выберите единственно правильный ответ

Биологический препарат общего действия для остановки кровотечения

- нативная плазма
- дицинон
- гемостатическая губка
- тромбин

12. Выберите единственно правильный ответ

Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении из

- паренхиматозных органов
- капилляров
- артерий
- вен

13. Выберите единственно правильный ответ

Больного с массивной кровопотерей транспортируют

- полусидя

- лежа на животе
- лежа с опущенными ногами
- лежа с приподнятым ножным концом

14. Выберите единственно правильный

ответ

Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к

- углу нижней челюсти
- ключице
- VI шейному позвонку
- I ребру

15. Выберите единственно правильный

ответ

Артериальное кровотечение из раны в верхней трети предплечья можно остановить путем сгибания руки

- в плечевом суставе
- в плечевом и локтевом суставах
- в локтевом суставе
- в лучезапястном суставе

16. Выберите единственно правильный

ответ

Признаком кровотечения в плевральную полость является

- отставание большой стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука
- алая пенистая кровь из полости рта
- рвота "кофейной гущей"
- кровохарканье

17. Выберите единственно правильный

ответ

Недостатком применения жгута Эсмарха является

- отсутствие чувствительности ниже наложения жгута
- сложность использования
- сдавление мягких тканей и нервных стволов
- повреждение кожных покровов

18. Выберите единственно правильный

ответ

Критерием правильного наложения жгута Эсмарха является

- синюшность кожи
- отсутствие чувствительности кожи ниже жгута
- повышение температуры тела ниже жгута
- исчезновение периферического пульса

19. Выберите единственно правильный

ответ

Группа крови, в которой содержится агглютиноген В и агглютинин альфа

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

20. Выберите единственно правильный

ответ

Противопоказания к переливанию крови

- тяжелая операция
- тяжелое нарушение функций печени
- шок
- снижение артериального давления

21. Выберите единственно правильный

ответ

Резус-фактор содержится в

- плазме
- лейкоцитах
- эритроцитах
- тромбоцитах

22. Выберите единственно правильный

ответ

Группа крови, в которой содержатся агглютиногены А и В

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

23. Выберите единственно правильный

ответ

Агглютинины находятся в

- эритроцитах
- лейкоцитах
- плазме крови
- других жидкостях организма

24. Выберите единственно правильный

ответ

При проведении пробы на групповую совместимость крови донора и реципиента агглютинация отсутствовала. Это означает, что кровь

- совместима по резус-фактору
- совместима по групповой принадлежности
- несовместима по резус-фактору
- не совместима по групповой принадлежности

25. Выберите единственно правильный

ответ

Состав крови II группы

- А
- В
- АВ
- О

26. Выберите единственно правильный

ответ

Кровь В (III) группы можно вводить лицам

- только с III группой крови
- с любой группой крови
- только с III и IV группами крови
- со II и III группами крови

27. Выберите единственно правильный

ответ

Для проведения биологической пробы следует

- ввести струйно однократно 10 мл крови и наблюдать за состоянием больного 5 мин.
- ввести струйно трижды по 10 мл крови с интервалом 5 мин, наблюдая за больным
- ввести капельно 10 мл крови, наблюдать за состоянием больного 5 минут
- ввести капельно троекратно по 10 мл крови

28. Выберите единственно правильный ответ

При переливании крови состояние больного ухудшилось, появилась боль в пояснице и за грудиной. Это указывает на

- геморрагический шок
- цитратный шок
- гемотранфузионный шок
- пирогенную реакцию

29. Выберите единственно правильный ответ

При появлении признаков гемотранфузионного шока при переливании крови необходимо

- сменить систему и вводить кровезаменители
- отключить систему, удалить иглу из вены
- уменьшить скорость и продолжать гемотранфузию
- продолжить гемотранфузию и срочно ввести наркотики

30. Выберите единственно правильный ответ

После переливания крови медсестра следит за

- стулом
- дыханием
- диурезом
- психическим состоянием

31. Выберите единственно правильный ответ

При нарушении техники переливания крови может развиваться осложнение

- цитратный шок
- анафилактический шок
- гемотранфузионный шок
- воздушная эмболия

32. Выберите единственно правильный ответ

Потенциальная проблема пациента после наложения гипсовой иммобилизации

- нарушение кровообращения
- развитие контрактуры
- зябкость конечности
- общее повышение температуры

33. Выберите единственно правильный ответ

Перед наложением бинтовой повязки медсестра оценит

- температуру тела
- частоту дыхания
- характер патологического процесса
- АД

34. Выберите единственно правильный ответ

При ранениях волосистой части головы накладывается повязка

- крестообразная на затылок и шею
- пращевидная
- "уздечка"
- "чепец"

35. Выберите единственно правильный ответ

При ранении плечевого сустава накладывают повязку

- черепашью
- колосовидную
- 8-образную
- Дезо

36. Выберите единственно правильный ответ

Окклюзионную повязку используют при

- артериальном кровотечении
- переломе ребер
- закрытом пневмотораксе
- открытом пневмотораксе

37. Выберите единственно правильный ответ

Вид повязки при венозном кровотечении

- давящая
- окклюзионная
- спиральная
- лейкопластырная

38. Выберите единственно правильный ответ

Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти

- крестообразная
- "перчатка"
- черепашья
- змеевидная

39. Выберите единственно правильный ответ

Повязка, применяемая при носовом кровотечении

- лейкопластырная
- пращевидная
- "уздечка"
- циркулярная

40. Выберите единственно правильный ответ

При переломе плечевой кости транспортная иммобилизация накладывается

- от большой лопатки до пальцев кисти
- от средней трети плеча до пальцев кисти

- от здоровой лопатки до пальцев кисти
- от верхней трети плеча до пальцев кисти

41. Выберите единственно правильный

ответ

При открытых переломах накладывают гипсовую повязку

- колосовидную
- лангетную
- створчатую
- циркулярную

42. Выберите единственно правильный

ответ

Реализацию краткосрочной цели "снятие швов" у пациента после аппендэктомии медицинская сестра запланирует на

- десятые сутки
- седьмые сутки
- третьи сутки
- двенадцатые сутки

43. Выберите единственно правильный

ответ

У пациента, готовящегося к плановой операции, медицинская сестра планирует бритье операционного поля

- в день операции
- на операционном столе
- вечером накануне операции
- за 1 сутки до операции

44. Выберите единственно правильный

ответ

Цель радикальной операции

- полное излечение пациента
- облегчение страданий пациента
- временное восстановление функции
- облегчение работы пораженного органа

45. Выберите единственно правильный

ответ

Независимое вмешательство медсестры в послеоперационном периоде

- инъекции антибиотиков каждые 4 часа
- смена дренажа
- оказание помощи пациенту в самообслуживании
- назначение пациенту рациональной диеты

46. Выберите единственно правильный

ответ

Цель паллиативной операции

- полное излечение пациента
- восстановление обмена веществ
- улучшение функции кишечника
- облегчение страданий пациента

47. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- дефицит самоухода
- беспокойство за оставленную работу
- чувство страха

- недооценка тяжести своего состояния

48. Выберите единственно правильный ответ

Предоперационный период начинается с

- начала заболевания
- момента поступления в хирургический стационар
- установления диагноза
- начала подготовки к операции

49. Выберите единственно правильный ответ

Вид санитарной обработки перед плановой операцией

- обтирание кожи и смена белья
- частичная санитарная обработка
- полная санитарная обработка
- санитарная обработка не производится

50. Выберите единственно правильный ответ

Основная задача предоперационного периода

- провести санацию очагов инфекции
- обследовать сердечно-сосудистую систему
- улучшить состояние пациента
- подготовить больного к операции

51. Выберите единственно правильный ответ

Бритье операционного поля перед экстренной операцией осуществляется

- непосредственно перед операцией в санитарной комнате
- на операционном столе
- не производится
- накануне

52. Выберите единственно правильный ответ

Вид санитарной обработки, выполняемой перед экстренной операцией

- полная санитарная обработка
- частичная санитарная обработка
- не осуществляется
- только бритье операционного поля

53. Выберите единственно правильный

ответ

Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

54. Выберите единственно правильный ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма ставится

- противопоказана
- в любое время
- за 1 час
- непосредственно перед операцией

55. Выберите единственно правильный

ответ

Для профилактики послеоперационных бронхолегочных осложнений больному назначают

- дыхательную гимнастику
- интубацию трахеи
- диету, богатую белком
- УВЧ на грудную клетку

56. Выберите единственно правильный

ответ

Диагностической операцией является

- вправление вывиха
- обработка раны с наложением швов
- биопсия тканей
- вскрытие гнойника

57. Выберите единственно правильный

ответ

Признаки нагноения послеоперационной раны

- побледнение краев
- гиперемия, отек, усиление боли
- промокание повязки кровью
- выходение кишечных петель под кожу

58. Выберите единственно правильный

ответ

Основное в уходе за больным с ИВЛ

- противокашлевые средства
- санация трахеобронхиального дерева
- профилактика пролежней
- питание через зонд

59. Выберите единственно правильный

ответ

Срок окончания послеоперационного периода

- после устранения ранних послеоперационных осложнений
- после выписки из стационара
- после заживления послеоперационной раны
- после восстановления трудоспособности

60. Выберите единственно правильный

ответ

При задержке мочеиспускания после аппендэктомии прежде всего необходимо

- вызвать мочеиспускание рефлекторно
- произвести катетеризацию мочевого пузыря
- ввести мочегонные средства
- применить теплую грелку на низ живота

61. Выберите единственно правильный

ответ

Для профилактики пневмонии в послеоперационном периоде необходимо

- назначить противокашлевые средства
- следить за соблюдением строгого постельного режима

- проводить дыхательную гимнастику, массаж

- антибактериальная терапия

62. Выберите единственно правильный

ответ

Положение больного в постели в первые часы после общего обезболивания

- лежа с опущенным головным концом
- полусидя
- лежа на боку
- лежа на спине без подушки, голова повернута набок

63. Выберите единственно правильный

ответ

В первые 6 часов после операции на желудочно-кишечном тракте запрещается прием жидкости, так как

- возможна провокация рвоты
- больной не хочет пить
- возможно увеличение ОЦК
- необходимо предупредить мочеиспускание

64. Выберите единственно правильный

ответ

При транспортировке в операционную больного нужно

- посадить на коляску
- положить на каталку
- отвести под руку
- отправить самостоятельно

65. Выберите единственно правильный

ответ

Корнцанг применяют для

- наложения швов
- остановки кровотечения
- подачи перевязочного материала
- фиксации операционного белья

66. Выберите единственно правильный

ответ

Время начала операции после последнего приема пищи через

- 1 час
- 2 часа
- 3 часа
- 4 часа

67. Выберите единственно правильный

ответ

Груз на рану после операции накладывается с целью

- предупреждения расхождения швов
- предупреждения инфицирования
- предупреждения кровотечения
- уменьшения болей

68. Выберите единственно правильный

ответ

Показанием к смене повязки на следующий день после операции является

- резкая бледность кожи вокруг раны

- похолодание кожи вокруг раны
- резкий цианоз вокруг раны
- обильное промокание повязки

69. Выберите единственно правильный

ответ

В первые трое суток после операции может возникнуть осложнение

- кровотечение
- нагноение
- выхождение внутренних органов под кожу
- расхождение швов

70. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с термической травмой

- чувство одиночества
- слабость
- боль в области ожоговой раны
- чувство страха манипуляций

71. Выберите единственно правильный

ответ

При осмотре пациента с тяжелой термической травмой медицинская сестра в первую очередь оценит

- общее состояние пациента
- состояние неповрежденной кожи и слизистых
- положение в постели
- температуру тела пациента

72. Выберите единственно правильный

ответ

Основной целью оказания первой медицинской помощи при отморожении является

- восстановление кровообращения
- прекращение боли
- восстановление чувствительности
- восстановление функции дыхания

73. Выберите единственно правильный

ответ

Взаимозависимое действие медсестры у пациента с переломом костей левого предплечья

- обучение пациента специальному комплексу ЛФК и самомассажа
- профилактика пролежней
- помощь в осуществлении санитарно-гигиенических мероприятий
- удовлетворение интеллектуальных потребностей пациента

74. Выберите единственно правильный

ответ

Неотложное независимое действие медсестры у пациента с вывихом

- вправление вывиха
- новокаиновая блокада
- транспортная иммобилизация
- тепловые процедуры

75. Выберите единственно правильный

ответ

Фаза травматического шока

- судорожная
- токсемия
- торпидная
- реконвалесценция

76. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с обширным ранением мягких тканей

- расстройство схемы тела
- чувство беспомощности
- острая боль
- лихорадка

77. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с ранением на этапе неотложной помощи:

- кровотечение
- дефицит движения
- дефицит самоухода
- угроза инфицирования

78. Выберите единственно правильный

ответ

Показатель шокового индекса – это отношение

- частоты сердечных сокращений к систолическому АД
- частоты сердечных сокращений к диастолическому АД
- частоты пульса к частоте дыхания
- частоты пульса к центральному венозному давлению

79. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный признак перелома костей

- деформация сустава
- деформация мягких тканей
- отек
- патологическая подвижность костных отломков

80. Выберите единственно правильный

ответ

Признак, характерный только для перелома

- кровоподтек
- припухлость
- крепитация костных отломков
- нарушение функции конечности

81. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный только для вывиха

- боль
- гиперемия
- нарушение функции
- пружинящая фиксация

82. Выберите единственно правильный

ответ

Рана является проникающей, если

- в ней находится инородное тело
- повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- повреждены мышцы и кости
- повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)

83. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность укушенной раны

- заражением бешенством
- заражением туберкулезом
- большой кровопотерей
- переломом костей

84. Выберите единственно правильный

ответ

Комбинированная травма это

- сочетание двух и более повреждающих факторов
- повреждение одного сегмента конечности
- перелом бедра и голени
- разрыв мочевого пузыря и перелом костей таза

85. Выберите единственно правильный

ответ

При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и деформация конечности, можно предположить

- повреждение связочного аппарата
- ушиб мягких тканей
- вывих
- закрытый перелом

86. Выберите единственно правильный

ответ

Сочетанная травма – это

- перелом плечевой кости и ЧМТ
- проникающее ранение брюшной полости
- перелом бедра и голени
- разрыв селезенки

87. Выберите единственно правильный

ответ

При переломе костей предплечья шина накладывается

- от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- от лучезапястного до локтевого сустава
- на место перелома
- от кончиков пальцев до верхней трети плеча

88. Выберите единственно правильный

ответ

В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом

- костей таза
- позвоночника
- бедра
- костей стоп

89. Выберите единственно правильный

ответ

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют

- ватно-марлевые кольца Дельбе
- ватно-марлевый воротник Шанца
- шину Еланского
- крестообразную повязку

90. Выберите единственно правильный

ответ

Причина ожогового шока

- спазм сосудов кожи
- психическая травма
- боль и плазмопотеря
- кровотечение

91. Выберите единственно правильный

ответ

Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается

- наличием "светлого промежутка"
- отсутствием очаговой симптоматики
- наличием повышенного АД
- нарушением сна

92. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный симптом вывиха костей

- отек
- нарушение функции
- боль
- "пустой сустав"

93. Выберите единственно правильный

ответ

У детей наблюдаются, как правило, переломы

- косые
- по типу "зеленой веточки"
- компрессионные
- полные

94. Выберите единственно правильный

ответ

Пациента с инородным телом дыхательных путей следует транспортировать в положении

- лежа на животе
- лежа на спине
- сидя или полусидя
- лежа с опущенной головой

95. Выберите единственно правильный

ответ

Типичное проявление перелома основания черепа

- кровотечение и ликворрея из носа и ушей
- отек век
- подкожная эмфизема
- двоение в глазах

96. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактику столбняка необходимо провести при

- ушибе мягких тканей кисти
- закрытом переломе плеча
- колотой ране стопы
- растяжении лучезапястного сустава

97. Выберите единственно правильный ответ

При сдавлении грудной клетки пострадавшему нужно ввести обезболивающее и

- уложить на живот
- уложить на спину
- уложить на бок
- придать полусидячее положение

98. Выберите единственно правильный ответ

Открытый пневмоторакс — это

- скопление воздуха в подкожной клетчатке
- воздух, попавший при ранении в плевральную полость
- перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана "дышит"
- скопление крови в плевральной полости

99. Выберите единственно правильный ответ

После спинно-мозговой пункции пациента транспортируют

- в положении лежа на боку
- лежа на животе
- полусидя
- лежа на спине

100. Выберите единственно правильный ответ

Причина травматического шока

- нарушение дыхания
- интоксикация
- болевой фактор
- психическая травма

101. Выберите единственно правильный ответ

Первая фаза течения раневого процесса в инфицированной ране это

- гидратация
- дегидратация
- рубцевание
- эпителизация

102. Выберите единственно правильный ответ

При накоплении экссудата в гнойной ране необходимо

- тампонировать рану
- дренировать рану
- наложить повязку с мазью Вишневского
- наложить сухую асептическую повязку

103. Выберите единственно правильный ответ

Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют с целью

- обезболивания
- улучшения кровообращения
- лизиса некротических тканей
- образования нежного тонкого рубца

104. Выберите единственно правильный ответ

Признак повреждения спинного мозга при травмах позвоночника

- деформация в области позвонков
- выстояние остистого отростка позвонка
- паралич
- "симптом вожжей"

105. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, характерный для перелома костей таза

- гематома в области промежности
- крепитация в области верхней трети бедра
- императивный позыв на мочеиспускание
- симптом "прилипшей пятки"

106. Выберите единственно правильный ответ

При переломах костей таза пациента транспортируют в положении

- на спине на мягких носилках
- на спине на щите в положении "лягушки"
- на животе
- полусидя

107. Выберите единственно правильный ответ

Раны называются сквозными, если

- имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- имеется только входное отверстие
- имеется входное и выходное отверстие
- повреждена кожа

108. Выберите единственно правильный ответ

Симптом раны

- крепитация
- зияние краев
- флюктуация
- патологическая подвижность

109. Выберите единственно правильный ответ

Дренаж в гнойную рану вводят для

- ускорения эпителизации
- остановки кровотечения
- обеспечения оттока отделяемого
- произведения тампонады

110. Выберите единственно правильный ответ

Один из основных симптомов сотрясения головного мозга

- ретроградная амнезия
- анизокория

- усиление рефлексов
- бессонница

111. Выберите единственно правильный

ответ

При ушибе головного мозга сознание чаще всего

- утрачивается после светлого промежутка
- утрачивается на несколько секунд или минут
- ясное
- утрачивается на длительное время

112. Выберите единственно правильный

ответ

Результат спинномозговой пункции при внутричерепной гематоме

- нет изменений
- примесь гноя
- примесь крови
- хлопья

113. Выберите единственно правильный

ответ

Для профилактики и борьбы с отеком мозга применяют

- оксигенотерапию
- физиотерпию
- дегидратационную терапию
- баротерапию

114. Выберите единственно правильный

ответ

Рана, нагноившаяся в процессе лечения, называется

- асептической
- первично инфицированной
- вторично инфицированной
- микробно-загрязненной

115. Выберите единственно правильный

ответ

Местный признак нагноения раны

- местное повышение температуры
- побледнение кожи
- подкожная эмфизема
- стихание боли

116. Выберите единственно правильный

ответ

"Симптом очков" наблюдается при

- сотрясении головного мозга
- ушибе головного мозга
- переломе основания черепа
- сдавлении головного мозга

117. Выберите единственно правильный

ответ

Множественный перелом – это

- перелом плеча и бедра
- перелом бедра
- перелом основания черепа
- перелом нижней челюсти

118. Выберите единственно правильный

ответ

При шоке пациента транспортируют

- с приподнятым головным концом
- в горизонтальном положении
- на боку
- с опущенным головным концом

119. Выберите единственно правильный

ответ

Репозиция отломков производится при

- интерпозиции
- любом смещении отломков
- поднадкостничных переломах
- открытых переломах

120. Выберите единственно правильный

ответ

Интерпозиция — это

- образование ложного сустава
- смещение костных отломков
- ущемление мягких тканей между отломками костей
- винтообразный перелом

121. Выберите единственно правильный

ответ

Помощь при электротравме следует начать с

- обезболивания
- наложения асептической повязки
- прекращения действия повреждающего фактора
- сердечно-легочной реанимации

122. Выберите единственно правильный

ответ

При обильном промокании кровью повязки в раннем послеоперационном периоде необходимо

- срочно информировать врача
- сменить повязку
- снять повязку
- наложить дополнительную повязку

123. Выберите единственно правильный

ответ

Характерный признак сдавления головного мозга гематомой

- повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
- длительная потеря сознания
- кратковременная потеря сознания
- потери сознания не бывает

124. Выберите единственно правильный

ответ

Окклюзионную повязку накладывают при

- переломе ребер
- сильном венозном кровотечении
- открытом пневмотораксе
- обширных повреждениях мягких тканей

125. Выберите единственно правильный

ответ

Гибель коры головного мозга – это

- декортикация
- дефибриляция

- регургитация
- краниocereбральная гипотермия

126. Выберите единственно правильный

ответ

Фактор риска в возникновении гидраденита

- несоблюдение личной гигиены
- переедание
- гипервитаминоз
- сухость кожи

127. Выберите единственно правильный

ответ

Неотложное независимое действие медсестры при наличии у пациента фурункула в области носогубного треугольника

- вскрытие и дренаж гнойника
- применение тепловых процедур
- срочное направление к врачу
- назначение антибиотиков

128. Выберите единственно правильный

ответ

Характер сестринского вмешательства у пациента с фурункулезом

- обучить пациента принципам рационального питания
- обеспечить прием достаточного количества жидкости
- регистрировать частоту и характер стула
- обеспечить тщательную гигиену кожи

129. Выберите единственно правильный

ответ

Острую гнойную хирургическую инфекцию чаще всего вызывает

- столбнячная палочка
- стафилококк
- стрептококк
- кишечная палочка

130. Выберите единственно правильный

ответ

Ограниченное скопление гноя в тканях — это

- гематома
- флегмона
- абсцесс
- атерома

131. Выберите единственно правильный

ответ

Гидраденит — это

- воспаление потовой железы
- воспаление сальной железы
- воспаление лимфатического узла
- воспаление лимфатического сосуда

132. Выберите единственно правильный

ответ

Местный симптом рожистого воспаления

- подергивание мышц
- гиперемия кожи с четкими границами
- разлитое покраснение кожи
- инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

133. Выберите единственно правильный

ответ

Тризм характерен для

- фурункулеза
- газовой гангрены
- столбняка
- рожистого воспаления

134. Выберите единственно правильный

ответ

Лимфаденит — это воспаление

- потовых желез
- лимфатических узлов
- лимфатических сосудов
- сальных желез

135. Выберите единственно правильный

ответ

Острый гематогенный остеомиелит — это воспаление

- пальца
- коленного сустава
- костного мозга и кости
- венозных сосудов

136. Выберите единственно правильный

ответ

При размягчении воспалительного инфильтрата следует

- наложить компресс с мазью Вишневского
- наложить пузырь со льдом
- наложить грелку
- произвести широкий разрез и дренирование

137. Выберите единственно правильный

ответ

Пандактилит — это воспаление

- кожи пальца
- сухожильного влагалища
- межфаланговых суставов
- всех тканей пальца

138. Выберите единственно правильный

ответ

Разлитое воспаление подкожной клетчатки — это

- сетчатый лимфангит
- рожистое воспаление
- флегмона
- абсцесс

139. Выберите единственно правильный

ответ

После вскрытия абсцесса накладывают повязку с

- гипертоническим раствором хлорида натрия
- мазью левомиколь
- преднизолоновой мазью
- 3% раствором перекиси водорода

140. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактика столбняка показана при

- при закрытом переломе шейки плеча
- острым гнойном плеврите
- ушибленной ране мягких тканей головы
- хроническом остеомиелите

141. Выберите единственно правильный

ответ

Независимое сестринское вмешательство при абсцедирующей стадии мастита включает в себя

- уменьшение питья, включение в рацион продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, исключение продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, включение продуктов, стимулирующих лактацию
- уменьшение питья, исключение продуктов, стимулирующих лактацию

142. Выберите единственно правильный

ответ

Форма остеомиелита

- эритематозный
- буллезный
- гематогенный
- стволочной

143. Выберите единственно правильный

ответ

Возбудитель газовой гангрены

- синегнойная палочка
- клостридия
- столбнячная палочка
- протей

144. Выберите единственно правильный

ответ

Осложнение сепсиса

- анафилактический шок
- септический шок
- септицемия
- септикопиемия

145. Выберите единственно правильный

ответ

Тактика среднего медработника при остром гематогенном остеомиелите

- сухое тепло, наблюдение
- антибиотикотерапия в амбулаторных условиях
- иммобилизация, срочная госпитализация
- направление пациента в травмпункт

146. Выберите единственно правильный

ответ

Пандактилит – это воспаление

- ногтевого валика
- межфалангового сустава
- всех тканей пальца
- сухожильного влагалища

147. Выберите единственно правильный

ответ

Карбункул — это воспаление

- лимфатической железы

- одного волосяного мешочка
- потовой железы
- нескольких волосяных мешочков

148. Выберите единственно правильный

ответ

Местный симптом газовой гангрены

- крепитация
- местное повышение температуры
- покраснение кожи без четких границ
- нагноение тканей

149. Выберите единственно правильный

ответ

"Флюктуация" — это

- появление пузырей на гиперемированной коже
- судорожное сокращение мимических мышц
- размягчение в центре инфильтрата
- "хруст" при пальпации кожи

150. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный для газовой гангрены

- симптом "тугой повязки"
- опистотонус
- судорожное сокращение поперечно-полосатых мышц
- стихание болей в ране

151. Выберите единственно правильный

ответ

Столбнячный анатоксин вводится для

- снятия симптомов воспаления
- предупреждения сепсиса
- создания активного иммунитета
- создания пассивного иммунитета

152. Выберите единственно правильный

ответ

При подкожном панариции применяется местная анестезия

- инфильтрационная
- фуллярная
- проводниковая
- спинно-мозговая

153. Выберите единственно правильный

ответ

Симптомом острого тромбоза является

- местное повышение температуры
- бледность кожи
- местное понижение температуры
- брадикардия

154. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактика столбняка показана при

- ожоге туловища 1 степени
- колотой ране передней брюшной стенки
- абсцессе легкого
- закрытом переломе предплечья

155. Выберите единственно правильный

ответ

Гидраденит чаще локализуется в

- подмышечной ямке
- паховой складке
- области шеи
- области спины

156. Выберите единственно правильный

ответ

Возбудителем рожистого воспаления является

- стафилококк
- стрептококк
- синегнойная палочка
- энтерококк

157. Выберите единственно правильный

ответ

Гематогенный остеомиелит может быть следствием

- огнестрельного ранения
- открытого перелома
- закрытого перелома
- флегмоны забрюшинного пространства

158. Выберите единственно правильный

ответ

Основная проблема пациента с облитерирующим эндартериитом

- трофические нарушения кожи конечностей
- отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы пораженной конечности
- боль в конечности
- зябкость дистальных отделов конечности

159. Выберите единственно правильный

ответ

Независимым сестринским вмешательством в послеоперационном периоде после удаления варикозных вен является

- запрещение ходьбы в течение шести дней
- запрещение занятий ЛФК в течение шести дней
- запрещение массажа ног
- запрещение сидеть с опущенными ногами

160. Выберите единственно правильный

ответ

Проблемой пациента с атеросклерозом сосудов нижних конечностей не является

- чувство боли
- трофические расстройства
- быстрое утомление при ходьбе
- чувство жара в области стоп

161. Выберите единственно правильный

ответ

Долгосрочная цель в плане сестринского ухода за пациентом с облитерирующим эндартериитом

- отказ от курения
- полное восстановление физической активности
- уменьшение зябкости конечностей

- полное восстановление пульсации на мелких артериях стоп

162. Выберите единственно правильный ответ

Сухая гангрена чаще развивается при

- медленно прогрессирующем нарушении кровообращения
- остром нарушении кровообращения
- бурном развитии инфекции в тканях
- повреждении нервных стволов

163. Выберите единственно правильный ответ

Симптомы интоксикации более выражены при

- сухой гангрене
- пролежнях
- влажной гангрене
- трофической язве

164. Выберите единственно правильный ответ

При сухой гангрене происходит

- нарастающий отек тканей
- гнилостный распад тканей
- мумифицирование тканей
- газообразование в тканях

165. Выберите единственно правильный ответ

При варикозной болезни рекомендуется

- ношение теплых носков
- удобная обувь
- холодные ванночки для стоп
- длительное пребывание на ногах

166. Выберите единственно правильный ответ

Во время беременности наиболее часто встречается сосудистая патология

- атеросклероз
- облитерирующий эндартериит
- варикозное расширение вен
- острый тромбоз артерии

167. Выберите единственно правильный ответ

Условие, способствующее образованию язв

- нарушение обмена электролитов
- неполноценное питание
- нарушение периферического кровообращения
- нагноительные процессы

168. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая причина образования свищей

- пороки развития
- оперативное вмешательство
- хронический воспалительный процесс
- травматические повреждения

169. Выберите единственно правильный ответ

Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей

- кровотечение
- перемежающаяся хромота
- сухая гангрена
- отек тканей

170. Выберите единственно правильный ответ

"Перемежающаяся" хромота — основной признак

- лимфангита
- облитерирующего эндартериита
- варикозного расширения вен нижних конечностей
- лимфостаза в нижних конечностях

171. Выберите единственно правильный ответ

Сестринское вмешательство у онкологического больного с проблемой в психоэмоциональной сфере

- обучение приёмам ЛФК
- поощрение общения с другими пациентами
- обеспечение максимального комфорта
- способствование физической активности пациента

172. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема пациента с раком пищевода:

- дисфагия
- нарушение аппетита
- сухость кожи
- дефицит массы тела

173. Выберите единственно правильный ответ

Характерный признак удовлетворения потребности выделять у пациента с раком прямой кишки:

- вздутие живота
- дефицит массы тела
- сухость кожи
- алая кровь при дефекации

174. Выберите единственно правильный ответ

При запущенных злокачественных опухолях показана операция

- радикальная
- паллиативная
- электрокоагуляция
- экстренная

175. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- метастазирует в регионарные узлы
- метастазирует в отдаленные органы
- метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы

- не метастазирует

176. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- ограничена капсулой
- не прорастает в соседние ткани
- прорастает в соседние ткани
- раздвигает ткани

177. Выберите единственно правильный ответ

Основной метод лечения злокачественных опухолей

- фитотерапия
- оперативное лечение
- гормонотерапия
- физиотерапия

178. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- не влияет на общее состояние
- растет медленно, имеет капсулу
- растет быстро, разрушая окружающие ткани
- не рецидивировать

179. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- растет медленно, не прорастает в окружающие ткани
- рецидивировать
- метастазирует
- вызывает кахексию

180. Выберите единственно правильный ответ

При доброкачественной опухоли

- развивается кахексия
- развивается анемия
- развивается интоксикация
- состояние не изменяется

181. Выберите единственно правильный ответ

Больной считается неоперабельным при

- предраке
- I ст. рака
- IV ст. рака
- II ст. рака

182. Выберите единственно правильный ответ

Характерный признак рака прямой кишки

- урчание в животе
- тошнота, рвота
- патологические выделения из прямой кишки
- отсутствие аппетита

183. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль из мышечной ткани

- аденома
- миома
- нейросаркома
- миосаркома

184. Выберите единственно правильный

ответ

Проблема пациента с колостомой

- повышение температуры тела
- недержание мочи
- затруднение, связанное с необходимостью осуществлять физиологическое опорожнение в непривычном положении
- необходимость посещения туалета в ночное время

185. Выберите единственно правильный

ответ

Необходимое сестринское обследование при подозрении на "острый живот"

- определение тургора тканей
- пальпация живота
- перкуссия грудной клетки
- аускультация сердца

186. Выберите единственно правильный

ответ

Перед оказанием неотложной помощи пациенту с неукротимой рвотой медсестра соберет дополнительную информацию о

- нарушении режима питания
- отсутствии в анамнезе болезни Боткина
- соблюдении режима сна и бодрствования
- нарушении периодичности приема пищи

187. Выберите единственно правильный

ответ

Характер сестринского вмешательства при синдроме "острый живот"

- постоянное наблюдение за пациентом
- применение грелки на живот
- кормление пациента охлажденной пищей
- создание щадящего покоя

188. Выберите единственно правильный

ответ

Защитное мышечное напряжение характерно для

- острого перитонита
- отечной формы панкреатита
- инвагинации кишечника
- желудочного кровотечения

189. Выберите единственно правильный

ответ

При желудочном кровотечении показана

- рентгенография желудка с барием
- УЗИ
- экстренная ФГДС
- экстренная операция

190. Выберите единственно правильный

ответ

Рвота при остром панкреатите

- многократная, не приносящая облегчения

- однократная
- многократная, приносящая облегчение
- отсутствует

191. Выберите единственно правильный ответ

Причина механической желтухи при холецистите

- печеночная недостаточность
- закупорка камнем общего желчного протока
- гемолиз эритроцитов
- нарушение обмена веществ

192. Опоясывающая боль наблюдается

при

- панкреатите
- холецистите
- травме селезенки
- перфоративной язве желудка

193. Выберите единственно правильный

ответ

Достоверный признак перитонита

- болезненность живота при пальпации
- неотхождение газов и кала
- рвота
- симптом раздражения брюшины

194. Выберите единственно правильный

ответ

Эвентрация — это

- воспаление брюшины
- ущемление кишечника в спайках
- выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку
- выделение кишечного содержимого из раны

195. Выберите единственно правильный

ответ

Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов брюшной полости

- острого перитонита
- нарушения функции желудочно-кишечного тракта
- внутреннего кровотечения
- острой дыхательной недостаточности

196. Выберите единственно правильный

ответ

Противопоказания к операции при остром аппендиците

- старческий возраст
- отсутствуют
- гипертоническая болезнь
- острая пневмония

197. Выберите единственно правильный

ответ

При остром перитоните выполняется операция

- диагностическая
- плановая
- срочная

экстренная

198. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром холецистите

постоянные, сильные в правой подвздошной области

постоянные, резкие боли в правом подреберье

опоясывающие, тупого характера

"кинжальные" в эпигастрии

199. Выберите единственно правильный ответ

Симптом острого холецистита

подающей капли

Пастернацкого

Ситковского

Ортугера

200. Выберите единственно правильный ответ

Анализ крови и мочи на содержание амилазы выполняют при подозрении на

кишечное кровотечение

острый проктит

острый панкреатит

острый перитонит

201. Выберите единственно правильный ответ

Транспортировка больного с перитонитом осуществляется

городским транспортом

сидя

лежа на носилках

лежа на шите

202. Выберите единственно правильный ответ

При кишечной непроходимости живот

не изменен

доскообразный

асимметричен, вздут

втянут

203. Выберите единственно правильный ответ

Тактика среднего медработника при остром холецистите

холод на живот, госпитализация

грелка на область печени

"слепое зондирование"

желчегонные средства в амбулаторных условиях

204. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при перфоративной язве желудка

постоянные, сильные в правой подвздошной области

постоянные, резкие боли в правом подреберье

опоясывающие, тупого характера

"кинжальные" в эпигастрии

205. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром аппендиците

постоянные, сильные боли в правой подвздошной области

постоянные, резкие боли в правом подреберье

опоясывающие тупого характера

"кинжальные" в эпигастрии

206. Выберите единственно правильный ответ

Причина трещин заднего прохода

проктит

геморрой

длительные запоры

парапроктит

207. Выберите единственно правильный ответ

Характер патологических примесей в каловых массах при геморрое

кровь смешана с каловыми массами

дегтеобразный стул

стул со слизью

кровь не смешана с каловыми массами

208. Выберите единственно правильный ответ

Геморрой может осложниться

тромбозом геморроидальных узлов

воспалением кожи вокруг анального отверстия

дерматитом

диспепсией

209. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при клинической картине «острого живота» у пациента

холод на живот

очистительная клизма

промывание желудка

дача слабительного средства

210. Выберите единственно правильный ответ

Парапроктит — это

воспаление вен прямой кишки

выпадение прямой кишки

воспаление околопрямокишечной клетчатки

воспаление прямой кишки

211. Выберите единственно правильный ответ

Симптомы подкожного парапроктита

напряженные сине-багровые узлы в области анального отверстия

трещины в области задней спайки

- боль, припухлость, гиперемия кожи вокруг заднего прохода
- зуд в анальной области

212. Выберите единственно правильный

ответ

Характер рвоты при стенозе привратника

- примесь желчи, рвота многократная
- цвета «кофейной гущи»
- пищей, съеденной накануне
- с каловым запахом

213. Выберите единственно правильный

ответ

Достоверный симптом аппендицита

- разлитая боль в животе
- тошнота
- вздутие живота
- симптом Щеткина-Блюмберга

214. Выберите единственно правильный

ответ

При остром аппендиците характерно положение больного лежа на

- правом боку
- левом боку
- спине, с опущенным головным концом
- животе

215. Выберите единственно правильный

ответ

Вид кишечной непроходимости, относящийся к динамической

- узлообразование
- заворот кишечника
- инвагинация
- парез кишечника

216. Выберите единственно правильный

ответ

"Серп" воздуха при рентгенографии брюшной полости характерен для

- кишечной непроходимости
- прободной язвы
- кровоточащей язвы
- панкреатита

217. Выберите единственно правильный

ответ

Осложнением язвенной болезни желудка является

- кишечная непроходимость
- ущемленная грыжа
- асцит
- перфорация

218. Выберите единственно правильный

ответ

Механическая желтуха — это осложнение

- острого панкреатита
- острого аппендицита
- острого холецистита
- острого дуоденита

219. Выберите единственно правильный

ответ

Мелена — это симптом

- острого холецистита
- желудочно-кишечного кровотечения
- острого аппендицита
- острого панкреатита

220. Выберите единственно правильный

ответ

Время постановки очистительной клизмы при динамической кишечной непроходимости

- одновременно с инъекцией спазмолитика
- через 30 минут после инъекции спазмолитика
- через 1,5 часа после инъекции спазмолитика
- проведение процедуры не связано с введением спазмолитика

221. Выберите единственно правильный

ответ

Мочевой пузырь опорожняется после последнего мочеиспускания через

- 2 – 3 часов
- 3 – 4 часа
- 1 – 2 часа
- 5 – 6 часов

222. Выберите единственно правильный

ответ

Независимое сестринское вмешательство при рефлекторной задержке мочеиспускания после операции

- назначение мочегонных средств
- подача теплого судна
- строгий постельный режим
- пузырь со льдом на низ живота

223. Выберите единственно правильный

ответ

Признак полного разрыва уретры

- отсутствие мочи
- гематурия
- моча цвета пива
- моча цвета мясных помоев

224. Выберите единственно правильный

ответ

Признак ушиба почек

- ложные позывы на мочеиспускание
- боль при мочеиспускании
- положительный симптом Щеткина-Блюмберга
- микро или макрогематурия

225. Выберите единственно правильный

ответ

Первая помощь при травме мочевого пузыря

- катетеризация
- пузырь со льдом
- мочегонные средства
- нитрофурановые препараты

226. Выберите единственно правильный

ответ

Доврачебная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы предстательной железы

- пузырь со льдом
- мочегонные средства
- обезболивающие
- катетеризация

227. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

- мягкий живот
- симптом Щеткина-Блюмберга
- симптом Ситковского
- кровотечение из уретры

228. Выберите единственно правильный ответ

Первая помощь при травме почек

- наркотические препараты
- холод, срочная госпитализация
- тепло
- мочегонные препараты

229. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при острой задержке мочи

- назначение обезболивающего средства
- выведение мочи резиновым катетером
- введение спазмолитика
- грелка на низ живота

230. Выберите единственно правильный ответ

При почечной колике наиболее характерна иррадиация боли в

- околопупочную область
- паховую область и бедро

- плечо
- эпигастрий

231. Выберите единственно правильный ответ

Причина болевых ощущений при почечной колике

- позывы на мочеиспускание
- затрудненное мочеиспускание
- спазм мочеточника и травма слизистой мочеточника
- восходящая инфекция

232. Выберите единственно правильный ответ

Почечная колика является осложнением

- гемангиомы мочевого пузыря
- уролитиаза
- паранефрита
- цистита

233. Выберите единственно правильный ответ

Дифференцировать мочекаменную болезнь с острыми заболеваниями органов брюшной полости позволяет

- общий анализ крови
- катетеризация мочевого пузыря
- УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы
- проба Каковского-Аддиса

234. Выберите единственно правильный ответ

Неотложная помощь при почечной колике

- антибиотики и катетеризация мочевого пузыря
- мочегонные и тепло
- холод на живот и фурагин
- спазмолитики и тепло

2. Знания современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности

235. Выберите единственно правильный ответ

Предоперационный период начинается с момента

- заболевания
- поступления в стационар
- установления диагноза
- начала подготовки к операции

236. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность предоперационного периода зависит от

- метода обезболивания
- срочности операции
- риска операции
- состава операционной бригады

237. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- боль
- рвота
- одиночество из-за отсутствия близких людей
- страх операции

238. Выберите единственно правильный ответ

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума

- риска операции и послеоперационных осложнений
- внутрибольничного инфицирования и выявление противопоказаний
- состояния послеоперационного шока и дыхательной недостаточности

239. Выберите единственно правильный

ответ

Больной транспортируется из приемного покоя в операционную в случаях

- состояния шока
- паховой грыжи
- внутреннего кровотечения
- ранения сердца

240. Выберите единственно правильный

ответ

В случае перитонита подготовка больного к экстренной операции включает

- теплый душ
- очистительную клизму
- дыхательную гимнастику перед наркозом
- бритье и дезинфекцию операционного поля

241. Выберите единственно правильный

ответ

Уменьшению предоперационного стресса способствует

- психологическая подготовка
- теплый душ
- физиопроцедуры
- диета

242. Выберите единственно правильный

ответ

В предоперационном периоде чаще всего у пациента выявляются страхи

- умереть во время операции
- большой кровопотери
- отсутствия сознания во время наркоза
- отсутствие самостоятельного дыхания

243. Выберите единственно правильный

ответ

Тревогу пациента в предоперационном периоде медсестра выявляет по

- хорошему настроению
- нервности, напряжению лицевой мускулатуры
- снижению аппетита
- показателям жизнедеятельности

244. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность прикладывания пузыря со льдом к послеоперационной ране не более

- 20 минут
- 2 часа
- 5 – 6 часов
- 24 часа

245. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность тромбозов возрастает при

- строгом постельном режиме
- активном ведении больного
- при переходе со строгого постельного режима на активный

246. Выберите единственно правильный

ответ

Сокращение диаметра вен в 2 раза с помощью эластичной компрессии ведет к ускорению кровотока в

- 2 раза
- 3 раза
- 4 раза
- 5 раз
- 6 раз

247. Выберите единственно правильный

ответ

Реальная угроза воздушной эмболии при кровотечении из

- артерий шеи
- вен шеи
- артерии плеча
- вен бедра

248. Выберите единственно правильный

ответ

При быстром промокании послеоперационной повязки медсестра обязана

- заменить верхние слои повязки новыми
- снять все слои и наложить новую повязку
- вызвать врача
- положить пузырь со льдом

249. Выберите единственно правильный

ответ

Положение пациента на операционном столе при операциях на почках

- на спине горизонтальное
- валик подложен под нижние ребра
- голова запрокинута назад
- на боку с валиком в поясничной области
- гинекологическое

250. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность подготовки к плановой операции

- 2–4 часа
- 4–6 часов
- 12 часов
- 24 часа

251. Выберите единственно правильный

ответ

В случае приема пищи больным за 40 минут до экстренной операции следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

252. Выберите единственно правильный

ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма

- противопоказана
- делается за 1 час до операции
- делается при полном кишечнике

делается всегда

253. Выберите единственно правильный ответ

При подготовке пациента к экстренной операции необходимо

- определить рост пациента
- дать пациенту стакан сладкого чая
- по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- сделать очистительную клизму

254. Выберите единственно правильный ответ

Пациента в операционный блок доставляют

- пешком
- только на каталке
- пешком, на каталке или на сидячем кресле, в зависимости от состояния
- на сидячем кресле

255. Выберите единственно правильный ответ

В операционный блок пациента на каталке перевозит персонал отделения

- клинического
- операционного блока
- любого
- санпропускника

256. Выберите единственно правильный ответ

В операционный зал доставляет пациента на каталке персонал отделения

- клинического
- операционного блока
- любого
- санпропускника

257. Выберите единственно правильный ответ

В операционную пациентов ввозят

- с одеялом
- с подкладной подушкой
- без одеял и подушек
- с матрасом

258. Выберите единственно правильный ответ

При гнойных операциях, для предотвращения загрязнения большого инструментального стола, целесообразен способ подачи инструментов

- в руки хирургу
- на инструментальный столик
- комбинированный
- в салфетке

259. Выберите единственно правильный ответ

Во время операции операционная медсестра подает инструменты

- рукой в перчатках
- инструментом
- в салфетке

на инструментальный столик

260. Выберите единственно правильный ответ

Шовный и перевязочный материал операционная медсестра подает хирургу

- рукой в перчатках
- инструментами
- любым способом
- в салфетке

261. Выберите единственно правильный ответ

Правила подачи скальпеля операционной медсестрой

- в салфетке, лезвием вверх, рукояткой к хирургу
- в салфетке, лезвием вниз, рукояткой к себе
- без салфетки, лезвием вниз, рукояткой к себе
- любым способом

262. Выберите единственно правильный ответ

Ножницы, зажимы, крючки операционная медсестра подает

- в закрытом виде, кольцами к хирургу
- в закрытом виде, кольцами к себе
- в открытом виде, кольцами к себе
- в открытом виде, кольцами к хирургу

263. Выберите единственно правильный ответ

Иглодержатель с заряженной в игле лигатурой операционная медсестра, поддерживая длинный конец лигатуры пинцетом, подает

- кольцами к хирургу
- кольцами к себе
- любым способом
- в салфетке

264. Выберите единственно правильный ответ

Лигатура вдевается в иглу так, чтобы ее конец был длиннее другого

- в 1–2 раза
- в 3–4 раза
- в 5–6 раз
- в 7–8 раз

265. Выберите единственно правильный ответ

Хирургические нити без игл операционная медсестра должна подавать хирургу

- рукой в перчатках
- пинцетом
- в салфетке
- на операционный столик

266. Выберите единственно правильный ответ

Длина хирургической нити для непрерывного шва

- 10–15 см

- 18–20 см
- 25–30 см
- любая

267. Выберите единственно правильный

ответ

Длина хирургической нити для поверхностных узловых швов

- 10–15 см
- 18–20 см
- 25–30 см
- любая

268. Выберите единственно правильный

ответ

Захватывание иглы широкой частью губок иглодержателя приводит

- к поломке иглы
- к проворачиванию
- к неправильному положению иглы
- к разрыву нити

269. Выберите единственно правильный

ответ

Прямую иглу после зарядки нитью подают хирургу

- без иглодержателя
- с помощью пинцета
- ушком к хирургу
- острием к хирургу

270. Выберите единственно правильный

ответ

При работе на кишечнике хирургу необходимо подавать только

- анатомические пинцеты
- хирургические пинцеты
- лапчатые пинцеты

271. Выберите единственно правильный

ответ

Шприц подается хирургу

- поршнем к себе
- иглой к себе
- боковой поверхностью
- любым способом

272. Выберите единственно правильный

ответ

Инфицированный перевязочный материал берется

- только инструментом
- только руками
- любым способом
- боковой поверхностью

273. Выберите единственно правильный

ответ

Во время операции перевязочный материал подается

- рукой
- инструментом
- любым способом
- боковой поверхностью

274. Выберите единственно правильный

ответ

Для обеспечения специализированных оперативных вмешательств используются инструменты

- общие хирургические
- специального назначения
- общие хирургические и специального назначения
- любые

275. Выберите единственно правильный

ответ

Микроирригаторы применяются

- для введения лекарственных веществ
- для выведения раневого отделяемого
- для введения турунд
- для введения инструментов

276. Выберите единственно правильный

ответ

Окончатые зажимы используются

- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей
- для сохранения герметичности при операциях на тканях и органах
- для коагуляции сосудов

277. Выберите единственно правильный

ответ

Зажимы Кохера отличаются от зажимов

Бильрота

- наличием острых зубцов
- кривизной
- величиной
- длинными браншами

278. Выберите единственно правильный

ответ

Медицинские зеркала предназначаются

- для разъединения тканей
- для отгеснения тканей
- для выделения органов
- для исследования ран и свищевых ходов

279. Выберите единственно правильный

ответ

Медицинский шпатель – инструмент

- оттесняющий
- разъединяющий
- режущий
- соединяющий

280. Выберите единственно правильный

ответ

Щипцы- диссекторы применяются

- для разделения тканей
- для рассечения тканей
- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей

281. Выберите единственно правильный

ответ

В общехирургической практике применяются иглодержатели

- Матъе
- Гегара
- Дальгрена
- Федорова

282. Выберите единственно правильный ответ

Иглодержатели Гегара бывают

- 2-х размеров
- 3-х размеров
- 5 размеров
- однотипные

283. Выберите два правильных ответа

К колющим инструментам относятся

- скальпели
- троакары
- иглы
- зонды
- зажимы

284. Выберите два правильных ответа

К инструментам, соединяющим ткани, относятся

- иглы и иглодержатели
- зажимы
- степлеры и клиперы
- кусачки
- зонды

285. Выберите два правильных ответа

Хирургические шовные иглы разделяют на

- колющие
- режущие
- рассекающие
- соединяющие
- вспомогательные

286. Выберите два правильных ответа

Вопросы, обсуждаемые с пациентом перед операцией

- подготовка кишечника
- эффективность анестезии
- ограничение питания
- возможность осложнений
- расположение на операционном столе

287. Выберите два правильных ответа

В хирургической операции различают

- начальный этап
- средний этап
- конечный этап
- оперативный доступ
- оперативный прием

288. Выберите два правильных ответа

Медицинские зонды предназначены

- для исследования ран и свищевых ходов
- для проведения тампонов и дренажей
- для рассечения тканей
- для коагуляции
- для остановки кровотечения

289. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь эффективна, если пациент в предоперационном периоде

- понимает эффективность голодания
- поел перед операцией
- выпил много жидкости
- дал информированное согласие
- скрыл симптомы начала ОРВИ

290. Выберите два правильных ответа

Медсестра объясняет необходимость перед премедикацией

- опорожнить мочевой пузырь
- выпить стакан жидкости
- сделать очистительную клизму
- измерить температуру
- снять все протезы

291. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь в интраоперационном периоде

- безопасность пациента
- реализация плана ухода
- мониторинг показателей жизнедеятельности
- расположение на операционном столе
- измерение температуры
- гемотрансфузия

292. Выберите два правильных ответа

Сестринский уход во время операции эффективен, если

- кожа со следами сдавлений
- кожа без гиперемии и сдавлений
- проводился мониторинг показателей жизнедеятельности
- соблюдена инфекционная безопасность
- измерялась температура тела
- проводилась гемотрансфузия

293. Выберите два правильных ответа

Для эффективного ухода в послеоперационном периоде перевязочной медсестре необходимо знать

- аппетит пациента
- продолжительность его сна
- локализацию операционного разреза
- характеристику пульса пациента
- физиологические отправления
- наличие дренажей

294. Выберите два правильных ответа

Послеоперационный уход включает

- улучшение памяти пациента
- прогулки на свежем воздухе
- контроль боли, ЛФК в постели
- контроль за раной, дренажами
- знать телефон родственников

295. Выберите два правильных ответа

Возможные послеоперационные осложнения из-за ограничения движений пациента

- переломы
- раневая инфекция
- низкие цифры АД

- пневмонии
- кровотечения
- инфильтраты
- тромбозы

296. Выберите два правильных ответа

Профилактике тромбозов в послеоперационном периоде способствуют

- инъекции антибиотиков
- ранняя активизация пациента
- поздняя активизация пациента
- использование эластичных бинтов, чулок
- оказание психологической поддержки
- назначение обезболивающих средств

297. Выберите два правильных ответа

Для профилактики тромбозов в послеоперационном периоде необходимо

- введение гепарина
- противопролежневый матрац
- компрессионная повязка
- давящая повязка
- назначение обезболивающих средств

298. Выберите два правильных ответа

К инструментам, разъединяющим ткани, относятся

- скальпели
- ножницы
- ранорасширители
- бельевые зажимы
- зажим Кохера

299. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по предназначению

- на общий
- на типовой
- на специальный
- на экстренный
- на плановый

300. Выберите два правильных ответа

Инструмент для защиты тканей от случайного повреждения

- ножницы остроконечные
- зонд Кохера
- иглы круглые
- пинцет хирургический
- мышечный ретрактор

301. Выберите три правильных ответа

Не осложненное течение раннего послеоперационного периода сопровождается

- поносом

- ослаблением перистальтики кишечника
- неукротимой рвотой
- тахикардией до 135 в минуту
- тахикардией до 100 в минуту
- фебрильной лихорадкой
- субфебрильной лихорадкой

302. Выберите три правильных ответа

Любая операция включает ряд последовательных этапов

- разъединение тканей
- металлоостеосинтез
- остановку кровотечения
- соединение рассеченных тканей
- резекцию кишки

303. Выберите три правильных ответа

Для перевязки сосудов в операционной ране применяют

- шелк
- кетгут
- капрон
- лавсан
- лен
- этибонд

304. Выберите три правильных ответа

Общие хирургические инструменты по своему воздействию на ткани делятся на следующие группы

- для разъединения тканей
- для остановки кровотечения
- для фиксации тканей
- для соединения тканей
- для создания анастомоза

305. Выберите три правильных ответа

В общехирургической практике применяются скальпели

- брюшистые
- остроконечные
- тупоконечные
- обоюдоострые
- со съемным лезвием

306. Выберите три правильных ответа

Пинцеты подразделяются по характеру воздействия на ткани на

- анатомические
- хирургические
- коагуляционные
- вспомогательные
- сдавливающие

3. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации

307. Выберите единственно правильный ответ

Выберите биологический гемостатик для ушивания раны почки

- гемостатическая губка
- серджесел

- серджесел нью-нит
- серджесел фибриллар

308. Выберите единственно правильный ответ

Выберите шовный материал для ушивания аорты

- кетгут
- шёлк
- пролен
- гортекс

309. Выберите единственно правильный

ответ

Нижнюю полую вену можно ушить

- кетгут
- лавсан
- викрил
- пролен

310. Выберите единственно правильный

ответ

Метод окончательной остановки кровотечения при микрохирургической операции без перевязки

- ушивание
- коагуляция
- сосудистый шов
- клипирование сосудов

311. Выберите единственно правильный

ответ

Микрохирургический инструмент для наложения клипс

- зажим Борхарда
- зажим Кохера
- клипатор
- клипсодержатель

312. Выберите единственно правильный

ответ

Эндохирургический кровоостанавливающий зажим

- зажим Кохера
- зажим Бека
- клипатор
- клипсодержатель

313. Выберите единственно правильный

ответ

Зажим для наложения бокового сосудистого шва на аорту

- Бильрота
- многоцелевой Де Бейки
- аортальный зажим Бека
- анастоматический зажим Кастенада

314. Выберите единственно правильный

ответ

Самая тонкая кетгутовая нить

- 6/0
- 0
- 4
- 11/0

315. Выберите единственно правильный

ответ

Инструмент для перевязки артерии на протяжении

- лигатурная игла Дешана, лигатурная игла Купера
- проводник Поленова, зажим Блелока

- Г-образный зажим, зажим Сатинского

316. Выберите единственно правильный ответ

Помещения с асептическим режимом

- не должны быть проходными
- могут быть проходными
- должны быть проходными
- могут быть частично проходными

317. Выберите единственно правильный

ответ

Ширина дверных проемов в существующих операционных должна быть не менее

- 50 см
- 80 см
- 110 см
- 150 см

318. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь малой операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 24 кв. м
- 36 кв. м

319. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 36 кв. м
- 42 кв. м

320. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь предоперационной для одной общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 42 кв. м
- 48 кв. м

321. Выберите единственно правильный

ответ

Инструментальная комната оперблока предназначена для

- дезинфекции хирургического инструментария
- стерилизации хирургического инструментария
- хранения хирургического инструментария и аппаратуры

322. Выберите единственно правильный

ответ

Операционный зал должен иметь высоту потолков не менее (метров)

- 3,0
- 3,5
- 4,0
- 4,4

323. Выберите единственно правильный

ответ

Полы в операционных, наркозных, реанимационных помещениях должны быть

- антистатическими
- непылеобразующими
- водонепроницаемыми
- мраморными
- любыми

324. Выберите единственно правильный

ответ

Положение Тренделенбурга на операционном столе применяется при операциях

- на органах малого таза
- гинекологических
- на прямой кишке
- на мочевом пузыре

325. Выберите единственно правильный

ответ

Решение о любом изменении позиции пациента на операционном столе

- принимают только после консультации с анестезиологом
- принимает операционная медсестра самостоятельно
- принимает хирург
- принимает зав. отделением

326. Выберите единственно правильный

ответ

На операционном столе изменять положение пациента, находящегося под наркозом

- необходимо быстро, осторожно
- необходимо медленно, осторожно, скоординировано
- нельзя до восстановления сознания
- можно быстро

327. Выберите единственно правильный

ответ

Пункцию голеностопного сустава осуществляют в положении пациента

- на боку
- на спине
- на животе
- сидячем

328. Выберите единственно правильный

ответ

Пункцию грудины (стерильную) осуществляют в положении пациента

- на боку
- на животе
- на спине
- сидячем

329. Выберите единственно правильный

ответ

Возможность естественного проветривания должна быть предусмотрена во всех помещениях за исключением помещений

- класса чистоты А

класса чистоты В

класса чистоты Б

класса чистоты Г

330. Выберите единственно правильный

ответ

В помещениях класса чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать %

- 50
- 60
- 70
- 80

331. Выберите единственно правильный

ответ

Для операционных обязательно системы приточно - вытяжной вентиляции

- самостоятельные
- общие
- раздельные
- комбинированы

332. Выберите единственно правильный

ответ

Воздух во всех помещениях операционного блока подается в

- верхнюю зону
- среднюю зону
- нижнюю зону
- среднюю и нижнюю зоны

333. Выберите единственно правильный

ответ

В операционных предусматривается удаление воздуха

- из верхней зоны
- 40 % из верхней и 60 % из нижней зоны
- 60 % из верхней зоны и 40 % из нижней
- из нижней зоны

334. Выберите единственно правильный

ответ

В асептических помещениях

- приток воздуха должен преобладать над вытяжкой
- вытяжка преобладает над притоком
- не имеет значения, преобладает вытяжка или приток воздуха
- приток воздуха 50% и вытяжка 50%

335. Выберите единственно правильный

ответ

Система вентиляции помещений класса чистоты А должна работать

- в непрерывном режиме
- только во время операций
- только между операциями
- в произвольном режиме

336. Выберите единственно правильный

ответ

Операционный зал должен иметь естественное освещение

- обязательно
- не обязательно

- желательно
- не желательно

337. Выберите единственно правильный ответ

Расположение пациента на операционном столе горизонтальное с приподнятым изголовьем называется положением

- Фовлера
- Тренделенбурга
- Кларка
- Федорова

338. Выберите единственно правильный ответ

Изголовье операционного стола не рекомендуется приподнимать выше, чем на

- 15°
- 20°
- 25°
- 45°

339. Выберите единственно правильный ответ

Положение пациента на операционном столе на боку с валиком в поясничной области применяется при операциях

- на мочевом пузыре
- на органах живота (передний доступ)
- на почках
- на груди

340. Выберите единственно правильный ответ

Положение пациента на операционном столе горизонтальное на спине с головой, запрокинутой назад при помощи валика, применяется при операциях

- на лице
- на органах живота (передний доступ)
- на щитовидной железе
- на груди

341. Выберите единственно правильный ответ

При операциях на лице, шее, груди, органах живота, мочевом пузыре, ампутации конечности положение пациента на операционном столе

- на спине горизонтально
- на боку
- на животе
- гинекологическое

342. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу требует от операционной медсестры

- четкого знания хода операции
- опережая хирурга, держать нужный инструмент
- произвольных действий
- только по требованию хирурга

343. Выберите единственно правильный ответ

Чем выше квалификация операционной медсестры, тем чаще она использует способ подачи инструментов

- в руки хирургу
- на инструментальный столик
- комбинированный
- только по требованию хирурга

344. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу – наиболее

- несовершенный
- совершенный и трудный
- простой и распространенный
- медленный

345. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов на инструментальный столик – наиболее

- совершенный
- трудный
- простой
- распространенный

346. Выберите единственно правильный ответ

Для обеспечения инфекционной безопасности на операционную рану накладывается повязка

- всегда
- по показаниям
- по решению хирурга
- по решению старшей мед.сестры

347. Выберите единственно правильный ответ

Браншевые инструменты – это инструменты

- с кольцами для удобства удерживания
- с фиксаторами
- с шарнирами
- с рамками

348. Выберите единственно правильный ответ

Кремальеры – это

- шарниры
- приспособления для фиксации инструментов в нужном положении
- специальные рукоятки
- режущие части инструментов

349. Выберите единственно правильный ответ

Зажимы Пеана, Кохера, Бильрота относятся к инструментам

- для остановки кровотечения
- для соединения ткани
- вспомогательным
- костным

350. Выберите единственно правильный

ответ

Желобоватый зонд используют

- для защиты тканей от случайного повреждения
- для разрезания мягких тканей
- для прокола мягких тканей
- для кройки перевязочного материала

351. Выберите единственно правильный

ответ

Пинцеты, зонды, крючки относятся к инструментам

- специальным
- соединяющим
- вспомогательным
- разъединяющим

352. Выберите единственно правильный

ответ

Дерматомы бывают

- клеевые
- пластырные
- с вращающимися дисковыми ножами
- с кремальерами

353. Выберите единственно правильный

ответ

При эксплуатации хирургических лазерных аппаратов

- защита не требуется
- обязательно применение закрытых защитных очков
- необходимо избегать смотреть на прямое излучение
- необходимо избегать попадания в глаза прямых и отраженных лучей

354. Выберите единственно правильный

ответ

При струмэктомии обязательным является наличие в операционном наборе

- системы для прямого переливания крови
- трахеостомического набора
- сосудистого набора
- костного набора

355. Выберите единственно правильный

ответ

В набор инструментов для операции по поводу зоба входят

- зонд Кохера
- зажим Де-Бейки
- зажим Федорова
- зажимы Микулича

356. Выберите единственно правильный

ответ

В набор инструментов для трахеостомии входят

- зонд Фогарти
- толстый резиновый катетер
- катетер трахеальный металлический
- хирургический коловорот, катетер

357. Выберите единственно правильный

ответ

Инструменты для стерильной пункции

- игла Кассирского, 10–20-х граммовый шприц, иглы инъекционные
- троакар, 10–20-х граммовый шприц, иглы инъекционные
- хирургический коловорот, катетер
- толстый резиновый катетер

358. Выберите единственно правильный

ответ

Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несет

- заведующий структурным подразделением
- старшая медсестра
- работник
- хирург

359. Выберите единственно правильный

ответ

В целях профилактики гемоконтактных инфекций надевать перчатки перед парентеральными манипуляциями/ операциями

- обязательно
- желательно
- необходимо в соответствии с показаниями
- можно не одевать

360. Выберите единственно правильный

ответ

Лицевая маска после операции снимается

- за завязки
- за фильтр
- любым способом
- можно не снимать

361. Выберите единственно правильный

ответ

Периодичность смены комплекта спецодежды в стерильной зоне

- 1 раз в неделю
- 1 раз в 2 дня
- 1 раз в смену
- 1 раз в 3 дня

362. Выберите единственно правильный

ответ

Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами ЛПУ

- запрещается
- разрешается
- допускается
- желательно

363. Выберите единственно правильный

ответ

Ношение защитных очков / щитков во время операции для всех членов операционной бригады

- обязательно
- защитные очки / щитки могут быть средством выбора

обязательно

допускается

364. Выберите два правильных ответа

Операционные должны быть пронумерованы и функционально разделены с учетом

степени чистоты оперативного вмешательства

хирургических бригад

вида анестезии

тяжести состояния пациента

необходимого оборудования

365. Выберите два правильных ответа

Виды операционных с учетом чистоты производимых в них операций

асептические

септические

смешанные

плановые

экстренные

366. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по назначению на

типовой

общий

специальный

экстренный

плановый

367. Выберите два правильных ответа

Буж применяется

для дренирования полостей

для механического расширения физиологических отверстий

для механического расширения искусственных отверстий

для исследования ран и свищевых ходов

для прокола

368. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

долото прямое

долото желобоватое

распатор изогнутый

пила дуговая

жомы

369. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу геморроя входят

ректальное зеркало

окончатые геморроидальные зажимы

кусачки Лангенбека

брюшные зеркала

жомы Пайера

370. Выберите два правильных ответа

Корнцанг применяют для

наложения швов

остановки кровотечения

подачи перевязочного материала

фиксации операционного белья

введения тампонов

371. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу ущемлённых грыж входят

ранорасширители (брюшные зеркала)

иглы кишечные

реберный распатор Фарабефа

реберный распатор Лангенбека

пуговчатый зонд

372. Выберите два правильных ответа

Для осуществления доступа в полость предсердия операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

сосудистый пинцет и ножницы

сосудистый пинцет и крючок Кули

пуговчатый зонд

крючок Мешалкина

малый диссектор

373. Выберите два правильных ответа

Для проведения операций с высоким риском нарушения целостности перчаток следует надевать:

2 пары перчаток

3 пары перчаток

перчатки повышенной прочности

резиновые перчатки

4 пары перчаток

374. Выберите два правильных ответа

Медицинский персонал обязательно работает в стерильных разовых масках

в операционных

в санпропускнике

при проведении инвазивных процедур

на посту

в приемном отделении

375. Выберите три правильных ответа

Для ревизии полости предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

сосудистый пинцет и ножницы

сосудистый пинцет и крючок Кули

пуговчатый зонд

крючок Мешалкина

малый диссектор

сосудистый пинцет

376. Выберите два правильных ответа

Для ушивания предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

кишечный жом

атравматический иглодержатель с атравматической нитью

сосудистый пинцет

мышечный ретрактор

малый диссектор

377. Выберите три правильных ответа

Для ушивания твердой мозговой оболочки операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с маленькой колющей иглой
- иглодержатель с режущей иглой
- пролен
- коагуляционный пинцет
- ножницы Купера
- сосудистый пинцет

378. Выберите три правильных ответа

Для мобилизации сигмовидной кишки операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- зажимы Бильрота 20 см
- кишечный жом
- лигатуры
- ножницы Купера

- брюшное зеркало широкое
- иглодержатель с режущей иглой

379. Выберите два правильных ответа

Для наложения узлового шва на кишечный анастомоз операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- анатомический пинцет
- иглодержатель с кишечной иглой
- скальпель
- кусачки Листона
- брюшное зеркало широкое

380. Выберите три правильных ответа

Для ушивания брюшины, мышц операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- иглодержатель с колющей иглой
- анатомический пинцет
- кетгут
- кусачки Листона
- ножницы остроконечные
- роторасширитель

381. Выберите три правильных ответа

Для наложения швов на кожу операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с колющей иглой
- брюшное зеркало широкое
- скальпель, леску
- хирургический пинцет
- ножницы Купера

382. Выберите три правильных ответа

Инструменты, расширяющие раны

- ножницы остроконечные
- роторасширитель
- крючки Фарабефа
- лапаротомные крючки
- рамочный ранорасширитель

383. Выберите три правильных ответа

В общий набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- распаторы

- пинцет сосудистый
- иглы кишечные
- брюшное зеркало широкое

384. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- жомы раздавливающие
- пила-ножовка
- пила Джигли
- долото прямое
- долото желобоватое

385. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу некроза кишки входят

- жомы кишечные эластические прямые
- жомы кишечные эластические изогнутые
- жомы раздавливающие
- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека

386. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека
- реберный распатор Дуайена
- шприцы 10–20-х граммовые
- ампутационные ножи

387. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберные ножницы Дуайена
- ампутационные ножи
- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- острая ложечка Фолькмана

388. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

- кишечный жом
- ампутационные ножи
- ретрактор мышечный
- распатор прямой
- крючки Листона

389. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для трахеостомии входят

- стерильный резиновый грушевидный баллон
- трахеостомические трубки разных размеров
- однозубые острые крючки
- расширитель Труссо
- кишечный жом

390. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для холецистэктомии входят

- зажим Федорова окончатый
- зажимы Микулича
- брюшные зеркала

- зонд Кохера
- зонд Фогарти

391. Выберите два правильных ответа

Для проведения микрохирургических операций необходимы следующие укладки инструментов

- основной травматологический набор
- стандартный микрохирургический набор
- набор для первичной хирургической обработки раны
- набор для стерильной пункции
- набор для плевральной пункции

392. Выберите три правильных ответа

Преимущества применения лазера в хирургии

- отсутствие грубых рубцов после операции
- безболезненный послеоперационный период
- более быстрое выздоровление
- менее выраженное повреждение тканей
- сокращение времени операции

393. Выберите три правильных ответа

Использование медицинских перчаток обязательно при малейшей возможности контакта

- с кровью и биологическими субстратами
- с поврежденной кожей
- со слизистыми оболочками
- с медицинской документацией
- с продуктами питания

394. Выберите три правильных ответа

Лицевые маски должны закрывать

- нос
- рот
- область подбородка
- только нос
- только рот

395. Выберите два правильных ответа

Для предупреждения внутрибольничной инфекции операционная медсестра обязана

- разделять хранить верхнюю одежду и спецодежду
- не выходить в спецодежде за пределы операционного блока
- не носить спецодежду в неслужебное время
- лично контролировать качество стирки и дезинфекции белья
- выходить в спецодежде за пределы операционного блока

396. Выберите три правильных ответа

Меры профилактики воздушно-капельной инфекции в операционном зале

- соблюдение этапности операции
- соблюдение асептики
- ношение маски
- влажная уборка, УФО
- ограничение хождений

Специальность « Операционное дело»

Первая квалификационная категория.

1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите единственно правильный ответ

Применение лазера в хирургии относится к антисептике

- механической
- физической
- биологической
- химической

2. Выберите единственно правильный ответ

Для контроля качества предоперационной обработки рук используют

- термоиндикаторы
- бактериологический контроль
- фенолфталеиновую пробу
- амидопириновую пробу

3. Выберите единственно правильный ответ

Нарушение асептики может привести к осложнению

- воздушной эмболии

- аллергической реакции
- абсцессу
- липодистрофии

4. Выберите единственно правильный ответ

После обработки рук дезраствором они становятся

- стерильными
- дезинфицированными
- чистыми
- подготовленными к операции

5. Выберите единственно правильный ответ

Физическим методом антисептики является

- применение антибиотиков
- применение ферментов
- дренирование ран
- удаление инородных тел

6. Выберите единственно правильный ответ

Способ транспортировки при внутреннем кровотечении

- с приподнятым головным концом
- с опущенным головным концом
- в горизонтальном положении
- горизонтально на боку
- придать положение полусидя

7. Выберите единственно правильный ответ

Физический метод окончательной остановки кровотечения

- переливание плазмы
- протезирование сосуда
- электрокоагуляция
- наложения шва на сосуд

8. Выберите единственно правильный ответ

Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из

- пищевода
- вен голени
- крупных вен шеи
- плечевой артерии

9. Выберите единственно правильный ответ

Механический способ окончательной остановки кровотечения

- применение фибриногена
- наложение артериального жгута
- наложение сосудистого шва
- применение гемостатической вискозы

10. Выберите единственно правильный ответ

Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к

- углу нижней челюсти
- ключице
- VI шейному позвонку
- I ребру

11. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное кровотечение из раны в верхней трети предплечья можно остановить путем сгибания руки

- в плечевом суставе
- в плечевом и локтевом суставах
- в локтевом суставе
- в лучезапястном суставе

12. Выберите единственно правильный ответ

Недостатком применения жгута Эсмарха является

- отсутствие чувствительности ниже наложения жгута
- сложность использования
- сдавление мягких тканей и нервных стволов
- повреждение кожных покровов

13. Выберите единственно правильный ответ

Критерием правильного наложения жгута Эсмарха является

- синюшность кожи
- отсутствие чувствительности кожи ниже жгута
- повышение температуры тела ниже жгута
- исчезновение периферического пульса

14. Выберите единственно правильный ответ

Группа крови, в которой содержится агглютиноген В и агглютинин альфа

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

15. Выберите единственно правильный ответ

Противопоказания к переливанию крови

- тяжелая операция
- тяжелое нарушение функций печени
- шок
- снижение артериального давления

16. Выберите единственно правильный ответ

Резус-фактор содержится в

- плазме
- лейкоцитах
- эритроцитах
- тромбоцитах

17. Выберите единственно правильный ответ

Группа крови, в которой содержатся агглютиногены А и В

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

18. Выберите единственно правильный ответ

Агглютинины находятся в

- эритроцитах
- лейкоцитах
- плазме крови
- других жидкостях организма

19. Выберите единственно правильный ответ

Состав крови II группы

- А
- В
- АВ
- О

20. Выберите единственно правильный ответ

Кровь В (III) группы можно вводить лицам

- только с III группой крови
- с любой группой крови

только с III и IV группами крови

со II и III группами крови

21. Выберите единственно правильный

ответ

Для проведения биологической пробы следует

ввести струйно однократно 10 мл крови и наблюдать за состоянием больного 5 мин

ввести струйно трижды по 10 мл крови с интервалом 5 мин, наблюдая за больным

ввести капельно 10 мл крови, наблюдать за состоянием больного 5 минут

ввести капельно трехкратно по 10 мл крови

22. Выберите единственно правильный

ответ

При переливании крови состояние больного ухудшилось, появилась боль в пояснице и за грудиной. Это указывает на

геморрагический шок

цитратный шок

гемотрансфузионный шок

пирогенную реакцию

23. Выберите единственно правильный

ответ

При нарушении техники переливания крови может развиваться осложнение

цитратный шок

анафилактический шок

гемотрансфузионный шок

воздушная эмболия

24. Выберите единственно правильный

ответ

Потенциальная проблема пациента после наложения гипсовой иммобилизации

нарушение кровообращения

развитие контрактуры

зябкость конечности

общее повышение температуры

25. Выберите единственно правильный

ответ

Перед наложением бинтовой повязки медсестра оценит

температуру тела

частоту дыхания

характер патологического процесса

АД

26. Выберите единственно правильный

ответ

При ранениях волосистой части головы накладывается повязка

крестообразная на затылок и шею

пращевидная

"уздечка"

"чепец"

27. Выберите единственно правильный

ответ

При ранении плечевого сустава накладывают повязку

черепашью

колосовидную

8-образную

Дезо

28. Выберите единственно правильный

ответ

Окклюзионную повязку используют при

артериальном кровотечении

переломе ребер

закрытом пневмотораксе

открытом пневмотораксе

29. Выберите единственно правильный

ответ

Вид повязки при венозном кровотечении

давящая

окклюзионная

спиральная

лейкопластырная

30. Выберите единственно правильный

ответ

Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти

крестообразная

"перчатка"

черепашья

змеевидная

31. Выберите единственно правильный

ответ

Повязка, применяемая при носовом кровотечении

лейкопластырная

пращевидная

"уздечка"

циркулярная

32. Выберите единственно правильный

ответ

При переломе плечевой кости транспортная иммобилизация накладывается

от больной лопатки до пальцев кисти

от средней трети плеча до пальцев кисти

от здоровой лопатки до пальцев кисти

от верхней трети плеча до пальцев кисти

33. Выберите единственно правильный

ответ

При открытых переломах накладывают гипсовую повязку

колосовидную

лонгетную

створчатую

циркулярную

34. Выберите единственно правильный

ответ

Реализацию краткосрочной цели "снятие швов" у пациента после аппендектомии медсестра планирует на

десятые сутки

- седьмые сутки
- третьи сутки
- двенадцатые сутки

35. Выберите единственно правильный

ответ

У пациента, готовящегося к плановой операции, медсестра запланирует бритье операционного поля

- в день операции
- на операционном столе
- вечером накануне операции
- за 1 сутки до операции

36. Выберите единственно правильный

ответ

Цель радикальной операции

- полное излечение пациента
- облегчение страданий пациента
- временное восстановление функции
- облегчение работы пораженного органа

37. Выберите единственно правильный

ответ

Цель паллиативной операции

- полное излечение пациента
- восстановление обмена веществ
- улучшение функции кишечника
- облегчение страданий пациента

38. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- дефицит самоухода
- беспокойство за оставленную работу
- чувство страха
- недооценка тяжести своего состояния

39. Выберите единственно правильный

ответ

Предоперационный период начинается с

- начала заболевания
- момента поступления в хирургический стационар
- установления диагноза
- начала подготовки к операции

40. Выберите единственно правильный

ответ

Вид санитарной обработки перед плановой операцией

- обтирание кожи и смена белья
- частичная санитарная обработка
- полная санитарная обработка
- санитарная обработка не производится

41. Выберите единственно правильный

ответ

Основная задача предоперационного периода

- провести санацию очагов инфекции
- обследовать сердечно-сосудистую систему
- улучшить состояние пациента
- подготовить больного к операции

42. Выберите единственно правильный ответ

Бритье операционного поля перед экстренной операцией осуществляется

- непосредственно перед операцией в санитарной комнате
- на операционном столе
- не производится
- накануне

43. Выберите единственно правильный ответ

Вид санитарной обработки, выполняемой перед экстренной операцией

- полная санитарная обработка
- частичная санитарная обработка
- не осуществляется
- только бритье операционного поля

44. Выберите единственно правильный ответ

Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

45. Выберите единственно правильный ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма ставится

- противопоказана
- в любое время
- за 1 час
- непосредственно перед операцией

46. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики послеоперационных бронхолегочных осложнений больному назначают

- дыхательную гимнастику
- интубацию трахеи
- диету, богатую белком
- УВЧ на грудную клетку

47. Выберите единственно правильный ответ

Диагностической операцией является

- вправление вывиха
- обработка раны с наложением швов
- биопсия тканей
- вскрытие гнояника

48. Выберите единственно правильный ответ

Признаки нагноения послеоперационной раны

- побледнение краев
- гиперемия, отек, усиление боли
- промокание повязки кровью
- выхождение кишечных петель под кожу

49. Выберите единственно правильный

ответ

Основное в уходе за больным с ИВЛ

- противокашлевые средства
- санация трахеобронхиального дерева
- профилактика пролежней
- питание через зонд

50. Выберите единственно правильный

ответ

Срок окончания послеоперационного периода

- после устранения ранних послеоперационных осложнений
- после выписки из стационара
- после заживления послеоперационной раны
- после восстановления трудоспособности

51. Выберите единственно правильный

ответ

При задержке мочеиспускания после аппендэктомии прежде всего необходимо

- вызвать мочеиспускание рефлекторно
- произвести катетеризацию мочевого пузыря
- ввести мочегонные средства
- применить теплую грелку на низ живота

52. Выберите единственно правильный

ответ

Для профилактики пневмонии в послеоперационном периоде необходимо

- назначить противокашлевые средства
- следить за соблюдением строгого постельного режима
- проводить дыхательную гимнастику, массаж
- антибактериальная терапия

53. Выберите единственно правильный

ответ

Положение больного в постели в первые часы после общего обезболивания

- лежа с опущенным головным концом
- полусидя
- лежа на боку
- лежа на спине без подушки, голова повернута набок

54. Выберите единственно правильный

ответ

В первые 6 часов после операции на желудочно-кишечном тракте запрещается прием жидкости, так как

- возможна провокация рвоты
- больной не хочет пить
- возможно увеличение ОЦК
- необходимо предупредить мочеиспускание

55. Выберите единственно правильный

ответ

При транспортировке в операционную больного нужно

- посадить на коляску
- положить на каталку
- отвести под руку
- отправить самостоятельно

56. Выберите единственно правильный

ответ

Корнцанг применяют для

- наложения швов
- остановки кровотечения
- подачи перевязочного материала
- фиксации операционного белья

57. Выберите единственно правильный

ответ

Время начала операции после последнего приема пищи через

- 1 час
- 2 часа
- 3 часа
- 4 часа

58. Выберите единственно правильный

ответ

Груз на рану после операции накладывается с целью

- предупреждения расхождения швов
- предупреждения инфицирования
- предупреждения кровотечения
- уменьшения болей

59. Выберите единственно правильный

ответ

Показанием к смене повязки на следующий день после операции является

- резкая бледность кожи вокруг раны
- похолодание кожи вокруг раны
- резкий цианоз вокруг раны
- обильное промокание повязки

60. Выберите единственно правильный

ответ

В первые трое суток после операции может возникнуть осложнение

- кровотечение
- нагноение
- выхождение внутренних органов под кожу
- расхождение швов

61. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с термической травмой

- чувство одиночества
- слабость
- боль в области ожоговой раны
- чувство страха манипуляций

62. Выберите единственно правильный

ответ

Основной целью оказания первой медицинской помощи при отморожении является

- восстановление кровообращения
- прекращение боли
- восстановление чувствительности
- восстановление функции дыхания

63. Выберите единственно правильный

ответ

Фаза травматического шока

- судорожная
- токсемия
- торпидная
- реконвалесценция

64. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с обширным ранением мягких тканей

- расстройство схемы тела
- чувство беспомощности
- острая боль
- лихорадка

65. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с ранением на этапе неотложной помощи

- кровотечение
- дефицит движения
- дефицит самоухода
- угроза инфицирования

66. Выберите единственно правильный

ответ

Показатель шокового индекса – это отношение

- частоты сердечных сокращений к систолическому АД
- частоты сердечных сокращений к диастолическому АД
- частоты пульса к частоте дыхания
- частоты пульса к центральному венозному давлению

67. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный признак перелома костей

- деформация сустава
- деформация мягких тканей
- отек
- патологическая подвижность костных отломков

68. Выберите единственно правильный

ответ

Признак, характерный только для перелома

- кровоподтек
- припухлость
- крепитация костных отломков
- нарушение функции конечности

69. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный только для вывиха

- боль
- гиперемия

- нарушение функции
- пружинящая фиксация

70. Выберите единственно правильный

ответ

Рана является проникающей, если

- в ней находится инородное тело
- повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- повреждены мышцы и кости
- повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)

71. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность укушенной раны

- заражением бешенством
- заражением туберкулезом
- большой кровопотерей
- переломом костей

72. Выберите единственно правильный

ответ

Комбинированная травма – это

- сочетание двух и более повреждающих факторов
- повреждение одного сегмента конечности
- перелом бедра и голени
- разрыв мочевого пузыря и перелом костей таза

73. Выберите единственно правильный

ответ

При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и деформация конечности, можно предположить

- повреждение связочного аппарата
- ушиб мягких тканей
- вывих
- закрытый перелом

74. Выберите единственно правильный

ответ

Сочетанная травма – это

- перелом плечевой кости и ЧМТ
- проникающее ранение брюшной полости
- перелом бедра и голени
- разрыв селезенки

75. Выберите единственно правильный

ответ

При переломе костей предплечья шина накладывается

- от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- от лучезапястного до локтевого сустава
- на место перелома
- от кончиков пальцев до верхней трети плеча

76. Выберите единственно правильный

ответ

В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом

- костей таза

- позвоночника
- бедра
- костей стоп

77. Выберите единственно правильный

ответ

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют

- ватно-марлевые кольца Дельбе
- ватно-марлевый воротник Шанца
- шину Еланского
- крестообразную повязку

78. Выберите единственно правильный

ответ

Причина ожогового шока

- спазм сосудов кожи
- психическая травма
- боль и плазмопотеря
- кровотечение

79. Выберите единственно правильный

ответ

Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается

- наличием "светлого промежутка"
- отсутствием очаговой симптоматики
- наличием повышенного АД
- нарушением сна

80. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный симптом вывиха костей

- отек
- нарушение функции
- боль
- "пустой сустав"

81. Выберите единственно правильный

ответ

У детей наблюдаются, как правило, переломы

- косые
- по типу "зеленой веточки"
- компрессионные
- полные

82. Выберите единственно правильный

ответ

Пациента с инородным телом дыхательных путей следует транспортировать в положении

- лежа на животе
- лежа на спине
- сидя или полусидя
- лежа с опущенной головой

83. Выберите единственно правильный

ответ

Типичное проявление перелома основания черепа

- кровотечение и ликворрея из носа и ушей
- отек век
- подкожная эмфизема

- двоение в глазах

84. Выберите единственно правильный ответ

Профилактику столбняка необходимо провести при

- ушибе мягких тканей кисти
- закрытом переломе плеча
- колотой ране стопы
- растяжении лучезапястного сустава

85. Выберите единственно правильный ответ

Открытый пневмоторакс — это

- скопление воздуха в подкожной клетчатке
- воздух, попавший при ранении в плевральную полость
- перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана "дышит"
- скопление крови в плевральной полости

86. Выберите единственно правильный

ответ

После спинно-мозговой пункции пациента транспортируют

- в положении лежа на боку
- лежа на животе
- полусидя
- лежа на спине

87. Выберите единственно правильный

ответ

Причина травматического шока

- нарушение дыхания
- интоксикация
- болевой фактор
- психическая травма

88. Выберите единственно правильный

ответ

Первая фаза течения раневого процесса в инфицированной ране это

- гидратация
- дегидратация
- рубцевание
- эпителизация

89. Выберите единственно правильный

ответ

При накоплении экссудата в гнойной ране необходимо

- тампонировать рану
- дренировать рану
- наложить повязку с мазью
- наложить сухую асептическую повязку

90. Выберите единственно правильный

ответ

Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют с целью

- обезболивания
- улучшения кровообращения
- лизиса некротических тканей
- образования нежного тонкого рубца

91. Выберите единственно правильный

ответ

Признак повреждения спинного мозга при травмах позвоночника

- деформация в области позвонков
- выстояние остистого отростка позвонка
- паралич
- "симптом вожжей"

92. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный для перелома костей таза

- гематома в области промежности
- крепитация в области верхней трети бедра
- императивный позыв на мочеиспускание
- симптом "прилипшей пятки"

93. Выберите единственно правильный

ответ

При переломах костей таза пациента транспортируют в положении

- на спине на мягких носилках
- на спине на щите в положении "лягушки"
- на животе
- полусидя

94. Выберите единственно правильный

ответ

Раны называются сквозными, если

- имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- имеется только входное отверстие
- имеется входное и выходное отверстие
- повреждена кожа

95. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом раны

- крепитация
- зияние краев
- флюктуация
- патологическая подвижность

96. Выберите единственно правильный

ответ

Дренаж в гнойную рану вводят для

- ускорения эпителизации
- остановки кровотечения
- обеспечения оттока отделяемого
- произведения тампонады

97. Выберите единственно правильный

ответ

Один из основных симптомов сотрясения головного мозга

- ретроградная амнезия
- анизокория
- усиление рефлексов
- бессонница

98. Выберите единственно правильный

ответ

При ушибе головного мозга сознание чаще всего

- утрачивается после светлого промежутка
- утрачивается на несколько секунд или минут
- ясное
- утрачивается на длительное время

99. Выберите единственно правильный

ответ

Результат спинномозговой пункции при внутричерепной гематоме

- нет изменений
- примесь гноя
- примесь крови
- хлопья

100. Выберите единственно правильный

ответ

Рана, нагноившаяся в процессе лечения, называется

- асептической
- первично инфицированной
- вторично инфицированной
- микробно-загрязненной

101. Выберите единственно правильный

ответ

Местный признак нагноения раны

- местное повышение температуры
- побледнение кожи
- подкожная эмфизема
- стихание боли

102. Выберите единственно правильный

ответ

"Симптом очков" наблюдается при

- сотрясении головного мозга
- ушибе головного мозга
- переломе основания черепа
- сдавлении головного мозга

103. Выберите единственно правильный

ответ

Множественный перелом – это

- перелом плеча и бедра
- перелом бедра
- перелом основания черепа
- перелом нижней челюсти

104. Выберите единственно правильный

ответ

При шоке пациента транспортируют

- с приподнятым головным концом
- в горизонтальном положении
- на боку
- с опущенным головным концом

105. Выберите единственно правильный

ответ

Репозиция отломков производится при

- интерпозиции
- любом смещении отломков
- поднадкостничных переломах
- открытых переломах

106. Выберите единственно правильный

ответ

Интерпозиция — это

- образование ложного сустава
- смещение костных отломков
- ущемление мягких тканей между отломками костей
- вингообразный перелом

107. Выберите единственно правильный ответ

Помощь при электротравме следует начать с

- обезболивания
- наложения асептической повязки
- прекращения действия повреждающего фактора
- сердечно-легочной реанимации

108. Выберите единственно правильный ответ

При обильном промокании кровью повязки в раннем послеоперационном периоде необходимо

- срочно информировать врача
- сменить повязку
- снять повязку
- наложить дополнительную повязку

109. Выберите единственно правильный ответ

Характерный признак сдавления головного мозга гематомой

- повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
- длительная потеря сознания
- кратковременная потеря сознания
- потери сознания не бывает

110. Выберите единственно правильный ответ

Окклюзионную повязку накладывают при

- переломе ребер
- сильном венозном кровотечении
- открытом пневмотораксе
- обширных повреждениях мягких тканей

111. Выберите единственно правильный ответ

Гибель коры головного мозга — это

- декортикация
- дефибриляция
- регургитация
- краниоцеребральная гипотермия

112. Выберите единственно правильный ответ

Фактор риска в возникновении гидраденита

- несоблюдение личной гигиены
- переизбыток
- гипервитаминоз
- сухость кожи

113. Выберите единственно правильный ответ

Характер сестринского вмешательства у пациента с фурункулезом

- обучить пациента принципам рационального питания
- обеспечить прием достаточного количества жидкости
- регистрировать частоту и характер стула
- обеспечить тщательную гигиену кожи

114. Выберите единственно правильный ответ

Острую гнойную хирургическую инфекцию чаще всего вызывает

- столбнячная палочка
- стафилококк
- стрептококк
- кишечная палочка

115. Выберите единственно правильный ответ

Ограниченное скопление гноя в тканях — это

- гематома
- флегмона
- абсцесс
- атерома

116. Выберите единственно правильный ответ

Гидраденит — это

- воспаление потовой железы
- воспаление сальной железы
- воспаление лимфатического узла
- воспаление лимфатического сосуда

117. Выберите единственно правильный ответ

Местный симптом рожистого воспаления

- подергивание мышц
- гиперемия кожи с четкими границами
- разлитое покраснение кожи
- гингилитация с цианотичным оттенком кожи

118. Выберите единственно правильный ответ

Тризм характерен для

- фурункулеза
- газовой гангрены
- столбняка
- рожистого воспаления

119. Выберите единственно правильный ответ

Лимфаденит — это воспаление

- потовых желез
- лимфатических узлов
- лимфатических сосудов
- сальных желез

120. Выберите единственно правильный ответ

Острый гематогенный остеомиелит — это воспаление

- пальца
- коленного сустава
- костного мозга и кости
- венозных сосудов

121. Выберите единственно правильный

ответ

Пандактилит — это воспаление

- кожи пальца
- сухожильного влагалища
- межфаланговых суставов
- всех тканей пальца

122. Выберите единственно правильный

ответ

Разлитое воспаление подкожной клетчатки — это

- сетчатый лимфангит
- рожистое воспаление
- флегмона
- абсцесс

123. Выберите единственно правильный

ответ

После вскрытия абсцесса накладывают повязку с

- гипертоническим раствором хлорида натрия
- мазью левомиколь
- преднизолоновой мазью
- 3% раствором перекиси водорода

124. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактика столбняка показана при

- при закрытом переломе шейки плеча
- остром гнойном плеврите
- ушибленной ране мягких тканей головы
- хроническом остеомиелите

125. Выберите единственно правильный

ответ

Независимое сестринское вмешательство при абсцедирующей стадии мастита включает в себя

- уменьшение питья, включение в рацион продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, исключение продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, включение продуктов, стимулирующих лактацию
- уменьшение питья, исключение продуктов, стимулирующих лактацию

126. Выберите единственно правильный

ответ

Форма остеомиелита

- эритематозный
- буллезный
- гематогенный
- стволовой

127. Выберите единственно правильный

ответ

Возбудитель газовой гангрены

- синегнойная палочка
- клостридия
- столбнячная палочка
- протей

128. Выберите единственно правильный

ответ

Осложнение сепсиса

- анафилактический шок
- септический шок
- септицемия
- септикопиемия

129. Выберите единственно правильный

ответ

Пандактилит — это воспаление

- ногтевого валика
- межфалангового сустава
- всех тканей пальца
- сухожильного влагалища

130. Выберите единственно правильный

ответ

Карбункул — это воспаление

- лимфатической железы
- одного волосяного мешочка
- потовой железы
- нескольких волосяных мешочков

131. Выберите единственно правильный

ответ

"Флюктуация" — это

- появление пузырей на гиперемированной коже
- судорожное сокращение мимических мышц
- размягчение в центре инфильтрата
- "хруст" при пальпации кожи

132. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный для газовой гангрены

- симптом "тугой повязки"
- опистонус
- судорожное сокращение поперечно-полосатых мышц
- стихание болей в ране

133. Выберите единственно правильный

ответ

Столбнячный анатоксин вводится для

- снятия симптомов воспаления
- предупреждения сепсиса
- создания активного иммунитета
- создания пассивного иммунитета

134. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактика столбняка показана при

- ожоге туловища 1 степени
- колотой ране передней брюшной стенки
- абсцессе легкого
- закрытом переломе предплечья

135. Выберите единственно правильный

ответ

Гидраденит чаще локализуется в

- подмышечной ямке
- паховой складке
- области шеи

области спины

136. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем рожистого воспаления является

- стафилококк
- стрептококк
- синегнойная палочка
- энтерококк

137. Выберите единственно правильный ответ

Гематогенный остеомиелит может быть следствием

- огнестрельного ранения
- открытого перелома
- закрытого перелома
- флегмоны забрюшинного пространства

138. Выберите единственно правильный ответ

Независимым сестринским вмешательством в послеоперационном периоде после удаления варикозных вен является

- запрещение ходьбы в течение шести дней
- запрещение занятий ЛФК в течение шести дней
- запрещение массажа ног
- запрещение сидеть с опущенными ногами

139. Выберите единственно правильный ответ

Долгосрочная цель в плане сестринского ухода за пациентом с облитерирующим эндартериитом

- отказ от курения
- полное восстановление физической активности
- уменьшение зябкости конечностей
- полное восстановление пульсации на мелких артериях стоп

140. Выберите единственно правильный ответ

Сухая гангрена чаще развивается при

- медленно прогрессирующем нарушении кровообращения
- остром нарушении кровообращения
- бурном развитии инфекции в тканях
- повреждении нервных стволов

141. Выберите единственно правильный ответ

Симптомы интоксикации более выражены при

- сухой гангрене
- пролежнях
- влажной гангрене
- трофической язве

142. Выберите единственно правильный ответ

При сухой гангрене происходит

- нарастающий отек тканей

гнилостный распад тканей

мумифицирование тканей

газообразование в тканях

143. Выберите единственно правильный ответ

При варикозной болезни рекомендуется

- ношение теплых носков
- удобная обувь
- холодные ванночки для стоп
- длительное пребывание на ногах

144. Выберите единственно правильный ответ

Во время беременности наиболее часто встречается сосудистая патология

- атеросклероз
- облитерирующий эндартериит
- варикозное расширение вен
- острый тромбоз артерии

145. Выберите единственно правильный ответ

Условие, способствующее образованию язв

- нарушение обмена электролитов
- неполноценное питание
- нарушение периферического кровообращения
- нагноительные процессы

146. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая причина образования свищей

- пороки развития
- оперативное вмешательство
- хронический воспалительный процесс
- травматические повреждения

147. Выберите единственно правильный ответ

Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей

- кровотечение
- перемежающаяся хромота
- сухая гангрена
- отек тканей

148. Выберите единственно правильный ответ

"Перемежающаяся" хромота — основной признак

- лимфангита
- облитерирующего эндартериита
- варикозного расширения вен нижних конечностей
- лимфостаза в нижних конечностях

149. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема пациента с раком пищевода

- дисфагия
- нарушение аппетита
- сухость кожи

дефицит массы тела

150. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- метастазирует в регионарные узлы
- метастазирует в отдаленные органы
- метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы
- не метастазирует

151. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- ограничена капсулой
- не прорастает в соседние ткани
- прорастает в соседние ткани
- раздвигает ткани

152. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- не влияет на общее состояние
- растет медленно, имеет капсулу
- растет быстро, разрушая окружающие ткани
- не рецидивирует

153. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- растет медленно, не прорастает в окружающие ткани
- рецидивирует
- метастазирует
- вызывает кахексию

154. Выберите единственно правильный ответ

Больной считается неоперабельным при

- предраке
- I ст. рака
- IV ст. рака
- II ст. рака

155. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль из мышечной ткани

- аденома
- миома
- нейросаркома
- миосаркома

156. Выберите единственно правильный ответ

Проблема пациента с колостомой

- повышение температуры тела
- недержание мочи
- затруднение, связанное с необходимостью осуществлять физиологическое опорожнение в непривычном положении
- необходимость посещения туалета в ночное время

157. Выберите единственно правильный ответ

Защитное мышечное напряжение характерно для

- острого перитонита
- отечной формы панкреатита
- инвагинации кишечника
- желудочного кровотечения

158. Выберите единственно правильный ответ

При желудочном кровотечении показана

- рентгенография желудка с барием
- УЗИ
- экстренная ФГДС
- экстренная операция

159. Выберите единственно правильный ответ

Рвота при остром панкреатите

- многократная, не приносящая облегчения
- однократная
- многократная, приносящая облегчение
- отсутствует

160. Выберите единственно правильный ответ

Причина механической желтухи при холецистите

- печеночная недостаточность
- закупорка камнем общего желчного протока
- гемолиз эритроцитов
- нарушение обмена веществ

161. Выберите единственно правильный ответ

Опоясывающая боль наблюдается при

- панкреатите
- холецистите
- травме селезенки
- перфоративной язве желудка

162. Выберите единственно правильный ответ

Достоверный признак перитонита

- болезненность живота при пальпации
- неотхождение газов и кала
- рвота
- симптом раздражения брюшины

163. Выберите единственно правильный ответ

Эвентрация — это

- воспаление брюшины
- ущемление кишечника в спайках
- выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку
- выделение кишечного содержимого из раны

164. Выберите единственно правильный ответ

Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов брюшной полости

- острого перитонита
- нарушения функции желудочно-кишечного тракта
- внутреннего кровотечения
- острой дыхательной недостаточности

165. Выберите единственно правильный ответ

Противопоказания к операции при остром аппендиците

- старческий возраст
- отсутствуют
- гипертоническая болезнь
- острая пневмония

166. Выберите единственно правильный ответ

При остром перитоните выполняется операция

- диагностическая
- плановая
- срочная
- экстренная

167. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром холецистите

- постоянные, сильные в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие, тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

168. Выберите единственно правильный ответ

Анализ крови и мочи на содержание амилазы выполняют при подозрении на

- кишечное кровотечение
- острый проктит
- острый панкреатит
- острый перитонит

169. Выберите единственно правильный ответ

Транспортировка больного с перитонитом осуществляется

- городским транспортом
- сидя
- лежа на носилках
- лежа на щите

170. Выберите единственно правильный ответ

При кишечной непроходимости живот

- не изменен
- доскообразный
- асимметричен, вздут
- втянут

171. Выберите единственно правильный ответ

Тактика среднего медработника при остром холецистите

- холод на живот, госпитализация
- грелка на область печени
- "слепое зондирование"
- желчегонные средства в амбулаторных условиях

172. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при перфоративной язве желудка

- постоянные, сильные в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие, тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

173. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром аппендиците

- постоянные, сильные боли в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

174. Выберите единственно правильный ответ

Причина трещин заднего прохода

- проктит
- геморрой
- длительные запоры
- парапроктит

175. Выберите единственно правильный ответ

Характер патологических примесей в каловых массах при геморрое

- кровь смешана с каловыми массами
- дегтеобразный стул
- стул со слизью
- кровь не смешана с каловыми массами

176. Выберите единственно правильный ответ

Геморрой может осложниться

- тромбозом геморроидальных узлов
- воспалением кожи вокруг анального отверстия
- дерматитом
- диспепсией

177. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при клинической картине «острого живота» у пациента

- холод на живот
- очистительная клизма
- промывание желудка
- дача слабительного средства

178. Выберите единственно правильный

ответ

Парапроктит — это

- воспаление вен прямой кишки
- выпадение прямой кишки
- воспаление околопрямокишечной клетчатки
- воспаление прямой кишки

179. Выберите единственно правильный

ответ

Симптомы подкожного парапроктита

- напряженные сине-багровые узлы в области анального отверстия
- трещины в области задней спайки
- боль, припухлость, гиперемия кожи вокруг заднего прохода
- зуд в анальной области

180. Выберите единственно правильный

ответ

Характер рвоты при стенозе привратника -

- примесь желчи, рвота многократная
- цвета «кофейной гущи»
- пищей, съеденной накануне
- с каловым запахом

181. Выберите единственно правильный

ответ

Достоверный симптом аппендицита

- разлитая боль в животе
- тошнота
- вздутие живота
- симптом Щеткина-Блюмберга

182. Выберите единственно правильный

ответ

При остром аппендиците характерно положение больного лежа на

- правом боку
- левом боку
- спине, с опущенным головным концом
- животу

183. Выберите единственно правильный

ответ

Вид кишечной непроходимости, относящийся к динамической

- узлообразование
- заворот кишечника
- инвагинация
- парез кишечника

184. Выберите единственно правильный

ответ

Осложнением язвенной болезни желудка является

- кишечная непроходимость
- ущемленная грыжа
- асцит
- перфорация

185. Выберите единственно правильный

ответ

Механическая желтуха — это осложнение

- острого панкреатита
- острого аппендицита
- острого холецистита
- острого дуоденита

186. Выберите единственно правильный

ответ

Мелена — это симптом

- острого холецистита
- желудочно-кишечного кровотечения
- острого аппендицита
- острого панкреатита

187. Выберите единственно правильный

ответ

Время постановки очистительной клизмы при динамической кишечной непроходимости

- одновременно с инъекцией спазмолитика
- через 30 минут после инъекции спазмолитика
- через 1,5 часа после инъекции спазмолитика
- проведение процедуры не связано с введением спазмолитика

188. Выберите единственно правильный

ответ

Мочевой пузырь опорожняется после последнего мочеиспускания через

- 2 – 3 часов
- 3 – 4 часа
- 1 – 2 часа
- 5 – 6 часов

189. Выберите единственно правильный

ответ

Независимое сестринское вмешательство при рефлекторной задержке мочеиспускания после операции

- назначение мочегонных средств
- подача теплого судна
- строгий постельный режим
- пузырь со льдом на низ живота

190. Выберите единственно правильный

ответ

Признак ушиба почек

- ложные позывы на мочеиспускание
- боль при мочеиспускании
- положительный симптом Щеткина-Блюмберга
- микро или макрогематурия

191. Выберите единственно правильный

ответ

Доврачебная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы предстательной железы

- пузырь со льдом
- мочегонные средства
- обезболивающие
- катетеризация

192. Выберите единственно правильный**ответ**

Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

- мягкий живот
 симптом Щеткина-Блюмберга
 симптом Ситковского
 кровотечение из уретры

193. Выберите единственно правильный**ответ**

Первая помощь при травме почек

- наркотические препараты
 холод, срочная госпитализация
 тепло
 мочегонные препараты

194. Выберите единственно правильный**ответ**

Независимое сестринское вмешательство при острой задержке мочи

- назначение обезболивающего средства
 выведение мочи резиновым катетером
 введение спазмолитика
 грелка на низ живота

195. Выберите единственно правильный**ответ**

При почечной колике наиболее характерна иррадиация боли в

- околопупочную область
 паховую область и бедро
 плечо
 эпигастрий

196. Выберите единственно правильный**ответ**

Причина болевых ощущений при почечной колике

- позывы на мочеиспускание
 затрудненное мочеиспускание
 спазм мочеоточника и травма слизистой мочеоточника
 восходящая инфекция

197. Выберите единственно правильный**ответ**

Почечная колика является осложнением

- гемангиомы мочевого пузыря
 уролитиаза
 паранефрита
 цистита

198. Определите соответствие между ре-**жимом и видом стерилизации**

стерилизация белья в автоклаве	132 град- 2,0 атм. — 20 мин.
сухожаровая стерилизация инструментария	180 град. — 1 час
холодная стерилизация	дезактив универсал 4% 15 минут

199. Определите соответствие между характером поражения и степенью ожога

термический ожог	образование пузырей
------------------	---------------------

II степени	
термический ожог III-A степени	некроз верхушек сосочкового слоя
термический ожог III-B степени	некроз всей толщи кожи
	некроз мышц

200. Определите соответствие длительности потери сознания и вида черепно-мозговой травмы

сотрясение головного мозга	кратковременная потеря сознания до нескольких секунд
ушиб головного мозга	длительная потеря сознания до нескольких часов
сдавление головного мозга гематомой	повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
	мозговая кома

201. Определите соответствие между определениями заболеваний

абсцесс	ограниченное скопление гноя в тканях
лимфаденит	воспаление лимфатических узлов
остеомиелит	воспаление костного мозга и кости
	воспаление лимфатических сосудов

202. Определите соответствие характера и локализации болей при заболеваниях

перфоративной язве желудка	«кинжальные» в эпигастрии
аппендиците	постоянные, сильные в правой подвздошной области
панкреатите	опоясывающие, тупого характера
	схваткообразные по всему животу

203. Определите соответствие между объемом и степенью кровопотери

500 – 700 мл	легкая кровопотеря
1500 – 2000 мл	тяжелая кровопотеря
1000 – 1400 мл	средняя кровопотеря
	крайне тяжелая

204. Определите соответствие вида подготовки пациента к операции

психологическая подготовка	индивидуальная беседа, охранительный режим
соматическая подготовка	ЭКГ, флюорография, проба Зимницкого
	группа крови, резус фактор, беседа о донорстве

205. Определите соответствие подготовки и вида операции

экстренная операция	одноэтапная подготовка операционного поля, опорожнение мочевого пузыря, премедикация
плановая	двухэтапная подготовка опера-

операция	ционного поля, опорожнение мочевого пузыря, утренняя и вечерняя премедикации
	полная санитарная обработка со сменой постельного белья

206. Определите соответствие целей и этапов предоперационного периода

диагностический этап предоперационного периода	определение срочности операции, выявление сопутствующих заболеваний
этап непосредственной предоперационной подготовки	коррекция нарушений функций органов и систем, проведение психологической и специальной подготовки
	перевод пациента в реанимационную палату

207. Определите соответствие этиологии и заболевания прямой кишки

воспалительные	парапроктит, проктит
----------------	----------------------

не воспалительные	геморрой, трещина заднего прохода, выпадение прямой кишки
	наличие злокачественного новообразования прямой кишки

208. Определите соответствие характеристики симптомам ЧМТ

общемозговые симптомы ЧМТ	гипертермия, повышение внутричерепного давления, рвота без облегчения
очаговые симптомы ЧМТ	расстройство речи, парезы конечностей, расстройство чувствительности
	рвота, симптом «очков», кровотечение из носа

209. Определите соответствие методов удаления гноя из полости плевры

открытый метод	дренирование, активная аспирация
закрытый метод	плевральная пункция, плеврорцентез
	пульмонэктомия

2. Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

210. Алгоритм при кровотечении из бедренной артерии

- 1: остановить кровотечение наложением жгута
- 2: обезболить
- 3: наложить асептическую повязку
- 4: наложить транспортную иммобилизацию
- 5: транспортировать в ЛПУ

211. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при артериальном кровотечении

- 1: остановить кровотечение
- 2: наложить асептическую повязку
- 3: наложить транспортную иммобилизацию
- 4: транспортировать в ЛПУ

212. Укажите последовательность стадий течения раневого процесса

- 1: гидратации
- 2: дегидратации
- 3: эпителизации

213. Укажите последовательность подготовки операционного поля в приемном отделении к экстренной операции

- 1: обработка спиртом
- 2: обработка антисептическим раствором
- 3: частичная санитарная обработка
- 4: сухое бритье

214. Укажите последовательность первой доврачебной помощи при ранении

- 1: остановка кровотечения

- 2: наложение асептической повязки

- 3: обезболивание

- 4: транспортная иммобилизация

- 5: выбор способа транспортировки

215. Укажите последовательность этапов доврачебной помощи при переломе переднего отдела таза

- 1: осмотреть пострадавшего
- 2: ввести кеталар
- 3: переложить на жесткие носилки
- 4: подложить валик под коленные суставы
- 5: укрыть одеялом
- 6: транспортировать в ЛПУ

216. Укажите последовательность этапов сбора мочи на общий анализ

- 1: приготовить чистую сухую емкость
- 2: провести туалет наружных половых органов

- 3: собрать среднюю порцию мочи

- 4: прикрепить направление к емкости

- 5: транспортировать мочу в лабораторию

217. Укажите последовательность помощи при рвоте

- 1: повернуть голову набок
- 2: накрыть шею и грудь полотенцем
- 3: поставить лоток ко рту
- 4: убрать рвотные массы
- 5: обработать полость рта

218. Укажите последовательность введения противостолбнячной сыворотки по Безредке

1: ввести 0,1 мл внутривенно

2: выждать 30 мин.

3: ввести 0,1 мл подкожно

4: выждать 30 мин.

5: ввести всю дозу внутримышечно

219. Выберите единственно правильный

ответ

Предоперационный период начинается с момента

заболевания

поступления в стационар

установления диагноза

начала подготовки к операции

220. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность предоперационного периода зависит от

метода обезболивания

срочности операции

риска операции

состава операционной бригады

221. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

боль

рвота

одиночество из-за отсутствия близких людей

страх операции

222. Выберите единственно правильный

ответ

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума

риска операции и послеоперационных осложнений

внутрибольничного инфицирования и выявление противопоказаний

состояния послеоперационного шока и дыхательной недостаточности

начала подготовки к операции

223. Выберите единственно правильный

ответ

Больной транспортируется из приемного покоя в операционную в случаях

состояния шока

паховой грыжи

внутреннего кровотечения

ранения сердца

224. Выберите единственно правильный

ответ

В случае перитонита подготовка больного к экстренной операции включает

теплый душ

очистительную клизму

дыхательную гимнастику перед наркозом

бритье и дезинфекцию операционного поля

225. Выберите единственно правильный

ответ

Уменьшению предоперационного стресса способствует

психологическая подготовка

теплый душ

физиопроцедуры

диета

226. Выберите единственно правильный

ответ

В предоперационном периоде чаще всего у пациента выявляются страхи

умереть во время операции

большой кровопотери

отсутствия сознания во время наркоза

отсутствие самостоятельного дыхания

227. Выберите единственно правильный

ответ

Тревогу пациента в предоперационном периоде медсестра выявляет по

хорошему настроению

нервности, на напряжению лицевой мускулатуры

снижению аппетита

показателям жизнедеятельности

228. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность прикладывания пузыря со льдом к послеоперационной ране не более

20 минут

2 часа

5 – 6 часов

24 часа

229. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность тромбозов возрастает при

строгом постельном режиме

активном ведении больного

при переходе со строгого постельного режима на активный

щадящем режиме

230. Выберите единственно правильный

ответ

Сокращение диаметра вен в 2 раза с помощью эластичной компрессии ведет к ускорению кровотока в

2 раза

3 раза

4 раза

5 раз

231. Выберите единственно правильный

ответ

Реальная угроза воздушной эмболии при кровотечении из

артерий шеи

- вен шеи
- артерии плеча
- вен бедра

232. Выберите единственно правильный

ответ

При быстром промокании послеоперационной повязки медсестра обязана

- заменить верхние слои повязки новыми
- снять все слои и наложить новую повязку
- вызвать врача
- положить пузырь со льдом

233. Выберите единственно правильный

ответ

Положение пациента на операционном столе при операциях на почках

- на спине горизонтальное
- валик подложен под нижние ребра
- голова запрокинута назад
- на боку с валиком в поясничной области

234. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность подготовки к плановой операции

- 2–4 часа
- 4–6 часов
- 12 часов
- 24 часа

235. Выберите единственно правильный

ответ

В случае приема пищи больным за 40 минут до экстренной операции следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

236. Выберите единственно правильный

ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма

- противопоказана
- делается за 1 час до операции
- делается при полном кишечнике
- делается всегда

237. Выберите единственно правильный

ответ

При подготовке пациента к экстренной операции необходимо

- определить рост пациента
- дать пациенту стакан сладкого чая
- по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд
- сделать очистительную клизму

238. Выберите единственно правильный

ответ

Пациента в операционный блок доставляют

- пешком
- только на каталке

- пешком, на каталке или на сидячем кресле, в зависимости от состояния
- на сидячем кресле

239. Выберите единственно правильный

ответ

В операционный блок пациента на каталке перевозит персонал отделения

- клинического
- операционного блока
- любого
- санпропускника

240. Выберите единственно правильный

ответ

В операционный зал доставляет пациента на каталке персонал отделения

- клинического
- операционного блока
- любого
- санпропускника

241. Выберите единственно правильный

ответ

В операционную пациентов ввозят

- с одеялом
- с подкладной подушкой
- без одеял и подушек
- с личной одеждой

242. Выберите единственно правильный

ответ

При гнойных операциях, для предотвращения загрязнения большого инструментального стола, целесообразен способ подачи инструментов

- в руки хирургу
- на инструментальный столик
- комбинированный
- в салфетке

243. Выберите единственно правильный

ответ

Во время операции операционная медсестра подает инструменты

- рукой в перчатках
- инструментом
- в салфетке
- на инструментальный столик

244. Выберите единственно правильный

ответ

Шовный и перевязочный материал операционная медсестра подает хирургу

- рукой в перчатках
- инструментами
- любым способом
- в салфетке

245. Выберите единственно правильный

ответ

Правила подачи скальпеля операционной медсестрой

- в салфетке, лезвием вверх, рукояткой к хирургу

- в салфетке, лезвием вниз, рукояткой к себе
- без салфетки, лезвием вниз, рукояткой к себе
- любым способом

246. Выберите единственно правильный ответ

Ножницы, зажимы, крючки операционная медсестра подает

- в закрытом виде, кольцами к хирургу
- в закрытом виде, кольцами к себе
- в открытом виде, кольцами к себе
- в открытом виде, кольцами к хирургу

247. Выберите единственно правильный ответ

Иглодержатель с заряженной в игле лигатурой операционная медсестра, поддерживая длинный конец лигатуры пинцетом, подает

- кольцами к хирургу
- кольцами к себе
- любым способом
- в салфетке

248. Выберите единственно правильный ответ

Лигатура вдевается в иглу так, чтобы ее конец был длиннее другого

- в 1–2 раза
- в 3–4 раза
- в 5–6 раз
- в 7–8 раз

249. Выберите единственно правильный ответ

Хирургические нити без игл операционная медсестра должна подавать хирургу

- рукой в перчатках
- пинцетом
- в салфетке
- на операционный столик

250. Выберите единственно правильный ответ

Длина хирургической нити для непрерывного шва

- 10–15 см
- 18–20 см
- 25–30 см
- любая

251. Выберите единственно правильный ответ

Длина хирургической нити для поверхностных узловых швов

- 10–15 см
- 18–20 см
- 25–30 см
- любая

252. Выберите единственно правильный ответ

Захватывание иглы широкой частью губок иглодержателя приводит

- к поломке иглы
- к проворачиванию
- к неправильному положению иглы
- к разрыву нити

253. Выберите единственно правильный ответ

Прямую иглу после зарядки нитью подают хирургу

- без иглодержателя
- с помощью пинцета
- ушком к хирургу
- острием к хирургу

254. Выберите единственно правильный ответ

При работе на кишечнике хирургу необходимо подавать только

- анатомические пинцеты
- хирургические пинцеты
- лапчатые пинцеты
- кусачки

255. Выберите единственно правильный ответ

Шприц подается хирургу

- поршнем к себе
- иглой к себе
- любым способом
- боковой поверхностью

256. Выберите единственно правильный ответ

Инфицированный перевязочный материал берется

- только инструментом
- только руками
- боковой поверхностью
- любым способом

257. Выберите единственно правильный ответ

Во время операции перевязочный материал подается

- рукой
- инструментом
- боковой поверхностью
- любым способом

258. Выберите единственно правильный ответ

Для обеспечения специализированных оперативных вмешательств используются инструменты

- общие хирургические
- специального назначения
- общие хирургические и специального назначения
- для остановки кровотечения

259. Выберите единственно правильный ответ

Микроирригаторы применяются

- для введения лекарственных веществ
- для выведения раневого отделяемого

- для введения турунд
- для введения инструментов

260. Выберите единственно правильный

ответ

Окончатые зажимы используются

- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей
- для сохранения герметичности при операциях на тканях и органах
- для коагуляции сосудов

261. Выберите единственно правильный

ответ

Зажимы Кохера отличаются от зажимов Бильрота

- наличием острых зубцов
- кривизной
- величиной
- длинными браншами

262. Выберите единственно правильный

ответ

Медицинские зеркала предназначаются

- для разъединения тканей
- для оттеснения тканей
- для выделения органов
- для исследования ран и свищевых ходов

263. Выберите единственно правильный

ответ

Медицинский шпатель – инструмент

- оттесняющий
- разъединяющий
- режущий
- соединяющий

264. Выберите единственно правильный

ответ

Щипцы- диссекторы применяются

- для разделения тканей
- для рассечения тканей
- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей

265. Выберите единственно правильный

ответ

В общехирургической практике применяются иглодержатели

- Матъе
- Гегара
- Дальгрена
- Федорова

266. Выберите единственно правильный

ответ

Иглодержатели Гегара бывают

- 2-х размеров
- 3-х размеров
- 5 размеров
- однотипные

267. Выберите два правильных ответа

К колющим инструментам относятся

- скальпели
- троакары
- иглы
- зонды
- зажимы

268. Выберите два правильных ответа

К инструментам, соединяющим ткани, относятся

- иглы и иглодержатели
- зажимы
- степлеры и клиперы
- кусачки
- зонды

269. Выберите два правильных ответа

Хирургические шовные иглы разделяют на

- колющие
- режущие
- рассекающие
- соединяющие
- вспомогательные

270. Выберите два правильных ответа

Вопросы, обсуждаемые с пациентом перед операцией

- подготовка кишечника
- эффективность анестезии
- ограничение питания
- возможность осложнений
- расположение на операционном столе

271. Выберите два правильных ответа

В хирургической операции различают

- начальный этап
- средний этап
- конечный этап
- оперативный доступ
- оперативный прием

272. Выберите два правильных ответа

Медицинские зонды предназначены

- для исследования ран и свищевых ходов
- для проведения тампонов и дренажей
- для рассечения тканей
- для коагуляции
- для остановки кровотечения

273. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь эффективна, если пациент в предоперационном периоде

- понимает эффективность голодания
- поел перед операцией
- выпил много жидкости
- дал информированное согласие
- скрыл симптомы начала ОРВИ

274. Выберите два правильных ответа

Медсестра объясняет необходимость перед премедикацией

- опорожнить мочевой пузырь
- выпить стакан жидкости
- сделать очистительную клизму
- измерить температуру
- снять все протезы

275. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь в интраоперационном периоде

- безопасность пациента
- реализация плана ухода
- мониторинг показателей жизнедеятельности
- расположение на операционном столе
- измерение температуры
- гемотрансфузия

276. Выберите два правильных ответа

Сестринский уход во время операции эффективен, если

- кожа со следами сдавлений
- кожа без гиперемии и сдавлений
- проводился мониторинг показателей жизнедеятельности
- соблюдена инфекционная безопасность
- измерялась температура тела
- проводилась гемотрансфузия

277. Выберите два правильных ответа

Для эффективного ухода в послеоперационном периоде перевязочной медсестре необходимо знать

- аппетит пациента
- продолжительность его сна
- локализацию операционного разреза
- характеристику пульса пациента
- физиологические отправления
- наличие дренажей

278. Выберите два правильных ответа

Послеоперационный уход включает

- улучшение памяти пациента
- прогулки на свежем воздухе
- контроль боли, ЛФК в постели
- контроль за раной, дренажами
- знать телефон родственников

279. Выберите два правильных ответа

Возможные послеоперационные осложнения из-за ограничения движений пациента

- переломы
- раневая инфекция
- низкие цифры АД
- пневмонии
- кровотечения
- инфильтраты
- тромбозы

280. Выберите два правильных ответа

Профилактике тромбозов в послеоперационном периоде способствуют

- инъекции антибиотиков
- ранняя активизация пациента
- поздняя активизация пациента
- использование эластичных бинтов, чулок
- оказание психологической поддержки
- назначение обезболивающих средств

281. Выберите два правильных ответа

Для профилактики тромбозов в послеоперационном периоде необходимо

- введение гепарина
- противопролежневый матрац
- компрессионная повязка
- давящая повязка
- назначение обезболивающих средств

282. Выберите два правильных ответа

К инструментам, разъединяющим ткани, относятся

- скальпели
- ножницы
- ранорасширители
- бельевые зажимы
- зажим Кохера

283. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по назначению

- на общий
- на типовой
- на специальный
- на экстренный
- на плановый

284. Выберите два правильных ответа

Инструмент для защиты тканей от случайного повреждения

- ножницы остроконечные
- зонд Кохера
- иглы круглые
- пинцет хирургический
- мышечный ретрактор

285. Выберите три правильных ответа

Не осложненное течение раннего послеоперационного периода сопровождается

- поносом
- ослаблением перистальтики кишечника
- неукротимой рвотой
- тахикардией до 135 в минуту
- тахикардией до 100 в минуту
- фебрильной лихорадкой
- субфебрильной лихорадкой

286. Выберите три правильных ответа

Любая операция включает ряд последовательных этапов

- разъединение тканей
- металлоостеосинтез
- остановку кровотечения
- соединение рассеченных тканей
- резекцию кишки

287. Выберите три правильных ответа

Для перевязки сосудов в операционной ране применяют

- шелк
- кетгут
- капрон
- лавсан
- лен
- этибонд

288. Выберите три правильных ответа
Общие хирургические инструменты по своему воздействию на ткани делятся на следующие группы

- для разъединения тканей
- для остановки кровотечения
- для фиксации тканей
- для соединения тканей
- для создания анастомоза

289. Выберите три правильных ответа
В общехирургической практике применяются скальпели

- брюшистые
- остроконечные
- тупоконечные
- обоюдоострые
- со съемным лезвием

290. Выберите три правильных ответа
Пинцеты подразделяются по характеру воздействия на ткани на

- анатомические
- хирургические
- коагуляционные
- вспомогательные
- сдавливающие

291. Определите соответствие между группами инструментов

для рассечения	скальпели, ножницы
для соединения	иглодержатель, иглы
кровоостанавливающие	зажимы Кохера, Бильрота
	зажим Микулича

292. Определите соответствие между шовным материалом и соединяемыми тканями

мочевой пузырь	хромированный кетгут
сосуды	пролен
кожа	шелк
	лавсан

293. Определите соответствие между сроками рассасывания нитей

викрил	70 дней
монокрил	90 - 119 дней
	120 - 140 дней

294. Определите соответствие между группами шовного материала

рассасывающийся синтетический шовный материал	полисорб, дексон, максон
нерассасывающийся синтетический шовный материал	капрон, нейлон, полипро-

	пилен
	шелк, лен

295. Определите соответствие между видами повязок

твердые повязки	шинная, окончатая
мягкие повязки	колосовидная, черепа- шья
специальные	окклюзионная, термо- изолирующая
	лейкопластырная

296. Установите соответствие между определениями

гематома	скопление крови, ограниченное тканями
кровотечение	истечение крови из кровяного русла
	истечение крови в полости тела

297. Определите соответствие между туалетом окружности ран

«чистая» послеоперационная рана	от краев раны к периферии
«гнойная» послеоперационная рана	от периферии к краям раны
	от периферии к наложенным швам

298. Определите соответствие между классами медицинских отходов

отходы класса «Б»	использованные иглы, шприцы, перчатки, скальпели
отходы класса «В»	перевязочный материал пациента с анаэробной инфекцией
отходы класса «Г»	просроченные лекарственные препараты, дезинфицирующие средства
	радиационные отходы

299. Определите соответствие между фазами течения раневого процесса

гидратации	обильное гнойное отделяемое
дегидратации	появление грануляций
эпителизации	заживление раны
	выделение костных секвестров

300. Определите соответствие осложнений со стороны операционной раны

в раннем послеоперационном периоде	кровотечение, инфильтрат
в позднем послеоперационном периоде	эвентрация
	сепсис

3. Проверка умения квалифицированно провести анализ профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации

301. Выберите единственно правильный

ответ

Выберите биологический гемостатик для ушивания раны почки

- гемостатическая губка
- серджесел
- серджесел нью-нит
- серджесел фибриллар

302. Выберите единственно правильный

ответ

Выберите шовный материал для ушивания аорты

- кетгут
- шёлк
- пролен
- гортекс

303. Выберите единственно правильный

ответ

Нижнюю полу ю вену можно ушить

- кетгут
- лавсан
- викрил
- пролен

304. Выберите единственно правильный

ответ

Метод окончательной остановки кровотечения при микрохирургической операции без перевязки

- ушивание
- коагуляция
- сосудистый шов
- клипирование сосудов

305. Выберите единственно правильный

ответ

Микрохирургический инструмент для наложения клипс

- зажим Борхарда
- костодержатель Люэра
- клипатор
- клипсодержатель

306. Выберите единственно правильный

ответ

Эндохирургический кровоостанавливающий зажим

- зажим Бильрота
- зажим Бека
- клипатор
- клипсодержатель

307. Выберите единственно правильный

ответ

Зажим для наложения бокового сосудистого шва на аорту

- Бильрота
- многоцелевой Де Бейки
- аортальный зажим Бека
- анастоматический зажим Кастенада

308. Выберите единственно правильный

ответ

Самая тонкая кетгутовая нить

- 6/0
- 0
- 4
- 11/0

309. Выберите единственно правильный

ответ

Инструмент для перевязки артерии на протяжении

- лигатурная игла Дешана, лигатурная игла Купера
- проводник Поленова, зажим Беллока
- Г-образный зажим, зажим Сатинского

310. Выберите единственно правильный

ответ

Помещения с асептическим режимом

- не должны быть проходными
- могут быть проходными
- должны быть проходными
- могут быть частично проходными

311. Выберите единственно правильный

ответ

Ширина дверных проемов в существующих операционных должна быть не менее

- 50 см
- 80 см
- 110 см
- 150 см

312. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь малой операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 24 кв. м
- 36 кв. м

313. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 36 кв. м
- 42 кв. м

314. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь предоперационной для одной общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 36 кв. м
- 42 кв. м

315. Выберите единственно правильный

ответ

Инструментальная комната оперблока предназначена для

- дезинфекции хирургического инструментария

- стерилизации хирургического инструментария
- хранения хирургического инструментария и аппаратуры
- дезактивация хирургического инструментария

316. Выберите единственно правильный ответ

Операционный зал должен иметь высоту потолков не менее (метров)

- 3,0
- 3,5
- 4,0
- 4,4

317. Выберите единственно правильный ответ

Полы в операционных, наркозных, реанимационных помещениях должны быть

- антистатическими
- непылеобразующими
- мраморными
- любыми

318. Выберите единственно правильный ответ

Положение Тренделенбурга на операционном столе применяется при операциях

- на органах малого таза
- гинекологических
- на прямой кишке
- на мочевом пузыре

319. Выберите единственно правильный ответ

Решение о любом изменении позиции пациента на операционном столе

- принимают только после консультации с анестезиологом
- принимает операционная медсестра самостоятельно
- принимает хирург
- принимает старшая мед.сестра

320. Выберите единственно правильный ответ

На операционном столе изменять положение пациента, находящегося под наркозом

- необходимо быстро, осторожно
- необходимо медленно, осторожно, скоординировано
- нельзя до восстановления сознания
- не менять

321. Выберите единственно правильный ответ

Пункцию голеностопного сустава осуществляют в положении пациента

- на боку
- на спине
- на животе
- сидячем

322. Выберите единственно правильный ответ

Пункцию грудины (стернальную) осуществляют в положении пациента

- на боку
- на животе
- на спине
- сидячем

323. Выберите единственно правильный ответ

Возможность естественного проветривания должна быть предусмотрена во всех помещениях за исключением помещений

- класса чистоты А
- класса чистоты В
- класса чистоты Б
- класса чистоты Г

324. Выберите единственно правильный ответ

В помещениях класса чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать %

- 50
- 60
- 70
- 80

325. Выберите единственно правильный ответ

Для операционных обязательны системы приточно - вытяжной вентиляции

- самостоятельные
- общие
- отдельные
- комбинированы

326. Выберите единственно правильный ответ

Воздух во всех помещениях операционного блока подается в

- верхнюю зону
- среднюю зону
- нижнюю зону
- среднюю и нижнюю зоны

327. Выберите единственно правильный ответ

В операционных предусматривается удаление воздуха

- из верхней зоны
- 40 % из верхней и 60 % из нижней зоны
- 60 % из верхней зоны и 40 % из нижней
- из нижней зоны

328. Выберите единственно правильный ответ

В асептических помещениях

- приток воздуха должен преобладать над вытяжкой
- вытяжка преобладает над притоком
- не имеет значения, преобладает вытяжка или приток воздуха
- приток воздуха 50% и вытяжка 50%

329. Выберите единственно правильный

ответ

Система вентиляции помещений класса чистоты А должна работать

- в непрерывном режиме
- только во время операций
- только между операциями
- в произвольном режиме

330. Выберите единственно правильный

ответ

Операционный зал должен иметь естественное освещение

- обязательно
- не обязательно
- желательно
- не желательно

331. Выберите единственно правильный

ответ

Расположение пациента на операционном столе горизонтальное с приподнятым изголовьем называется положением

- Фовлера
- Тренделенбурга
- Кларка
- Федорова

332. Выберите единственно правильный

ответ

Изголовье операционного стола не рекомендуется приподнимать выше, чем на

- 15°
- 20°
- 25°
- 45°

333. Выберите единственно правильный

ответ

Положение пациента на операционном столе на боку с валиком в поясничной области применяется при операциях

- на мочевом пузыре
- на органах живота (передний доступ)
- на почках
- на груди

334. Выберите единственно правильный

ответ

Положение пациента на операционном столе горизонтальное на спине с головой, запрокинутой назад при помощи валика, применяется при операциях

- на лице
- на органах живота (передний доступ)
- на щитовидной железе
- на груди

335. Выберите единственно правильный

ответ

При операциях на лице, шее, груди, органах живота, мочевом пузыре, ампутации конечности положение пациента на операционном столе

- на спине горизонтально
- на боку
- на животе
- гинекологическое

336. Выберите единственно правильный

ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу требует от операционной медсестры

- четкого знания хода операции
- опережая хирурга, держать нужный инструмент
- произвольных действий
- выполнения инструкций старшей мед.сестры

337. Выберите единственно правильный

ответ

Чем выше квалификация операционной медсестры, тем чаще она использует способ подачи инструментов

- в руки хирургу
- на инструментальный столик
- комбинированный
- произвольно

338. Выберите единственно правильный

ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу – наиболее

- несовершенный
- совершенный и трудный
- простой и распространенный
- медленный

339. Выберите единственно правильный

ответ

Способ подачи инструментов на инструментальный столик – наиболее

- совершенный
- трудный
- простой
- распространенный

340. Выберите единственно правильный

ответ

Для обеспечения инфекционной безопасности на операционную рану накладывается повязка

- всегда
- по показаниям
- по решению хирурга
- по решению зав.отделения

341. Выберите единственно правильный

ответ

Браншевые инструменты – это инструменты

- с кольцами для удобства удерживания
- с фиксаторами
- с шарнирами
- с рамками

342. Выберите единственно правильный

ответ

Кремальеры – это

- приспособления для фиксации инструментов в нужном положении
- специальные рукоятки
- режущие части инструментов
- шарниры

343. Выберите единственно правильный

ответ

Зажимы Пеана, Кохера, Бильрота относятся к инструментам

- для остановки кровотечения
- для соединения ткани
- вспомогательным
- костным

344. Выберите единственно правильный

ответ

Желобоватый зонд используют

- для защиты тканей от случайного повреждения
- для разрезания мягких тканей
- для прокола мягких тканей
- для кройки перевязочного материала

345. Выберите единственно правильный

ответ

Пинцеты, зонды, крючки относятся к инструментам

- специальным
- соединяющим
- вспомогательным
- разъединяющим

346. Выберите единственно правильный

ответ

Дерматомы бывает

- клеевые
- пластырные
- с вращающимися дисковыми ножами
- с кремальерами

347. Выберите единственно правильный

ответ

При эксплуатации хирургических лазерных аппаратов

- защита не требуется
- обязательно применение закрытых защитных очков
- необходимо избегать смотреть на прямое излучение
- необходимо избегать попадания в глаза прямых и отраженных лучей

348. Выберите единственно правильный

ответ

При струмэктомии обязательным является наличие в операционном наборе

- системы для прямого переливания крови
- трахеостомического набора
- сосудистого набора
- костного набора

349. Выберите единственно правильный

ответ

В набор инструментов для операции по поводу зоба входят

- зонд Кохера
- зажим Де-Бейки
- зажим Федорова
- зажимы Микулича

350. Выберите единственно правильный

ответ

В набор инструментов для трахеостомии входят

- зонд Фогарти
- толстый резиновый катетер
- катетер трахеальный металлический
- зажим Федорова

351. Выберите единственно правильный

ответ

Инструменты для стеральной пункции

- хирургический коловорот, катетер
- зажим Федорова
- игла Кассирского, 10–20-х граммовый шприц, иглы инъекционные
- троакар, 10–20-х граммовый шприц, иглы инъекционные

352. Выберите единственно правильный

ответ

Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несет

- заведующий структурным подразделением
- старшая медсестра
- работник
- главный врач

353. Выберите единственно правильный

ответ

В целях профилактики гемоконтактных инфекций надевать перчатки перед парентеральными манипуляциями/ операциями

- обязательно
- желательно
- необходимо в соответствии с показаниями
- нежелательно

354. Выберите единственно правильный

ответ

Лицевая маска после операции снимается

- за завязки
- за фильтр
- любым способом
- чистыми руками

355. Выберите единственно правильный

ответ

Периодичность смены комплекта спецодежды в стерильной зоне

- 1 раз в неделю
- 1 раз в 2 дня
- 1 раз в смену
- 1 раз в 3 дня

356. Выберите единственно правильный

ответ

Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами ЛПУ

- запрещается
- разрешается
- допускается
- необязательно

357. Выберите единственно правильный ответ

Ношение защитных очков / щитков во время операции для всех членов операционной бригады

- обязательно
- защитные очки / щитки могут быть средством выбора
- необязательно
- допускается

358. Выберите два правильных ответа

Операционные должны быть пронумерованы и функционально разделены с учетом

- степени чистоты оперативного вмешательства
- хирургических бригад
- вида анестезии
- тяжести состояния пациента
- необходимого оборудования

359. Выберите два правильных ответа

Виды операционных с учетом чистоты производимых в них операций

- асептические
- септические
- смешанные
- плановые
- экстренные

360. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по назначению на

- типовой
- общий
- специальный
- экстренный
- плановый

361. Выберите два правильных ответа

Буж применяется

- для дренирования полостей
- для механического расширения физиологических отверстий
- для механического расширения искусственных отверстий
- для исследования ран и свищевых ходов
- для прокола

362. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

- долото прямое
- долото желобоватое
- распатор изогнутый
- пила дуговая
- жомы

363. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу геморроя входят

- ректальное зеркало
- окончатые геморроидальные зажимы
- кусачки Лангенбека
- брюшные зеркала
- жомы Пайера

364. Выберите два правильных ответа

Корнцанг применяют для

- наложения швов
- остановки кровотечения
- подачи перевязочного материала
- фиксации операционного белья
- введения тампонов

365. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу ущемлённых грыж входят

- ранорасширители (брюшные зеркала)
- иглы кишечные
- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека
- пуговчатый зонд

366. Выберите два правильных ответа

Для осуществления доступа в полость предсердия операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- сосудистый пинцет и ножницы
- сосудистый пинцет и крючок Кули
- пуговчатый зонд
- крючок Мешалкина
- малый диссектор

367. Выберите два правильных ответа

Для проведения операций с высоким риском нарушения целостности перчаток следует надевать:

- 2 пары перчаток
- 3 пары перчаток
- перчатки повышенной прочности
- резиновые перчатки
- 4 пары перчаток

368. Выберите два правильных ответа

Медицинский персонал обязательно работает в стерильных разовых масках

- в операционных
- в санпропускнике
- при проведении инвазивных процедур
- на посту
- в приемном отделении

369. Выберите три правильных ответа

Для ревизии полости предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

- сосудистый пинцет и ножницы
- сосудистый пинцет и крючок Кули
- пуговчатый зонд
- крючок Мешалкина
- малый диссектор

370. Выберите два правильных ответа

Для ушивания предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

- кишечный жом
- атравматический иглодержатель с атравматической нитью
- сосудистый пинцет
- мышечный ретрактор

371. Выберите три правильных ответа

Для ушивания твердой мозговой оболочки операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с маленькой колющей иглой
- иглодержатель с режущей иглой
- пролен
- коагуляционный пинцет
- ножницы Купера

372. Выберите три правильных ответа

Для мобилизации сигмовидной кишки операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- зажимы Бильрота 20 см
- кишечный жом
- лигатуры
- ножницы Купера
- брюшное зеркало широкое

373. Выберите два правильных ответа

Для наложения узлового шва на кишечный анастомоз операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- анатомический пинцет
- иглодержатель с кишечной иглой
- скальпель
- кусачки Листона
- брюшное зеркало широкое

374. Выберите три правильных ответа

Для ушивания брюшины, мышц операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- иглодержатель с колющей иглой
- анатомический пинцет
- кетгут
- кусачки Листона

375. Выберите три правильных ответа

Для наложения швов на кожу операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с кожной иглой
- брюшное зеркало широкое
- скальпель, леску
- хирургический пинцет
- ножницы Купера

376. Выберите три правильных ответа

Инструменты, расширяющие раны

- ножницы остроконечные
- роторасширитель
- крючки Фарабефа
- лапаротомные крючки

- рамочный ранорасширитель

377. Выберите три правильных ответа

В общий набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- распаторы
- пинцет сосудистый
- иглы кишечные

378. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- жомы раздавливающие
- пила-ножовка
- пила Джигли
- долото прямое
- долото желобоватое

379. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу некроза кишки входят

- жомы кишечные эластические прямые
- жомы кишечные эластические изогнутые
- жомы раздавливающие
- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека

380. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека
- реберный распатор Дуайена
- шприцы 10–20хграммовые
- ампутационные ножи

381. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберные ножницы Дуайена
- ампутационные ножи
- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- острая ложечка Фолькмана

382. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

- кишечный жом
- ампутационные ножи
- ретрактор мышечный
- распатор прямой
- крючки Листона

383. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для трахеостомии входят

- стерильный резиновый грушевидный баллон
- трахеостомические трубки разных размеров
- однозубые острые крючки
- расширитель Труссо

кишечный жом

384. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для холецистэктомии входят

- зажим Федорова окончатый
- зажимы Микулича
- брюшные зеркала
- зонд Кохера
- зонд Фогарти

385. Выберите два правильных ответа

Для проведения микрохирургических операций необходимы следующие укладки инструментов

- основной травматологический набор
- стандартный микрохирургический набор
- набор для первичной хирургической обработки раны
- набор для стерильной пункции
- набор для плевральной пункции

386. Выберите три правильных ответа

Преимущества применения лазера в хирургии

- отсутствие грубых рубцов после операции
- безболезненный послеоперационный период
- более быстрое выздоровление
- менее выраженное повреждение тканей
- сокращение времени операции

387. Выберите три правильных ответа

Использование медицинских перчаток обязательно при малейшей возможности контакта

- с кровью и биологическими субстратами
- с поврежденной кожей
- со слизистыми оболочками
- с медицинской документацией
- с продуктами питания

388. Выберите три правильных ответа

Лицевые маски должны закрывать

- нос
- рот
- область подбородка
- только нос
- только рот

389. Выберите два правильных ответа

Для предупреждения внутрибольничной инфекции операционная медсестра обязана

- раздельно хранить верхнюю одежду и спецодежду

не выходить в спецодежде за пределы операционного блока

- не носить спецодежду в неслужебное время

лично контролировать качество стирки и дезинфекции белья

выходить в спецодежде за пределы операционного блока

390. Выберите три правильных ответа

Меры профилактики воздушно-капельной инфекции в операционном зале

- соблюдение этапности операции
- соблюдение асептики
- ношение маски
- влажная уборка, УФО
- ограничение хождений

391. Выберите единственно правильный ответ

В стерильной зоне оперблока размещаются помещения

- операционные
- предоперационные
- для хранения стерильных материалов
- санпропускник для входа персонала

392. Выберите единственно правильный ответ

Количество операционных в оперблоке зависит от

- величины и профиля хирургических отделений
- сложности и длительности выполняемых операций
- количества операционных дней
- графика хирургических дней

393. Выберите единственно правильный ответ

Лица с острыми респираторными заболеваниями в операционную

- не допускаются
- допускаются при определенных условиях
- допускаются в двойной маске
- допускаются в зависимости от оперативного вмешательства

394. Выберите единственно правильный ответ

Плановая операционная может работать в неделю не более

- 3 дней
- 4 дней
- 5 дней
- 6 дней

395. Выберите единственно правильный ответ

Для обеспечения специализированных оперативных вмешательств используются инструменты

- общие хирургические
- специального назначения
- общие хирургические и специального назначения

396. Выберите два правильных ответа

Операционные должны быть пронумерованы и функционально разделены с учетом

- степени чистоты оперативного вмешательства
- хирургических бригад
- вида анестезии

- тяжести состояния пациента
- необходимого оборудования
- экстренные

397. Выберите три правильных ответа

Аппарат искусственного кровообращения состоит из

- нагнетающего насоса и фильтра
- артериальной и венозной систем
- оксигенатора
- аспиратора
- аппарата электронож-57 М

398. Выберите три правильных ответа

Стандартное оборудование и оснащение предоперационной

- рефлекторный светильник стационарный
- настенный дозатор кожных антисептиков
- настенный дозатор для жидкого мыла
- система централизованной подачи кислорода

диспенсер для полотенец

399. Выберите три правильных ответа

В стандартное оснащение операционной входят столы

- гипсовый
- столик для удаленных органов
- операционный
- большой инструментальный
- инструментальный столик

400. Выберите три правильных ответа

Медицинское оборудование, применяемое в операционной

- настенный дозатор кожных антисептиков
- настенный дозатор для жидкого мыла

- бактерицидный облучатель
- рефлекторный светильник стационарный
- система централизованной подачи кислорода

401. Установите соответствие между определениями

остеометаллосинтез	фиксация правильного стояния отломков
репозиция	сопоставление отломков кости
	вправление вывиха

402. Определите соответствие между сроками снятия швов

с кожной раны передней брюшной стенки	на 7 сутки
с раны на лице	на 5 сутки
	на 10 сутки

403. Определите соответствие между разрезами при гнойных заболеваниях

мастит	радиарный
фурункул	линейный
карбункул	крестообразный
	поперечный

404. Определите соответствие между гнойными заболеваниями

фурункул	воспаление сальных желез
карбункул	воспаление волосяных фолликулов, сальных желез с некрозом клетчатки
гидраденит	воспаление потовых желез
	воспаление лимфатических узлов

Специальность « Операционное дело»

Высшая квалификационная категория

1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите единственно правильный ответ

Применение лазера в хирургии относится к антисептике

- механической
- физической
- биологической
- химической

2. Выберите единственно правильный ответ

Для контроля качества предоперационной обработки рук используют

- термоиндикаторы
- бактериологический контроль
- фенолфталеиновую пробу
- амидопириновую пробу

3. Выберите единственно правильный ответ

Нарушение асептики может привести к осложнению

- воздушной эмболии
- аллергической реакции
- абсцессу
- липодистрофии

4. Выберите единственно правильный ответ

После обработки рук дезраствором они становятся

- стерильными
- дезинфицированными
- чистыми
- подготовленными к операции

5. Выберите единственно правильный ответ

Физическим методом антисептики является

- применение антибиотиков
- применение ферментов
- дренирование ран
- удаление инородных тел

6. Выберите единственно правильный ответ

Способ транспортировки при внутреннем кровотечении

- с приподнятым головным концом
- с опущенным головным концом
- в горизонтальном положении
- горизонтально на боку
- придать положение полусидя

7. Выберите единственно правильный ответ

Физический метод окончательной остановки кровотечения

- переливание плазмы
- протезирование сосуда
- электрокоагуляция
- наложения шва на сосуд

8. Выберите единственно правильный ответ

Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из

- пищевода
- вен голени
- крупных вен шеи
- плечевой артерии

9. Выберите единственно правильный ответ

Механический способ окончательной остановки кровотечения

- применение фибриногена
- наложение артериального жгута
- наложение сосудистого шва
- применение гемостатической вискозы

10. Выберите единственно правильный ответ

Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к

- углу нижней челюсти
- ключице
- VI шейному позвонку
- I ребру

11. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное кровотечение из раны в верхней трети предплечья можно остановить путем сгибания руки

- в плечевом суставе
- в плечевом и локтевом суставах
- в локтевом суставе
- в лучезапястном суставе

12. Выберите единственно правильный ответ

Недостатком применения жгута Эсмарха является

- отсутствие чувствительности ниже наложения жгута
- сложность использования
- сдавление мягких тканей и нервных стволов
- повреждение кожных покровов

13. Выберите единственно правильный ответ

Критерием правильного наложения жгута Эсмарха является

- синюшность кожи
- отсутствие чувствительности кожи ниже жгута
- повышение температуры тела ниже жгута
- исчезновение периферического пульса

14. Выберите единственно правильный ответ

Группа крови, в которой содержится агглютиноген В и агглютинин альфа

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

15. Выберите единственно правильный ответ

Противопоказания к переливанию крови

- тяжелая операция
- тяжелое нарушение функций печени
- шок
- снижение артериального давления

16. Выберите единственно правильный ответ

Резус-фактор содержится в

- плазме
- лейкоцитах
- эритроцитах
- тромбоцитах

17. Выберите единственно правильный ответ

Группа крови, в которой содержатся агглютиногены А и В:

- первая
- вторая
- третья
- четвертая

18. Выберите единственно правильный ответ

Агглютинины находятся в

- эритроцитах
- лейкоцитах
- плазме крови
- других жидкостях организма

19. Выберите единственно правильный ответ

Состав крови II группы

- А
- В
- АВ
- О

20. Выберите единственно правильный

ответ

Кровь В (III) группы можно вводить лицам

- только с III группой крови
- с любой группой крови
- только с III и IV группами крови
- со II и III группами крови

21. Выберите единственно правильный

ответ

Для проведения биологической пробы следует

- ввести струйно однократно 10 мл крови и наблюдать за состоянием больного 5 мин
- ввести струйно трижды по 10 мл крови с интервалом 5 мин, наблюдая за больным
- ввести капельно 10 мл крови, наблюдать за состоянием больного 5 минут
- ввести капельно трехкратно по 10 мл крови

22. Выберите единственно правильный

ответ

При переливании крови состояние больного ухудшилось, появилась боль в пояснице и за грудиной. Это указывает на

- геморрагический шок
- цитратный шок
- гемотрансфузионный шок
- пирогенную реакцию

23. Выберите единственно правильный

ответ

При нарушении техники переливания крови может развиваться осложнение

- цитратный шок
- анафилактический шок
- гемотрансфузионный шок
- воздушная эмболия

24. Выберите единственно правильный

ответ

Потенциальная проблема пациента после наложения гипсовой иммобилизации

- нарушение кровообращения
- развитие контрактуры
- зябкость конечности
- общее повышение температуры

25. Выберите единственно правильный

ответ

Перед наложением бинтовой повязки медсестра оценит

- температуру тела
- частоту дыхания
- характер патологического процесса
- АД

26. Выберите единственно правильный

ответ

При ранениях волосистой части головы накладывается повязка

- крестообразная на затылок и шею
- пращевидная
- "уздечка"
- "чепец"

27. Выберите единственно правильный

ответ

При ранении плечевого сустава накладывают повязку

- черепашью
- колосовидную
- 8-образную
- Дезо

28. Выберите единственно правильный

ответ

Окклюзионную повязку используют при

- артериальном кровотечении
- переломе ребер
- закрытом пневмотораксе
- открытом пневмотораксе

29. Выберите единственно правильный

ответ

Вид повязки при венозном кровотечении

- давящая
- окклюзионная
- спиральная
- лейкопластырная

30. Выберите единственно правильный

ответ

Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти

- крестообразная
- "перчатка"
- черепашья
- змеевидная

31. Выберите единственно правильный

ответ

Повязка, применяемая при носовом кровотечении

- лейкопластырная
- пращевидная
- "уздечка"
- циркулярная

32. Выберите единственно правильный

ответ

При переломе плечевой кости транспортная иммобилизация накладывается

- от больной лопатки до пальцев кисти
- от средней трети плеча до пальцев кисти
- от здоровой лопатки до пальцев кисти
- от верхней трети плеча до пальцев кисти

33. Выберите единственно правильный

ответ

При открытых переломах накладывают гипсовую повязку

- колосовидную
- лонгетную
- створчатую
- циркулярную

34. Выберите единственно правильный

ответ

Реализацию краткосрочной цели "снятие швов" у пациента после аппендектомии медсестра запланирует на

- десятые сутки
- седьмые сутки
- третьи сутки
- двенадцатые сутки

35. Выберите единственно правильный

ответ

У пациента, готовящегося к плановой операции, медсестра запланирует бритье операционного поля

- в день операции
- на операционном столе
- вечером накануне операции
- за 1 сутки до операции

36. Выберите единственно правильный

ответ

Цель радикальной операции

- полное излечение пациента
- облегчение страданий пациента
- временное восстановление функции
- облегчение работы пораженного органа

37. Выберите единственно правильный

ответ

Цель паллиативной операции

- полное излечение пациента
- восстановление обмена веществ
- улучшение функции кишечника
- облегчение страданий пациента

38. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- дефицит самоухода
- беспокойство за оставленную работу
- чувство страха
- недооценка тяжести своего состояния

39. Выберите единственно правильный

ответ

Предоперационный период начинается с

- начала заболевания
- момента поступления в хирургический стационар
- установления диагноза
- начала подготовки к операции

40. Выберите единственно правильный

ответ

Вид санитарной обработки перед плановой операцией

- обтирание кожи и смена белья
- частичная санитарная обработка

- полная санитарная обработка
- санитарная обработка не производится

41. Выберите единственно правильный

ответ

Основная задача предоперационного периода

- провести санацию очагов инфекции
- обследовать сердечно-сосудистую систему
- улучшить состояние пациента
- подготовить больного к операции

42. Выберите единственно правильный

ответ

Бритье операционного поля перед экстренной операцией осуществляется

- непосредственно перед операцией в санитарной комнате
- на операционном столе
- не производится
- накануне

43. Выберите единственно правильный

ответ

Вид санитарной обработки, выполняемой перед экстренной операцией

- полная санитарная обработка
- частичная санитарная обработка
- не осуществляется
- только бритье операционного поля

44. Выберите единственно правильный

ответ

Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

45. Выберите единственно правильный

ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма ставится

- противопоказана
- в любое время
- за 1 час
- непосредственно перед операцией

46. Выберите единственно правильный

ответ

Для профилактики послеоперационных бронхолегочных осложнений больному назначают

- дыхательную гимнастику
- интубацию трахеи
- диету, богатую белком
- УВЧ на грудную клетку

47. Выберите единственно правильный

ответ

Диагностической операцией является

- вправление вывиха
- обработка раны с наложением швов
- биопсия тканей

- вскрытие гнойника

48. Выберите единственно правильный ответ

Признаки нагноения послеоперационной раны

- побледнение краев
- гиперемия, отек, усиление боли
- промокание повязки кровью
- выхождение кишечных петель под кожу

49. Выберите единственно правильный ответ

Основное в уходе за больным с ИВЛ

- противокашлевые средства
- санация трахеобронхиального дерева
- профилактика пролежней
- питание через зонд

50. Выберите единственно правильный ответ

Срок окончания послеоперационного периода

- после устранения ранних послеоперационных осложнений
- после выписки из стационара
- после заживления послеоперационной раны
- после восстановления трудоспособности

51. Выберите единственно правильный ответ

При задержке мочеиспускания после аппендэктомии прежде всего необходимо

- вызвать мочеиспускание рефлекторно
- произвести катетеризацию мочевого пузыря
- ввести мочегонные средства
- применить теплую грелку на низ живота

52. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики пневмонии в послеоперационном периоде необходимо

- назначить противокашлевые средства
- следить за соблюдением строгого постельного режима
- проводить дыхательную гимнастику, массаж
- антибактериальная терапия

53. Выберите единственно правильный ответ

Положение больного в постели в первые часы после общего обезболивания

- лежа с опущенным головным концом
- полусидя
- лежа на боку
- лежа на спине без подушки, голова повернута набок

54. Выберите единственно правильный ответ

В первые 6 часов после операции на желудочно-кишечном тракте запрещается прием жидкости, так как

- возможна провокация рвоты
- больной не хочет пить
- возможно увеличение ОЦК
- необходимо предупредить мочеиспускание

55. Выберите единственно правильный ответ

При транспортировке в операционную больного нужно

- посадить на коляску
- положить на каталку
- отвести под руку
- отправить самостоятельно

56. Выберите единственно правильный ответ

Корнцанг применяют для

- наложения швов
- остановки кровотечения
- подачи перевязочного материала
- фиксации операционного белья

57. Выберите единственно правильный ответ

Время начала операции после последнего приема пищи через

- 1 час
- 2 часа
- 3 часа
- 4 часа

58. Выберите единственно правильный ответ

Груз на рану после операции накладывается с целью

- предупреждения расхождения швов
- предупреждения инфицирования
- предупреждения кровотечения
- уменьшения боли

59. Выберите единственно правильный ответ

Показанием к смене повязки на следующий день после операции является

- резкая бледность кожи вокруг раны
- похолодание кожи вокруг раны
- резкий цианоз вокруг раны
- обильное промокание повязки

60. Выберите единственно правильный ответ

В первые трое суток после операции может возникнуть осложнение

- кровотечение
- нагноение
- выхождение внутренних органов под кожу
- расхождение швов

61. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема пациента с термической травмой

- чувство одиночества
- слабость
- боль в области ожоговой раны
- чувство страха манипуляций

62. Выберите единственно правильный

ответ

Основной целью оказания первой медицинской помощи при отморожении является

- восстановление кровообращения
- прекращение боли
- восстановление чувствительности
- восстановление функции дыхания

63. Выберите единственно правильный

ответ

Фаза травматического шока

- судорожная
- токсемия
- торпидная
- реконвалесценция

64. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с обширным ранением мягких тканей

- расстройство схемы тела
- чувство беспомощности
- острая боль
- лихорадка

65. Выберите единственно правильный

ответ

Приоритетная проблема пациента с ранением на этапе неотложной помощи

- кровотечение
- дефицит движения
- дефицит самоухода
- угроза инфицирования

66. Выберите единственно правильный

ответ

Показатель шокового индекса – это отношение

- частоты сердечных сокращений к систолическому АД
- частоты сердечных сокращений к диастолическому АД
- частоты пульса к частоте дыхания
- частоты пульса к центральному венозному давлению

67. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный признак перелома костей

- деформация сустава
- деформация мягких тканей
- отек
- патологическая подвижность костных отломков

68. Выберите единственно правильный

ответ

Признак, характерный только для перелома

- кровоподтек
- припухлость
- крепитация костных отломков
- нарушение функции конечности

69. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, характерный только для вывиха

- боль
- гиперемия
- нарушение функции
- пружинящая фиксация

70. Выберите единственно правильный

ответ

Рана является проникающей, если

- в ней находится инородное тело
- повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- повреждены мышцы и кости
- повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)

71. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность укушенной раны

- заражением бешенством
- заражением туберкулезом
- большой кровопотерей
- переломом костей

72. Выберите единственно правильный

ответ

Комбинированная травма – это

- сочетание двух и более повреждающих факторов
- повреждение одного сегмента конечности
- перелом бедра и голени
- разрыв мочевого пузыря и перелом костей таза

73. Выберите единственно правильный

ответ

При сохраненной целостности кожи определяется локальная боль, крепитация и деформация конечности, можно предположить

- повреждение связочного аппарата
- ушиб мягких тканей
- вывих
- закрытый перелом

74. Выберите единственно правильный

ответ

Сочетанная травма – это

- перелом плечевой кости и ЧМТ
- проникающее ранение брюшной полости
- перелом бедра и голени
- разрыв селезенки

75. Выберите единственно правильный

ответ

При переломе костей предплечья шина накладывается

- от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- от лучезапястного до локтевого сустава
- на место перелома
- от кончиков пальцев до верхней трети плеча

76. Выберите единственно правильный

ответ

В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом

- костей таза
- позвоночника
- бедра
- костей стоп

77. Выберите единственно правильный

ответ

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют

- ватно-марлевые кольца Дельбе
- ватно-марлевый воротник Шанца
- шину Еланского
- крестообразную повязку

78. Выберите единственно правильный

ответ

Причина ожогового шока

- спазм сосудов кожи
- психическая травма
- боль и плазмопотеря
- кровотечение

79. Выберите единственно правильный

ответ

Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается

- наличием "светлого промежутка"
- отсутствием очаговой симптоматики
- наличием повышенного АД
- нарушением сна

80. Выберите единственно правильный

ответ

Абсолютный симптом вывиха костей

- отек
- нарушение функции
- боль
- "пустой сустав"

81. Выберите единственно правильный

ответ

У детей наблюдаются, как правило, переломы

- косые
- по типу "зеленой веточки"
- компрессионные
- полные

82. Выберите единственно правильный

ответ

Пациента с инородным телом дыхательных путей следует транспортировать в положении

- лежа на животе
- лежа на спине
- сидя или полусидя
- лежа с опущенной головой

83. Выберите единственно правильный

ответ

Типичное проявление перелома основания черепа

- кровотечение и ликворрея из носа и ушей
- отек век
- подкожная эмфизема
- двоение в глазах

84. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактику столбняка необходимо провести при

- ушибе мягких тканей кисти
- закрытом переломе плеча
- колотой ране стопы
- растяжении лучезапястного сустава

85. Выберите единственно правильный

ответ

Открытый пневмоторакс — это

- скопление воздуха в подкожной клетчатке
- воздух, попавший при ранении в плевральную полость
- перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана дышит
- скопление крови в плевральной полости

86. Выберите единственно правильный

ответ

После спинно-мозговой пункции пациента транспортируют

- в положении лежа на боку
- лежа на животе
- полусидя
- лежа на спине

87. Выберите единственно правильный

ответ

Причина травматического шока

- нарушение дыхания
- интоксикация
- болевой фактор
- психическая травма

88. Выберите единственно правильный

ответ

Первая фаза течения раневого процесса в инфицированной ране это

- гидратация
- дегидратация
- рубцевание
- эпителизация

89. Выберите единственно правильный

ответ

При накоплении экссудата в гнойной ране необходимо

- тампонировать рану

- дренировать рану
- наложить повязку с мазью
- наложить сухую асептическую повязку

90. Выберите единственно правильный

ответ

Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют с целью

- обезболивания
- улучшения кровообращения
- лизиса некротических тканей
- образования нежного тонкого рубца

91. Выберите единственно правильный

ответ

Признак повреждения спинного мозга при травмах позвоночника

- деформация в области позвонков
- выстояние остистого отростка позвонка
- паралич
- "симптом вожжей"

92. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом, характерный для перелома костей таза

- гематома в области промежности
- крепитация в области верхней трети бедра
- императивный позыв на мочеиспускание
- симптом "прилипшей пятки"

93. Выберите единственно правильный

ответ

При переломах костей таза пациента транспортируют в положении

- на спине на мягких носилках
- на спине на щите в положении "лягушки"
- на животе
- полусидя

94. Выберите единственно правильный

ответ

Раны называются сквозными, если

- имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- имеется только входное отверстие
- имеется входное и выходное отверстие
- повреждена кожа

95. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом раны

- крепитация
- зияние краев
- флюктуация
- патологическая подвижность

96. Выберите единственно правильный

ответ

Дренаж в гнойную рану вводят для

- ускорения эпителизации
- остановки кровотечения
- обеспечения оттока отделяемого
- произведения тампонады

97. Выберите единственно правильный

ответ

Один из основных симптомов сотрясения головного мозга

- ретроградная амнезия
- анизокория
- усиление рефлексов
- бессонница

98. Выберите единственно правильный

ответ

При ушибе головного мозга сознание чаще всего

- утрачивается после светлого промежутка
- утрачивается на несколько секунд или минут
- ясное
- утрачивается на длительное время

99. Выберите единственно правильный

ответ

Результат спинномозговой пункции при внутрочерепной гематоме

- нет изменений
- примесь гноя
- примесь крови
- хлопья

100. Выберите единственно правильный

ответ

Рана, нагноившаяся в процессе лечения, называется

- асептической
- первично инфицированной
- вторично инфицированной
- микробно-загрязненной

101. Выберите единственно правильный

ответ

Местный признак нагноения раны

- местное повышение температуры
- побледнение кожи
- подкожная эмфизема
- стихание боли

102. Выберите единственно правильный

ответ

"Симптом очков" наблюдается при

- сотрясении головного мозга
- ушибе головного мозга
- переломе основания черепа
- сдавлении головного мозга

103. Выберите единственно правильный

ответ

Множественный перелом – это

- перелом плеча и бедра
- перелом бедра
- перелом основания черепа
- перелом нижней челюсти

104. Выберите единственно правильный

ответ

При шоке пациента транспортируют

- с приподнятым головным концом

- в горизонтальном положении
- на боку
- с опущенным головным концом

105. Выберите единственно правильный

ответ

Репозиция отломков производится при

- интерпозиции
- любом смещении отломков
- поднадкостничных переломах
- открытых переломах

106. Выберите единственно правильный

ответ

Интерпозиция — это

- образование ложного сустава
- смещение костных отломков
- ущемление мягких тканей между отломками костей
- винтообразный перелом

107. Выберите единственно правильный

ответ

Помощь при электротравме следует начать с

- обезболивания
- наложения асептической повязки
- прекращения действия повреждающего фактора
- сердечно-легочной реанимации

108. Выберите единственно правильный

ответ

При обильном промокании кровью повязки в раннем послеоперационном периоде необходимо

- срочно информировать врача
- сменить повязку
- снять повязку
- наложить дополнительную повязку

109. Выберите единственно правильный

ответ

Характерный признак сдавления головного мозга гематомой

- повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
- длительная потеря сознания
- кратковременная потеря сознания
- потери сознания не бывает

110. Выберите единственно правильный

ответ

Окклюзионную повязку накладывают при

- переломе ребер
- сильном венозном кровотечении
- открытом пневмотораксе
- обширных повреждениях мягких тканей

111. Выберите единственно правильный

ответ

Гибель коры головного мозга — это

- декортикация
- дефибриляция
- регургитация
- краниоцеребральная гипотермия

112. Выберите единственно правильный

ответ

Фактор риска в возникновении гидраденита

- несоблюдение личной гигиены
- переиздание
- гипервитаминоз
- сухость кожи

113. Выберите единственно правильный

ответ

Характер сестринского вмешательства у пациента с фурункулезом

- обучить пациента принципам рационального питания
- обеспечить прием достаточного количества жидкости
- регистрировать частоту и характер стула
- обеспечить тщательную гигиену кожи

114. Выберите единственно правильный

ответ

Острую гнойную хирургическую инфекцию чаще всего вызывает

- столбнячная палочка
- стафилококк
- стрептококк
- кишечная палочка

115. Выберите единственно правильный

ответ

Ограниченное скопление гноя в тканях — это

- гематома
- флегмона
- абсцесс
- атерома

116. Выберите единственно правильный

ответ

Гидраденит — это

- воспаление потовой железы
- воспаление сальной железы
- воспаление лимфатического узла
- воспаление лимфатического сосуда

117. Выберите единственно правильный

ответ

Местный симптом рожистого воспаления

- подергивание мышц
- гиперемия кожи с четкими границами
- разлитое покраснение кожи
- инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

118. Выберите единственно правильный

ответ

Тризм характерен для

- фурункулеза
- газовой гангрены
- столбняка
- рожистого воспаления

119. Выберите единственно правильный

ответ

Лимфаденит — это воспаление

- потовых желез

- лимфатических узлов
- лимфатических сосудов
- сальных желез

120. Выберите единственно правильный ответ

Острый гематогенный остеомиелит — это воспаление

- пальца
- коленного сустава
- костного мозга и кости
- венозных сосудов

121. Выберите единственно правильный ответ

Пандактилит — это воспаление

- кожи пальца
- сухожильного влагалища
- межфаланговых суставов
- всех тканей пальца

122. Выберите единственно правильный ответ

Разлитое воспаление подкожной клетчатки — это

- сетчатый лимфангит
- рожистое воспаление
- флегмона
- абсцесс

123. Выберите единственно правильный ответ

После вскрытия абсцесса накладывают повязку с

- гипертоническим раствором хлорида натрия
- мазью левомиколь
- преднизолоновой мазью
- 3% раствором перекиси водорода

124. Выберите единственно правильный ответ

Профилактика столбняка показана при

- при закрытом переломе шейки плеча
- остром гнойном плеврите
- ушибленной ране мягких тканей головы
- хроническом остеомиелите

125. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при абсцедирующей стадии мастита включает в себя

- уменьшение питья, включение в рацион продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, исключение продуктов, стимулирующих лактацию
- обильное питье, включение продуктов, стимулирующих лактацию
- уменьшение питья, исключение продуктов, стимулирующих лактацию

126. Выберите единственно правильный ответ

Форма остеомиелита

- эритематозный
- буллезный
- гематогенный
- стволочной

127. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель газовой гангрены

- синегнойная палочка
- клостридия
- столбнячная палочка
- протей

128. Выберите единственно правильный ответ

Осложнение сепсиса

- анафилактический шок
- септический шок
- септицемия
- септикопиемия

129. Выберите единственно правильный ответ

Пандактилит — это воспаление

- ногтевого валика
- межфалангового сустава
- всех тканей пальца
- сухожильного влагалища

130. Выберите единственно правильный ответ

Карбункул — это воспаление

- лимфатической железы
- одного волосяного мешочка
- потовой железы
- нескольких волосяных мешочков

131. Выберите единственно правильный ответ

"Флюктуация" — это

- появление пузырей на гиперемированной коже
- судорожное сокращение мимических мышц
- размягчение в центре инфильтрата
- "хруст" при пальпации кожи

132. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, характерный для газовой гангрены

- симптом "тугой повязки"
- опистонус
- судорожное сокращение поперечно-полосатых мышц
- стихание болей в ране

133. Выберите единственно правильный ответ

Столбнячный анатоксин вводится для

- снятия симптомов воспаления
- предупреждения сепсиса
- создания активного иммунитета
- создания пассивного иммунитета

134. Выберите единственно правильный ответ

ответ

Профилактика столбняка показана при

- ожоге туловища 1 степени
- колотой ране передней брюшной стенки
- абсцессе легкого
- закрытом переломе предплечья

135. Выберите единственно правильный

ответ

Гидраденит чаще локализуется в

- подмышечной ямке
- паховой складке
- области шеи
- области спины

136. Выберите единственно правильный

ответ

Возбудителем рожистого воспаления является

- стафилококк
- стрептококк
- синегнойная палочка
- энтерококк

137. Выберите единственно правильный

ответ

Гематогенный остеомиелит может быть следствием

- огнестрельного ранения
- открытого перелома
- закрытого перелома
- флегмоны забрюшинного пространства

138. Выберите единственно правильный

ответ

Независимым сестринским вмешательством в послеоперационном периоде после удаления варикозных вен является

- запрещение ходьбы в течение шести дней
- запрещение занятий ЛФК в течение шести дней
- запрещение массажа ног
- запрещение сидеть с опущенными ногами

139. Выберите единственно правильный

ответ

Долгосрочная цель в плане сестринского ухода за пациентом с облитерирующим эндартериитом

- отказ от курения
- полное восстановление физической активности
- уменьшение зябкости конечностей
- полное восстановление пульсации на мелких артериях стоп

140. Выберите единственно правильный

ответ

Сухая гангрена чаще развивается при

- медленно прогрессирующем нарушении кровообращения
- остром нарушении кровообращения
- бурном развитии инфекции в тканях
- повреждении нервных стволов

141. Выберите единственно правильный

ответ

Симптомы интоксикации более выражены при

- сухой гангрене
- пролежнях
- влажной гангрене
- трофической язве

142. Выберите единственно правильный

ответ

При сухой гангрене происходит

- нарастающий отек тканей
- гнилостный распад тканей
- мумифицирование тканей
- газообразование в тканях

143. Выберите единственно правильный

ответ

При варикозной болезни рекомендуется

- ношение теплых носков
- удобная обувь
- холодные ванночки для стоп
- длительное пребывание на ногах

144. Выберите единственно правильный

ответ

Во время беременности наиболее часто встречается сосудистая патология

- атеросклероз
- облитерирующий эндартериит
- варикозное расширение вен
- острый тромбоз артерии

145. Выберите единственно правильный

ответ

Условие, способствующее образованию язв

- нарушение обмена электролитов
- неполноценное питание
- нарушение периферического кровообращения
- нагноительные процессы

146. Выберите единственно правильный

ответ

Наиболее частая причина образования свищей

- пороки развития
- оперативное вмешательство
- хронический воспалительный процесс
- травматические повреждения

147. Выберите единственно правильный

ответ

Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей

- кровотечение
- перемежающаяся хромота
- сухая гангрена
- отек тканей

148. Выберите единственно правильный

ответ

"Перемежающаяся" хромота — основной признак

- лимфангита
- облитерирующего эндартериита
- варикозного расширения вен нижних конечностей
- лимфостаза в нижних конечностях

149. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема пациента с раком пищевода:

- дисфагия
- нарушение аппетита
- сухость кожи
- дефицит массы тела

150. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- метастазирует в регионарные узлы
- метастазирует в отдаленные органы
- метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы
- не метастазирует

151. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- ограничена капсулой
- не прорастает в соседние ткани
- прорастает в соседние ткани
- раздвигает ткани

152. Выберите единственно правильный ответ

Злокачественная опухоль

- не влияет на общее состояние
- растет медленно, имеет капсулу
- растет быстро, разрушая окружающие ткани
- не рецидивирует

153. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль

- растет медленно, не прорастает в окружающие ткани
- рецидивирует
- метастазирует
- вызывает кахексию

154. Выберите единственно правильный ответ

Больной считается неоперабельным при

- предраке
- I ст рака
- IV ст рака
- II ст рака

155. Выберите единственно правильный ответ

Доброкачественная опухоль из мышечной ткани

- аденома
- миома
- нейросаркома

- миосаркома

156. Выберите единственно правильный ответ

Проблема пациента с колостомой

- повышение температуры тела
- недержание мочи
- затруднение, связанное с необходимостью осуществлять физиологическое опорожнение в непривычном положении
- необходимость посещения туалета в ночное время

157. Выберите единственно правильный ответ

Защитное мышечное напряжение характерно для

- острого перитонита
- отечной формы панкреатита
- инвагинации кишечника
- желудочного кровотечения

158. Выберите единственно правильный ответ

При желудочном кровотечении показана

- рентгенография желудка с барием
- УЗИ
- экстренная ФГДС
- экстренная операция

159. Выберите единственно правильный ответ

Рвота при остром панкреатите

- многократная, не приносящая облегчения
- однократная
- многократная, приносящая облегчение
- отсутствует

160. Выберите единственно правильный ответ

Причина механической желтухи при холецистите

- печеночная недостаточность
- закупорка камнем общего желчного протока
- гемолиз эритроцитов
- нарушение обмена веществ

161. Выберите единственно правильный ответ

Опоясывающая боль наблюдается при

- панкреатите
- холецистите
- травме селезенки
- перфоративной язве желудка

162. Выберите единственно правильный ответ

Достоверный признак перитонита

- болезненность живота при пальпации
- неотхождение газов и кала
- рвота
- симптом раздражения брюшины

163. Выберите единственно правильный ответ

Эвентрация — это

- воспаление брюшины
- ущемление кишечника в спайках
- выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку
- выделение кишечного содержимого из раны

164. Выберите единственно правильный ответ

Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов брюшной полости

- острого перитонита
- нарушения функции желудочно-кишечного тракта
- внутреннего кровотечения
- острой дыхательной недостаточности

165. Выберите единственно правильный ответ

Противопоказания к операции при остром аппендиците

- старческий возраст
- отсутствуют
- гипертоническая болезнь
- острая пневмония

166. Выберите единственно правильный ответ

При остром перитоните выполняется операция

- диагностическая
- плановая
- срочная
- экстренная

167. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром холецистите

- постоянные, сильные в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие, тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

168. Выберите единственно правильный ответ

Анализ крови и мочи на содержание амилазы выполняют при подозрении на

- кишечное кровотечение
- острый проктит
- острый панкреатит
- острый перитонит

169. Выберите единственно правильный ответ

Транспортировка больного с перитонитом осуществляется

- городским транспортом
- сидя
- лежа на носилках
- лежа на шите

170. Выберите единственно правильный ответ

При кишечной непроходимости живот

- не изменен
- доскообразный
- асимметричен, вздут
- втянут

171. Выберите единственно правильный ответ

Тактика среднего медработника при остром холецистите

- холод на живот, госпитализация
- грелка на область печени
- "слепое зондирование"
- желчегонные средства в амбулаторных условиях

172. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при перфоративной язве желудка

- постоянные, сильные в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие, тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

173. Выберите единственно правильный ответ

Характер и локализация болей при остром аппендиците

- постоянные, сильные боли в правой подвздошной области
- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие тупого характера
- "кинжальные" в эпигастрии

174. Выберите единственно правильный ответ

Причина трещин заднего прохода

- проктит
- геморрой
- длительные запоры
- парапроктит

175. Выберите единственно правильный ответ

Характер патологических примесей в каловых массах при геморрое

- кровь смешана с каловыми массами
- дегтеобразный стул
- стул со слизью
- кровь не смешана с каловыми массами

176. Выберите единственно правильный ответ

Геморрой может осложниться

- тромбозом геморроидальных узлов
- воспалением кожи вокруг анального отверстия
- дерматитом

диспепсией

177. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при клинической картине «острого живота» у пациента

- холод на живот
- очистительная клизма
- промывание желудка
- дача слабительного средства

178. Выберите единственно правильный ответ

Парапроктит — это

- воспаление вен прямой кишки
- выпадение прямой кишки
- воспаление околопрямокишечной клетчатки
- воспаление прямой кишки

179. Выберите единственно правильный ответ

Симптомы подкожного парапроктита

- напряженные сине-багровые узлы в области анального отверстия
- трещины в области задней спайки
- боль, припухлость, гиперемия кожи вокруг заднего прохода
- зуд в анальной области

180. Выберите единственно правильный ответ

Характер рвоты при стенозе привратника

- примесь желчи, рвота многократная
- цвета «кофейной гущи»
- пищей, съеденной накануне
- с каловым запахом

181. Выберите единственно правильный ответ

Достоверный симптом аппендицита

- разлитая боль в животе
- тошнота
- вздутие живота
- симптом Щеткина-Блюмберга

182. Выберите единственно правильный ответ

При остром аппендиците характерно положение больного лежа на

- правом боку
- левом боку
- спине, с опущенным головным концом
- животе

183. Выберите единственно правильный ответ

Вид кишечной непроходимости, относящийся к динамической

- узлообразование
- заворот кишечника
- инвагинация
- парез кишечника

184. Выберите единственно правильный ответ

Осложнением язвенной болезни желудка является

- кишечная непроходимость
- ущемленная грыжа
- асцит
- перфорация

185. Выберите единственно правильный ответ

Механическая желтуха — это осложнение

- острого панкреатита
- острого аппендицита
- острого холецистита
- острого дуоденита

186. Выберите единственно правильный ответ

Мелена — это симптом

- острого холецистита
- желудочно-кишечного кровотечения
- острого аппендицита
- острого панкреатита

187. Выберите единственно правильный ответ

Время постановки очистительной клизмы при динамической кишечной непроходимости

- одновременно с инъекцией спазмолитика
- через 30 минут после инъекции спазмолитика
- через 1,5 часа после инъекции спазмолитика
- проведение процедуры не связано с введением спазмолитика

188. Выберите единственно правильный ответ

Мочевой пузырь опорожняется после последнего мочеиспускания через

- 2 – 3 часов
- 3 – 4 часа
- 1 – 2 часа
- 5 – 6 часов

189. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при рефлекторной задержке мочеиспускания после операции

- назначение мочегонных средств
- подача теплого судна
- строгий постельный режим
- пузырь со льдом на низ живота

190. Выберите единственно правильный ответ

Признак ушиба почек

- ложные позывы на мочеиспускание
- боль при мочеиспускании
- положительный симптом Щеткина-Блюмберга

- микро или макрогематурия

191. Выберите единственно правильный ответ

Доврачебная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы предстательной железы

- пузырь со льдом
 мочегонные средства
 обезболивающие
 катетеризация

192. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

- мягкий живот
 симптом Щеткина-Блюмберга
 симптом Ситковского
 кровотечение из уретры

193. Выберите единственно правильный ответ

Первая помощь при травме почек

- наркотические препараты
 холод, срочная госпитализация
 тепло
 мочегонные препараты

194. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при острой задержке мочи

- назначение обезболивающего средства
 выведение мочи резиновым катетером
 введение спазмолитика
 грелка на низ живота

195. Выберите единственно правильный ответ

При почечной колике наиболее характерна иррадиация боли в

- околопупочную область
 паховую область и бедро
 плечо
 эпигастрий

196. Выберите единственно правильный ответ

Причина болевых ощущений при почечной колике

- позывы на мочеиспускание
 затрудненное мочеиспускание
 спазм мочеточника и травма слизистой мочеточника
 восходящая инфекция

197. Выберите единственно правильный ответ

Почечная колика является осложнением

- гемангиомы мочевого пузыря
 уролитиаза
 паранефрита
 цистита

198. Определите соответствие между режимом и видом стерилизации

стерилизация белья в автоклаве	132 град- 2,0 атм. — 20 мин.
сухожаровая стерилизация инструментария	180 град. — 1 час
холодная стерилизация	дезактив универсал 4% 15 минут
	комбидез 2% 15 минут

199. Определите соответствие между характером поражения и степенью ожога

термический ожог I степени	образование пузырей
термический ожог III-А степени	некроз верхушек сосочкового слоя
термический ожог III-Б степени	некроз всей толщи кожи
	некроз мышц

200. Определите соответствие длительности потери сознания и вида черепно-мозговой травмы

сотрясение головного мозга	кратковременная потеря сознания до нескольких секунд
ушиб головного мозга	длительная потеря сознания до нескольких часов
сдавление головного мозга гематомой	повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
	мозговая кома

201. Определите соответствие между определениями заболеваний

абсцесс	ограниченное скопление гноя в тканях
лимфаденит	воспаление лимфатических узлов
остеомиелит	воспаление костного мозга и кости
	воспаление лимфатических сосудов

202. Определите соответствие характера и локализации болей при заболеваниях

перфоративной язве желудка	«кинжальные» в эпигастрии
аппендиците	постоянные, сильные в правой подвздошной области
панкреатите	опоясывающие, тупого характера схваткообразные по всему животу

203. Определите соответствие между объемом и степенью кровопотери

500 – 700 мл	легкая кровопотеря
1500 – 2000 мл	тяжелая кровопотеря
1000 – 1400 мл	средняя кровопотеря
	крайне тяжелая

204. Определите соответствие вида подготовки пациента к операции

психологическая подготовка	индивидуальная беседа, охранительный режим
соматическая подготовка	ЭКГ, флюорография, проба Зимницкого
	группа крови, резус фактор, беседа о донорстве

205. Определите соответствие подготовки и вида операции

экстренная операция	одноэтапная подготовка операционного поля, опорожнение мочевого пузыря, премедикация
плановая операция	двухэтапная подготовка операционного поля, опорожнение мочевого пузыря, утренняя и вечерняя премедикации
	полная санитарная обработка со сменой постельного белья

206. Определите соответствие целей и этапов предоперационного периода

диагностический этап предоперационного периода	определение срочности операции, выявление сопутствующих заболеваний
этап непосредственной предоперационной подготовки	коррекция нарушений функций органов и систем, проведение психо-

	логической и специальной подготовки
	перевод пациента в реанимационную палату

207. Определите соответствие этиологии и заболевания прямой кишки

воспалительные	парапроктит, проктит
невоспалительные	геморрой, трещина заднего прохода, выпадение прямой кишки
	наличие злокачественного новообразования прямой кишки

208. Определите соответствие характеристики симптомам ЧМТ

общемозговые симптомы ЧМТ	гипертермия, повышение внутричерепного давления, рвота без облегчения
очаговые симптомы ЧМТ	расстройство речи, парезы конечностей, расстройство чувствительности
	рвота, симптом «очков», кровотечение из носа

209. Определите соответствие методов удаления гноя из полости плевры

открытый метод	дренирование, активная аспирация
закрытый метод	плевральная пункция, плевростомия
	пульмонэктомия

2. Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

210. Выберите единственно правильный ответ

Предоперационный период начинается с момента

- заболевания
- поступления в стационар
- установления диагноза
- начала подготовки к операции

211. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность предоперационного периода зависит от

- метода обезболивания
- срочности операции
- риска операции
- состава операционной бригады

212. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде

- боль
- рвота
- одиночество из-за отсутствия близких людей
- страх операции

213. Выберите единственно правильный ответ

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума

- риска операции и послеоперационных осложнений
- внутрибольничного инфицирования и выявление противопоказаний
- состояния послеоперационного шока и дыхательной недостаточности
- предоперационной подготовки

214. Выберите единственно правильный ответ

Больной транспортируется из приемного покоя в операционную в случаях

- состояния шока
- паховой грыжи
- внутреннего кровотечения
- ранения сердца

215. Выберите единственно правильный

ответ

В случае перитонита подготовка больного к экстренной операции включает

- теплый душ
- очистительную клизму
- дыхательную гимнастику перед наркозом
- бритье и дезинфекцию операционного поля

216. Выберите единственно правильный

ответ

Уменьшению предоперационного стресса способствует

- психологическая подготовка
- теплый душ
- физиопроцедуры
- диета

217. Выберите единственно правильный

ответ

В предоперационном периоде чаще всего у пациента выявляются страхи

- умереть во время операции
- большой кровопотери
- отсутствия сознания во время наркоза
- отсутствие самостоятельного дыхания

218. Выберите единственно правильный

ответ

Тревогу пациента в предоперационном периоде медсестра выявляет по

- хорошему настроению
- нервности, напряжению лицевой мускулатуры
- снижению аппетита
- показателям жизнедеятельности

219. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность прикладывания пузыря со льдом к послеоперационной ране не более

- 20 минут
- 2 часа
- 5 – 6 часов
- 24 часа

220. Выберите единственно правильный

ответ

Опасность тромбозов возрастает при

- строгом постельном режиме
- активном ведении больного
- при переходе со строгого постельного режима на активный

221. Выберите единственно правильный

ответ

Сокращение диаметра вен в 2 раза с помощью эластичной компрессии ведет к ускорению кровотока в

- 2 раза
- 3 раза
- 4 раза
- 5 раз

222. Выберите единственно правильный

ответ

Реальная угроза воздушной эмболии при кровотечении из

- артерий шеи
- вен шеи
- артерии плеча
- вен бедра

223. Выберите единственно правильный

ответ

При быстром промокании послеоперационной повязки медсестра обязана

- заменить верхние слои повязки новыми
- снять все слои и наложить новую повязку
- вызвать врача
- положить пузырь со льдом

224. Выберите единственно правильный

ответ

Положение пациента на операционном столе при операциях на почках

- на спине горизонтальное
- валик подложен под нижние ребра
- голова запрокинута назад
- на боку с валиком в поясничной области

225. Выберите единственно правильный

ответ

Продолжительность подготовки к плановой операции

- 2–4 часа
- 4–6 часов
- 12 часов
- 24 часа

226. Выберите единственно правильный

ответ

В случае приема пищи больным за 40 минут до экстренной операции следует

- отложить операцию на сутки
- удалить содержимое желудка через зонд
- вызвать рвоту
- ничего не предпринимать

227. Выберите единственно правильный

ответ

Перед экстренной операцией очистительная клизма

- противопоказана
- делается за 1 час до операции
- делается при полном кишечнике
- делается всегда

228. Выберите единственно правильный

ответ

При подготовке пациента к экстренной операции необходимо

- определить рост пациента
- дать пациенту стакан сладкого чая

по назначению врача удалить содержимое желудка через зонд

сделать очистительную клизму

229. Выберите единственно правильный

ответ

Пациента в операционный блок доставляют

пешком

только на каталке

пешком, на каталке или на сидячем кресле, в зависимости от состояния

на сидячем кресле

230. Выберите единственно правильный

ответ

В операционный блок пациента на каталке перевозит персонал отделения

клинического

операционного блока

любого

санпропускника

231. Выберите единственно правильный

ответ

В операционный зал доставляет пациента на каталке персонал отделения

клинического

операционного блока

любого

санпропускника

232. Выберите единственно правильный

ответ

В операционную пациентов ввозят

с одеялом

с подкладной подушкой

без одеял и подушек

233. Выберите единственно правильный

ответ

При гнойных операциях, для предотвращения загрязнения большого инструментального стола, целесообразен способ подачи инструментов

в руки хирургу

на инструментальный столик

комбинированный

в салфетке

234. Выберите единственно правильный

ответ

Во время операции операционная медсестра подает инструменты

рукой в перчатках

инструментом

в салфетке

на инструментальный столик

235. Выберите единственно правильный

ответ

Шовный и перевязочный материал операционная медсестра подает хирургу

рукой в перчатках

инструментами

любым способом

в салфетке

236. Выберите единственно правильный

ответ

Правила подачи скальпеля операционной медсестрой

в салфетке, лезвием вверх, рукояткой к хирургу

в салфетке, лезвием вниз, рукояткой к себе

без салфетки, лезвием вниз, рукояткой к себе

любым способом

237. Выберите единственно правильный

ответ

Ножницы, зажимы, крючки операционная медсестра подает

в закрытом виде, кольцами к хирургу

в закрытом виде, кольцами к себе

в открытом виде, кольцами к себе

в открытом виде, кольцами к хирургу

238. Выберите единственно правильный

ответ

Иглодержатель с заряженной в игле лигатурой операционная медсестра, поддерживая длинный конец лигатуры пинцетом, подает

кольцами к хирургу

кольцами к себе

любым способом

в салфетке

239. Выберите единственно правильный

ответ

Лигатура вдевается в иглу так, чтобы ее конец был длиннее другого

в 1–2 раза

в 3–4 раза

в 5–6 раз

в 7–8 раз

240. Выберите единственно правильный

ответ

Хирургические нити без игл операционная медсестра должна подавать хирургу

рукой в перчатках

пинцетом

в салфетке

на операционный столик

241. Выберите единственно правильный

ответ

Длина хирургической нити для непрерывного шва

10–15 см

18–20 см

25–30 см

любая

242. Выберите единственно правильный

ответ

Длина хирургической нити для поверхностных узловых швов

10–15 см

- 18–20 см
- 25–30 см
- любая

243. Выберите единственно правильный ответ

Захватывание иглы широкой частью губок иглодержателя приводит

- к поломке иглы
- к проворачиванию
- к неправильному положению иглы
- к разрыву нити

244. Выберите единственно правильный ответ

Прямую иглу после зарядки нитью подают хирургу

- без иглодержателя
- с помощью пинцета
- ушком к хирургу
- острием к хирургу

245. Выберите единственно правильный ответ

При работе на кишечнике хирургу необходимо подавать только

- анатомические пинцеты
- хирургические пинцеты
- лапчатые пинцеты
- боковой поверхностью

246. Выберите единственно правильный ответ

Шприц подается хирургу

- поршнем к себе
- иглой к себе
- боковой поверхностью
- любым способом

247. Выберите единственно правильный ответ

Инфицированный перевязочный материал берется

- только инструментом
- только руками
- боковой поверхностью
- любым способом

248. Выберите единственно правильный ответ

Во время операции перевязочный материал подается

- рукой
- инструментом
- боковой поверхностью
- любым способом

249. Выберите единственно правильный ответ

Для обеспечения специализированных оперативных вмешательств используются инструменты

- общие хирургические
- специального назначения

- общие хирургические и специального назначения
- любые

250. Выберите единственно правильный ответ

Микроирригаторы применяются

- для введения лекарственных веществ
- для выведения раневого отделяемого
- для введения турунд
- для введения инструментов

251. Выберите единственно правильный ответ

Окончатые зажимы используются

- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей
- для сохранения герметичности при операциях на тканях и органах
- для коагуляции сосудов

252. Выберите единственно правильный ответ

Зажимы Кохера отличаются от зажимов Бильрота

- наличием острых зубцов
- кривизной
- величиной
- длинными браншами

253. Выберите единственно правильный ответ

Медицинские зеркала предназначаются

- для разъединения тканей
- для оттеснения тканей
- для выделения органов
- для исследования ран и свищевых ходов

254. Выберите единственно правильный ответ

Медицинский шпатель – инструмент

- оттесняющий
- разъединяющий
- режущий
- соединяющий

255. Выберите единственно правильный ответ

Щипцы- диссекторы применяются

- для разделения тканей
- для рассечения тканей
- для остановки кровотечения
- для захвата и выведения в рану органов и тканей

256. Выберите единственно правильный ответ

В общехирургической практике применяются иглодержатели

- Матье
- Гегара
- Дальгрена
- Федорова

257. Выберите единственно правильный ответ

Иглодержатели Гегара бывают

- 2-х размеров
- 3-х размеров
- 5 размеров
- однотипные

258. Выберите два правильных ответа

К колющим инструментам относятся

- скальпели
- троакары
- иглы
- зонды
- зажимы

259. Выберите два правильных ответа

К инструментам, соединяющим ткани, относятся

- иглы и иглодержатели
- зажимы
- степлеры и клиперы
- кусачки
- зонды

260. Выберите два правильных ответа

Хирургические шовные иглы разделяют на

- колющие
- режущие
- рассекающие
- соединяющие
- вспомогательные

261. Выберите два правильных ответа

Вопросы, обсуждаемые с пациентом перед операцией

- подготовка кишечника
- эффективность анестезии
- ограничение питания
- возможность осложнений
- расположение на операционном столе

262. Выберите два правильных ответа

В хирургической операции различают

- начальный этап
- средний этап
- конечный этап
- оперативный доступ
- оперативный прием

263. Выберите два правильных ответа

Медицинские зонды предназначены

- для исследования ран и свищевых ходов
- для проведения тампонов и дренажей
- для рассечения тканей
- для коагуляции
- для остановки кровотечения

264. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь эффективна, если пациент в предоперационном периоде

- понимает эффективность голодания
- поел перед операцией
- выпил много жидкости
- дал информированное согласие

- скрыл симптомы начала ОРВИ

265. Выберите два правильных ответа

Медсестра объясняет необходимость перед премедикацией

- опорожнить мочевой пузырь
- выпить стакан жидкости
- сделать очистительную клизму
- измерить температуру
- снять все протезы

266. Выберите два правильных ответа

Сестринская помощь в интраоперационном периоде

- безопасность пациента
- реализация плана ухода
- мониторинг показателей жизнедеятельности
- расположение на операционном столе
- измерение температуры
- гемотрансфузия

267. Выберите два правильных ответа

Сестринский уход во время операции эффективен, если

- кожа со следами сдавлений
- кожа без гиперемии и сдавлений
- проводился мониторинг показателей жизнедеятельности
- соблюдена инфекционная безопасность
- измерялась температура тела
- проводилась гемотрансфузия

268. Выберите два правильных ответа

Для эффективного ухода в послеоперационном периоде перевязочной медсестре необходимо знать

- аппетит пациента
- продолжительность его сна
- локализацию операционного разреза
- характеристику пульса пациента
- физиологические отправления
- наличие дренажей

269. Выберите два правильных ответа

Послеоперационный уход включает

- улучшение памяти пациента
- прогулки на свежем воздухе
- контроль боли, ЛФК в постели
- контроль за раной, дренажами
- знать телефон родственников

270. Выберите два правильных ответа

Возможные послеоперационные осложнения из-за ограничения движений пациента

- раневая инфекция
- низкие цифры АД
- пневмонии
- кровотечения
- инфильтраты
- тромбозы

271. Выберите два правильных ответа

Профилактике тромбозов в послеоперационном периоде способствуют

- инъекции антибиотиков
- ранняя активизация пациента
- поздняя активизация пациента
- использование эластичных бинтов, чулок
- оказание психологической поддержки
- назначение обезболивающих средств

272. Выберите два правильных ответа

Для профилактики тромбозов в послеоперационном периоде необходимо

- введение гепарина
- противопролежневый матрац
- компрессионная повязка
- давящая повязка
- назначение обезболивающих средств

273. Выберите два правильных ответа

К инструментам, разъединяющим ткани, относятся

- скальпели
- ножницы
- ранорасширители
- бельевые зажимы
- зажим Кохера

274. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по предназначению

- на общий
- на типовой
- на специальный
- на экстренный
- на плановый

275. Выберите два правильных ответа

Инструмент для защиты тканей от случайного повреждения

- ножницы остроконечные
- зонд Кохера
- иглы круглые
- пинцет хирургический
- мышечный ретрактор

276. Выберите три правильных ответа

Не осложненное течение раннего послеоперационного периода сопровождается

- поносом
- ослаблением перистальтики кишечника
- неукротимой рвотой
- тахикардией до 135 в минуту
- тахикардией до 100 в минуту
- фебрильной лихорадкой
- субфебрильной лихорадкой

277. Выберите три правильных ответа

Любая операция включает ряд последовательных этапов

- разъединение тканей
- металлоостеосинтез
- остановку кровотечения
- соединение рассеченных тканей
- резекцию кишки
- сдавление

278. Выберите три правильных ответа

Для перевязки сосудов в операционной ране применяют

- шелк
- кетгут
- капрон
- лавсан
- лен
- этибонд

279. Выберите три правильных ответа

Общие хирургические инструменты по своему воздействию на ткани делятся на следующие группы

- для разъединения тканей
- для остановки кровотечения
- для фиксации тканей
- для соединения тканей
- для создания анастомоза

280. Выберите три правильных ответа

В общехирургической практике применяются скальпели

- брюшистые
- остроконечные
- тупоконечные
- обоюдоострые
- со съемным лезвием

281. Выберите три правильных ответа

Пинцеты подразделяются по характеру воздействия на ткани на

- анатомические
- хирургические
- коагуляционные
- вспомогательные
- сдавливающие

282. Определите соответствие между группами инструментов

для рассечения	скальпели ножницы
для соединения	иглодержатель, иглы
кровоостанавливающие	зажимы Кохера, Бильрота
	зажим Микулича

283. Определите соответствие между шовным материалом и соединяемыми тканями

мочевой пузырь	хромированный кетгут
сосуды	пролен
кожа	шелк
	лавсан

284. Определите соответствие между сроками рассасывания нитей

викрил	70 дней
монокрил	90 -119 дней
	120 -140 дней

285. Определите соответствие между группами шовного материала

рассасывающийся синте-	полисорб, дек-
------------------------	----------------

тический шовный материал	сон, максон
нерассасывающийся синтетический шовный материал	капрон, нейлон, полипропилен
	шелк, лен

286. Определите соответствие между видами повязок

твердые повязки	шинная, окончатая
мягкие повязки	колосовидная, черепашья
специальные	окклюзионная, термоизолирующая
	лейкопластырная

287. Установите соответствие между определениями

гематома	скопление крови, ограниченное тканями
кровотечение	истечение крови из кровяного русла
	истечение крови в полости тела

288. Определите соответствие между туалетом окружности ран

«чистая» послеоперационная рана	от краев раны к периферии
«гнойная» послеоперационная рана	от периферии к краям раны
	от периферии к наложенным швам

289. Определите соответствие между классами медицинских отходов

отходы класса «Б»	использованные иглы, шприцы, перчатки, скальпели
отходы класса «В»	перевязочный материал пациента с анаэробной инфекцией
отходы класса «Г»	просроченные лекарственные препараты, дезинфицирующие средства
	радиационные отходы

290. Определите соответствие между фазами течения раневого процесса

гидратации	обильное гнойное отделяемое
дегидратации	появление грануляций
эпителизации	заживление раны
	выделение костных секвестров

291. Определите соответствие осложнений со стороны операционной раны

в раннем послеоперационном периоде	кровотечение, инфильтрат
в позднем послеоперационном периоде	эвентрация
	сепсис

292. Алгоритм при кровотечении из бедренной артерии

- 1: остановить кровотечение наложением жгута
- 2: обезболить

- 3: наложить асептическую повязку
- 4: наложить транспортную иммобилизацию
- 5: транспортировать в ЛПУ

293. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при артериальном кровотечении

- 1: остановить кровотечение
- 2: наложить асептическую повязку
- 3: наложить транспортную иммобилизацию
- 4: транспортировать в ЛПУ

294. Укажите последовательность стадий течения раневого процесса

- 1: гидратации
- 2: дегидратации
- 3: эпителизации

295. Укажите последовательность подготовки операционного поля в приемном отделении к экстренной операции

- 1: обработка спиртом
- 2: обработка антисептическим раствором
- 3: частичная санитарная обработка
- 4: сухое бритье

296. Укажите последовательность первой доврачебной помощи при ранении

- 1: остановка кровотечения
- 2: наложение асептической повязки
- 3: обезболивание
- 4: транспортная иммобилизация

297. Укажите последовательность оказания доврачебной помощи при открытой ЧМТ

- 1: наложить асептическую повязку
- 2: расстегнуть воротник
- 3: проверить ротовую полость
- 4: обеспечить проходимость дыхательных путей
- 5: перенести пациента на носилки
- 6: подсчет пульса, ЧДД, АД во время транспортировки

298. Укажите последовательность этапов доврачебной помощи при переломе переднего отдела таза

- 1: осмотреть пострадавшего
- 2: ввести кеталар
- 3: переложить на жесткие носилки
- 4: подложить валик под коленные суставы
- 5: укрыть одеялом
- 6: транспортировать в ЛПУ

299. Укажите последовательность этапов сбора мочи на общий анализ

- 1: приготовить чистую сухую емкость
- 2: провести туалет наружных половых органов
- 3: собрать среднюю порцию мочи
- 4: прикрепить направление к емкости
- 5: транспортировать мочу в лабораторию

300. Укажите последовательность помощи при рвоте

- 1: повернуть голову набок
- 2: накрыть шею и грудь полотенцем
- 3: поставить лоток ко рту
- 4: убрать рвотные массы
- 5: обработать полость рта

301. Укажите последовательность введения противостолбнячной сыворотки по Безредке

- 1: ввести 0,1 мл внутривенно
- 2: выждать 30 мин.
- 3: ввести 0,1 мл подкожно
- 4: выждать 30 мин.
- 5: ввести всю дозу внутримышечно

3. Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза

302. Выберите единственно правильный

ответ

К методам исследования мочевыделительной системы относится

- холедохоскопия
- цистоскопия
- ирригоскопия
- ректороманоскопия

303. Выберите единственно правильный

ответ

Для промывания мочевого пузыря используют раствор

- водный хлоргексидина
- перекиси водорода
- физиологический
- гипертонический

304. Выберите единственно правильный

ответ

Дополнительное исследование, подтверждающее повреждение мочевого пузыря

- общий анализ мочи
- цистография
- проба по Зимницкому
- экскреторная урография

305. Выберите единственно правильный

ответ

"Чаши Клойбера" при рентгенографии брюшной полости характерны для

- кишечной непроходимости
- прободной язвы
- кровоточащей язвы
- острого панкреатита

306. Выберите единственно правильный

ответ

Тактика среднего медработника при ущемленной грыже

- срочная госпитализация
- грелка на живот
- вправление грыжи
- очистительная клизма

307. Выберите единственно правильный

ответ

Метод, применяемый для диагностики рака молочной железы

- УЗИ
- ФГДС
- ректороманоскопия

маммография

308. Выберите единственно правильный

ответ

Симптомокомплекс «острого живота» - это

- боли в животе, мягкий живот, отрицательный симптом Щеткина-Блюмберга
- боли в животе, задержка стула, мягкий живот

- боли в животе, напряжение мышц передней брюшной стенки, положительный симптом Щеткина-Блюмберга

309. Выберите единственно правильный

ответ

Симптом Кохера наблюдается при остром

- аппендиците
- холицистите
- парапроктите
- панкреатите

310. Выберите единственно правильный

ответ

В общем анализе крови при остром аппендиците

- ускорение СОЭ
- анемия
- лейкоцитоз
- изменений нет

311. Выберите единственно правильный

ответ

Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием

- ультразвуковым
- радиоизотопным
- гистологическим
- рентгенологическим

312. Выберите единственно правильный

ответ

Обязательное исследование для диагностики рака пищевода

- ультразвуковое
- эндоскопическое с биопсией
- радиоизотопное
- в зеркалах

313. Выберите единственно правильный

ответ

Операция аортокоронарное шунтирование является эффективным методом лечения для заболевания

- желчекаменная болезнь
- ишемическая болезнь сердца
- язвенная болезнь желудка
- мочекаменная болезнь

314. Выберите единственно правильный

ответ

Полное удаление органа -это

- резекция
- экстракция
- экстирпация
- эвентрация

315. Выберите единственно правильный

ответ

Зажим Микулича используется как

- кровоостанавливающий
- зажим почечной ножки
- инструмент для пережатия крупных сосудов
- инструмент для прикрепления белья к брюшине

316. Выберите единственно правильный

ответ

Для определения уровня квалификации специалиста и присвоения квалификационной категории проводится процедура

- аттестация
- сертификация
- аккредитация
- лицензирование

317. Выберите единственно правильный

ответ

Трепанация, при которой удаляется фрагмент кости

- костно-пластическая
- резекционная
- ламинэктомия
- одномоментная

318. Выберите единственно правильный

ответ

Противопоказание к оперативному лечению при остром аппендиците

- стенокардия
- ангина
- беременность
- аппендикулярный инфильтрат без признаков абсцедирования

319. Выберите единственно правильный

ответ

Профилактика нагноения операционной раны

- рассасывающие швы на рану
- дренирование раны
- лечебная физкультура
- герметичная повязка

320. Выберите единственно правильный

ответ

К диагностическим операциям относятся

- аппендэктомия

- грыжесечение
- биопсия лимфоузла
- вправление вывиха плеча

321. Выберите единственно правильный

ответ

Более вероятно развитие инфекции в ране

- резаной
- рубленной
- расположенной на лице
- укушенной

322. Выберите единственно правильный

ответ

Линию разреза гипсовой повязки для облегчения ее снятия смачивают

- эфиром
- касторовым маслом
- спиртом
- гипертоническим раствором натрия хлорида

323. Выберите единственно правильный

ответ

При травматических повреждениях холод к месту повреждения возможно применять в течение

- 48 часов
- 4 – 6 часов
- 2 часа
- 30 минут

324. Выберите единственно правильный

ответ

Истинная аневризма - это

- патологическое выпячивание стенки сердца или сосуда
- разрыв сосудистой стенки с образованием гематомы
- расслоение стенки артерии
- расположение артерии внутри гематомы

325. Выберите единственно правильный

ответ

Сосудистый шов в целях гемостаза накладывается при повреждении

- артериол
- венул
- любых сосудов
- магистральных сосудов

326. Выберите единственно правильный

ответ

При операциях на головном мозге положение пациента на операционном столе

- на боку
- голова запрокинута назад
- валик подложен под нижние ребра
- на спине горизонтально

327. Выберите единственно правильный

ответ

Для обеспечения нейрохирургических оперативных вмешательств используются инструменты

- общие хирургические
- специального назначения
- общие хирургические и нейрохирургические
- любые

328. Выберите единственно правильный

ответ

Твердую мозговую оболочку зашивают

- нерассасывающейся нитью и режущей иглой
- нерассасывающейся нитью и колющей иглой
- рассасывающейся нитью и режущей иглой
- рассасывающейся нитью и колющей иглой

329. Выберите единственно правильный

ответ

Рана черепа является проникающей, если

- повреждены мышцы и кости
- повреждены плевра, брюшина
- повреждена синовиальная оболочка
- повреждена твердая мозговая оболочка

330. Выберите единственно правильный

ответ

В области затылка и задней поверхности шеи перевязочный материал закрепляется повязкой

- черепашьей
- колосовидной
- ползучей
- восьмиобразной

331. Выберите единственно правильный

ответ

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют

- ватно-марлевые кольца Дельбе
- ватно-марлевый воротник Шанца
- мостовидную повязку
- шину Еланского

332. Выберите единственно правильный

ответ

Пострадавший с переломом грудного отдела позвоночника транспортируется в положении

- лежа на спине на жестких носилках
- лежа на боку на жестких носилках
- лежа на животе на жестких носилках
- сидя на жестком сидении

333. Выберите единственно правильный

ответ

Трепанация черепа – это

- хирургическая операция вскрытия полости черепа с целью обеспечения доступа к внутричерепным образованиям
- резекция расширенных вен семенного канатика

- резекция мочевого пузыря с уретеросигмоанастомозом
- резекция ампулы прямой кишки со слизистой оболочкой заднего прохода

334. Выберите единственно правильный

ответ

Ликвор – это жидкость

- цереброспинальная
- воспалительная
- межклеточная
- внутрисуставная

335. Выберите единственно правильный

ответ

Ликворея – это истечение

- цереброспинальной жидкости наружу
- воспалительной жидкости в рану
- внутрисуставной жидкости в рану
- крови во внешнюю среду

336. Выберите единственно правильный

ответ

Для сдавления головного мозга характерно

- только общемозговые симптомы
- наличие крови в спинномозговой жидкости
- рана на голове
- нарастающие очаговые симптомы

337. Выберите единственно правильный

ответ

При нарастающей черепной гематоме требуется

- экстренная операция и дегидратационная терапия
- симптоматическая и дегидратационная терапия
- симптоматическая терапия, при отсутствии эффекта – операция
- противошоковая терапия

338. Выберите единственно правильный

ответ

Инструменты, используемые для выделения костного лоскута при костно-пластической трепанации

- пила дуговая, кусачки Янсена
- пила листовая, пила дуговая
- проволочная пила Джигли, кусачки Дальгрена

остеотом, распатор

339. Выберите единственно правильный

ответ

Особенность оснащения нейрохирургической операционной – наличие

- большого инструментального стола
- самостоятельной питающей линии электроснабжения
- столика для удаленных органов
- трансформаторов, понижающих напряжение

340. Выберите единственно правильный

ответ

Для сшивания кости проволокой необходимы инструменты

- буравчик, сверло, перфоратор
- игла Дешана, иглодержатель Матье
- трепан с набором фрез, проводник Поленова
- пинцет, скальпель

341. Выберите два правильных ответа

Положение пациента на операционном столе при проведении люмбальной пункции

- на спине горизонтально с валиком в поясничной области
- на спине, голова запрокинута назад
- на боку, бедра прижаты к животу
- сидячее с выгнутой кзади спиной
- гинекологическое, ноги разведены

342. Выберите два правильных ответа

Для фиксации перевязочного материала, остановки кровотечения после трепанации черепа накладывается повязка

- черепашья с валиком вокруг раны
- уздечка с валиком вокруг раны
- чепец с валиком вокруг раны
- крестообразная на теменную область
- колосовидная для фиксации нижней челюсти

343. Выберите два правильных ответа

Способы остановки кровотечения из сосудов губчатого вещества костей свода черепа

- пальцевое прижатие наружной костной пластинки
- использование штифтов для введения в просвет сосудов
- использование специальных кровоостанавливающих зажимов
- тампонада раны кетгуттом
- втирание восковой пасты в поперечный срез кости
- использование тахокомба на шве кости

344. Выберите два правильных ответа

Снижение интенсивности болей при подозрении на острый аппендицит свидетельствует о:

- полном выздоровлении
- переходе болезни в хроническую форму
- возможных гангренозных изменениях в отростке
- возможном формировании периаппендикулярного абсцесса
- начале перитонита

345. Выберите два правильных ответа

Заболевания, которые могут быть причиной перитонита

- обострение язвенной болезни желудка
- гепатит
- острый панкреатит

- непроходимость кишечника
- свободная грыжа
- пневмония

346. Выберите три правильных ответа

Методы диагностики анемий

- ФГДС
- клинический анализ крови
- кал на скрытую кровь
- моча на амилазу
- пункция печени
- стерильная пункция

347. Выберите три правильных ответа

Три симптома столбняка, которые известны как триада Гиппократа

- тризм жевательных мышц
- судороги
- дисфагия
- опистотонус
- ригидность затылочных мышц

348. Выберите три правильных ответа

Требованием к современным послеоперационным повязкам является

- стерильность
- эстетичность
- хорошие сорбционные свойства
- гипоаллергенность
- неподвижность

349. Выберите три правильных ответа

Цель современной фиксирующей повязки при катетеризации периферических вен

- защита места пункции от проникновения инфекции
- возможность движения катетера
- фиксация катетера
- возможность визуального контроля места пункции
- неподвижность

350. Выберите три правильных ответа

В общий набор инструментов для трепанации черепа входят

- распатор прямой
- проводник Поленова
- пила Джигли
- долото прямое
- долото желобоватое
- мышечный ретрактор

351. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для трепанации черепа входят

- расширитель Труссо
- коловорот с набором фрез
- мышечный ретрактор
- мозговой шпатель (элеватор)
- стерильный резиновый грушевидный баллон

352. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для трепанации черепа входят

- расширитель Труссо
- мышечный ретрактор
- кусачки Дальгрена
- мозговой шпатель ложкообразный
- ручной пневматический трепан

353. Выберите три правильных ответа

Для ушивания твердой мозговой оболочки операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с маленькой колющей иглой
- иглодержатель с режущей иглой
- викрил
- ножницы Купера
- коагуляционный пинцет

354. Выберите три правильных ответа

При первичной хирургической обработке проникающего ранения черепа дефекту кости придают овальную форму кусачками

- Листона
- Борхарда
- Люэра
- Фарабефа
- Бильрота

355. Выберите правильный ответ

Молодой человек поскользнулся на улице и упал, почувствовал резкую боль в левой голени, не смог встать на ногу и идти. Прохожие помогли ему сесть на скамью. Объективные данные левая голень в нижней трети деформирована, здесь же отмечаются обширный кровоподтек и отек, болезненность при пальпации; положение голени вынужденное, нагрузка по оси резко болезненна. Выберите уровень транспортной иммобилизации

- от пальцев стопы до н/3 бедра
- от пальцев стопы до с/3 бедра
- от пальцев стопы до в/3 бедра
- от пальцев стопы до в/3 голени

356. Выберите правильный ответ

Вы стали свидетелем автомобильной аварии Мужчины, 37 лет, получил рану нижней трети левого плеча размером 10 х 4 х 4 см, которая кровоточит пульсирующей струей. Пострадавший бледен, пульс частый до 140 в минуту; на левой лучевой артерии пульс не определяется. Выберите уровень наложения жгута Эсмарха

- жгут Эсмарха на в/3 левого плеча
- жгут Эсмарха на с/3 левого плеча
- жгут Эсмарха на н/3 левого плеча
- жгут Эсмарха на в/3 левого предплечья

357. Выберите правильный ответ

Упавшее стекло нанесло резаную рану передней поверхности предплечья женщине, 40 лет Из раны размером 5 х 3 х 3 см вытекает

кровь темного цвета постоянной струй. Выберите способ временной остановки кровотечения

- наложить жгут
- наложить жгут - закрутку
- сделать максимальное сгибание предплечья в локтевом суставе
- наложить давящую повязку на рану

358. Выберите правильный ответ

У женщины, страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей, вследствие случайного ранения проволокой возникло кровотечение из варикозного узла на правой голени. Цвет крови темный, вытекает обильной постоянной струей. Выберите способ остановки кровотечения

- наложить давящую повязку
- наложить обычную повязку
- наложить жгут Эсмарха
- сделать максимальное сгибание

359. Выберите правильный ответ

К Вам в метро обратился молодой человек, 16 лет Он почувствовал слабость, головокружение, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, жажду. Вы выяснили, что он возвращается домой с тренировки, где получил удар ногой в живот Объективно: пульс 120 в минуту, ритмичный, слабого наполнения. Выберите причину этого состояния

- ушиб передней брюшной стенки
- внутреннее кровотечение
- черепно-мозговая травма

360. Выберите правильный ответ

Больная 50 лет после операции по поводу острого аппендицита в течение 6 часов не может самостоятельно помочиться. Выберите алгоритм оказания доврачебной помощи

- медсестра должна пригласить врача, одеть перчатки и приготовить все для катетеризации мочевого пузыря
- медсестра должна оградить пациентку ширмой, одеть перчатки, вывести мочу катетером, доложить врачу.
- медсестра должна оградить пациентку ширмой, одеть перчатки, предложить пациентке теплое судно, создать звук падающей струи, при неэффективности пригласить врача.

361. Выберите правильный ответ

Девочка, 7-ми лет, упала с турника. Беспокоят боли в области левого плечевого сустава, движения в нем резко ограничены, сустав деформирован. Выберите алгоритм оказания доврачебной помощи

- наложить косыночную повязку
- иммобилизация повязкой Дезо

наложить шину Крамера для иммобилизации от пальцев кисти до здорового надплечья

наложение задней шины Крамера до угла лопатки

362. Выберите правильный ответ

В результате автомобильной аварии у мужчины, 42-х лет травмировано правое бедро: в средней трети его имеется деформация, отек, болезненность при пальпации, нагрузка по оси резко болезненна. Выберите алгоритм оказания доврачебной помощи

наложить косыночную повязку

наложение задней шины Крамера до угла лопатки

наложение шин Крамера задней и двух боковых до поясничной области

наложение шин Крамера задней и двух боковых до подмышечной впадины

363. Выберите правильный ответ

Мужчина, 31 года, сбит машиной. Жалобы на боли в области левой голени. При осмотре левая голень отечна, в верхней трети деформирована, резко болезненна, осевые нагрузки резко усиливают боль. Выберите алгоритм оказания доврачебной помощи

транспортная иммобилизация левой голени шинами Крамера до н/3 левого бедра

транспортная иммобилизация левой голени шинами Крамера до с/3 левого бедра

транспортная иммобилизация левой голени шинами Крамера до в/3 левого бедра

транспортная иммобилизация левой голени шинами Крамера до угла лопатки

364. Выберите правильный ответ

Мужчина, 70-ти лет, споткнулся, упал на левую руку. Возникла резкая боль в области левого лучезапястного сустава, усиливающаяся при любом движении кисти. При осмотре в области нижней трети левого предплечья отмечается деформация, отек, кровоподтек, резкая болезненность при пальпации, нагрузка по оси болезненная. Выберите алгоритм оказания доврачебной помощи

транспортная иммобилизация шиной Крамера до н/3 левого плеча.

транспортная иммобилизация шиной Крамера до с/3 левого плеча.

транспортная иммобилизация шиной Крамера до в/3 левого плеча.

транспортная иммобилизация шиной Крамера до здорового надплечья

365. Выберите правильный ответ

У пациента рана в области волосистой части головы в результате травмы – удара палкой по голове. Края раны, размером 4 x 4 x 2 см, неровные, кровотечение из нее – умеренное.

Отмечается ретроградная амнезия. Выберите вид повязки на рану.

возвращающаяся на голову

«чепец»

восьмиобразная

повязка Дезо

366. Выберите правильный ответ

В результате травмы у женщины, 37 лет, появилась рана в области тыльной поверхности правой кисти, кровотечение из раны – фонтаном. Выберите способ остановки кровотечения

давящая повязка

обычная повязка

жгут Эсмарха

максимальное сгибание

367. Выберите правильный ответ

Молодой человек получил ножевое ранение в грудь под ключицей справа резаная рана, размером 2 x 1,5 см, из раны вытекает пенящаяся кровь. Выберите вид повязки при оказании доврачебной помощи

асептическая повязка

термоизолирующая

давящая повязка

окклюзионная повязка

368. Выберите правильный ответ

Пациент Р., 16 лет, упал, катаясь на велосипеде, получил травму живота. При осмотре крайне бледен, в области правой реберной дуги ссадина; пульс 136 в минуту, АД 70/40 мм.ртст; живот при пальпации болезненный в области правого подреберья. Выберите способ транспортировки пациента на носилках

с приподнятым головным концом

с опущенным головным концом

горизонтально

полусидя

369. Выберите правильный ответ

Неизвестный нанес подростку удар ножом в живот. На передней брюшной стенке имеется рана размером 5 x 4 см, умеренно кровоточит, в рану выпала петля кишки. Определите неотложное состояние

проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки с эвентрацией

непроникающее ножевое ранение передней брюшной стенки с кровотечением

непроникающее ножевое ранение передней брюшной стенки

ножевое ранение кишечника

370. Выберите правильный ответ

У мужчины, 43-х лет, на фоне болей в животе вдруг появилась рвота темного цвета. Было обморочное состояние, после него остается слабость, головокружение, учащенное сердцебиение.

цебиение. Определите вид исследования показанный в данной ситуации

- рентгенография желудка с барием
- УЗИ
- экстренная ФГДС
- экстренная операция

371. Выберите правильный ответ

Имеется рваная рана. Края раны гиперемированы с фибринозным налетом. Тактика медицинской сестры

- провести первичную хирургическую обработку
- провести вторичную хирургическую обработку
- сделать туалет раны и наложить повязку с антисептиком
- наложить швы

372. Выберите правильный ответ

Имеется рана. Необходимо иссечь края, стенки и дно раны. На сколько сантиметров это необходимо сделать

- 4,5 - 6
- 2,5 - 3
- 0,5 - 2
- 0,1 - 0,4

373. Выберите правильный ответ

Имеется рана. Кожу вокруг раны обрабатываем 0,5% спиртовым хлоргексидином в радиусе не менее

- 5 см
- 10 см
- 20 см
- 30 см

374. Выберите правильный ответ

Имеются швы на передней брюшной стенке, после операции 7 суток, без осложнений. Можно ли снять швы

- нет
- через один
- да

375. Выберите правильный ответ

Ушивается рана сердца. Имеют ли значение свойства шовного материала при этом

- применяются металлические скрепки или проволока
- шовный материал может быть любой, но нити не должны проникать в полость сердца
- важен не выбор материала, а проведение нитей сквозь всю толщу стенки камер сердца
- нельзя использовать рассасывающийся материал, может привести к расхождению краев раны со смертельным исходом

376. Выберите правильный ответ

У пациента перелом нижней челюсти. Какую повязку ему следует наложить

- уздечку
- пращевидную
- крестообразную

- Дезо

377. Выберите правильный ответ

У пациента в результате травмы перелом плеча, ему нужно зафиксировать

- один плечевой сустав
- локтевой и плечевой суставы
- плечевой, локтевой и лучезапястный
- лучезапястный и локтевой

378. Выберите правильный ответ

Для ушивания раны легкого необходимо взять

- капрон
- шелк
- кетгут
- пролен

379. Выберите правильный ответ

Во время операции необходимо мобилизовать тонкую кишку. Какие инструменты вы подадите

- кишечные жомы
- кровоостанавливающие зажимы Кохера
- кровоостанавливающие зажимы Бильрота
- кровоостанавливающие зажимы Пеана

380. Выберите правильный ответ

Во время операции необходимо наложить швы на стенку мочевого пузыря. Какой шовный материал вы подадите для наложения 1-го ряда швов

- рассасывающийся шовный материал
- не рассасывающийся шовный материал

381. Выберите правильный ответ

По ходу операции во избежание потери «пластических свойств» брюшину смачивают

- дистиллированной водой
- новокаином
- физиологическим раствором
- водным раствором хлоргексидина

382. Выберите правильный ответ

Во время операции тампонада ран паренхиматозных органов свободными сальниковыми фрагментами или сальниковыми лоскутами на ножке применяется с целью:

- предупреждения инфицирования полости брюшины
- более эффективной остановки кровотечения
- лучшего всасывания раневого отделяемого
- исключения прорезывания нитей

383. Выберите правильный ответ

Пациент находится на скелетном вытяжении левой нижней конечности, при этом необходимо:

- приподнять головной конец кровати
- кровать установить строго горизонтально
- приподнять ножной конец кровати
- придать положение «лягушки»

384. Выберите правильный ответ

Во время операции ушита аорта. Что можно использовать для гемостаза во время операции

- тахакомб
- гемостатическую губку
- серджесел
- серджесел нью-нит

385. Выберите правильный ответ

У пациента артериальное кровотечение из магистральной артерии бедра, пульс 120 ударов в минуту, АД 70/40 мм рт ст. В чем опасность данного кровотечения

- развитии шока

- аневризмы
- лейкопении
- асфиксии

386. Выберите правильный ответ

Во время операции по поводу ранения брюшной полости обнаружено ранение аорты. Укажите метод окончательного гемостаза при этом ранении

- перевязка сосуда в ране
- тампонада раны
- перевязка сосуда на протяжении
- сосудистый шов

4. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

387. Выберите единственно правильный ответ

Выберите биологический гемостатик для ушивания раны почки

- гемостатическая губка
- серджесел
- серджесел нью-нит
- серджесел фибриллар

388. Выберите единственно правильный ответ

Выберите шовный материал для ушивания аорты

- шёлк
- викрил
- пролен
- гортекс

389. Выберите единственно правильный ответ

Нижнюю полую вену можно ушить

- кетгут
- лавсан
- викрил
- пролен

390. Выберите единственно правильный ответ

Метод окончательной остановки кровотечения при микрохирургической операции без перевязки

- ушивание
- коагуляция
- сосудистый шов
- клипирование сосудов

391. Выберите единственно правильный ответ

Микрохирургический инструмент для наложения клипс

- зажим Борхарда
- зажим Кохера
- клипатор
- клипсодержатель

392. Выберите единственно правильный ответ

Эндохирургический кровоостанавливающий зажим

- зажим Кохера
- зажим Бека
- клипатор
- клипсодержатель

393. Выберите единственно правильный ответ

Зажим для наложения бокового сосудистого шва на аорту

- Бильрота
- многоцелевой Де Бейки
- аортальный зажим Бека
- анастоматический зажим Кастенада

394. Выберите единственно правильный ответ

Самая тонкая кетгутовая нить

- 6/0
- 0
- 4
- 11/0

395. Выберите единственно правильный ответ

Инструмент для перевязки артерии на протяжении

- лигатурная игла Дешана, лигатурная игла Купера
- проводник Поленова, зажим Блелока
- Г-образный зажим, зажим Сатинского
- зажим Бильрота

396. Выберите единственно правильный ответ

Помещения с асептическим режимом

- не должны быть проходными
- могут быть проходными
- должны быть проходными
- могут быть частично проходными

397. Выберите единственно правильный

ответ

Ширина дверных проемов в существующих операционных должна быть не менее

- 50 см
- 80 см
- 110 см
- 150 см

398. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь малой операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 24 кв. м
- 36 кв. м

399. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 36 кв. м
- 42 кв. м

400. Выберите единственно правильный

ответ

Площадь предоперационной для одной общепрофильной операционной должна быть

- 10 кв. м
- 12 кв. м
- 36 кв. м
- 42 кв. м

401. Выберите единственно правильный

ответ

Инструментальная комната оперблока предназначена для

- дезинфекции хирургического инструментария
- стерилизации хирургического инструментария
- хранения хирургического инструментария и аппаратуры

402. Выберите единственно правильный

ответ

Операционный зал должен иметь высоту потолков не менее (метров)

- 3,0
- 3,5
- 4,0
- 4,4

403. Выберите единственно правильный

ответ

Полы в операционных, наркозных, реанимационных помещениях должны быть

- антистатическими
- непылеобразующими
- мраморными
- любыми

404. Выберите единственно правильный

ответ

Положение Тренделенбурга на операционном столе применяется при операциях

- на органах малого таза
- гинекологических
- на прямой кишке
- на мочевом пузыре

405. Выберите единственно правильный

ответ

Решение о любом изменении позиции пациента на операционном столе

- принимают только после консультации с анестезиологом
- принимает операционная медсестра самостоятельно
- принимает старшая медсестра
- принимает хирург

406. Выберите единственно правильный

ответ

Пункцию голеностопного сустава осуществляют в положении пациента

- на боку
- на спине
- на животе
- сидячем

407. Выберите единственно правильный

ответ

Пункцию грудины (стернальную) осуществляют в положении пациента

- на боку
- на животе
- на спине
- сидячем

408. Выберите единственно правильный

ответ

Возможность естественного проветривания должна быть предусмотрена во всех помещениях за исключением помещений

- класса чистоты А
- класса чистоты В
- класса чистоты Б
- класса чистоты Г

409. Выберите единственно правильный

ответ

В помещениях класса чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать %

- 50
- 60
- 70
- 80

410. Выберите единственно правильный

ответ

Для операционных обязательны системы приточно - вытяжной вентиляции

- самостоятельные
- общие
- отдельные

- комбинированы

411. Выберите единственно правильный ответ

Воздух во всех помещениях операционного блока подается в

- верхнюю зону
 среднюю зону
 нижнюю зону
 среднюю и нижнюю зоны

412. Выберите единственно правильный ответ

В операционных предусматривается удаление воздуха

- из верхней зоны
 40 % из верхней и 60 % из нижней зоны
 60 % из верхней зоны и 40 % из нижней
 из нижней зоны

413. Выберите единственно правильный ответ

В асептических помещениях

- приток воздуха должен преобладать над вытяжкой
 вытяжка преобладает над притоком
 не имеет значения, преобладает вытяжка или приток воздуха
 приток воздуха 50% и вытяжка 50%

414. Выберите единственно правильный ответ

Система вентиляции помещений класса чистоты А должна работать

- в непрерывном режиме
 только во время операций
 только между операциями
 в произвольном режиме

415. Выберите единственно правильный ответ

Операционный зал должен иметь естественное освещение

- обязательно
 не обязательно
 желательно
 не желательно

416. Выберите единственно правильный ответ

Расположение пациента на операционном столе горизонтальное с приподнятым изголовьем называется положением

- Фовлера
 Тренделенбурга
 Кларка
 Федорова

417. Выберите единственно правильный ответ

Изголовье операционного стола не рекомендуется приподнимать выше, чем на

- 15°
 20°
 25°

- 45°

418. Выберите единственно правильный ответ

Положение пациента на операционном столе на боку с валиком в поясничной области применяется при операциях

- на мочевом пузыре
 на органах живота (передний доступ)
 на почках
 на груди

419. Выберите единственно правильный ответ

Положение пациента на операционном столе горизонтальное на спине с головой, запрокинутой назад при помощи валика, применяется при операциях

- на лице
 на органах живота (передний доступ)
 на щитовидной железе
 на груди

420. Выберите единственно правильный ответ

При операциях на лице, шее, груди, органах живота, мочевом пузыре, ампутации конечности положение пациента на операционном столе

- на спине горизонтально
 на боку
 на животе
 положение Тренделенбурга

421. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу требует от операционной медсестры

- четкого знания хода операции
 опережая хирурга, держать нужный инструмент
 произвольных действий

422. Выберите единственно правильный ответ

Чем выше квалификация операционной медсестры, тем чаще она использует способ подачи инструментов

- в руки хирургу
 на инструментальный столик
 комбинированный
 произвольный

423. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов в руки хирургу – наиболее

- несовершенный
 совершенный и трудный
 простой и распространенный
 медленный

424. Выберите единственно правильный ответ

Способ подачи инструментов на инструментальный столик – наиболее

- совершенный
- трудный
- простой
- распространенный

425. Выберите единственно правильный ответ

Браншевые инструменты – это инструменты

- с кольцами для удобства удерживания
- с фиксаторами
- с шарнирами
- с рамками

426. Выберите единственно правильный ответ

Кремальеры – это

- приспособления для фиксации инструментов в нужном положении
- специальные рукоятки
- режущие части инструментов
- шарниры

427. Выберите единственно правильный ответ

Зажимы Пеана, Кохера, Бильрота относятся к инструментам

- для остановки кровотечения
- для соединения ткани
- вспомогательным
- костным

428. Выберите единственно правильный ответ

Желобоватый зонд используют

- для защиты тканей от случайного повреждения
- для разрезания мягких тканей
- для прокола мягких тканей
- для кройки перевязочного материала

429. Выберите единственно правильный ответ

Пинцеты, зонды, крючки относятся к инструментам

- специальным
- соединяющим
- вспомогательным
- разъединяющим

430. Выберите единственно правильный ответ

Дерматомы бывают

- клеевые
- пластырные
- с вращающимися дисковыми ножами
- с кремальерами

431. Выберите единственно правильный ответ

При эксплуатации хирургических лазерных аппаратов

- защита не требуется

- обязательно применение закрытых защитных очков
- необходимо избегать смотреть на прямое излучение
- необходимо избегать попадания в глаза прямых и отраженных лучей

432. Выберите единственно правильный ответ

При струмэктомии обязательным является наличие в операционном наборе

- системы для прямого переливания крови
- трахеостомического набора
- сосудистого набора
- костного набора

433. Выберите единственно правильный ответ

В набор инструментов для операции по поводу зоба входят

- зонд Кохера
- зажим Де-Бейки
- зажим Федорова
- зажимы Микулича

434. Выберите единственно правильный ответ

В набор инструментов для трахеостомии входят

- зонд Фогарти
- толстый резиновый катетер
- катетер трахеальный металлический
- хирургический коловорот, катетер

435. Выберите единственно правильный ответ

Инструменты для стерильной пункции

- игла Кассирского, 10–20-граммовый шприц, иглы инъекционные
- троакар, 10–20-граммовый шприц, иглы инъекционные
- хирургический коловорот, катетер
- толстый резиновый катетер

436. Выберите единственно правильный ответ

Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несет

- заведующий структурным подразделением
- старшая медсестра
- главный врач
- работник

437. Выберите единственно правильный ответ

Периодичность смены комплекта спецодежды в стерильной зоне

- 1 раз в неделю
- 1 раз в 2 дня
- 1 раз в смену
- 1 раз в 3 дня

438. Выберите единственно правильный ответ

Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами ЛПУ

- запрещается
- разрешается
- необязательно
- допускается

439. Выберите единственно правильный ответ

Ношение защитных очков / щитков во время операции для всех членов операционной бригады

- обязательно
- защитные очки / щитки могут быть средством выбора
- допускается
- необязательно

440. Выберите два правильных ответа

Операционные должны быть пронумерованы и функционально разделены с учетом

- степени чистоты оперативного вмешательства
- хирургических бригад
- вида анестезии
- тяжести состояния пациента
- необходимого оборудования

441. Выберите два правильных ответа

Виды операционных с учетом чистоты производимых в них операций

- асептические
- септические
- смешанные
- плановые
- экстренные

442. Выберите два правильных ответа

Современный хирургический инструментарий подразделяется по назначению на

- типовой
- общий
- специальный
- экстренный
- плановый

443. Выберите два правильных ответа

Буж применяется

- для дренирования полостей
- для механического расширения физиологических отверстий
- для механического расширения искусственных отверстий
- для исследования ран и свищевых ходов
- для прокола

444. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

- долото прямое
- долото желобоватое
- распатор изогнутый
- пила дуговая
- жомы

445. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу геморроя входят

- ректальное зеркало
- окончатые геморроидальные зажимы
- кусачки Лангенбека
- брюшные зеркала
- жомы Пайера

446. Выберите два правильных ответа

Корнцанг применяют для

- наложения швов
- остановки кровотечения
- подачи перевязочного материала
- фиксации операционного белья
- введения тампонов

447. Выберите два правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу ущемлённых грыж входят

- ранорасширители (брюшные зеркала)
- иглы кишечные
- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека
- пуговчатый зонд

448. Выберите два правильных ответа

Для осуществления доступа в полость предсердия операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- сосудистый пинцет и ножницы
- сосудистый пинцет и крючок Кули
- пуговчатый зонд
- крючок Мешалкина
- малый диссектор

449. Выберите два правильных ответа

Для проведения операций с высоким риском нарушения целостности перчаток следует надевать

- 2 пары перчаток
- 3 пары перчаток
- перчатки повышенной прочности
- 4 пары перчаток
- резиновые перчатки

450. Выберите два правильных ответа

Медицинский персонал обязательно работает в стерильных разовых масках

- в операционных
- в санпропускнике
- при проведении инвазивных процедур
- на посту
- в приемном отделении

451. Выберите три правильных ответа

Для ревизии полости предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

- сосудистый пинцет и ножницы
- сосудистый пинцет и крючок Кули
- пуговчатый зонд
- крючок Мешалкина
- малый диссектор

452. Выберите два правильных ответа

Для ушивания предсердия и дефекта межпредсердной перегородки операционная сестра должна подать хирургу

- кишечный жом
- атравматический иглодержатель с атравматической нитью
- сосудистый пинцет
- мышечный ретрактор

453. Выберите три правильных ответа

Для ушивания твердой мозговой оболочки операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с маленькой колющей иглой
- иглодержатель с режущей иглой
- пролен
- коагуляционный пинцет
- ножницы Купера

454. Выберите три правильных ответа

Для мобилизации сигмовидной кишки операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- зажимы Бильрота 20 см
- кишечный жом
- лигатуры
- ножницы Купера
- брюшное зеркало широкое

455. Выберите два правильных ответа

Для наложения узлового шва на кишечный анастомоз операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- анатомический пинцет
- иглодержатель с кишечной иглой
- скальпель
- кусачки Листона
- брюшное зеркало широкое

456. Выберите три правильных ответа

Для ушивания брюшины, мышц операционная сестра должна подать хирургу и ассистенту

- иглодержатель с колющей иглой
- анатомический пинцет
- кетгут
- брюшное зеркало широкое
- кусачки Листона

457. Выберите три правильных ответа

Для наложения швов на кожу операционная сестра подает хирургу и ассистенту

- иглодержатель с кожной иглой
- брюшное зеркало широкое
- скальпель, леску
- хирургический пинцет
- ножницы Купера

458. Выберите три правильных ответа

Инструменты, расширяющие раны

- ножницы остроконечные
- роторасширитель
- крючки Фарабефа

- лапаротомные крючки
- рамочный ранорасширитель

459. Выберите три правильных ответа

В общий набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- распаторы
- пинцет сосудистый
- иглы кишечные

460. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для первичной хирургической обработки костной раны входят

- жомы раздавливающие
- пила-ножовка
- пила Джигли
- долото прямое
- долото желобоватое

461. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для операции по поводу некроза кишки входят

- жомы кишечные эластические прямые
- жомы кишечные эластические изогнутые
- жомы раздавливающие
- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека

462. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберный распатор Фарабефа
- реберный распатор Лангенбека
- реберный распатор Дуайена
- шприцы 10–20 граммовые
- ампуторные ножи

463. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для резекции ребра входят

- реберные ножницы Дуайена
- ампуторные ножи
- кусачки Люэра
- кусачки Листона
- острая ложечка Фолькмана

464. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для ампутации входят

- кишечный жом
- ампуторные ножи
- ретрактор мышечный
- распатор прямой
- крючки Листона

465. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для трахеостомии входят

- стерильный резиновый грушевидный баллон
- трахеостомические трубки разных размеров
- однозубые острые крючки

расширитель Труссо

кишечный жом

466. Выберите три правильных ответа

В набор инструментов для холецистэктомии входят

зажим Федорова окончатый

зажимы Микулича

брюшные зеркала

зонд Кохера

зонд Фогарти

467. Выберите два правильных ответа

Для проведения микрохирургических операций необходимы следующие укладки инструментов

основной травматологический набор

стандартный микрохирургический набор

набор для первичной хирургической обработки раны

набор для стеральной пункции

набор для шлевральной пункции

468. Выберите три правильных ответа

Преимущества применения лазера в хирургии

отсутствие грубых рубцов после операции

безболезненный послеоперационный период

более быстрое выздоровление

менее выраженное повреждение тканей

сокращение времени операции

469. Выберите три правильных ответа

Использование медицинских перчаток обязательно при малейшей возможности контакта

с кровью и биологическими субстратами

с поврежденной кожей

со слизистыми оболочками

с медицинской документацией

с продуктами питания

470. Выберите три правильных ответа

Лицевые маски должны закрывать

нос

рот

область подбородка

только нос

только рот

471. Выберите два правильных ответа

Для предупреждения внутрибольничной инфекции операционная медсестра обязана

отдельно хранить верхнюю одежду и спецодежду

не выходить в спецодежде за пределы операционного блока

не носить спецодежду в неслужебное время

лично контролировать качество стирки и дезинфекции белья

выходить в спецодежде за пределы операционного блока

472. Выберите три правильных ответа

Меры профилактики воздушно-капельной инфекции в операционном зале

соблюдение этапности операции

соблюдение асептики

ношение маски

влажная уборка, УФО

ограничение хождений