

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием Новосибирской области
по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа
квалификационного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.**

**г. Новосибирск
2016**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- описания Трудовых функций, которые содержатся в проекте профессионального стандарта «Медицинская сестра» (код № 85.14.1);
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	17
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	23

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 50%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	27
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	39
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	50

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - 50%, задание на установление соответствия - 20%, задание на установление правильного порядка - 20%, типовые задачи -10%.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	54
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	66
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	72
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	75

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Сестринское дело в педиатрии»
Вторая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите единственно правильный ответ

Периодичность смены халата в процедурном кабинете ЛПУ

- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ 1 раз в 2 дня
- ☒ 1 раз в смену
- ☐ 1 раз в 3 дня

2. Выберите единственно правильный ответ

При выполнении инъекций смену перчаток рекомендуется проводить

- ☒ после каждого пациента
- ☐ после всех инъекций
- ☐ после 3-х пациентов
- ☐ после 5 пациентов

3. Выберите единственно правильный ответ

Кожа инъекционного поля протирается стерильным ватным тампоном с кожным антисептиком

- ☐ однократно
- ☒ последовательно дважды
- ☐ последовательно трижды
- ☐ последовательно четырежды

4. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность измерения температуры в подмышечной области составляет

- ☐ 2–5 минут
- ☐ 5–7 минут
- ☒ 7–10 минут
- ☐ до 25 минут

5. Выберите единственно правильный ответ

Температура тела здорового человека, измеряемая в прямой кишке, составляет

- ☐ 35–36 °С
- ☐ 36–37 °С
- ☒ 37–38 °С
- ☐ 38–39 °С

6. Выберите единственно правильный ответ

Температура тела называется фебрильной, если она находится в интервале

- ☐ 36–37 °С
- ☐ 37–38 °С
- ☒ 38–39 °С
- ☐ 39–40 °С

7. Выберите единственно правильный ответ

Для сужения кровеносных сосудов кожи и глубоже расположенных тканей и органов используют

- ☐ банки
- ☐ горячую ванну
- ☒ пузырь со льдом
- ☐ горчичники

8. Выберите единственно правильный ответ

Для расширения кровеносных сосудов и расслабления гладкой мускулатуры применяется

- ☐ пузырь со льдом

- ☒ грелка

- ☐ прохладная ванна
- ☐ холодный компресс

9. Выберите единственно правильный ответ

Показание для применения согревающего компресса или грелки

- ☐ острый аппендицит
- ☐ кровотечение
- ☐ ушибы в первые часы
- ☒ инфильтрат на месте инъекций

10. Выберите два правильных ответа

Пузырь со льдом применяется

- ☐ при приступе почечной колики
- ☐ при лихорадке в I периоде
- ☐ при пневмонии
- ☒ при кровотечении
- ☒ при лихорадке во II периоде

11. Выберите единственно правильный ответ

Полуспиртовый согревающий компресс целесообразно использовать

- ☐ 2–3 часа
- ☐ 10–15 минут
- ☐ 30–40 минут
- ☒ 4–6 часов

12. Выберите единственно правильный ответ

В лечебном отделении должен быть запас лекарств, обеспечивающий

- ☐ суточную потребность
- ☒ двух-трехдневную потребность
- ☐ недельную потребность
- ☐ месячную потребность

13. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной столовой ложки составляет

- ☐ 5 мл
- ☐ 10 мл
- ☒ 15 мл
- ☐ 30 мл

14. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной чайной ложки составляет

- ☒ 5 мл
- ☐ 10 мл
- ☐ 15 мл
- ☐ 30 мл

15. Выберите единственно правильный ответ

Шприц Жане применяется

- ☐ для подкожных инъекций
- ☐ для внутримышечных инъекций
- ☐ для внутривенных инъекций
- ☒ для промывания полостей

16. Выберите единственно правильный ответ

Область ягодицы для внутримышечных инъекций

- ☐ верхневнутренний квадрант
- ☒ верхненаружный квадрант

- ☐ нижненааружный квадрант
- ☐ нижневнутренний квадрант

17. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное давление зависит

- ☐ только от частоты сокращений сердца
- ☐ только от силы сокращений сердца
- ☐ только от тонуса артериальной стенки
- ☒ как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериального столба

18. Выберите единственно правильный ответ

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением является

- ☐ максимальным артериальным давлением
- ☐ минимальным артериальным давлением
- ☒ пульсовым давлением
- ☐ дефицитом пульса

19. Выберите единственно правильный ответ

Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Пролежни», определен приказом МЗ РФ

- ☒ № 123
- ☐ № 330
- ☐ № 408
- ☐ № 720

20. Выберите единственно правильный ответ

При обработке глаз ресницы и веки протирают по направлению

- ☐ от центра к углам глаза
- ☒ от наружного края к внутреннему
- ☐ произвольно
- ☐ от внутреннего угла к наружному

21. Выберите два правильных ответа

Преимуществом введения лекарственных веществ через рот является

- ☐ частичная инаktivация в печени
- ☒ простота и доступность
- ☐ требуется соблюдение стерильности
- ☒ введение не требует специально подготовленного персонала

22. Выберите единственно правильный ответ

Преимуществом внутривенного пути введения является

- ☐ простота и доступность
- ☐ не требуется соблюдение стерильности
- ☒ обеспечение более управляемого и быстрого лекарственного воздействия
- ☐ отсутствие аллергических реакций

23. Выберите два правильных ответа

Местами возможной локализации опрелостей являются

- ☒ под молочными железами
- ☐ на затылке
- ☐ на лопатках
- ☐ на крестце
- ☒ в паховых складках

24. Выберите единственно правильный ответ

Для постановки очистительной клизмы для ребенка 14 лет готовят

- ☐ 100 мл касторового масла
- ☒ 1 литр чистой воды

- ☐ 10 литров чистой воды
- ☐ 100 мл отвара ромашки

25. Выберите единственно правильный ответ

Пассивный искусственный иммунитет формируется на введение

- ☐ живой ослабленной вакцины
- ☐ убитой (инактивированной) вакцины
- ☐ анатоксинов
- ☒ иммуноглобулинов

26. Выберите единственно правильный ответ

Перед проведением профилактической прививки проводится

- ☒ медицинский осмотр, термометрия
- ☐ медицинский осмотр, термометрия, проведение анализов мочи, крови
- ☐ медицинский осмотр, иммунологическое исследование
- ☐ медицинский осмотр, термометрия

27. Выберите единственно правильный ответ

Общие прививочные реакции на АКДС-вакцинацию

- ☒ повышение температуры тела
- ☐ общие токсические осложнения
- ☐ общие аллергические реакции немедленного и замедленного типа
- ☐ осложнения со стороны центральной нервной системы

28. Выберите единственно правильный ответ

Аллергическое осложнение немедленного типа при АКДС-вакцинации

- ☒ анафилактический шок
- ☐ повышение температуры тела до 37,5 °C
- ☐ вялость
- ☐ головная боль

29. Выберите единственно правильный ответ

Цель постановки пробы Манту вызвать выработку антител

- ☐ лечебная
- ☒ диагностическая
- ☐ профилактическая
- ☐ лечебно - диагностическая

30. Выберите единственно правильный ответ

Иммунобиологический препарат, используемый для постановки пробы Манту

- ☐ вакцина БЦЖ
- ☒ туберкулин
- ☐ бруцеллин
- ☐ дизентерин

31. Выберите единственно правильный ответ

Туберкулин вводится

- ☐ подкожно
- ☒ внутрикожно
- ☐ внутримышечно
- ☐ подкожно

32. Выберите единственно правильный ответ

Постоянные противопоказания к вакцинации

- ☐ железодефицитная анемия легкой степени
- ☐ стабильные неврологические состояния
- ☐ рахит

☒ анафилактический шок на предыдущее введение вакцины

33. Выберите единственно правильный ответ

Относительные противопоказания к вакцинации

☐ первичный иммунодефицит

☐ злокачественные заболевания

☒ острые заболевания

☐ сильная реакция на предыдущую дозу этой вакцины

34. Выберите единственно правильный ответ

Схема вакцинации против гепатита В

☐ 0–3–7 месяцев

☐ 1–4–8 месяцев

☒ 0–1–6 месяцев

☐ 2–4–10 месяцев

35. Выберите единственно правильный ответ

Признаки местной прививочной реакции на вакцинацию

☒ инфильтрат менее 8 см в диаметре

☐ крапивница

☐ абсцесс

☐ некроз тканей

36. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

☐ слабость

☐ недомогание

☐ снижение аппетита

☒ кашель

37. Выберите единственно правильный ответ

Решающее значение в диагностике пневмонии у детей имеет

☐ общий анализ крови

☐ общий анализ мочи

☒ рентгенография легких

☐ спирография

38. Выберите единственно правильный ответ

Этиотропная терапия пневмонии у детей - применение препаратов

☒ противомикробные

☐ десенсибилизирующие

☐ отхаркивающие

☐ бронхолитические

39. Выберите единственно правильный ответ

Причина затрудненного дыхания при остром рините у детей

☒ отек слизистой, гиперсекреция слизи

☐ отек слизистой, гиперсекреция мокроты

☐ атрофия слизистой, гиперсекреция слизи

☐ атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты

40. Выберите единственно правильный ответ

Ведущим симптомом при остром отите у детей является

☐ кашель

☐ одышка

☐ боль в грудной клетке

☒ боль в ухе

41. Выберите единственно правильный ответ

Для закапывания капель в наружный слуховой проход у детей раннего возраста ушную раковину оттягивают

☒ книзу

☐ кверху

☐ вправо

☐ влево

42. Выберите единственно правильный ответ

Острый бронхит у детей вызывается преимущественно

☒ вирусами

☐ пневмококками

☐ микоплазмой

☐ хламидиями

43. Выберите единственно правильный ответ

При бронхите у детей поражается

☐ бронхи мелкого калибра

☒ бронхи разного калибра

☐ паренхима лёгкого

☐ бронхи крупного калибра

44. Выберите единственно правильный ответ

Укажите наиболее характерное проявление простого бронхита у детей

☒ сухой кашель, повышение температуры тела в течение 2-3-х дней

☐ дистанционные хрипы

☐ интоксикация, повышение температуры тела в течение 5-7 дней

☐ отсутствие эффекта от антибиотиков

45. Выберите единственно правильный ответ

Для обструктивного бронхита у детей наиболее характерны

☐ сухие хрипы

☒ сухие свистящие хрипы

☐ влажные разнокалиберные хрипы

☐ мелкокалиберные хрипы

46. Выберите единственно правильный ответ

У детей в возрасте до 1 года пневмония вызывается преимущественно

☐ вирусами

☒ стафилококками

☐ гемофильной палочкой

☐ микоплазмой

47. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма – это

☐ острое аллергическое воспалительное заболевание бронхов

☐ хроническое воспалительное заболевание бронхов

☒ хроническое аллергическое воспаление бронхов

☐ хроническое воспалительное заболевание легких

48. Выберите единственно правильный ответ

Тяжесть течения БА у детей определяется в первую очередь

☒ наличием астматического статуса в анамнезе

☐ частотой ночных приступов

☐ способом купирования приступов

☐ частотой дневных приступов

49. Выберите единственно правильный ответ

О хронизации бронхолегочного процесса следует говорить, если он сохраняется

- ☐ 3 месяца
- ☐ 6 недель
- ☒ 6 месяцев
- ☐ 10 недель

50. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма у ребенка характеризуется

- ☐ лихорадкой
- ☐ судорогами
- ☒ приступами удушья
- ☐ отеками

51. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей

- ☐ лейкоз
- ☒ пневмония
- ☐ сахарный диабет
- ☐ туберкулез

52. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы назофарингита у детей

- ☐ отеки
- ☐ желтуха
- ☐ кровотечения
- ☒ кашель

53. Выберите единственно правильный ответ

Возможное осложнение ринита у грудных детей

- ☒ отит
- ☐ асфиксия
- ☐ ложный круп
- ☐ ангина

54. Выберите единственно правильный ответ

Одной из наиболее частых причин хронического гастрита у детей является

- ☐ длительный прием салицилатов
- ☐ пищевая аллергия
- ☒ нерегулярное и неполноценное по составу питание
- ☐ хронические заболевания печени и желчевыводящих путей

55. Выберите единственно правильный ответ

Существенную роль в язвообразовании у детей отводят

- ☐ кишечной палочке
- ☐ протею
- ☒ хеликобактерным микроорганизмам
- ☐ палочке молочно-кислого брожения

56. Выберите единственно правильный ответ

При глистных инвазиях боли локализуются

- ☐ в правом подреберье
- ☐ в эпигастральной области
- ☐ в левом подреберье
- ☒ в околопупочной области

57. Выберите единственно правильный ответ

Выберите жалобу, характеризующую диспептические расстройства у детей раннего возраста

- ☐ головная боль
- ☐ утомляемость
- ☒ метеоризм

- ☐ похудании

58. Выберите единственно правильный ответ

Назовите возбудителя герпетического стоматита у детей

- ☒ вирус
- ☐ стрептококк
- ☐ стафилококк
- ☐ хеликобактер пилори

59. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при энтеробиозе у детей

- ☐ кашель
- ☐ боль в животе
- ☐ запор
- ☒ зуд в перианальной области

60. Выберите единственно правильный ответ

Вид питания ребёнка, больного стоматитом

- ☐ острые блюда
- ☐ продукты, богатые клетчаткой
- ☒ теплую, жидкую, полужидкую пищу
- ☐ слизкогонные продукты

61. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при кандидозном стоматите у детей

- ☐ головная боль
- ☐ слюнотечение
- ☒ высыпания и боль в полости рта
- ☐ насморк

62. Выберите единственно правильный ответ

Энтеробиоз у детей может приводить к развитию

- ☐ кишечного кровотечения
- ☐ менингита
- ☒ вульвовагинита
- ☐ пенетрации

63. Выберите единственно правильный ответ

В клинике афтозного стоматита у детей характерно

- ☐ раздражительность
- ☐ лихорадка
- ☒ гиперсаливация
- ☐ боль в животе

64. Выберите единственно правильный ответ

Осложнение аскаридоза

- ☐ перфорация
- ☐ пенетрация
- ☐ аутоинвазия
- ☒ кишечная непроходимость

65. Выберите единственно правильный ответ

При дисфункции билиарного тракта по гипертонической форме у детей исключается

- ☒ сливочное масло
- ☐ отварное мясо
- ☐ свежий хлеб
- ☐ творожная запеканка

66. Выберите единственно правильный ответ

При глистных инвазиях боли локализуются

- ☐ в правом подреберье
- ☐ в эпигастральной области
- ☐ в левом подреберье
- ☒ в околопупочной области

67. Выберите единственно правильный ответ

Выберите жалобу, характеризующую диспептические расстройства у детей раннего возраста

- ☐ головная боль
- ☐ утомляемость
- ☒ метеоризм
- ☐ похудание

68. Выберите единственно правильный ответ

Сроки формирования вторичных половых признаков у мальчиков

- ☐ с 8-9 лет до 16 лет
- ☒ с 10-11 лет до 17-21
- ☐ с 6-7 лет до 12 лет
- ☐ с 5-6 лет до 10 лет

69. Выберите единственно правильный ответ

Антибактериальная (противовоспалительная) терапия должна проводиться с учетом

- ☐ возраста ребенка
- ☐ тяжести заболевания
- ☒ верно всё
- ☐ массы тела

70. Выберите единственно правильный ответ

Приём лекарственных средств в стационаре осуществляется детьми

- ☐ самостоятельно
- ☒ в присутствии медицинской сестры
- ☐ в присутствии родителей
- ☐ в присутствии врача

71. Выберите два правильных варианта ответа

Частоту пульса у детей определяют на

- ☒ лучевой артерии
- ☐ локтевой артерии
- ☒ плечевой артерии
- ☐ бедренной артерии

72. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное давление у детей

- ☐ выше, чем у взрослых
- ☒ ниже, чем у взрослых
- ☐ такое же, как у взрослых
- ☐ выше, чем у пожилых

73. Выберите единственно правильный ответ

К принципам диеты при заболеваниях сердечно - сосудистой системы относятся

- ☒ ограничение соли
- ☐ ограничение белков
- ☐ ограничение сахара
- ☐ ограничение углеводов

74. Выберите единственно правильный ответ

Решающее значение в этиологии острой ревматической лихорадки у детей имеет

- ☒ b-гемолитический стрептококк группы А
- ☐ b-гемолитический стрептококк группы В
- ☐ стафилококки
- ☐ вирусы

75. Выберите единственно правильный ответ

Длительность диспансерного наблюдения за ребёнком, перенёсшим ревматизм

- ☐ 3 года
- ☐ 5 лет

- ☒ до передачи в подростковый кабинет

- ☐ 2 года

76. Выберите единственно правильный ответ

При любом врождённом пороке у детей осложнением могут быть

- ☐ пневмония
- ☐ гипоксический криз
- ☐ тромбоэмболия
- ☒ недостаточность кровообращения

77. Выберите единственно правильный ответ

Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

78. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее эффективной мерой профилактики ВИЧ-инфекции среди населения является

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

79. Выберите три правильных ответа

Терминальными состояниями являются

- ☒ преагония
- ☒ агония
- ☒ клиническая смерть
- ☐ биологическая смерть
- ☐ коллапс
- ☐ шок

80. Выберите три правильных ответа

Признаками клинической смерти является

- ☐ угнетение сознания
- ☒ отсутствие сознания, широкие зрачки
- ☒ отсутствие дыхания
- ☒ отсутствие кровообращения
- ☐ брадикаardia
- ☐ брадипноэ

81. Выберите единственно правильный ответ

Длительность реанимационных мероприятий при их неэффективности

- ☐ 60 минут
- ☒ 30 минут
- ☐ 40 минут
- ☐ 20 минут

82. Выберите единственно правильный ответ

Реанимационные мероприятия начинаются

- ☐ с непрямого массажа сердца
- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей
- ☐ не имеет значения, с чего начинаются реанимационные мероприятия
- ☒ с укладывания на ровную и твердую поверхность

83. Выберите единственно правильный ответ

При проведении непрямого массажа сердца у детей 14 лет руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в верхней трети грудины
- ☒ в средней трети грудины

84. Выберите единственно правильный ответ

Сочетание компрессий и вдуваний при проведении реанимационных мероприятий

- ☐ 10:1
- ☐ 5:2
- ☒ 30:2
- ☐ 15:2

85. Выберите три правильных ответа

Клиническими признаками коллапса является

- ☐ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание
- ☒ слабый, частый пульс
- ☐ редкий, слабый пульс
- ☒ резкое снижение артериального давления
- ☐ отсутствие кровообращения

86. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая причина развития терминального состояния при электротравме

- ☐ титанический спазм дыхательной мускулатуры
- ☒ фибрилляция желудочков сердца
- ☐ угнетение стволовых функций головного мозга
- ☐ коллапс

87. Выберите единственно правильный ответ

При отсутствии кровообращения на фоне электротравмы реанимационные мероприятия начинают

- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей
- ☐ с искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ с купирования фибрилляции желудочков сердца
- ☐ с непрямого массажа сердца

88. Выберите два правильных ответа

Признаками геморрагического шока является

- ☒ бледность кожных покровов
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ головная боль
- ☐ гиперемия кожных покровов
- ☒ частый, слабый пульс

89. Выберите единственно правильный ответ

Шоковый индекс Альговера – это соотношение

- ☒ частоты пульса за одну минуту к систолическому артериальному давлению
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к диастолическому артериальному давлению
- ☐ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к систолическому артериальному давлению

90. Выберите единственно правильный ответ

При оказании неотложной помощи при обмороке, пациенту придают следующее положение

- ☐ горизонтальное
- ☒ горизонтальное с опущенной головой и приподнятыми ногами
- ☐ полусидя
- ☐ горизонтальное с опущенной головой и ногами

91. Выберите единственно правильный ответ

Купирование анафилактического шока начинается с введения

- ☒ адреналина
- ☐ полиглюкина
- ☐ димедрола
- ☐ преднизолона

92. Выберите единственно правильный ответ

Для коматозного состояния наиболее характерным является следующий симптом

- ☐ угнетение сознания
- ☒ отсутствие сознания
- ☐ угнетение сердечной деятельности
- ☐ угнетение дыхания

93. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипогликемической комы является

- ☒ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

94. Выберите единственно правильный ответ

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения раствора

- ☒ 40% раствор глюкозы
- ☐ 10% раствор глюкозы
- ☐ гемодез
- ☐ 5% раствор глюкозы

95. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипергликемической комы является

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная холодная, одышка, зрачки различной величины
- ☒ сознание отсутствует, кожа сухая, гиперемия, дыхание шумное типа Куссмауля
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

96. Выберите единственно правильный ответ

Промывание желудка в коме проводят

- ☐ без интубации трахеи
- ☒ после интубации трахеи
- ☐ не имеет значения
- ☐ не проводят

97. Выберите единственно правильный ответ

Отек легких относится

- ☐ к острой правожелудочковой недостаточности
- ☐ к острой бивентрикулярной недостаточности
- ☒ к острой левожелудочковой недостаточности

☐ к острой предсердной недостаточности

98. Выберите два правильных ответа

Пациенту с носовым кровотечением следует придать положение

- ☒ усадить
- ☐ уложить
- ☐ голову запрокинуть
- ☒ голову опустить

99. Выберите единственно правильный ответ

Последовательность действий при остром лекарственном отравлении

- ☒ промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма
- ☐ прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма
- ☐ очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка
- ☐ промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

100. Выберите три правильных ответа

Клиническими симптомами внутреннего кровотечения является

- ☒ снижение артериального давления
- ☐ частый пульс
- ☒ резкая слабость
- ☒ бледность кожных покровов
- ☐ затрудненное дыхание
- ☐ гиперемия кожных покровов

101. Выберите единственно правильный ответ

При отморожении мягких тканей, в качестве неотложной помощи в до реактивном периоде рекомендуется

- ☐ легкое постепенное согревание
- ☐ активное согревание пораженных участков
- ☒ наложение термоизолирующей повязки
- ☐ обработка отмороженных участков спиртом

102. Выберите три правильных ответа

Беззондовый метод промывания желудка противопоказан при

- ☒ судорожном синдроме
- ☒ отравлении прижигающими ядами
- ☒ отсутствии сознания
- ☐ отравлении не прижигающими ядами
- ☐ сохраненном сознании

103. Выберите два правильных ответа

При отравлении угарным газом необходимо

- ☒ вывести пострадавшего из зараженной зоны
- ☐ провести непрямой массаж сердца
- ☐ провести искусственное дыхание
- ☐ введение лекарственных препаратов
- ☒ провести оксигенацию легких

104. Выберите единственно правильный ответ

Основной механизм развития геморрагического шока

- ☒ уменьшение объема циркулирующей крови
- ☐ сердечная недостаточность
- ☐ парез сосудов
- ☐ плазмопотеря

105. Выберите единственно правильный ответ

Тройной прием Сафара применяют

- ☐ для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- ☐ для проведения прекардиального удара
- ☐ для интубации трахеи

106. Выберите два правильных ответа

Критериями правильного наложения кровоостанавливающего жгута является

- ☐ продолжающееся кровотечение
- ☒ отсутствие пульса ниже жгута
- ☐ цианоз конечности
- ☒ бледность конечности

107. Выберите единственно правильный ответ

Ревматическая хорея у детей проявляется

- ☒ гиперкинезами
- ☐ ларингоспазмом
- ☐ пилоростенозом
- ☐ удушьем

108. Выберите единственно правильный ответ

Гемартрозы у детей характерны при заболевании

- ☒ гемофилия
- ☐ острый лейкоз
- ☐ аллергия
- ☐ паразитарная инвазия

109. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой носа

- ☒ ринит
- ☐ фарингит
- ☐ отит
- ☐ менингит

110. Выберите единственно правильный ответ

Повышение сахара в крови

- ☒ гипергликемия
- ☐ гипогликемия
- ☐ анемия
- ☐ гипокальциемия

111. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление мышечной оболочки сердца

- ☒ миокардит
- ☐ эндокардит
- ☐ перикардит
- ☐ панкардит

112. Выберите единственно правильный ответ

Ночное недержание мочи у детей

- ☒ энурез
- ☐ никтурия
- ☐ энкопрез
- ☐ ишурия

113. Выберите единственно правильный ответ

Кратковременная остановка дыхания у детей

- ☒ апноэ
- ☐ тахипноэ
- ☐ брадипноэ
- ☐ асфиксия

114. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки у детей

- ☒ назофарингит
- ☐ трахеит
- ☐ гайморит
- ☐ трахеит

115. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление среднего уха у детей

- ☒ отит
- ☐ мастит
- ☐ перитонит
- ☐ мастоидит

116. Выберите единственно правильный ответ

Поражение нервной системы при ревматизме у детей

- ☒ хорея
- ☐ менингит
- ☐ энцефалит
- ☐ энцефалопатия

117. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление тонкого и толстого кишечника у детей

- ☒ энтероколит
- ☐ гастроэнтерит
- ☐ гастроэнтероколит
- ☐ колит

118. Выберите единственно правильный ответ

Уменьшение суточного объема мочи у ребенка

- ☒ олигурия
- ☐ полиурия
- ☐ гематурия
- ☐ протеинурия

119. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление яичек у мальчика

- ☒ орхит
- ☐ баланопостит
- ☐ простатит
- ☐ колит

120. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой желудка у детей

- ☒ гастрит
- ☐ колит
- ☐ энтерит
- ☐ дуоденит

121. Выберите единственно правильный ответ

При запорах у детей рекомендуется исключить из рациона

- ☐ кисломолочные продукты
- ☐ фрукты
- ☒ рисовую кашу
- ☐ овощи

122. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- ☐ больной гриппом человек
- ☐ больное животное
- ☐ больные птицы
- ☒ человек с момента заражения

123. Выберите единственно правильный ответ

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- ☐ аденовирусов
- ☒ ретровирусов

- ☐ энтеровирусов
- ☐ пикорнавирусов

124. Выберите единственно правильный ответ

Источник заражения при ВИЧ-инфекции

- ☒ зараженный человек
- ☐ домашнее животное
- ☐ комары
- ☐ клещи

125. Выберите единственно правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- ☐ слюна
- ☐ слезная жидкость
- ☒ кровь
- ☐ спинномозговая жидкость

126. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

- ☒ артифициальный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ трансмиссивный

127. Выберите единственно правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

128. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

129. Выберите два правильных ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- ☐ через рукопожатия
- ☐ через укусы насекомых
- ☒ при половых контактах
- ☒ при гемотрансфузии
- ☐ через поцелуи

130. Выберите два правильных ответа

Существует риск заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери

- ☒ при грудном вскармливании
- ☒ во время родов
- ☐ при уходе за ребенком
- ☐ при поцелуях
- ☐ через прикосновения

131. Выберите единственно правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

132. Выберите единственно правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

133. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

- ☒ кровь
- ☐ секрет потовых желез
- ☐ моча
- ☒ сперма
- ☒ грудное молоко
- ☐ кал

134. Выберите единственно правильный ответ

При ВИЧ-инфекции поражается

- ☐ костная система
- ☒ иммунная система
- ☐ мышечная система
- ☐ сердечно-сосудистая система

135. Выберите единственно правильный ответ

Латентная стадия ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☐ длительной лихорадкой
- ☐ увеличением печени, селезенки
- ☒ увеличением лимфоузлов
- ☐ вторичными заболеваниями

136. Выберите два правильных ответа

СПИД-маркерными являются заболевания

- ☒ пневмоцистная пневмония
- ☒ кандидоз пищевода, трахеи, бронхов
- ☐ дизентерия
- ☐ насморк
- ☐ кашель

137. Выберите единственно правильный ответ

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

138. Выберите единственно правильный ответ

Длительность вирусоносительства при ВИЧ-инфекции

- ☐ от 2 недель до 6 месяцев
- ☐ до 5 лет
- ☐ до 15 лет
- ☒ пожизненно

139. Выберите единственно правильный ответ

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) является

- ☒ стадией ВИЧ-инфекции
- ☐ самостоятельным заболеванием
- ☐ синонимом ВИЧ-инфекции
- ☐ осложнением ВИЧ-инфекции

140. Выберите единственно правильный ответ

Контингентом с наибольшим риском заражения ВИЧ являются

- ☒ наркоманы
- ☐ беременные
- ☐ доноры
- ☐ реципиенты крови

141. Выберите единственно правильный ответ

Для диагностики ВИЧ-инфекции у больного забирают

- ☐ кал
- ☐ мочу
- ☒ кровь
- ☐ желчь

142. Выберите единственно правильный ответ

Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является

- ☒ серологический
- ☐ генетический
- ☐ люминесцентный
- ☐ бактериологический

143. Выберите единственно правильный ответ

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 1 сутки
- ☐ 3 суток

144. Выберите единственно правильный ответ

При диарее у детей рекомендуют употреблять

- ☐ манную кашу
- ☒ кисель
- ☐ фрукты
- ☐ помидоры

145. Выберите единственно правильный ответ

Помощью больному ребёнку при диарее является

- ☐ уменьшение объема жидкости
- ☐ слабительная фитотерапия
- ☒ глюкозо-солевые растворы
- ☐ фитотерапия

146. Выберите единственно правильный ответ

Закаливающими водными процедурами у детей являются

- ☒ контрастные обтирания
- ☐ горячие ножные ванны
- ☐ плавание в ванной
- ☐ теплый душ

147. Выберите два правильных ответа

Особенности ревматического полиартрита является

- ☐ симметричное поражение мелких суставов
- ☒ поражение крупных суставов
- ☒ летучий характер полиартрита
- ☐ продолжительность полиартрита более 10 дней
- ☐ постоянный характер полиартрита

148. Выберите два правильных ответа

Преимущественно при ревматической лихорадке у детей поражается ткань

- ☐ эпителиальная

- ☒ соединительная
- ☒ нервная
- ☐ костная
- ☐ кровь

149. Выберите два правильных ответа

Преимущественно при ревматизме у детей поражаются

- ☒ сердце
- ☐ почки
- ☐ печень
- ☐ кишечник
- ☒ нервная система

150. Выберите два правильных ответа

Проявления недостаточности кровообращения у детей

- ☒ тахикардия
- ☐ спленомегалия
- ☐ брадикардия
- ☐ рвота
- ☒ одышка

151. Выберите два правильных ответа

При ревматизме у детей, могут предшествовать заболевания

- ☒ ангина
- ☐ менингит
- ☒ скарлатина
- ☐ колит
- ☐ гастрит

152. Выберите два правильных ответа

При лечении синдрома недостаточности кровообращения используются препараты следующих групп

- ☒ сердечные гликозиды
- ☒ диуретики
- ☐ антигистаминные
- ☐ антибиотики
- ☐ витамины

153. Выберите два правильных ответа

В план обследования при подозрении на ревматизм обязательно входят

- ☒ общий анализ крови
- ☒ биохимический анализ крови
- ☐ биохимический анализ мочи
- ☐ общий анализ мочи
- ☐ общий анализ кала

154. Выберите два правильных ответа

Лечение атаки ревматизма с явлениями кардита обязательно включает

- ☒ антибактериальные препараты пенициллинового ряда
- ☒ НПВС
- ☐ седативные препараты
- ☐ сердечные гликозиды
- ☐ диуретики

155. Выберите два правильных ответа

При рахите у ребенка наблюдаются

- ☐ артриты
- ☐ переломы
- ☐ гематомы

- ☒ О-, Х-образные ноги
- ☒ рёберные чётки

156. Выберите два правильных ответа

При осмотре кожи ребенка оценивается

- ☐ влажность
- ☐ температура
- ☒ цвет
- ☐ эластичность
- ☒ наличие сыпи

157. Выберите два правильных ответа

Проявления недостаточности кровообращения у детей

- ☐ спленомегалия
- ☐ брадикардия
- ☐ рвота
- ☒ одышка
- ☒ отеки

158. Выберите два правильных ответа

Симптомы кишечного экзикоза у детей

- ☒ сухость кожи
- ☐ полиурия, влажность кожи
- ☐ одышка, тахикардия
- ☒ олигурия
- ☐ судороги

159. Выберите два правильных ответа

Наиболее частые признаки заболеваний органов пищеварения у детей

- ☒ боль в животе
- ☒ нарушение аппетита
- ☐ сухость во рту
- ☐ желтушность кожи
- ☐ астения

160. Выберите два правильных ответа

Основные признаки пиелонефрита у детей

- ☒ интоксикация
- ☐ запоры
- ☒ дизурические расстройства
- ☐ ангина
- ☐ насморк

161. Выберите два правильных ответа

Основные клинические симптомы стоматита у детей

- ☐ кашель
- ☒ отек слизистой полости рта
- ☒ боль при приеме пищи
- ☐ жидкий стул
- ☐ боль в эпигастрии

162. Выберите два правильных ответа

Основные формы ангины у детей

- ☐ стеногическая
- ☒ лакунарная
- ☐ вирулентная
- ☒ фолликулярная
- ☐ вирусная

163. Выберите два правильных ответа

Клинические симптомы сахарного диабета у детей

- ☒ полифагия
- ☐ боли в пояснице
- ☒ полиурия

- ☐ кашель
- ☐ боли в животе

164. Выберите два правильных ответа

Способ введения инсулина при лечении сахарного диабета

- ☒ внутривенно
- ☐ внутримышечно
- ☒ подкожно
- ☐ внутривенно
- ☐ артериальный

165. Выберите два правильных ответа

Применяют для лечения гломерулонефрита у детей

- ☒ диуретики
- ☒ гипотензивные препараты
- ☐ гемостатические препараты
- ☐ противовирусные препараты
- ☐ противогерпетические препараты

166. Выберите единственно правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

167. Выберите единственно правильный ответ

Раннему активному выявлению больных туберкулезом среди взрослых способствует

- ☐ массовый осмотр населения
- ☐ рентгеноскопия легких
- ☒ массовое флюорографическое обследование
- ☐ туберкулинодиагностика

168. Выберите единственно правильный ответ

Особенности питания при туберкулезе

- ☐ ограничение поваренной соли
- ☒ рекомендуется диета с повышенным содержанием белка и витаминов
- ☐ рекомендуется диета с повышенным содержанием витаминов и углеводов
- ☐ ограничение копченостей

169. Выберите два правильных ответа

Осложнения при туберкулезе

- ☐ анафилактический шок
- ☒ легочное кровотечение
- ☒ пневмоторакс
- ☐ пневмосклероз
- ☐ пневмония

170. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза включает

- ☒ вакцинацию и ревакцинацию против туберкулеза
- ☐ химиопрофилактику контактными лицам
- ☐ проведение заключительной дезинфекции в очаге
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом
- ☐ проведение текущей дезинфекции в очаге

171. Выберите единственно правильный ответ

БЦЖ является

- ☒ живой вакциной
- ☐ инактивированной вакциной

- ☐ анатоксином
- ☐ сывороткой

172. Выберите единственно правильный ответ

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д
- ☐ Г

173. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ бактерии
- ☐ микобактерии
- ☒ вирусы
- ☐ кокки

174. Выберите единственно правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире называется

- ☐ вспышка
- ☐ эпидемия
- ☒ пандемия
- ☐ групповые заболевания

175. Выберите единственно правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ низкая температура
- ☐ воздействие радиации

176. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем ВИЧ-инфекции является

- ☐ цитомегаловирус
- ☐ аденовирус
- ☒ ретровирус
- ☐ пикорнавирус

177. Выберите единственно правильный ответ

Понятие медицинская деонтология включает в себя

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента
- ☒ учение о профессиональном долге

178. Выберите единственно правильный ответ

Внутренняя картина болезни

- ☐ фрустрация
- ☐ апатия
- ☒ реакция пациентов на болезнь
- ☐ депрессия

179. Выберите единственно правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

180. Выберите единственно правильный ответ

Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из окружающей среды

- ☐ невроз
- ☐ лихорадка
- ☐ фобии
- ☒ стресс

181. Выберите единственно правильный ответ

Детская эвтаназия в РФ

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

182. Выберите единственно правильный ответ

Нормы поведения в определенных условиях во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

- ☒ деонтология
- ☐ этика
- ☐ биоэтика
- ☐ мораль

183. Выберите единственно правильный ответ

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинской сестры и пациента

- ☐ релаксация
- ☒ эмпатия (сопереживание)
- ☐ психотерапия
- ☐ рефлексия

184. Выберите три правильных ответа

Уровни общения в сестринском деле

- ☐ доверительный
- ☒ общественный
- ☐ убеждающий
- ☒ внутриличностный
- ☒ межличностный
- ☐ избегание

185. Выберите единственно правильный ответ

На медицинскую сестру, обязанность хранить профессиональную тайну распространяется

- ☒ всегда
- ☐ не распространяется
- ☐ по указанию врача
- ☐ иногда

186. Выберите единственно правильный ответ

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- ☐ в условиях стационара
- ☐ только по назначению врача
- ☒ любому человеку, нуждающемуся в ней
- ☐ в условиях поликлиники

187. Выберите единственно правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс
- ☐ медицинский этикет
- ☒ медицинская этика
- ☐ медицинская деонтология

188. Выберите два правильных ответа

Эффективному общению с пациентами и медицинской сестрой способствует

- ☒ положительная обратная связь
- ☐ тревожность пациента
- ☐ замечания медицинской сестры
- ☐ строгость медицинской сестры
- ☒ доброжелательность медицинской сестры

189. Выберите единственно правильный ответ

Трагическое переживание болезни у пациента проявляется

- ☐ повышенной требовательностью к медицинской сестре
- ☒ суицидальными действиями
- ☐ массой жалоб
- ☐ отказом от обследования

190. Выберите единственно правильный ответ

Конфликты с пациентами у персонала возникают по причине

- ☒ медицинский персонал не учитывает эмоции пациентов
- ☐ нарушения санитарно-эпидемического режима
- ☐ отказа пациента от обследования
- ☐ эмпатии медицинской сестры

191. Выберите единственно правильный ответ

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- ☐ 0–45 см
- ☒ 45–120 см
- ☐ 120–400 см
- ☐ 400–500 см
- ☐ 400–750 см

192. Выберите три правильных ответа

Агрессивность пациента может вызываться

- ☒ психическими заболеваниями
- ☒ болью и стрессом
- ☒ страхом
- ☐ низким уровнем артериального давления
- ☐ изменением климатических условий

193. Выберите два правильных ответа

Естественные психологические реакции пациентов перед операцией, манипуляциями

- ☒ тревога
- ☒ страх
- ☐ эйфория
- ☐ радость
- ☐ боль

194. Выберите два правильных ответа

Причины депрессии у пациентов

- ☒ травматическая потеря органа
- ☒ косметический дефект во внешности после травмы
- ☐ низкий уровень артериального давления
- ☐ неудовлетворенность медицинской помощью
- ☐ высокий уровень артериального давления

195. Выберите два правильных ответа

В понятие профессиональная тайна входит

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе

- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

196. Выберите единственно правильный ответ

Ятрогенные заболевания обусловлены

- ☐ вредными факторами производства
- ☒ неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболеваниями с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболеваниями наследственного генеза

197. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание туберкулезом является

- ☐ наследственным
- ☒ социальным
- ☐ зоонозным
- ☐ соматическим

198. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем туберкулеза является

- ☐ вирус
- ☐ грибы
- ☒ микобактерия
- ☐ клебсиелла

199. Выберите единственно правильный ответ

Срок жизнеспособности возбудителя туберкулеза в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев
- ☐ до 6 месяцев

200. Выберите два правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающие заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышиный
- ☐ собачий

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

201. Выберите два правильных ответа

Лечение атаки ревматизма с явлениями кардита обязательно включает

- ☒ антибактериальные препараты пенициллинового ряда
- ☒ НПВС
- ☐ седативные препараты
- ☐ витамины
- ☐ антигистаминные препараты

202. Выберите два правильных ответа

При рахите у ребенка наблюдаются

- ☐ артриты
- ☐ переломы
- ☐ гемартрозы
- ☒ О- и Х-образные ноги
- ☒ рёберные чётки

203. Выберите два правильных ответа

При осмотре кожи ребенка оценивается

- ☐ влажность
- ☐ температура
- ☒ цвет
- ☐ эластичность
- ☒ наличие сыпи

204. Выберите два правильных ответа

Проявления недостаточности кровообращения у детей

- ☐ спленомегалия
- ☐ брадикардия
- ☐ рвота
- ☒ одышка

- ☒ отеки

205. Выберите два правильных ответа

Симптомы кишечного эксикоза у детей

- ☒ сухость кожи
- ☐ полиурия
- ☐ одышка
- ☒ олигурия
- ☐ судороги

206. Выберите единственно правильный ответ

Основная форма ангины у детей

- ☐ стеногическая
- ☐ грибковая
- ☐ вирулентная
- ☒ фолликулярная

207. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая форма дифтерии – дифтерия

- ☒ зева
- ☐ носа
- ☐ гортани
- ☐ кожи

208. Выберите два правильных ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное

209. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

210. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ слизистые оболочки и поврежденная кожа

211. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

212. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

213. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ в общественном транспорте
- ☐ половой

214. Выберите два правильных ответа

Применяют для лечения гломерулонефрита у детей

- ☒ диуретики
- ☒ гипотензивные препараты
- ☐ гемостатические препараты
- ☐ противовирусные препараты
- ☐ антибактериальные препараты

215. Выберите два правильных ответа

Метод исследования при подозрении на дискинезию желчевыводящих путей у детей

- ☒ УЗИ желчных протоков, холецистография
- ☐ эндоскопический
- ☒ фракционное дуоденальное зондирование
- ☐ радиоизотопный
- ☐ общеклинический

216. Выберите два правильных ответа

Проводится для выявления скрытого сахарного диабета у детей

- ☐ общий анализ мочи
- ☐ общий анализ крови
- ☐ анализ мочи по Нечипоренко
- ☒ тест толерантности к глюкозе
- ☒ сахарная кривая

217. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятие, которое необходимо провести в очаге дифтерии после изоляции больного

- ☐ текущую дезинфекцию
- ☒ заключительную дезинфекцию
- ☐ влажную уборку
- ☐ проветривание

218. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при дифтерии

- ☒ больной и носитель токсигенных бактерий дифтерии
- ☐ больной легкой ангиной
- ☐ носитель нетоксических бактерий дифтерии
- ☐ больное животное

219. Выберите единственно правильный ответ

Бактериологическое исследование на дифтерию проводится путем взятия

- ☒ мазка из носа и зева
- ☐ мазка с конъюнктивы
- ☐ мазка с задней стенки глотки
- ☐ мазка с небных миндалин

220. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, проводимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

- ☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются
- ☐ не отстраняются от посещения коллектива
- ☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются
- ☐ не госпитализируются

221. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☒ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

222. Выберите единственно правильный ответ

Метод введения противодифтерийной антитоксической сыворотки

- ☒ дробно (по Безредко)
- ☐ одномоментно вся доза
- ☐ не имеет значения
- ☐ 2 раза в день

223. Выберите единственно правильный ответ

Корь по механизму передачи

- ☐ кишечная инфекция
- ☒ воздушно-капельная инфекция
- ☐ трансмиссивная инфекция
- ☐ инфекция кожных покровов

224. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при кори

- ☐ животные
- ☐ бактериовыделитель
- ☒ больной корью человек
- ☐ почва

225. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинация живой коревой вакциной в очаге кори проводится в течение

- ☐ первого дня

- ☒ первых 3 дней
- ☐ первых 5 дней
- ☐ первых 7 дней

226. Выберите единственно правильный ответ
Наиболее характерный симптом кори в начальном периоде

- ☐ катаральные явления
- ☐ светобоязнь
- ☒ пятна Бельского–Филатова
- ☐ ангина

227. Выберите единственно правильный ответ

Сыпь при кори высыпает

- ☐ одномоментно
- ☐ этапно, в течение 1 дня
- ☒ этапно в течение 3 дней
- ☐ в течение 5 дней

228. Выберите единственно правильный ответ

Вторичные элементы после угасания сыпи при кори

- ☐ корочки
- ☒ пигментация
- ☐ рубцы
- ☐ расчесы

229. Выберите два правильных варианта ответа

Вакцинации живой коревой вакциной по эпидемиологическим показаниям подлежат дети

- ☒ ранее не болевшие и не привитые
- ☐ имеющие противопоказания к вакцинации
- ☐ ранее болевшие корью
- ☒ не привитые

230. Выберите единственно правильный ответ

Мазок при подозрении на коклюш берут

- ☐ из носа сухим тампоном
- ☐ из зева сухим тампоном
- ☐ с небных миндалин сухим тампоном
- ☒ методом кашлевых пластинок

231. Выберите единственно правильный ответ

Характерные особенности кашля при коклюше

- ☒ приступы спазматического кашля с репризами
- ☐ влажный кашель, с обильной мокротой
- ☐ влажный кашель со скудной мокротой
- ☐ сухой лающий кашель, осиплость голоса

232. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность периода спазматического кашля

- ☐ 3 - 5 дней
- ☐ 5 - 7 дней
- ☐ 7 - 10 дней
- ☒ 2 – 4 недели

233. Выберите единственно правильный ответ

Длительно кашляющие дети подлежат бактериологическому обследованию

- ☐ на дифтерию
- ☐ на дизентерию
- ☐ на скарлатину
- ☒ на коклюш

234. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☐ фильтрующий вирус

- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк
- ☒ нейссерия

235. Выберите единственно правильный ответ

Мазок для бактериологического исследования на менингококковую инфекцию берут

- ☐ из носа
- ☐ с миндалин
- ☒ с задней стенки глотки
- ☐ с языка

236. Выберите единственно правильный ответ

Характер сыпи при менингококковой инфекции

- ☐ мелкоточечная на гиперемизованном фоне кожных покровов
- ☐ пятнисто-папулезная на бледном фоне кожных покровов
- ☐ везикулезная на обычном фоне кожных покровов
- ☒ геморрагическая звездчатая на бледном фоне кожных покровов

237. Выберите два правильных ответа

Локализованная форма менингококковой инфекции

- ☒ носительство менингококка
- ☐ менингококцемия
- ☐ менингококковый менингит
- ☒ менингококковый ринофарингит

238. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина при менингококковой инфекции

- ☐ 7 дней
- ☒ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

239. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина в очаге эпидпаротита

- ☐ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☒ 21 день

240. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель скарлатины

- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☒ бета-гемолитический стрептококк
- ☐ менингококк

241. Выберите единственно правильный ответ

Детям, контактным с больным скарлатиной, проводят

- ☒ осмотр кожи, носоглотки, термометрию
- ☐ определение границ сердца, термометрию
- ☐ определение диуреза, термометрию
- ☐ определение симптома Пастернацкого, термометрию

242. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции ребенка дошкольного возраста, заболевшего скарлатиной

- ☐ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней

☒ 22 дня

243. Выберите единственно правильный ответ

Карантин на очаг инфекции при скарлатине после изоляции больного накладывается

☒ на 7 дней

☐ на 10 дней

☐ на 14 дней

☐ на 21 день

244. Выберите единственно правильный ответ

Вторичные элементы после угасания сыпи при скарлатине

☐ корочки

☐ пигментация

☒ шелушение

☐ расчесы

245. Выберите единственно правильный ответ

Осложнения при скарлатине

☒ миокардит, гломерулонефрит

☐ назофарингит, стоматит, ринит

☐ менингит, паратонзиллит

☐ пиелонефрит, отит

246. Выберите единственно правильный ответ

Ведущие симптомы при скарлатине

☒ сыпь, ангина, интоксикация

☐ сыпь, кашель, интоксикация

☐ сыпь, судороги, интоксикация

☐ сыпь, диарея, интоксикация

247. Выберите единственно правильный ответ

Ветряная оспа относится к группе

☐ кишечных инфекций

☒ воздушно-капельных инфекций

☐ трансмиссивных инфекций

☐ инфекций кожных покровов

248. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при ветряной оспе

☐ животные

☐ бактериовыделитель

☒ больной человек

☐ вирусоноситель

249. Выберите единственно правильный ответ

Механизм заражения ветряной оспой

☐ фекально-оральный

☐ парентеральный

☒ воздушно-капельный

☐ контактный

250. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции больного ветряной оспой

☒ 10 дней от начала высыпаний

☐ до 14 дней с момента высыпаний

☐ до 21 дня с момента высыпаний

☐ до 7 дня с момента высыпаний

251. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель краснухи

☒ фильтрующий вирус

☐ золотистый стафилококк

☐ бета-гемолитический стрептококк

☐ менингококк

252. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при краснухе

☐ животные

☐ бактериовыделитель

☒ больной краснухой человек

☐ вирусоноситель

253. Выберите единственно правильный ответ

Локализация сыпи при краснухе

☐ на волосистой части головы

☐ по всему телу

☒ на сгибательных поверхностях конечностей, боковых поверхностях туловища, в естественных складках кожи

☐ в основном на ладонях и стопах

254. Выберите единственно правильный ответ

Содержание глюкозы в плазме крови у детей составляет

☐ 1,5 – 2,5 ммоль/л

☐ 2,6 – 3,2 ммоль/л

☒ 3,3 – 5,5 ммоль/л

☐ 8,2 – 9,5 ммоль/л

255. Выберите единственно правильный ответ

Распространенность отека при отеке Квинке

☐ губы, щеки

☐ губы, щеки, уши

☒ губы, щеки, уши, гортань

☐ губы, щеки, уши, шея

256. Выберите единственно правильный ответ

Аллергический ринит и аллергический конъюнктивит – это заболевания, которые

☒ всегда сопутствуют друг другу

☐ не связаны друг с другом

☐ развиваются одно после другого

☐ развиваются после атопического дерматита

257. Выберите единственно правильный ответ

Аллергия на пыль у ребенка исключает

☒ участие в уборке помещения

☐ игры на улице

☐ посещение детского сада

☐ учебу в школе

258. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее важный элемент в лечении аллергии

☒ выявление вещества, вызывающего аллергию у ребенка

☐ назначение комплексного лечения

☐ назначение физиотерапии

☐ назначение антигистаминных препаратов

259. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма у детей характеризуется

☒ периодически возникающими приступами удушья вследствие бронхоспазма, гиперсекреции слизи и отека слизистой оболочки бронхов

☐ периодически возникающими приступами затрудненного дыхания

☐ постоянными приступами удушья вследствие бронхоспазма

☐ бронхоспазмом и отеком слизистой оболочки бронхов

260. Выберите единственно правильный ответ

Вынужденное положение при приступе бронхиальной астмы у ребенка

- ☐ лежа в постели
- ☒ сидя, опираясь на руки
- ☐ сидя, запрокинув голову назад
- ☐ лежа, прижав ноги к животу

261. Выберите единственно правильный ответ

Аллергены являющиеся причиной поллинозов

- ☒ пыльцевые
- ☐ белковые
- ☐ пищевые
- ☐ эпидермальные

262. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при обструктивном бронхите у детей

- ☐ кашель
- ☒ одышка
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ тахикардия

263. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при остром бронхите у детей

- ☒ кашель
- ☐ одышка
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ тахикардия

264. Выберите единственно правильный ответ

Гипертоксической форма течения заболевания бывает

- ☐ при риновирусной инфекции
- ☒ при гриппе
- ☐ при аденовирусной инфекции
- ☐ при парагриппе

265. Выберите единственно правильный ответ

Обязательное назначение детям при ОРВИ

- ☒ постельный режим
- ☐ витамины
- ☐ антибиотики
- ☐ антипиретики

266. Выберите единственно правильный ответ

Препараты, используемые для снижения температуры при ОРВИ у детей

- ☒ парацетамол и ибупрофен
- ☐ анальгин
- ☐ аспирин
- ☐ амидопирин

267. Выберите единственно правильный ответ

Важный компонент ухода за детьми, больными пневмонией

- ☐ строгий покой
- ☐ положение лежа на животе
- ☒ возвышенное положение головы, частая смена положения тела
- ☐ возвышенное положение ног, строгий покой

268. Выберите единственно правильный ответ

Стенозирующий ларингит наиболее часто развивается

- ☒ при вирусных и бактериальных инфекциях
- ☐ при атопии
- ☐ при грибковых инфекциях
- ☐ при протозойных инфекциях

269. Выберите единственно правильный ответ

Клинические проявления стенозирующего ларингита

- ☒ осиплость голоса, грубый лающий кашель, развитие дыхательной недостаточности
- ☐ тихий голос, непродуктивный кашель, развитие дыхательной недостаточности
- ☐ осиплость голоса, влажный кашель, развитие дыхательной недостаточности
- ☐ влажный кашель, развитие дыхательной недостаточности

270. Выберите единственно правильный ответ

Положение, которое необходимо принять ребенку при остром стенозирующем ларинготрахеите

- ☐ сидя
- ☐ стоя
- ☒ лежа с приподнятым головным концом
- ☐ лежа с приподнятыми ногами

271. Выберите единственно правильный ответ

Аппарат небулайзер применяется

- ☒ для проведения ингаляций
- ☐ для контроля дыхания ребенка
- ☐ для измерения объема вдоха
- ☐ для измерения объема выдоха

272. Выберите единственно правильный ответ

Продукты, прием которых должен быть ограничен при заболеваниях почек в питании ребенка

- ☐ каши, хлебо - булочные изделия
- ☐ овощи, фрукты
- ☒ острые, соленые блюда, пряности, жидкости
- ☐ сладости

273. Выберите единственно правильный ответ

Физические и эмоциональные нагрузки у детей с заболеваниями почек могут привести

- ☐ к снижению артериального давления, усилению болевого синдрома
- ☐ к снижению артериального давления, увеличению диуреза
- ☒ к повышению артериального давления, усилению болевого синдрома
- ☐ к выздоровлению пациента

274. Выберите единственно правильный ответ

Локализация отеков при остром гломерулонефрите в начале заболевания

- ☐ на ногах
- ☐ на передней брюшной стенке
- ☒ на лице
- ☐ на пояснице

275. Выберите единственно правильный ответ

Диета при заболеваниях почек для восстановления нормального функционирования подразумевает

- ☒ ограничение поваренной соли, жидкости и животного белка
- ☐ увеличение поваренной соли, жидкости и животного белка
- ☐ ограничение жиров, жидкости и животного белка
- ☐ ограничение поваренной соли, углеводов и животного белка

276. Выберите единственно правильный ответ

Порция мочи, необходимая для анализа по Нечипоренко

- ☐ суточная моча
- ☐ моча за 12 часов
- ☐ разовая порция мочи из первой струи
- ☒ разовая порция мочи из средней струи

277. Выберите два правильных варианта ответа

Моча для пробы по Зимницкому собирается

- ☐ в течение 3 часов
- ☐ в течение 12 часов
- ☒ в течение суток
- ☒ каждые 3 часа
- ☐ каждые 6 часов

278. Выберите три правильных варианта ответа

Характерные признаки почечных отеков

- ☒ появление утром
- ☐ появление вечером
- ☒ появление в первую очередь на лице
- ☐ появление в первую очередь на ногах
- ☒ теплые, бледные
- ☐ холодные, цианотичные

279. Выберите единственно правильный ответ

Энурез - это

- ☐ задержка мочеиспускания
- ☒ недержание мочи во время сна
- ☐ недержание мочи во время бодрствования
- ☐ учащение мочеиспускания

280. Выберите единственно правильный ответ

Полное прекращение выделения мочи

- ☐ острая задержка мочи
- ☒ анурия
- ☐ олигурия
- ☐ полиурия

281. Выберите единственно правильный ответ

Оптимальное количество лейкоцитов в 1 мм³ мочи, при котором моча считается инфицированной

- ☐ 1-4
- ☒ 5-10
- ☐ 11-20
- ☐ 21-30

282. Выберите единственно правильный ответ

Гематурия – это увеличение содержания в моче

- ☒ эритроцитов
- ☐ лейкоцитов и эритроцитов
- ☐ лейкоцитов
- ☐ гиалиновых цилиндров

283. Выберите единственно правильный ответ

Лейкоцитурия – это увеличение в моче

- ☐ эритроцитов
- ☐ лейкоцитов и эритроцитов
- ☒ лейкоцитов
- ☐ гиалиновых цилиндров

284. Выберите два правильных ответа

Дети группы риска по сахарному диабету

- ☒ дети с наследственной отягощенностью
- ☐ недоношенные

- ☐ с аномалией конституции

- ☐ с гипотрофией

- ☒ дети с избыточным весом

285. Выберите два правильных ответа

Активную иммунизацию против кори проводят детям

- ☒ живой коревой вакциной
- ☐ человеческим иммуноглобулином
- ☐ туберкулином
- ☐ аскорбиновой кислотой
- ☒ тривакциной

286. Выберите два правильных ответа

Детям с лейкозом, особое внимание при уходе уделяют

- ☐ лечебной физкультуре
- ☒ санитарно-эпидемиологическому режиму
- ☐ диетотерапии
- ☐ режиму дня
- ☒ строгий приём лекарственных препаратов

287. Выберите два правильных ответа

Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться

- ☐ детским травматологом
- ☒ гематологом специализированного центра
- ☐ детским хирургом
- ☐ главным врачом поликлиники
- ☒ участковым педиатром

288. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи вирусного гепатита В

- ☐ алиментарный путь
- ☒ парентеральный путь
- ☐ водный путь
- ☐ воздушно – капельный путь

289. Выберите единственно правильный ответ

Описторхоз поражает

- ☐ тонкий и толстый кишечник
- ☐ двенадцатиперстную кишку и толстый кишечник
- ☒ желчевыводящие пути, двенадцатиперстную кишку
- ☐ желудок и тонкий кишечник

290. Выберите единственно правильный ответ

Проба мочи по Нечипоренко это

- ☐ определение количества форменных элементов в моче за 1 минуту
- ☐ определение количества форменных элементов в суточной моче
- ☒ определение количества форменных элементов в 1 мл мочи
- ☐ определение количества форменных элементов в моче за 1 час

291. Выберите единственно правильный ответ

Проба, используемая для оценки концентрационной функции почек

- ☐ Нечипоренко
- ☐ Каковского-Аддиса
- ☒ Зимницкого
- ☐ Амбурже

292. Выберите единственно правильный ответ

Прием жидкости при пиелонефрите

- ☐ ограничивается
- ☐ отменяется
- ☒ повышается
- ☐ не изменяется

293. Выберите единственно правильный ответ

Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом сопровождается

- ☐ лейкоцитурией, гематурией и протеинурией
- ☒ гематурией, протеинурией и гипертонией
- ☐ протеинурией, гипертонией и гиперлипидемией
- ☐ лейкоцитурией, гиперлипидемией

294. Выберите единственно правильный ответ

Отеки при остром гломерулонефрите с нефритическим синдромом

- ☒ распространенные
- ☐ локальные
- ☐ метастатические
- ☐ отсутствуют

295. Выберите единственно правильный ответ

Отеки при остром гломерулонефрите

- ☒ нарастают к утру
- ☐ нарастают к вечеру
- ☐ не изменяются в течение дня
- ☐ не появляются

296. Выберите единственно правильный ответ

Дети, перенесшие гломерулонефрит, наблюдаются

- ☐ в течение 1 года
- ☐ в течение 3 лет
- ☐ в течение 5 лет

- ☒ до перевода во взрослую поликлинику

297. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая причина развития острого гломерулонефрита

- ☐ вирусная инфекция
- ☐ стафилококковая инфекция
- ☒ стрептококковая инфекция
- ☐ грамотрицательная инфекция

298. Выберите единственно правильный ответ

Повышение артериального давления у большинства детей с острым гломерулонефритом

- ☒ незначительное и кратковременное
- ☐ незначительное, но длительное
- ☐ злокачественное и длительное
- ☐ злокачественное, но кратковременное

299. Выберите два правильных варианта ответа

Продукты, исключаемые из рациона при оксалурии

- ☒ смородина
- ☒ щавель
- ☐ яйца
- ☐ молоко
- ☐ мясо

300. Выберите единственно правильный ответ

Рацион питания при оксалурии исключает употребление продуктов, содержащих

- ☐ пурины
- ☒ аскорбиновую кислоту
- ☐ триптофан
- ☐ метионин

3. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации

301. Выберите единственно правильный ответ

Питательный режим при обменных нефропатиях

- ☐ ограничивают
- ☐ не изменяют
- ☒ увеличивают
- ☐ резкое ограничение

302. Выберите единственно правильный ответ

Гипотиреоз у детей, это синдром недостаточности функциональной активности

- ☒ щитовидной железы
- ☐ паращитовидных желез
- ☐ вилочковой железы
- ☐ надпочечников

303. Выберите единственно правильный ответ

Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к развитию комы

- ☐ гипергликемической (диабетической)
- ☒ гипогликемической
- ☐ печеночной
- ☐ уремической

304. Выберите единственно правильный ответ

Важнейший этиологический фактор сахарного диабета у детей

- ☐ переохлаждение
- ☐ перегревание

- ☐ избыточный прием белков

- ☒ наследственная отягощенность

305. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы сахарного диабета у детей

- ☒ полифагия, полидипсия, полиурия
- ☐ лихорадка, кашель с мокротой
- ☐ боль в пояснице, отеки
- ☐ тахикардия, тремор, экзофтальм

306. Выберите единственно правильный ответ

Не диагностированный сахарный диабет у детей ведет к развитию комы

- ☒ кетоацидотической
- ☐ гипогликемической
- ☐ печеночной
- ☐ уремической

307. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи дифтерии

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ алиментарный
- ☐ половой
- ☐ вертикальный

308. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая форма дифтерии – дифтерия

- ☒ зева
- ☐ носа

☐ гортани

☐ кожи

309. Выберите единственно правильный ответ

Характер налетов на миндалинах при дифтерии зева

☐ гнойные

☐ некротические

☐ гнойно - некротические

☒ фибринозные

310. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятие, которое необходимо провести в очаге дифтерии после изоляции больного

☐ текущую дезинфекцию

☒ заключительную дезинфекцию

☐ влажную уборку

☐ проветривание

311. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при дифтерии

☒ больной и носитель токсигенных бактерий дифтерии

☐ больной легкой ангиной

☐ носитель нетоксических бактерий дифтерии

☐ больное животное

312. Выберите единственно правильный ответ

Бактериологическое исследование на дифтерию проводится путем взятия

☒ мазка из носа и зева

☐ мазка с конъюнктивы

☐ мазка с задней стенки глотки

☐ мазка с небных миндалин

313. Выберите единственно правильный ответ

Режим питания ребенка при хроническом гастрите

☒ 4–5-разовое питание малыми порциями

☐ 2–3-разовое питание малыми порциями

☐ водно-чайная пауза

☐ питание по потребности

314. Выберите единственно правильный ответ

Психоэмоциональные нагрузки при заболеваниях желудка у детей

☒ способствуют развитию обострений и осложнений

☐ не способствуют развитию обострений и осложнений

☐ не имеют значения

☐ положительно влияют на течение заболевания

315. Выберите единственно правильный ответ

Диета при гипертоническом типе дискинезии желчевыводящих путей

☒ с исключением продуктов, усиливающих образование желчи и раздражающих желчные пути

☐ с исключением продуктов, уменьшающих раздражение воспаленной слизистой желудка

☐ с уменьшением количества углеводов

☐ с уменьшением количества белка

316. Выберите единственно правильный ответ

Нарушение диеты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

☐ не влияет на течение заболевания

☒ может спровоцировать обострение болевого синдрома

☐ может вызвать кровотечение

☐ может вызвать рвоту

317. Выберите единственно правильный ответ

Функционально выгодное положение ребенка при рвоте

☐ усадить на стул

☒ уложить с возвышенным головным концом, голову повернуть набок

☐ уложить с опущенным головным концом, голову повернуть набок

☐ уложить на горизонтальную поверхность, поднять ноги

318. Выберите единственно правильный ответ

Действия медсестры после рвоты у ребенка

☒ прополоскать ему рот кипяченой водой, применить водно-чайную паузу на 2–4 часа, направить рвотные массы в лабораторию

☐ быстро накормить ребенка

☐ при необходимости направить рвотные массы в лабораторию

☐ уложить ребенка в постель

319. Выберите единственно правильный ответ

Метеоризм – это

☐ вздутие живота скопившимися в кишечнике каловыми массами

☐ вздутие живота скопившейся в животе жидкостью

☒ вздутие живота скопившимися в животе газами

☐ втяжение живота при обезвоживании

320. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи вирусного гепатита В

☐ алиментарный путь

☒ парентеральный путь

☐ водный путь

☐ воздушно – капельный путь

321. Выберите единственно правильный ответ

Описторхоз поражает

☐ тонкий и толстый кишечник

☐ двенадцатиперстную кишку и толстый кишечник

☒ желчевыводящие пути, двенадцатиперстную кишку

☐ желудок и тонкий кишечник

322. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая форма дифтерии – дифтерия

☒ зева

☐ носа

☐ гортани

☐ кожи

323. Выберите единственно правильный ответ

Неотложную помощь при приступе БА у детей следует начинать с введения

☒ сальбутамола

☐ ипратропиума бромида

☐ эуфиллина

☐ преднизолона

324. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы у ребенка

- ☐ провести оксигенотерапию
- ☐ ввести бронхолитики
- ☒ освободить от стесняющей одежды
- ☐ ввести глюкокортикоиды

325. Выберите единственно правильный ответ

Соскоб с перианальных складок проводится для диагностики у детей

- ☐ лямблиоза
- ☒ энтеробиоза
- ☐ эшерихиоза
- ☐ аскаридоза

326. Выберите единственно правильный ответ

Желчегонный препарат, применяемый у детей

- ☐ омепразол
- ☒ оксафенамид
- ☐ оксациллин
- ☐ ортофен

327. Выберите единственно правильный ответ

Для диагностики язвенной болезни и 12-перстной кишки ребёнку проводится

- ☐ УЗИ органов брюшной полости
- ☐ анализ на скрытую кровь
- ☒ ФГДС
- ☐ дуоденальное зондирование

328. Выберите единственно правильный ответ

Группы препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
- ☒ антиретровирусные
- ☐ симптоматические
- ☐ гормональные

329. Выберите единственно правильный ответ

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
- ☐ для выявления ВИЧ
- ☒ для тестирования при аварийных ситуациях
- ☐ для ранней диагностики

330. Выберите единственно правильный ответ

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

331. Выберите единственно правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

332. Выберите единственно правильный ответ

При желудочно-кишечном кровотечении у ребёнка медсестра в первую очередь обеспечит

- ☒ экстренную транспортировку в стационар

☐ промывание желудка раствором аминокaproновой кислоты

- ☐ проведение гемостатической терапии
- ☐ направление на ФГДС

333. Выберите единственно правильный ответ

Сорбент, применяемый у детей

- ☐ мотилиум
- ☐ кларитромицин
- ☒ смекта
- ☐ тетрациклин

334. Выберите единственно правильный ответ

Антацид, применяемый у детей в старшем возрасте

- ☐ анальгин
- ☐ ампициллин
- ☒ альмагель
- ☐ аминазин

335. Выберите единственно правильный ответ

Для диагностики язвенной болезни и 12-перстной кишки ребёнку проводится

- ☐ УЗИ органов брюшной полости
- ☐ анализ на скрытую кровь
- ☒ ФГДС
- ☐ дуоденальное зондирование

336. Выберите единственно правильный ответ

Для копрологического исследования у детей берут кал

- ☐ утром натощак
- ☐ после очистительной клизмы
- ☐ стерильной петлей
- ☒ из разных мест при самостоятельной дефекации

337. Выберите единственно правильный ответ

Антибактериальная (противовоспалительная) терапия должна проводиться с учетом

- ☐ возраста ребенка
- ☐ тяжести заболевания
- ☒ верно всё
- ☐ массы тела

338. Выберите единственно правильный ответ

ЭКГ-исследование проводится

- ☒ после 10-15 минут отдыха
- ☐ после физической нагрузки
- ☐ после сна
- ☐ после еды

339. Выберите единственно правильный ответ

При ЭКГ-исследовании оценивают

- ☒ регулярность и частоту сердечных сокращений
- ☐ шумы в сердце
- ☐ тоны сердца
- ☐ скорость кровотока

340. Выберите единственно правильный ответ

Фонокардиография позволяет оценить

- ☒ характеристику тонов
- ☐ структуру сердца
- ☐ скорость кровотока
- ☐ регулярность и частоту сердечных сокращений

341. Выберите единственно правильный ответ

Допплерография позволяет оценить

- ☒ скорость кровотока
- ☐ шумы в сердце

- ☐ тоны сердца
 - ☐ регулярность и частоту сердечных сокращений
- 342. Выберите единственно правильный ответ**
При измерении артериального давления манжетка должна находиться на уровне

- ☒ сердца
- ☐ головы
- ☐ кушетки
- ☐ живота

343. Выберите два правильных ответа

При лечении синдрома недостаточности кровообращения используются препараты следующих групп

- ☒ сердечные гликозиды
- ☒ диуретики
- ☐ антигистаминные
- ☐ антибиотики
- ☐ витамины

344. Выберите два правильных ответа

В план обследования при подозрении на ревматизм входят

- ☒ общий анализ крови
- ☒ биохимический анализ крови
- ☐ биохимический анализ мочи
- ☐ фракционное дуоденальное зондирование
- ☐ доплерография

345. Выберите единственно правильный ответ

Лечение атаки ревматизма с явлениями кардита обязательно включает

- ☒ антибактериальные препараты пенициллинового ряда
- ☐ витамины
- ☐ седативные препараты
- ☐ антигистаминные

346. Выберите два правильных ответа

Наиболее эффективные средства для купирования анафилактического шока у ребенка

- ☒ адреналин
- ☒ преднизолон
- ☐ димедрол
- ☐ актовегин
- ☐ пенициллин

347. Выберите единственно правильный ответ

Передавать персональные данные третьим лицам можно в случае

- ☒ письменного согласия работника
- ☐ без согласия работника
- ☐ по устному разрешению
- ☐ по согласованию с администрацией

348. Выберите единственно правильный ответ

Должностные инструкции это

- ☐ свод законов
- ☐ локальный акт
- ☐ служебная записка
- ☒ документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника

349. Выберите единственно правильный ответ

Должностным преступлением является

- ☐ злоупотребление властью или служебным положением
- ☒ халатность
- ☐ оскорбление
- ☐ клевета

350. Выберите три правильных ответа

Требованием к современным послеоперационным повязкам является

- ☒ стерильность
- ☐ эстетичность
- ☐ удобство наложения
- ☒ хорошие сорбционные свойства
- ☒ гипоаллергенность

351. Выберите единственно правильный ответ

Для определения уровня квалификации специалиста и присвоения квалификационной категории проводится процедура

- ☒ аттестация
- ☐ сертификация
- ☐ аккредитация
- ☐ лицензирование
- ☐ освидетельствование

352. Выберите три правильных ответа

Цель современной фиксирующей повязки при катетеризации периферических вен

- ☒ защита места пункции от проникновения инфекции
- ☐ возможность движения катетера
- ☒ фиксация катетера
- ☒ возможность визуального контроля места пункции
- ☐ эстетичность

353. Выберите единственно правильный ответ

Главной причиной ИСМП (инфекций, связанных с медицинской помощью) является

- ☒ руки персонала
- ☐ медицинская аппаратура
- ☐ предметы ухода
- ☐ заболевание пациента

354. Выберите три правильных ответа

Современные требования к средствам по уходу за кожей для профилактики пролежней у пациентов с недержанием мочи

- ☒ отсутствие парникового эффекта
- ☐ поддержание pH для кожи пациента в пределах до 10
- ☒ поддержание кожи в сухом состоянии
- ☒ поддержание pH для кожи пациента в пределах 4,5-5,5

355. Выберите два правильных ответа

Признаки передозировки сердечных гликозидов

- ☐ тахикардия
- ☐ нормокардия
- ☒ тошнота
- ☒ нарушение цветового зрения

356. Выберите единственно правильный ответ

Повышенная чувствительность организма на повторное введение лекарственного вещества называется

- ☐ привыкание
- ☐ пристрастие
- ☐ кумуляция
- ☒ сенсibilизация

357. Выберите единственно правильный ответ

- Эритроцитарная масса применяется с целью
- ☐ увеличения объема циркулирующей крови
 - ☐ парентерального питания
 - ☐ дезинтоксикации
 - ☒ лечения анемии

358. Выберите единственно правильный ответ

- Свежезамороженная плазма размораживается при температуре +37 °С на водяной бане
- ☒ непосредственно перед переливанием
 - ☐ за несколько часов до переливания
 - ☐ за сутки до переливания
 - ☐ срок размораживания значения не имеет

359. Выберите единственно правильный ответ

- Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента
- ☐ Уголовный кодекс
 - ☐ Конституция РФ
 - ☐ Трудовой кодекс
 - ☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

360. Выберите единственно правильный ответ

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании

- ☒ обязательном
- ☐ добровольном
- ☐ возвратном
- ☐ социальном

361. Выберите два правильных ответа

Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное

362. Выберите единственно правильный ответ

Обязательное медицинское страхование

- ☒ всеобщее
- ☐ коллективное
- ☐ групповое
- ☐ индивидуальное

363. Выберите три правильных ответа

Показатели, характеризующие здоровье населения

- ☒ заболеваемость
- ☒ инвалидность
- ☐ уровень медицинской активности населения
- ☐ качество жизни населения
- ☐ уровень жизни населения
- ☒ демографические

Специальность «Сестринское дело в педиатрии» Первая квалификационная категория

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите единственно правильный ответ

Понятие медицинская деонтология включает в себя

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента
- ☒ учение о профессиональном долге

2. Выберите единственно правильный ответ

Внутренняя картина болезни

- ☐ фрустрация
- ☐ апатия
- ☒ реакция пациентов на болезнь
- ☐ депрессия

3. Выберите единственно правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

4. Выберите единственно правильный ответ

Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из окружающей среды

- ☐ невроз
- ☐ лихорадка

- ☐ фобии

- ☒ стресс

5. Выберите единственно правильный ответ

Эвтаназия в России

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

6. Выберите единственно правильный ответ

Нормы поведения в определенных условиях во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

- ☒ деонтология
- ☐ этика
- ☐ биоэтика
- ☐ мораль

7. Выберите единственно правильный ответ

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинской сестры и пациента

- ☐ релаксация
- ☒ эмпатия (сопереживание)
- ☐ психотерапия
- ☐ рефлексия

8. Выберите три правильных ответа

Уровни общения в сестринском деле

- ☐ доверительный
- ☒ общественный
- ☐ убеждающий

- ☒ внутриличностный
- ☒ межличностный
- ☐ избегание

9. Выберите единственно правильный ответ

На медицинскую сестру, обязанность хранить профессиональную тайну распространяется

- ☒ всегда
- ☐ не распространяется
- ☐ по указанию врача
- ☐ иногда

10. Выберите единственно правильный ответ

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- ☐ в условиях стационара
- ☐ только по назначению врача
- ☒ любому человеку, нуждающемуся в ней
- ☐ в условиях поликлиники

11. Выберите единственно правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс
- ☐ медицинский этикет
- ☒ медицинская этика
- ☐ медицинская деонтология

12. Выберите два правильных ответа

Эффективному общению с пациентами и медицинской сестрой способствует

- ☒ положительная обратная связь
- ☐ тревожность пациента
- ☐ замечания медицинской сестры
- ☒ доброжелательность медицинской сестры

13. Выберите единственно правильный ответ

Трагическое переживание болезни у пациента проявляется

- ☒ суицидальными действиями
- ☐ массой жалоб
- ☐ отказом от лечения
- ☐ отказом от обследования

14. Выберите единственно правильный ответ

Конфликты с пациентами у персонала возникают по причине

- ☒ медицинский персонал не учитывает эмоции пациентов
- ☐ нарушения санитарно-эпидемического режима
- ☐ отказа пациента от обследования
- ☐ отказа пациента от лечения

15. Выберите единственно правильный ответ

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- ☐ 0–45 см
- ☒ 45–120 см
- ☐ 120–400 см
- ☐ 400–500 см

16. Выберите три правильных ответа

Агрессивность пациента может вызываться

- ☒ психическими заболеваниями
- ☒ болью и стрессом
- ☒ страхом

- ☐ низким уровнем артериального давления
- ☐ изменением климатических условий

17. Выберите два правильных ответа

Естественные реакции пациентов перед операцией, манипуляциями

- ☒ тревога
- ☒ страх
- ☐ эйфория
- ☐ радость

18. Выберите два правильных ответа

Определение понятия профессиональная тайна

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

19. Выберите единственно правильный ответ

Ятрогенные заболевания обусловлены

- ☐ вредными факторами производства
- ☒ неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболеваниями с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболеваниями наследственного генеза

20. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание туберкулезом является

- ☐ наследственным
- ☒ социальным
- ☐ зоонозным
- ☐ соматическим

21. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем туберкулеза является

- ☐ вирус
- ☐ грибы
- ☒ микобактерия
- ☐ клебсиелла

22. Выберите единственно правильный ответ

Срок жизнеспособности возбудителя туберкулеза в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев

23. Выберите два правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающие заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный

24. Выберите два правильных ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения

- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное

25. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

26. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

27. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

28. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

29. Задание {{ 29 }} ТЗ 29 Тема 2-0-0

Выберите единственно правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный
- ☐ половой
- ☐ случайный

30. Выберите единственно правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

- ☐ контроль состояния больных
- ☐ диагностика туберкулеза
- ☐ предупреждение туберкулеза
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

31. Выберите единственно правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

- ☐ кровохарканье, лихорадка
- ☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка
- ☒ слабость, покашливание, субфебрилитет
- ☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

32. Выберите единственно правильный ответ

Раннему активному выявлению больных туберкулезом среди взрослых способствует

- ☐ массовый осмотр населения
- ☐ рентгеноскопия легких

- ☒ массовое флюорографическое обследование
- ☐ туберкулинодиагностика

33. Выберите единственно правильный ответ

Особенности питания при туберкулезе

- ☐ ограничение поваренной соли
- ☒ рекомендуется диета с повышенным содержанием белка и витаминов
- ☐ рекомендуется диета с повышенным содержанием витаминов и углеводов
- ☐ ограничение копченостей

34. Выберите два правильных ответа

Осложнения при туберкулезе

- ☐ анафилактический шок
- ☒ легочное кровотечение
- ☒ пневмоторакс
- ☐ пневмосклероз

35. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза включает

- ☒ вакцинацию и ревакцинацию против туберкулеза
- ☐ химиопрофилактику контактным лицам
- ☐ проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге
- ☒ раннее выявление больных туберкулезом

36. Выберите единственно правильный ответ

БЦЖ является

- ☒ живой вакциной
- ☐ инактивированной вакциной
- ☐ анатоксин
- ☐ сыворотка

37. Выберите единственно правильный ответ

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

- ☐ А
- ☐ Б
- ☒ В
- ☐ Д
- ☐ Г

38. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- ☐ бактерии
- ☐ микобактерии
- ☒ вирусы
- ☐ кокки

39. Выберите единственно правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире называется

- ☐ вспышка
- ☐ эпидемия
- ☒ пандемия
- ☐ групповые заболевания

40. Выберите единственно правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

- ☒ нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ☐ ультрафиолетовое облучение
- ☐ низкая температура
- ☐ воздействие радиации

41. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем ВИЧ-инфекции является

- ☐ цитомегаловирус
- ☒ ретровирус
- ☐ флавивирус
- ☐ пикорнавирус

42. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- ☐ больной гриппом человек
- ☐ больное животное
- ☐ больные птицы
- ☒ человек с момента заражения

43. Выберите единственно правильный ответ

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- ☐ аденовирусов
- ☒ ретровирусов
- ☐ энтеровирусов
- ☐ пикорнавирусов

44. Выберите единственно правильный ответ

Источник заражения ВИЧ-инфекцией

- ☒ зараженный человек
- ☐ домашнее животное
- ☐ комары
- ☐ клещи

45. Выберите единственно правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- ☐ слюна
- ☐ слезная жидкость
- ☒ кровь
- ☐ спинномозговая жидкость

46. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

- ☒ артифициальный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ трансмиссивный

47. Выберите единственно правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

48. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

49. Выберите два правильных ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- ☐ через рукопожатия
- ☐ через прикосновения
- ☐ через укусы насекомых
- ☒ при половых контактах
- ☒ при гемотрансфузии

50. Выберите два правильных ответа

Существует риск заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери

- ☒ при грудном вскармливании
- ☒ во время родов
- ☐ при уходе за ребенком
- ☐ при поцелуях
- ☐ через дыхание

51. Выберите единственно правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

52. Выберите единственно правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

53. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

- ☒ кровь
- ☐ секрет потовых желез
- ☐ моча
- ☒ сперма
- ☒ грудное молоко
- ☐ кал

54. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ-инфекции поражается

- ☐ костная система
- ☒ иммунная система
- ☐ мышечная система
- ☐ сердечно-сосудистая система

55. Выберите единственно правильный ответ

Латентная стадия ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☐ длительной лихорадкой
- ☐ увеличением печени, селезенки
- ☒ увеличением лимфоузлов
- ☐ вторичными заболеваниями

56. Выберите единственно правильный ответ

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

57. Выберите единственно правильный ответ

Длительность вирусоносительства при ВИЧ-инфекции

- ☐ от 2 недель до 6 месяцев
- ☐ до 5 лет
- ☐ до 15 лет

☒ пожизненно

58. Выберите единственно правильный ответ

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) является

- ☒ стадией ВИЧ-инфекции
- ☐ самостоятельным заболеванием
- ☐ синонимом ВИЧ-инфекции
- ☐ осложнением ВИЧ-инфекции

59. Выберите единственно правильный ответ

Группы препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
- ☒ антиретровирусные
- ☐ симптоматические
- ☐ гормональные

60. Выберите единственно правильный ответ

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
- ☐ для выявления ВИЧ
- ☒ для тестирования при аварийных ситуациях
- ☐ для ранней диагностики

61. Выберите единственно правильный ответ

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

62. Выберите единственно правильный ответ

Контингентом с наибольшим риском заражения ВИЧ являются

- ☐ дети
- ☒ наркоманы
- ☐ беременные
- ☐ доноры
- ☐ реципиенты крови

63. Выберите единственно правильный ответ

Для диагностики ВИЧ-инфекции у больного берут

- ☐ кал
- ☐ мочу
- ☒ кровь
- ☐ желчь

64. Выберите единственно правильный ответ

Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является

- ☒ серологический
- ☐ генетический
- ☐ люминесцентный
- ☐ бактериологический

65. Выберите единственно правильный ответ

Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 1 сутки

☐ 3 суток

66. Выберите единственно правильный ответ

Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

67. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее эффективной мерой профилактики ВИЧ-инфекции среди населения является

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

68. Выберите три правильных ответа

Терминальными состояниями являются

- ☒ преагония
- ☒ агония
- ☒ клиническая смерть
- ☐ биологическая смерть
- ☐ коллапс
- ☐ шок

69. Выберите три правильных ответа

Признаками клинической смерти является

- ☐ угнетение сознания
- ☒ отсутствие сознания, широкие зрачки
- ☒ отсутствие дыхания
- ☒ отсутствие кровообращения
- ☐ наличие сознания
- ☐ широкие зрачки

70. Выберите единственно правильный ответ

Длительность реанимационных мероприятий при их неэффективности

- ☐ 60 минут
- ☒ 30 минут
- ☐ 40 минут
- ☐ 20 минут

71. Выберите единственно правильный ответ

Реанимационные мероприятия начинаются

- ☐ с непрямого массажа сердца
- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей
- ☐ не имеет значения, с чего начинаются реанимационные мероприятия
- ☒ с укладывания на ровную и твердую поверхность

72. Выберите единственно правильный ответ

При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в верхней трети грудины
- ☒ в средней трети грудины

73. Выберите единственно правильный ответ

Сочетание компрессий и вдуваний при проведении реанимационных мероприятий

- ☐ 10:1
- ☐ 5:2
- ☒ 30:2
- ☐ 15:2

74. Выберите три правильных ответа

Клиническими признаками коллапса является

- ☐ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание
- ☒ слабый, частый пульс
- ☐ брадикардия
- ☐ тахипноэ
- ☒ резкое снижение артериального давления

75. Выберите единственно правильный ответ

Нижняя граница систолического артериального давления для применения нитроглицерина

- ☒ 100 мм рт. ст.
- ☐ 90 мм рт. ст.
- ☐ 110 мм рт. ст.
- ☐ 80 мм рт. ст.

80. Выберите единственно правильный ответ

При оказании неотложной помощи при обмороке, пациенту придают следующее положение

- ☐ горизонтальное
- ☒ горизонтальное с опущенной головой и приподнятыми ногами
- ☐ полусидя
- ☐ горизонтальное с приподнятой головой

81. Выберите единственно правильный ответ

Купирование анафилактического шока начинается с введения

- ☒ адреналина
- ☐ полиглюкина
- ☐ димедрола
- ☐ преднизолона

82. Выберите единственно правильный ответ

Для купирования анафилактического шока адреналин разводят физиологическим раствором в следующем соотношении

- ☐ 1 : 5
- ☐ 1 : 1
- ☐ 1 : 20
- ☒ 1 : 10

83. Выберите единственно правильный ответ

Для коматозного состояния наиболее характерным является следующий симптом

- ☐ угнетение сознания
- ☒ отсутствие сознания
- ☐ угнетение сердечной деятельности
- ☐ угнетение дыхания

84. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипогликемической комы является

- ☒ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

85. Выберите единственно правильный ответ

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения

- ☒ 40% раствор глюкозы
- ☐ 5% раствор глюкозы
- ☐ гемодез
- ☐ инсулин

86. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипергликемической комы является

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная холодная, одышка, зрачки различной величины
- ☒ сознание отсутствует, кожа сухая, гиперемированная, дыхание шумное типа Куссмауля
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

87. Выберите единственно правильный ответ

Промывание желудка в коме проводят

- ☐ без интубации трахеи
- ☒ после интубации трахеи
- ☐ не имеет значения
- ☐ не проводят

88. Выберите единственно правильный ответ

Отек легких относится

- ☐ к острой правожелудочковой недостаточности
- ☐ к острой бивентрикулярной недостаточности
- ☒ к острой левожелудочковой недостаточности
- ☐ к острой предсердной недостаточности

89. Выберите два правильных ответа

Пациенту с носовым кровотечением следует придать положение

- ☒ усадить
- ☐ уложить
- ☐ голову запрокинуть
- ☒ голову опустить
- ☐ не имеет значения

90. Выберите единственно правильный ответ

Последовательность действий при остром лекарственном отравлении

- ☒ промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма
- ☐ прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма
- ☐ очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка
- ☐ промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

91. Выберите единственно правильный ответ

При отморожении мягких тканей, в качестве неотложной помощи в до реактивного периода рекомендуется

- ☐ легкое постепенное согревание
- ☐ активное согревание пораженных участков

- ☒ наложение термоизолирующей повязки
- ☐ обработка отмороженных участков спиртом

92. Выберите три правильных ответа

Беззондовый метод промывания желудка противопоказан при

- ☒ судорожном синдроме
- ☒ отравлении прижигающими ядами
- ☒ отсутствии сознания
- ☐ отравлении не прижигающими ядами
- ☐ отравлении не прижигающими ядами и сохраненном сознании

93. Выберите два правильных ответа

При отравлении угарным газом необходимо

- ☒ вывести пострадавшего из зараженной зоны
- ☐ провести непрямой массаж сердца
- ☐ провести искусственное дыхание
- ☐ введение лекарственных препаратов
- ☒ провести оксигенацию легких

94. Выберите единственно правильный ответ

Основной механизм развития геморрагического шока

- ☒ уменьшение объема циркулирующей крови
- ☐ сердечная недостаточность
- ☐ парез сосудов
- ☐ плазмопотеря

95. Выберите единственно правильный ответ

Тройной прием Сафара применяют

- ☐ для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- ☐ для проведения прекардиального удара
- ☐ для интубации трахеи

96. Выберите три правильных ответа

Критериями правильного наложения кровоостанавливающего жгута является

- ☒ остановка кровотечения
- ☒ отсутствие пульса ниже жгута
- ☐ цианоз конечности
- ☒ бледность конечности
- ☐ цианоз лица

97. Выберите три правильных ответа

Клиническими признаками обморока является

- ☒ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание
- ☐ слабый, частый пульс
- ☒ редкий, слабый пульс
- ☐ цианоз конечностей

98. Выберите единственно правильный ответ

Внезапная кардиальная смерть чаще развивается вследствие

- ☒ фибрилляции желудочков сердца
- ☐ остановки дыхания
- ☐ асистолии желудочков сердца
- ☐ электромеханической диссоциации

99. Выберите единственно правильный ответ

Максимальная продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет

- ☐ 2 часа

- ☐ 4 часа

- ☐ 3 часа

- ☒ 30 минут

100. Выберите два правильных ответа

При травме позвоночника пострадавшего транспортируют в положении

- ☐ полусидя
- ☒ на спине и на щите
- ☒ на носилках, на животе
- ☐ на спине
- ☐ в положении лягушки
- ☐ в положении Фаулера

101. Выберите единственно правильный ответ

При поверхностных ожогах оказание помощи начинают

- ☐ с наложения повязки
- ☒ с охлаждения ожога холодной проточной водой
- ☐ с обработки ожога спиртом
- ☐ с обезболивания

102. Выберите единственно правильный ответ

Для промывания желудка температура воды составляет

- ☐ +37 °C
- ☐ +25 °C
- ☒ +18 °C
- ☐ +10 °C

103. Выберите единственно правильный ответ

При отравлении уксусной эссенцией промывание желудка проводится

- ☐ теплой водой
- ☐ холодной водой
- ☒ после обезболивания и введения атропина
- ☐ слабым раствором соды

104. Выберите два правильных ответа

Специфическими признаками перелома кости конечности является

- ☐ боль
- ☐ отек
- ☒ патологическая подвижность отломков в месте перелома
- ☐ деформация
- ☒ крепитация в месте перелома

105. Выберите три правильных ответа

Признаками биологической смерти являются

- ☒ помутнение и высыхание роговицы
- ☐ отсутствие кровообращения
- ☐ отсутствие дыхания
- ☒ симптом «Кошачий глаз»
- ☒ трупное окоченение
- ☐ отсутствие сознания

106. Выберите единственно правильный ответ

Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является

- ☐ введение антигистаминных препаратов
- ☒ введение адреналина и глюкокортикоидов
- ☐ наложение жгута выше места инъекции
- ☐ восполнение объема циркулирующей крови

107. Выберите единственно правильный ответ

Основными мероприятиями при открытом переломе являются

- ☐ восполнение объема циркулирующей крови, введение адреналина
- ☒ остановка кровотечения, обезболивание, иммобилизация
- ☐ введение сердечных гликозидов, гепарина
- ☐ иммобилизация, обезболивание

108. Выберите два правильных ответа

Причинами развития анафилактического шока являются

- ☒ снижение тонуса сосудов
- ☒ снижение объема циркулирующей крови
- ☐ сердечная недостаточность
- ☐ болевой синдром
- ☐ дыхательная недостаточность

109. Выберите единственно правильный ответ

Пациенту придается устойчивое боковое положение для предупреждения

- ☒ аспирации рвотными массами
- ☐ шока
- ☐ ларингоспазма
- ☐ бронхоспазма

110. Выберите два правильных ответа

Критериями эффективности реанимации является

- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет, усиление цианоза кожи
- ☐ отсутствие дыхательных движений
- ☐ расширение зрачков
- ☒ восстановление сердечной деятельности и дыхания
- ☒ положительная реакция сужения зрачков на свет, уменьшение цианоза

111. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности

- ☐ 1 час
- ☐ 30 минут
- ☐ 2 часа
- ☒ до восстановления жизнедеятельности

112. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии

- ☐ до 3–4 минут
- ☐ до 10–12 минут
- ☐ до 2–3 минут
- ☒ до 5–6 минут

113. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее эффективным препаратом при бронхоспазме является

- ☐ пипольфен
- ☐ но-шпа
- ☐ атропин
- ☒ эуфиллин

114. Выберите три правильных ответа

При желудочном кровотечении необходимы мероприятия

- ☐ тепло на область желудка
- ☐ обезболивание

- ☒ горизонтальное положение
- ☒ холод на область желудка
- ☒ экстренная госпитализация

115. Выберите три правильных ответа

Наиболее характерными проблемами у пациента с сотрясением головного мозга являются

- ☐ падение артериального давления
- ☒ головная боль
- ☒ тошнота, рвота
- ☐ очаговые неврологические симптомы
- ☒ кратковременная потеря сознания

116. Выберите единственно правильный ответ

При явлениях острой сосудистой недостаточности больному необходимо придать положение

- ☐ сидя
- ☒ горизонтальное положение с опущенной головой и приподнятыми ногами
- ☐ полусидячее
- ☐ горизонтальное с приподнятой головой и опущенными ногами

117. Выберите единственно правильный ответ

При переломе костей средней трети голени необходимо зафиксировать

- ☐ 1 сустав
- ☒ 2 сустава
- ☐ 3 сустава
- ☐ не имеет значения

118. Выберите единственно правильный ответ

Из перечисленных препаратов наиболее часто вызывают развитие анафилактического шока

- ☐ гормональные препараты
- ☒ местные анестетики
- ☐ антигистаминные препараты
- ☐ сердечные гликозиды

119. Выберите два правильных ответа

Временный гемостаз осуществляется при помощи

- ☐ лигирования сосуда в ране
- ☐ наложения сосудистого шва
- ☒ жгута
- ☒ пальцевого прижатия
- ☐ диатермокоагуляции

120. Выберите два правильных ответа

При попадании прижигающего яда на кожу или слизистые оболочки, активная детоксикация проводится

- ☒ к промыванию пораженных участков большим количеством проточной воды
- ☐ к промыванию пораженных участков большим количеством нейтрализующих растворов
- ☒ к наложению на пораженные участки сухих асептических повязок
- ☐ к наложению на пораженные участки мазевых повязок с нейтрализующим эффектом
- ☐ к наложению на пораженные участки гелевых повязок с нейтрализующим эффектом

121. Выберите два правильных ответа

Мероприятия по удалению инородных тел из трахеи при обтурационной асфиксии на догоспитальном этапе

- ☐ ларингоскопия, интубация трахеи
- ☐ искусственная вентиляция легких
- ☐ коникотомия, искусственная вентиляция легких
- ☒ удар ладонью по спине
- ☒ компрессия в эпигастрии

122. Выберите единственно правильный ответ

Поздним признаком биологической смерти является

- ☐ остановка дыхания
- ☐ зрачок не реагирует на свет, максимально расширен
- ☐ отсутствие роговичного рефлекса
- ☒ гипостатические пятна в отлогих местах тела, трупное окоченение

123. Выберите три правильных ответа

Причины гипогликемической комы

- ☒ голодание
- ☒ физическая перегрузка
- ☒ передозировка инсулина
- ☐ прием пищи богатой углеводами
- ☐ прием пищи богатой жирами
- ☐ прием пищи богатой витаминами

124. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее ранний признак эффективности сердечно-легочной реанимации

- ☒ сужение зрачков
- ☐ появление пульса на сонной артерии
- ☐ повышение артериального давления до 60–70 мм рт. ст.
- ☐ появление дыхательных движений

125. Выберите единственно правильный ответ

Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

- ☒ на спине, на ровной твердой поверхности
- ☐ на спине, на кровати
- ☐ оставить положение, в котором он был обнаружен
- ☐ роли не играет

126. Выберите единственно правильный ответ

При диагностике клинической смерти необходимо определить в первую очередь

- ☒ сознание
- ☐ частоту пульса
- ☐ дыхание
- ☐ степень одышки

127. Выберите единственно правильный ответ

При отсутствии сознания оценивают

- ☐ пульс, артериальное давление
- ☐ величину зрачков
- ☐ данные осмотра, пальпацию
- ☒ наличие дыхания, кровообращения, величину зрачков и их реакцию на свет

128. Выберите единственно правильный ответ

Ранние признаки биологической смерти

- ☐ трупные пятна, трупное окоченение
- ☐ отсутствие дыхания
- ☐ судорожные подергивания
- ☒ помутнение роговицы глаза, симптом «Кошачьего глаза»

129. Выберите единственно правильный ответ

Меры профилактики внутрибольничной инфекции предусмотрены инструкциями

- ☒ по санитарно-противоэпидемическому режиму
- ☐ по лечению нозологических форм болезни
- ☐ по лечебно-охранительному режиму
- ☐ по исследованиям пациента

130. Выберите единственно правильный ответ

Систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности в лечебно-профилактическом учреждении организует

- ☐ главный врач
- ☐ главная медсестра
- ☐ старшая медсестра
- ☒ эпидемиолог

131. Выберите единственно правильный ответ

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в стационаре несет

- ☒ главный врач
- ☐ главная медсестра
- ☐ старшая медсестра
- ☐ заведующий отделением

132. Выберите два правильных ответа

Ответственность за организацию и контроль санитарно-эпидемиологического режима в отделении возлагается

- ☐ на главную медицинскую сестру
- ☒ на старшую медицинскую сестру
- ☐ на главного врача
- ☒ на заведующего отделением
- ☐ на медицинскую сестру

133. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности, является

- ☐ карантинным
- ☐ особо опасным
- ☒ внутрибольничным (ВБИ)
- ☐ эндемичным

134. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение

- ☒ микроорганизмов
- ☐ грызунов
- ☐ насекомых
- ☐ членистоногих

135. Выберите единственно правильный ответ

Механическим методом дезинфекции является

- ☒ проветривание
- ☐ кварцевание
- ☐ кипячение
- ☐ пастеризация

136. Выберите единственно правильный ответ

УФО является методом

- ☐ стерилизации
- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ дератизации

137. Выберите единственно правильный ответ

Физическим методом дезинфекции является

- ☐ уборка помещений
- ☐ проветривание
- ☐ стирка
- ☒ кипячение

138. Выберите единственно правильный ответ

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

139. Выберите единственно правильный ответ

Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводят

- ☐ паром под давлением
- ☐ сухим горячим воздухом
- ☐ УФ-лучами
- ☒ дезинфицирующими средствами

140. Выберите единственно правильный ответ

Перед дезинфекцией растворами многократного применения инструменты отмываются от биологических сред

- ☐ да
- ☐ нет
- ☒ в зависимости от инструкции по применению
- ☐ не имеет значения

141. Выберите единственно правильный ответ

Режим дезинфекции фонендоскопа

- ☐ протирание 4% раствором перекиси водорода
- ☐ протирание 3% раствором перекиси водорода
- ☐ протирание 6% раствором перекиси водорода
- ☒ протирание 70% раствором этилового спирта, двукратно

142. Выберите единственно правильный ответ

Генеральную уборку процедурного кабинета проводят с периодичностью

- ☐ 1 раз в 3 дня
- ☒ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☐ 1 раз в месяц

143. Выберите единственно правильный ответ

Текущую уборку процедурного кабинета проводят

- ☐ 1 раз в день
- ☐ 3 раза в сутки
- ☒ 2 раза в день
- ☐ 4 раза в сутки

144. Выберите единственно правильный ответ

Генеральную уборку палат проводят

- ☐ 1 раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☒ 1 раз в месяц

145. Выберите два правильных ответа

Методы дезинфекции для предметов ухода за больными (грелок, пузырей, клеенок)

- ☐ орошение
- ☐ промывание 1-кратное

- ☐ промывание 2-кратное

- ☒ замачивание

- ☒ протирание

146. Выберите единственно правильный ответ

Проба для определения остатков скрытой крови на инструментах

- ☐ аспиринная
- ☒ азопирамовая
- ☐ фенолфталеиновая
- ☐ с суданом III

147. Выберите единственно правильный ответ

Проба для определения остатков моющих средств на инструментах

- ☐ бензидиновая
- ☐ азопирамовая
- ☒ фенолфталеиновая
- ☐ с суданом III

148. Выберите единственно правильный ответ

При положительной пробе на остатки крови на инструменте появляется окраска

- ☐ зеленая
- ☒ сине-фиолетовая
- ☐ розовая
- ☐ желтая

149. Выберите единственно правильный ответ

При положительной пробе на остатки моющих средств на инструменте появляется окраска

- ☐ зеленая
- ☒ розовая
- ☐ сине-фиолетовая
- ☐ желтая

150. Выберите единственно правильный ответ

В пакетах из мешочной бумаги (крафт-пакетах) изделия стерилизуются

- ☒ паровым методом
- ☐ радиационным методом
- ☐ химическим методом
- ☐ воздушным

151. Выберите единственно правильный ответ

Количество инструментов, которое необходимо взять для контроля качества предстерилизационной очистки

- ☐ 3 % от обработанной партии
- ☐ 5 % от обработанной партии
- ☒ 1 % от обработанной партии
- ☐ 1 инструмент

152. Выберите единственно правильный ответ

Индикаторы стерилизации изделий из металла в автоклаве

- ☐ ИС – 180 °С
- ☐ ИС – 160 °С
- ☒ ИС – 132 °С
- ☐ ИС – 120 °С

153. Выберите единственно правильный ответ

Индикаторы стерилизации перевязочного материала, белья

- ☐ ИС – 180 °С
- ☐ ИС – 160 °С
- ☒ ИС – 132 °С

☐ ИС – 120 °С

154. Выберите единственно правильный ответ

Документ, регламентирующий стерилизацию и дезинфекцию изделий медицинского назначения

- ☐ приказ № 720
- ☐ приказ № 408
- ☐ приказ № 747
- ☒ ОСТ 42-21-2-85

155. Выберите единственно правильный ответ

Уровень деkontаминации рук медицинского персонала перед и после кормления пациента

- ☐ профилактический
- ☐ терапевтический
- ☒ гигиенический
- ☐ хирургический

156. Выберите единственно правильный ответ

Цель хирургической обработки рук медицинского персонала

- ☐ обеспечение кратковременной стерильности
- ☒ обеспечение продолжительной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

157. Выберите единственно правильный ответ

Цель гигиенической деkontаминации рук медицинского персонала

- ☐ обеспечение продолжительной стерильности
- ☒ создание кратковременной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

158. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность мытья рук после любой манипуляции

- ☐ 5 минут
- ☒ 1 минута
- ☐ 30 секунд
- ☐ 15 секунд

159. Выберите единственно правильный ответ

Естественная среда обитания и резервуар стафилококка в организме человека

- ☐ кожа
- ☐ кишечник
- ☒ передние отделы носа
- ☐ мочевыделительная система

160. Выберите единственно правильный ответ

Для медицинских работников наиболее надежным способом профилактики инфекционного контакта с ВИЧ-инфекцией, гепатитами является

- ☐ обследование всех пациентов
- ☐ профилактические прививки
- ☒ соблюдение стандартных мер защиты
- ☐ полноценное питание

161. Выберите единственно правильный ответ

Частота смены маски при карантине по гриппу в ЛПУ

- ☐ 1 час
- ☒ 2 часа
- ☐ 3 часа
- ☐ 4 часа

162. Выберите единственно правильный ответ

Периодичность смены халата в процедурном кабинете ЛПУ

- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ 1 раз в 2 дня
- ☒ 1 раз в смену
- ☐ 1 раз в 3 дня

163. Выберите единственно правильный ответ

При выполнении инъекций смену перчаток рекомендуется проводить

- ☒ после каждого пациента
- ☐ после всех инъекций
- ☐ после 3-х пациентов
- ☐ после 5 пациентов

164. Выберите единственно правильный ответ

Кожа инъекционного поля протирается стерильным ватным тампоном с кожным антисептиком

- ☐ однократно
- ☒ последовательно дважды
- ☐ последовательно трижды
- ☐ последовательно четырежды

165. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность измерения температуры в подмышечной области составляет

- ☐ 2–5 минут
- ☐ 5–7 минут
- ☒ 7–10 минут
- ☐ до 15 минут

166. Выберите единственно правильный ответ

Температура тела здорового человека, измеряемая в прямой кишке, составляет

- ☐ 35–36 °С
- ☐ 36–37 °С
- ☒ 37–38 °С
- ☐ 38–39 °С

167. Задание {{ 167 }} ТЗ 167 Тема 2-0-0

Выберите единственно правильный ответ

Температура тела называется фебрильной, если она находится в интервале

- ☐ 36–37 °С
- ☐ 37–38 °С
- ☒ 38–39 °С
- ☐ 39–40 °С

168. Выберите единственно правильный ответ

Для сужения кровеносных сосудов кожи и глубже расположенных тканей и органов используют

- ☐ банки
- ☐ горячую ванну
- ☒ пузырь со льдом
- ☐ горчичники

169. Выберите единственно правильный ответ

Для расширения кровеносных сосудов и расслабления гладкой мускулатуры применяется

- ☐ пузырь со льдом
- ☒ грелка
- ☐ прохладная ванна
- ☐ холодный компресс

170. Выберите единственно правильный ответ

Показание для применения согревающего компресса или грелки

- ☐ острый аппендицит
- ☐ кровотечение
- ☐ ушибы в первые часы
- ☒ инфильтрат на месте инъекций

171. Выберите два правильных ответа

Пузырь со льдом применяется

- ☐ при приступе почечной колики
- ☐ при лихорадке в I периоде
- ☐ при инфильтрате
- ☒ при кровотечении
- ☒ при лихорадке во II периоде

172. Выберите единственно правильный ответ

Полуспиртовой согревающий компресс целесообразно использовать в течение

- ☐ 2–3 часа
- ☐ 10–15 минут
- ☐ 30–40 минут
- ☒ 4–6 часов

173. Выберите единственно правильный ответ

В лечебном отделении должен быть запас лекарств, обеспечивающий

- ☐ суточную потребность
- ☒ двух-трехдневную потребность
- ☐ недельную потребность
- ☐ месячную потребность

174. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной столовой ложки составляет

- ☐ 5 мл
- ☐ 10 мл
- ☒ 15 мл
- ☐ 30 мл

175. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной чайной ложки составляет

- ☒ 5 мл
- ☐ 10 мл
- ☐ 15 мл
- ☐ 30 мл

176. Выберите единственно правильный ответ

Шприц Жане применяется

- ☐ для подкожных инъекций
- ☐ для внутримышечных инъекций
- ☐ для внутривенных инъекций
- ☒ для промывания полостей

177. Выберите единственно правильный ответ

Область ягодицы для внутримышечных инъекций

- ☐ верхневнутренний квадрант
- ☒ верхненаружный квадрант
- ☐ нижненаружный квадрант
- ☐ нижневнутренний квадрант

178. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное давление зависит

- ☐ только от частоты сокращений сердца
- ☐ только от силы сокращений сердца
- ☐ только от тонуса артериальной стенки
- ☒ как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериального столба

179. Выберите единственно правильный ответ

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением является

- ☐ максимальным артериальным давлением
- ☐ минимальным артериальным давлением
- ☒ пульсовым давлением
- ☐ дефицитом пульса

180. Выберите единственно правильный ответ

Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Пролежни», определен приказом МЗ РФ

- ☒ № 123
- ☐ № 330
- ☐ № 408
- ☐ № 720

181. Выберите единственно правильный ответ

При обработке глаз ресницы и веки протирают по направлению

- ☐ от центра к углам глаза
- ☒ от наружного края к внутреннему
- ☐ произвольно
- ☐ от внутреннего угла к наружному

182. Выберите два правильных ответа

Преимуществом введения лекарственных веществ через рот является

- ☐ частичная инактивация в печени
- ☒ простота и доступность
- ☐ обеспечение более управляемого и быстрого лекарственного воздействия
- ☐ требуется соблюдение стерильности
- ☒ введение не требует специально подготовленного персонала

183. Выберите единственно правильный ответ

Преимуществом внутривенного пути введения является

- ☐ простота и доступность
- ☐ не требуется соблюдение стерильности
- ☒ обеспечение более управляемого и быстрого лекарственного воздействия
- ☐ отсутствие аллергических реакций

184. Выберите два правильных ответа

Местами возможной локализации опрелостей являются

- ☒ под молочными железами
- ☐ на затылке
- ☐ на лопатках
- ☐ на крестце
- ☒ в паховых складках

185. Выберите единственно правильный ответ

Для постановки очистительной клизмы готовят

- ☐ 100 мл касторового масла
- ☒ 1 литр чистой воды
- ☐ 10 литров чистой воды
- ☐ 100 мл отвара ромашки

186. Выберите единственно правильный ответ

Пассивный искусственный иммунитет формируется на введение

- ☐ живой ослабленной вакцины
- ☐ убитой (инактивированной) вакцины
- ☐ анатоксинов
- ☒ иммуноглобулинов

187. Выберите единственно правильный ответ

Перед проведением профилактической прививки проводится

- ☒ медицинский осмотр, термометрия
- ☐ медицинский осмотр, термометрия, проведение анализов мочи, крови
- ☐ медицинский осмотр, термометрия, иммунологическое исследование

188. Выберите единственно правильный ответ
Общие прививочные реакции на АКДС-вакцинацию

- ☒ повышение температуры тела
- ☐ общие токсические осложнения
- ☐ общие аллергические реакции немедленного и замедленного типа
- ☐ осложнения со стороны центральной нервной системы

189. Выберите единственно правильный ответ
Аллергическое осложнение немедленного типа при АКДС-вакцинации

- ☒ анафилактический шок
- ☐ повышение температуры тела до 37,5 °С
- ☐ вялость
- ☐ головная боль

190. Выберите единственно правильный ответ
Цель постановки пробы Манту

- ☐ вызвать выработку антител
- ☐ лечебная
- ☒ диагностическая
- ☐ профилактическая

191. Выберите единственно правильный ответ
Иммунобиологический препарат, используемый для постановки пробы Манту

- ☐ вакцина БЦЖ
- ☒ туберкулин
- ☐ бруцеллин

- ☐ дизентерин

192. Выберите единственно правильный ответ

Способ введения туберкулина

- ☐ подкожно
- ☒ внутрикожно
- ☐ внутримышечно
- ☐ подкожно

193. Выберите единственно правильный ответ

Постоянные противопоказания к вакцинации

- ☐ железодефицитная анемия легкой степени
- ☐ стабильные неврологические состояния
- ☐ рахит
- ☒ анафилактический шок на предыдущее введение вакцины

194. Выберите единственно правильный ответ

Относительные противопоказания к вакцинации

- ☐ первичный иммунодефицит
- ☐ злокачественные заболевания
- ☒ острые заболевания
- ☐ сильная реакция на предыдущую дозу этой вакцины

195. Выберите единственно правильный ответ

Схема вакцинации против гепатита В

- ☐ 0–3–7 месяцев
- ☐ 1–4–8 месяцев
- ☒ 0–1–6 месяцев
- ☐ 2–4–10 месяцев

196. Выберите единственно правильный ответ

Признаки местной прививочной реакции на вакцинацию

- ☒ инфильтрат менее 8 см в диаметре
- ☐ крапивница
- ☐ абсцесс
- ☐ некроз тканей

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно – диагностической техникой в области осуществления профессиональной деятельности.

197. Выберите единственно правильный ответ
Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- ☐ слабость
- ☐ недомогание
- ☐ снижение аппетита
- ☒ кашель

198. Выберите единственно правильный ответ
Решающее значение в диагностике пневмонии у детей имеет

- ☐ общий анализ крови
- ☐ общий анализ мочи
- ☒ рентгенография легких
- ☐ спирография

199. Выберите единственно правильный ответ
Этиотропная терапия пневмонии у детей - применение препаратов группы

- ☒ противомикробные
- ☐ десенсибилизирующие

- ☐ отхаркивающие

- ☐ бронхолитические

200. Выберите единственно правильный ответ

Причина затрудненного дыхания при остром рините у детей

- ☒ отек слизистой, гиперсекреция слизи
- ☐ отек слизистой, гиперсекреция мокроты
- ☐ атрофия слизистой, гиперсекреция слизи
- ☐ атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты

201. Выберите единственно правильный ответ

Ведущим симптомом при остром отите у детей является

- ☐ кашель
- ☐ одышка
- ☐ боль в грудной клетке
- ☒ боль в ухе

202. Выберите единственно правильный ответ

Острый бронхит у детей вызывается преимущественно

- ☒ вирусами
- ☐ пневмококками
- ☐ микоплазмой
- ☐ хламидиями

203. Выберите единственно правильный ответ

При бронхите у детей поражается

- ☐ бронхи мелкого калибра
- ☒ бронхи разного калибра
- ☐ паренхима лёгкого
- ☐ бронхи крупного калибра

204. Выберите единственно правильный ответ

Укажите наиболее характерное проявление простого бронхита у детей

- ☒ сухой кашель, повышение температуры тела в течение 2-3-х дней
- ☐ дистанционные хрипы
- ☐ интоксикация, повышение температуры тела в течение 5-7 дней
- ☐ отсутствие эффекта от антибиотиков

205. Выберите единственно правильный ответ

Для обструктивного бронхита у детей наиболее характерны

- ☐ сухие хрипы
- ☒ сухие свистящие хрипы
- ☐ влажные разнокалиберные хрипы
- ☐ влажные мелкокалиберные хрипы

206. Выберите единственно правильный ответ

У детей в возрасте до 1 года пневмония вызывается преимущественно

- ☐ вирусами
- ☒ стафилококками
- ☐ гемофильной палочкой
- ☐ микоплазмой

207. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма – это

- ☐ острое аллергическое воспалительное заболевание бронхов
- ☐ хроническое воспалительное заболевание бронхов
- ☒ хроническое аллергическое воспаление бронхов
- ☐ острое воспалительное заболевание бронхов

208. Выберите единственно правильный ответ

Тяжесть течения БА у детей определяется в первую очередь

- ☒ наличием астматического статуса в анамнезе
- ☐ частотой ночных приступов
- ☐ частотой дневных приступов
- ☐ способом купирования приступов

209. Выберите единственно правильный ответ

Неотложную помощь при приступе БА у детей следует начинать с введения

- ☒ сальбутамола
- ☐ ипратропиума бромид
- ☐ эуфиллина
- ☐ преднизолона

210. Выберите единственно правильный ответ

О хронизации бронхолегочного процесса следует говорить, если он сохраняется

- ☐ 1 месяца

- ☐ 3 месяца
- ☐ 6 недель
- ☒ 6 месяцев

211. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма у ребенка характеризуется

- ☐ лихорадкой
- ☐ судорогами
- ☒ приступами удушья
- ☐ отеками

212. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей

- ☐ лейкоз
- ☒ пневмония
- ☐ сахарный диабет
- ☐ туберкулез

213. Выберите единственно правильный ответ

Независимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы у ребенка

- ☐ провести оксигенотерапию
- ☐ ввести бронхолитики
- ☒ освободить от стесняющей одежды
- ☐ ввести глюкокортикоиды

214. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы назофарингита у детей

- ☐ отеки
- ☐ желтуха
- ☐ кровотечения
- ☒ кашель

215. Выберите единственно правильный ответ

Возможное осложнение ринита у грудных детей

- ☒ отит
- ☐ асфиксия
- ☐ ложный круп
- ☐ ангина

216. Выберите единственно правильный ответ

Содержание глюкозы в плазме крови у детей составляет

- ☐ 1,5 – 2,5 ммоль/л
- ☐ 2,6 – 3,2 ммоль/л
- ☒ 3,3 – 5,5 ммоль/л
- ☐ 8,2 – 9,5 ммоль/л

217. Выберите единственно правильный ответ

Одной из наиболее частых причин хронического гастрита у детей является

- ☐ длительный прием салицилатов
- ☐ пищевая аллергия
- ☒ нерегулярное и неполноценное по составу питание
- ☐ хронические заболевания печени и желчевыводящих путей

218. Выберите единственно правильный ответ

Существенную роль в язвообразовании у детей отводят

- ☐ кишечной палочке
- ☐ протею
- ☒ хеликобактерным микроорганизмам
- ☐ палочке молочно-кислого брожения

219. Выберите единственно правильный ответ

При желудочно-кишечном кровотечении у ребёнка медсестра в первую очередь обеспечит

- ☒ экстренную транспортировку в стационар
- ☐ промывание желудка раствором аминокaproновой кислоты
- ☐ проведение гемостатической терапии
- ☐ направление на ФГДС

220. Выберите единственно правильный ответ

При глистных инвазиях боли локализуются

- ☐ в правом подреберье
- ☐ в эпигастральной области
- ☐ в левом подреберье
- ☒ в околопупочной области

221. Выберите единственно правильный ответ

Выберите жалобу, характеризующую диспептические расстройства у детей раннего возраста

- ☐ головная боль
- ☐ утомляемость
- ☒ метеоризм
- ☐ похудании

222. Выберите единственно правильный ответ

Назовите возбудителя герпетического стоматита у детей

- ☒ вирус
- ☐ стрептококк
- ☐ стафилококк
- ☐ хеликобактер

223. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при энтеробиозе у детей

- ☐ кашель
- ☐ боль в животе
- ☐ запор
- ☒ зуд в перианальной области

224. Выберите единственно правильный ответ

Вид питания ребёнка, больного стоматитом

- ☐ острые блюда
- ☐ продукты, богатые клетчаткой
- ☒ теплую, жидкую, полужидкую пищу
- ☐ слюногонные продукты

225. Выберите единственно правильный ответ

Соскоб с перианальных складок проводится для диагностики у детей

- ☐ лямблиоза
- ☒ энтеробиоза
- ☐ эшерихеоза
- ☐ аскаридоза

226. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при кандидозном стоматите у детей

- ☐ головная боль
- ☐ слюнотечение
- ☒ высыпания и боль в полости рта
- ☐ насморк

227. Выберите единственно правильный ответ

Энтеробиоз у детей может приводить к развитию

- ☐ кишечного кровотечения
- ☐ менингита
- ☒ вульвовагинита
- ☐ пенетрации

228. Выберите единственно правильный ответ

В клинике афтозного стоматита у детей характерно

- ☐ раздражительность
- ☐ лихорадка
- ☒ гиперсаливация
- ☐ боль в животе

229. Выберите единственно правильный ответ

Осложнение аскаридоза

- ☐ перфорация
- ☐ пенетрация
- ☐ аутоинвазия
- ☒ кишечная непроходимость

230. Выберите единственно правильный ответ

Сорбент, применяемый у детей младшего возраста

- ☐ мотилиум
- ☐ кларитромицин
- ☒ смекта
- ☐ тетрациклин

231. Выберите единственно правильный ответ

Приём лекарственных средств в стационаре осуществляется детьми

- ☐ самостоятельно
- ☒ в присутствии медицинской сестры
- ☐ в присутствии родителей
- ☐ в присутствии врача

239. Выберите два правильных ответа

Частоту пульса у детей определяют на

- ☒ лучевой артерии
- ☐ локтевой артерии
- ☒ плечевой артерии
- ☐ бедренной артерии

240. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное давление у детей

- ☐ выше, чем у взрослых
- ☒ ниже, чем у взрослых
- ☐ такое же, как у взрослых

241. Выберите единственно правильный ответ

ЭКГ- исследование проводится

- ☒ после 10-15 минут отдыха
- ☐ после физической нагрузки
- ☐ после еды
- ☐ после ванны

242. Выберите единственно правильный ответ

При ЭКГ-исследовании оценивают

- ☒ регулярность и частоту сердечных сокращений
- ☐ шумы в сердце
- ☐ тоны сердца
- ☐ акцент тонов сердца

243. Выберите единственно правильный ответ

Фонокардиография позволяет оценить

- ☒ характеристику тонов
- ☐ структуру сердца
- ☐ скорость кровотока
- ☐ шумы в сердце

244. Выберите единственно правильный ответ

Доплерография позволяет оценить

- ☒ скорость кровотока
- ☐ шумы в сердце
- ☐ тоны сердца

- ☐ структуру сердца

245. Выберите единственно правильный ответ

При измерении артериального давления манжетка должна находиться на уровне

- ☒ сердца
☐ головы
☐ кушетки
☐ живота

246. Выберите единственно правильный ответ

К принципам диеты при заболеваниях сердечно - сосудистой системы относятся

- ☒ ограничение соли
☐ ограничение белков
☐ ограничение сахара
☐ ограничение углеводов

247. Выберите единственно правильный ответ

Решающее значение в этиологии острой ревматической лихорадки имеет у детей

- ☒ b-гемолитический стрептококк группы А
☐ b-гемолитический стрептококк группы Б
☐ стафилококки
☐ вирусы

248. Выберите единственно правильный ответ

Длительность диспансерного наблюдения за ребёнком, перенёсшим ревматизм

- ☐ 3 года
☐ 5 лет
☒ до передачи в подростковый кабинет
☐ 2 года

249. Выберите единственно правильный ответ

При любом врождённом пороке у детей осложнением может быть

- ☐ пневмония
☐ гипоксический криз
☐ тромбоэмболия
☒ недостаточность кровообращения

250. Выберите единственно правильный ответ

Ревматическая хорея у детей проявляется

- ☒ гиперкинезами
☐ ларингоспазмом
☐ пилоростенозом
☐ удушьем

251. Выберите единственно правильный ответ

Гемартрозы у детей характерны для заболевания

- ☒ гемофилия
☐ острый лейкоз
☐ аллергоз
☐ паразитарная инвазия

252. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой носа

- ☒ ринит
☐ фарингит
☐ отит
☐ менингит

253. Выберите единственно правильный ответ

Повышение сахара в крови

- ☒ гипергликемия
☐ гипогликемия
☐ анемия

- ☐ гипокальциемия

254. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление мышечной оболочки сердца

- ☒ миокардит
☐ эндокардит
☐ перикардит
☐ панкардит

255. Выберите единственно правильный ответ

Ночное недержание мочи у детей

- ☒ энурез
☐ никтурия
☐ энкопрез
☐ ишурия

256. Выберите единственно правильный ответ

Кратковременная остановка дыхания у детей

- ☒ апноэ
☐ тахипноэ
☐ брадипноэ
☐ нормопноэ

257. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки у детей

- ☒ назофарингит
☐ трахеит
☐ гайморит
☐ фронтит

258. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление среднего уха у детей

- ☒ отит
☐ мастит
☐ перитонит
☐ мастоидит

259. Выберите единственно правильный ответ

Поражение нервной системы при ревматизме у детей

- ☒ хорея
☐ менингит
☐ энцефалит
☐ энцефалопатия

260. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление тонкого и толстого кишечника у детей

- ☒ энтероколит
☐ гастроэнтерит
☐ гастроэнтероколит
☐ колит

261. Выберите единственно правильный ответ

Врожденные пороки сердца – это аномалии развития

- ☒ сердца и магистральных сосудов
☐ сердца
☐ сосудов
☐ соединительной ткани

262. Выберите единственно правильный ответ

Специалист, определяющий сроки проведения операции при врожденных пороках сердца

- ☒ кардиохирург
☐ акушер
☐ неонатолог
☐ реаниматолог

263. Выберите единственно правильный ответ

Профилактика осложнений врожденных пороков сердца у детей включает

- ☐ сон на свежем воздухе
- ☐ активную физическую нагрузку матери
- ☒ санацию очагов хронической инфекции матери
- ☐ усиленное питание матери

264. Выберите единственно правильный ответ

Разновидность деформации, возможная при врожденных пороках сердца

- ☒ деформация грудной клетки в виде «сердечного горба»
- ☐ деформация грудной клетки в виде воронки
- ☐ Х-образная деформация конечностей
- ☐ О-образная деформация конечностей

265. Выберите единственно правильный ответ

Употребление поваренной соли при врожденных пороках сердца

- ☒ ограничивается
- ☐ не ограничивается
- ☐ увеличивается
- ☐ не имеет значения

266. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частое заболевание при проявлениях аллергии у детей младшего возраста

- ☐ отек Квинке
- ☐ крапивница
- ☐ анафилактический шок
- ☒ атопический дерматит

267. Выберите единственно правильный ответ

Первые признаки атопического дерматита

- ☐ кожа грубая, сухая, шелушится
- ☐ появление мокнущих корочек
- ☒ покраснение и шелушение кожи щек, головы, кожи за ушами, кожи ягодиц
- ☐ появление экземы на голенях

268. Выберите единственно правильный ответ

При атопическом дерматите зуд проявляется

- ☐ только ночью
- ☐ в течение дня
- ☒ в течение дня, усиливается утром и ночью
- ☐ только утром

269. Выберите единственно правильный ответ

Распространенность отека при отеке Квинке

- ☐ губы, щеки
- ☐ губы, щеки, уши
- ☒ губы, щеки, уши, гортань
- ☐ губы, щеки, уши, шея

270. Выберите единственно правильный ответ

Аллергический ринит и аллергический конъюнктивит – эти заболевания

- ☒ всегда сопутствуют друг другу
- ☐ не связаны друг с другом
- ☐ развиваются одно после другого
- ☐ развиваются после атопического дерматита

271. Выберите единственно правильный ответ

Аллергия на пыль у ребенка исключает

- ☒ участие в уборке помещения
- ☐ игры на улице

- ☐ посещение детского сада

- ☐ учебу в школе

272. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее важный элемент в лечении аллергии

- ☒ выявление вещества, вызывающего аллергию у ребенка
- ☐ назначение комплексного лечения
- ☐ назначение физиотерапии
- ☐ назначение антигистаминных препаратов

273. Выберите единственно правильный ответ

Бронхиальная астма у детей характеризуется

- ☒ периодически приступами удушья вследствие бронхоспазма, гиперсекреции слизи и отека слизистой бронхов
- ☐ периодически возникающими приступами затрудненного дыхания
- ☐ постоянными приступами удушья вследствие бронхоспазма
- ☐ бронхоспазмом и отеком слизистой оболочки бронхов

274. Выберите единственно правильный ответ

Вынужденное положение при приступе бронхиальной астмы у ребенка

- ☐ лежа в постели
- ☒ сидя, опираясь на руки
- ☐ сидя, запрокинув голову назад
- ☐ лежа, прижав ноги к животу

275. Выберите единственно правильный ответ

Аллергены, являющиеся причиной поллинозов

- ☒ пылевые
- ☐ белковые
- ☐ пищевые
- ☐ эпидермальные

276. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при обструктивном бронхите у детей

- ☐ кашель
- ☒ одышка
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ тахикардия

277. Выберите единственно правильный ответ

Приоритетная проблема при остром бронхите у детей

- ☒ кашель
- ☐ одышка
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ тахикардия

278. Выберите единственно правильный ответ

Гипертоксическая форма течения заболевания бывает

- ☐ при риновирусной инфекции
- ☒ при гриппе
- ☐ при аденовирусной инфекции
- ☐ при парагриппе

279. Выберите единственно правильный ответ

Обязательное назначение детям при ОРВИ

- ☒ постельный режим
- ☐ витамины
- ☐ антибиотики

- ☐ антипиретики

280. Выберите единственно правильный ответ

Препараты, используемые для снижения температуры при ОРВИ у детей

- ☒ парацетамол и ибупрофен

- ☐ анальгин

- ☐ аспирин

- ☐ амидопирин

281. Выберите единственно правильный ответ

Важный компонент ухода за детьми, больными пневмонией

- ☐ строгий покой

- ☐ положение лежа на животе

- ☒ возвышенное положение головы, частая смена положения тела

- ☐ возвышенное положение ног, строгий покой

282. Выберите единственно правильный ответ

Стенозирующий ларингит наиболее часто развивается

- ☒ при вирусных и бактериальных инфекциях

- ☐ при атопии

- ☐ при грибковых инфекциях

- ☐ при протозойных инфекциях

283. Выберите единственно правильный ответ

Клинические проявления стенозирующего ларингита

- ☒ осиплость голоса, грубый лающий кашель, развитие дыхательной недостаточности

- ☐ тихий голос, непродуктивный кашель, развитие дыхательной недостаточности

- ☐ осиплость голоса, влажный кашель, развитие дыхательной недостаточности

- ☐ влажный кашель, развитие дыхательной недостаточности

284. Выберите единственно правильный ответ

Положение, которое необходимо принять ребенку при остром стенозирующем ларинготрахеите

- ☐ сидя

- ☐ стоя

- ☒ лежа с приподнятым головным концом

- ☐ лежа с приподнятыми ногами

285. Выберите единственно правильный ответ

Отвлекающая терапия при остром стенозирующем ларинготрахеите у ребенка включает

- ☐ холод к голове

- ☐ холод к ногам

- ☒ теплые ножные ванны

- ☐ физические нагрузки

286. Выберите единственно правильный ответ

Продукты, прием которых должен быть ограничен при заболеваниях почек в питании ребенка

- ☐ каши, хлебо - булочные изделия

- ☐ овощи, фрукты

- ☒ острые, соленые блюда, пряности, жидкости

- ☐ сладости

287. Выберите единственно правильный ответ

Физические и эмоциональные нагрузки у детей с заболеваниями почек могут привести

- ☐ к снижению артериального давления, усилению болевого синдрома

- ☐ к снижению артериального давления, увеличению диуреза

- ☒ к повышению артериального давления, усилению болевого синдрома

- ☐ к выздоровлению пациента

288. Выберите единственно правильный ответ

Локализация отеков при остром гломерулонефрите в начале заболевания

- ☐ на ногах

- ☐ на передней брюшной стенке

- ☒ на лице

- ☐ на пояснице

289. Выберите единственно правильный ответ

Диета при заболеваниях почек для восстановления нормального функционирования подразумевает

- ☒ ограничение поваренной соли, жидкости и животного белка

- ☐ увеличение поваренной соли, жидкости и животного белка

- ☐ ограничение жиров, жидкости и животного белка

- ☐ ограничение поваренной соли, углеводов и животного белка

290. Выберите единственно правильный ответ

Порция мочи, необходимая для анализа по Нечипоренко

- ☐ суточная моча

- ☐ моча за 12 часов

- ☐ разовая порция мочи из первой струи

- ☒ разовая порция мочи из средней струи

291. Выберите два правильных варианта ответа

Моча для пробы по Зимницкому собирается

- ☐ в течение 3 часов

- ☐ в течение 12 часов

- ☒ в течение суток

- ☒ каждые 3 часа

- ☐ каждые 6 часов

292. Выберите три правильных варианта ответа

Характерные признаки почечных отеков

- ☒ появление утром

- ☐ появление вечером

- ☒ появление в первую очередь на лице

- ☐ появление в первую очередь на ногах

- ☒ теплые, бледные

- ☐ холодные, цианотичные

293. Выберите единственно правильный ответ

Энурез - это

- ☐ задержка мочеиспускания

- ☒ недержание мочи во время сна

- ☐ недержание мочи во время бодрствования

- ☐ учащение мочеиспускания

294. Выберите единственно правильный ответ

Полное прекращение выделения мочи

- ☐ острая задержка мочи

- ☒ анурия

- ☐ олигурия
- ☐ полиурия

295. Выберите единственно правильный ответ

Оптимальное количество лейкоцитов в 1 мм мочи, при котором она считается инфицированной

- ☐ 1-4
- ☒ 5-10
- ☐ 11-20
- ☐ 21-30

296. Выберите единственно правильный ответ

Гематурия – это увеличение содержания в моче

- ☒ эритроцитов
- ☐ лейкоцитов и эритроцитов
- ☐ лейкоцитов
- ☐ гиалиновых цилиндров

297. Выберите единственно правильный ответ

Лейкоцитурия – это увеличение в моче

- ☐ эритроцитов
- ☐ лейкоцитов и эритроцитов
- ☒ лейкоцитов
- ☐ гиалиновых цилиндров

298. Выберите единственно правильный ответ

Проба мочи по Нечипоренко это

- ☐ определение количества форменных элементов в моче за 1 минуту
- ☐ определение количества форменных элементов в суточной моче
- ☒ определение количества форменных элементов в 1 мл мочи
- ☐ определение количества форменных элементов в моче за 1 час

299. Выберите единственно правильный ответ

Проба, используемая для оценки концентрационной функции почек

- ☐ Нечипоренко
- ☐ Каковского-Аддиса
- ☒ Зимницкого
- ☐ Амбурже

300. Выберите единственно правильный ответ

Прием жидкости при пиелонефрите

- ☐ ограничивается
- ☐ отменяется
- ☒ повышается
- ☐ не изменяется

301. Выберите единственно правильный ответ

Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом сопровождается

- ☐ лейкоцитурией, гематурией и протеинурией
- ☒ гематурией, протеинурией и гипертонией
- ☐ протеинурией, гипертонией и гиперлипидемией
- ☐ протеинурией, гипотонией и гиперлипидемией

302. Выберите единственно правильный ответ

Отеки при остром гломерулонефрите с нефритическим синдромом

- ☒ распространенные
- ☐ локальные
- ☐ метастатические
- ☐ отсутствуют

303. Выберите единственно правильный ответ

Отеки при остром гломерулонефрите

- ☒ нарастают к утру
- ☐ нарастают к вечеру
- ☐ не изменяются в течение дня
- ☐ нарастают к обеду

304. Выберите единственно правильный ответ

Дети, перенесшие гломерулонефрит, наблюдаются

- ☐ в течение 1 года
- ☐ в течение 3 лет
- ☐ в течение 5 лет
- ☒ до перевода во взрослую поликлинику

305. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая причина развития острого гломерулонефрита

- ☐ вирусная инфекция
- ☐ стафилококковая инфекция
- ☒ стрептококковая инфекция
- ☐ грамотрицательная инфекция

306. Выберите единственно правильный ответ

Повышение артериального давления у большинства детей с острым гломерулонефритом

- ☒ незначительное и кратковременное
- ☐ незначительное, но длительное
- ☐ злокачественное и длительное
- ☐ злокачественное, но кратковременное

307. Выберите два правильных варианта ответа

Продукты, исключаемые из рациона при оксалурии

- ☒ смородина
- ☒ щавель
- ☐ яйца
- ☐ молоко
- ☐ мясо

308. Выберите единственно правильный ответ

Рацион питания при оксалурии исключает употребление продуктов, содержащих

- ☐ пурины
- ☒ аскорбиновую кислоту
- ☐ триптофан
- ☐ метионин

309. Выберите единственно правильный ответ

Питьевой режим при обменных нефропатиях

- ☐ ограничивают
- ☐ не изменяют
- ☒ увеличивают
- ☐ не изменяется

310. Выберите единственно правильный ответ

Гипотиреоз у детей, это синдром недостаточности функциональной активности

- ☒ щитовидной железы
- ☐ паращитовидных желез
- ☐ вилочковой железы
- ☐ надпочечников

311. Выберите единственно правильный ответ

Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к развитию комы

- ☐ гипергликемической (диабетической)
- ☒ гипогликемической
- ☐ печеночной
- ☐ уремической

312. Выберите единственно правильный ответ

Важнейший этиологический фактор сахарного диабета у детей

- ☐ переохлаждение
- ☐ перегревание
- ☐ избыточный прием белков
- ☒ наследственная отягощенность

313. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы сахарного диабета у детей

- ☒ полифагия, полидипсия, полиурия
- ☐ лихорадка, кашель с мокротой
- ☐ боль в пояснице, отеки
- ☐ тахикардия, тремор, экзофтальм

314. Выберите единственно правильный ответ

Недиагностированный сахарный диабет у детей ведет к развитию комы

- ☒ кетоацидотической
- ☐ гипогликемической
- ☐ печеночной
- ☐ уремической

315. Выберите единственно правильный ответ

Щадящая диета при хроническом гастрите

- ☐ повышает выделение желудочного сока
- ☐ повышает секрецию желчи
- ☐ повышает секрецию сока поджелудочной железы
- ☒ уменьшает раздражение слизистой оболочки желудка

316. Выберите единственно правильный ответ

Режим питания ребенка при хроническом гастрите

- ☒ 4–5-разовое питание малыми порциями
- ☐ 2–3-разовое питание малыми порциями
- ☐ водно-чайная пауза
- ☐ питание по потребности

317. Выберите единственно правильный ответ

Психосоциальные нагрузки при заболеваниях желудка у детей

- ☒ способствуют развитию обострений и осложнений
- ☐ не способствуют развитию обострений и осложнений
- ☐ не имеют значения
- ☐ положительно влияют на течение заболевания

318. Выберите единственно правильный ответ

Диета при дискинезии желчевыводящих путей по гипертоническому типу

- ☒ с исключением продуктов, усиливающих образование желчи и раздражающих желчные пути
- ☐ с исключением продуктов, уменьшающих раздражение воспаленной слизистой желудка
- ☐ с уменьшением количества углеводов
- ☐ с уменьшением количества белка

319. Выберите единственно правильный ответ

Нарушение диеты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- ☐ не влияет на течение заболевания
- ☒ может спровоцировать обострение болевого синдрома
- ☐ может вызвать кровотечение

- ☐ может вызвать рвоту

320. Выберите единственно правильный ответ

Функционально выгодное положение ребенка при рвоте

- ☐ усадить на стул
- ☒ уложить с возвышенным головным концом, голову повернуть набок
- ☐ уложить с опущенным головным концом, голову повернуть набок
- ☐ уложить на горизонтальную поверхность, поднять ноги

321. Выберите единственно правильный ответ

Действия медицинской сестры после рвоты у ребенка

- ☒ прополоскать ему рот кипяченой водой, применить водно-чайную паузу на 2–4 часа, направить рвотные массы в лабораторию
- ☐ быстро накормить ребенка
- ☐ при необходимости направить рвотные массы в лабораторию
- ☐ уложить ребенка в постель

322. Выберите единственно правильный ответ

Метеоризм – это

- ☐ вздутие живота скопившимися в кишечнике каловыми массами
- ☐ вздутие живота скопившейся в животе жидкостью
- ☒ вздутие живота скопившимися в кишечнике газами
- ☐ втяжение живота при обезвоживании

323. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи вирусного гепатита В

- ☐ алиментарный путь
- ☒ парентеральный путь
- ☐ водный путь
- ☐ воздушно – капельный путь

324. Выберите единственно правильный ответ

Описторхоз поражает

- ☐ тонкий и толстый кишечник
- ☐ двенадцатиперстную кишку и толстый кишечник
- ☒ желчевыводящие пути, двенадцатиперстную кишку
- ☐ желудок и тонкий кишечник

325. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи дифтерии

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ алиментарный
- ☐ половой
- ☐ вертикальный

326. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая форма дифтерии – дифтерия

- ☒ зева
- ☐ носа
- ☐ гортани
- ☐ кожи

327. Выберите единственно правильный ответ

Характер налетов на миндалинах при дифтерии зева

- ☐ гнойные
- ☐ некротические
- ☐ гнойно - некротические
- ☒ фибринозные

328. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятие, которое необходимо провести в очаге дифтерии после изоляции больного

- ☐ текущую дезинфекцию
- ☒ заключительную дезинфекцию
- ☐ влажную уборку
- ☐ проветривание

329. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при дифтерии

- ☒ больной и носитель токсигенных бактерий дифтерии
- ☐ больной легкой ангиной
- ☐ носитель нетоксических бактерий дифтерии
- ☐ больное животное

330. Выберите единственно правильный ответ

Бактериологическое исследование на дифтерию проводится путем взятия

- ☒ мазка из носа и зева
- ☐ мазка с конъюнктивы
- ☐ мазка с задней стенки глотки
- ☐ мазка с небных миндалин

331. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, производимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

- ☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются
- ☐ не отстраняются от посещения коллектива
- ☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются
- ☐ не госпитализируются

332. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☒ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

333. Выберите единственно правильный ответ

Метод введения противодифтерийной антитоксической сыворотки

- ☒ дробно (по Безредко)
- ☐ одномоментно вся доза
- ☐ не имеет значения
- ☐ 2 раза в день

334. Выберите единственно правильный ответ

Корь по механизму передачи

- ☐ кишечная инфекция
- ☒ воздушно-капельная инфекция
- ☐ трансмиссивная инфекция
- ☐ инфекция кожных покровов

335. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при кори

- ☐ животные
- ☐ бактериовыделитель
- ☒ больной корью человек
- ☐ почва

336. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинация живой коревой вакциной в очаге кори проводится в течение

- ☐ первого дня
- ☒ первых 3 дней
- ☐ первых 5 дней
- ☐ первых 7 дней

337. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее характерный симптом кори в начальном периоде

- ☐ катаральные явления
- ☐ светобоязнь
- ☒ пятна Бельского—Филатова
- ☐ ангина

338. Выберите единственно правильный ответ

Сыпь при кори высыпает

- ☐ одномоментно
- ☐ этапно, в течение 2 дней
- ☒ этапно в течение 3 дней
- ☐ в течение 5 дней

339. Выберите единственно правильный ответ

Вторичные элементы после угасания сыпи при кори

- ☐ корочки
- ☒ пигментация
- ☐ рубцы
- ☐ расчесы

340. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинации живой коревой вакциной по эпидемиологическим показаниям подлежат дети

- ☒ ранее не болевшие и не привитые
- ☐ имеющие противопоказания к вакцинации
- ☐ ранее болевшие корью
- ☐ не имеет значения

341. Выберите единственно правильный ответ

Мазок при подозрении на коклюш берут

- ☐ из носа сухим тампоном
- ☐ из зева сухим тампоном
- ☐ с небных миндалин сухим тампоном
- ☒ методом кашлевых пластинок

342. Выберите единственно правильный ответ

Характерные особенности кашля при коклюше

- ☒ приступы спазматического кашля с репризами
- ☐ влажный кашель, с обильной мокротой
- ☐ влажный кашель со скудной мокротой
- ☐ сухой лающий кашель, осиплость голоса

343. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность периода спазматического кашля

- ☐ 3 - 5 дней
- ☐ 5 - 7 дней
- ☐ 7 - 10 дней
- ☒ 2 - 4 недели

344. Выберите единственно правильный ответ

Длительно кашляющие дети подлежат бактериологическому обследованию

- ☐ на дифтерию
- ☐ бна дизентерию
- ☐ на скарлатину

- ☒ на коклюш

345. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☐ фильтрующий вирус
☐ золотистый стафилококк
☐ бета-гемолитический стрептококк
☒ нейссерия

346. Выберите единственно правильный ответ

Мазок для бактериологического исследования на менингококковую инфекцию берут

- ☐ из носа
☐ с миндалин
☒ с задней стенки глотки
☐ С языка

347. Выберите единственно правильный ответ

Характер сыпи при менингококковой инфекции

- ☐ мелкоточечная на гиперемизованном фоне кожных покровов
☐ пятнисто-папулезная на бледном фоне кожных покровов
☐ везикулезная на обычном фоне кожных покровов
☒ геморрагическая звездчатая на бледном фоне кожных покровов

348. Выберите два правильных варианта ответа

Локализованная форма менингококковой инфекции

- ☒ носительство менингококка
☐ менингококцемия
☐ менингококковый менингит
☒ менингококковый ринофарингит

349. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина при менингококковой инфекции

- ☐ 7 дней
☒ 10 дней
☐ 14 дней
☐ 21 день

350. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина в очаге эпидпаротита

- ☐ 7 дней
☐ 10 дней
☐ 14 дней
☒ 21 день

351. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель скарлатины

- ☐ фильтрующий вирус
☐ золотистый стафилококк
☒ бета-гемолитический стрептококк
☐ менингококк

352. Выберите единственно правильный ответ

Детям, контактным с больным скарлатиной, проводят

- ☒ осмотр кожи, носоглотки, термометрию
☐ определение границ сердца, термометрию
☐ определение диуреза, термометрию
☐ определение симптома Пастернацкого, термометрию

353. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции ребенка дошкольного возраста, заболевшего скарлатиной

- ☐ 7 дней
☐ 10 дней
☐ 14 дней
☒ 22 дня

354. Выберите единственно правильный ответ

Карантин на очаг инфекции при скарлатине после изоляции больного накладывается

- ☒ на 7 дней
☐ на 10 дней
☐ на 14 дней
☐ на 21 день

355. Выберите единственно правильный ответ

Вторичные элементы после угасания сыпи при скарлатине

- ☐ корочки
☐ пигментация
☒ шелушение
☐ расчесы

356. Выберите единственно правильный ответ

Осложнения при скарлатине

- ☒ миокардит, гломерулонефрит
☐ назофарингит, стоматит, ринит
☐ менингит, паратонзиллит
☐ пиелонефрит, отит

357. Выберите единственно правильный ответ

Ведущие симптомы при скарлатине

- ☒ сыпь, ангина, интоксикация
☐ сыпь, кашель, интоксикация
☐ сыпь, судороги, интоксикация
☐ сыпь, диарея, интоксикация

358. Выберите единственно правильный ответ

Ветряная оспа относится к группе

- ☐ кишечных инфекций
☒ воздушно-капельных инфекций
☐ трансмиссивных инфекций
☐ инфекций кожных покровов

359. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при ветряной оспе

- ☐ животные
☐ бактериовыделитель
☒ больной человек
☐ вирусоноситель

360. Выберите единственно правильный ответ

Механизм заражения ветряной оспой

- ☐ фекально-оральный
☐ парентеральный
☒ воздушно-капельный
☐ контактный

361. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции больного ветряной оспой

- ☐ до 7 дня с момента высыпаний
☒ 10 дней от начала высыпаний
☐ до 14 дней с момента высыпаний
☐ до 21 дня с момента высыпаний

362. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель краснухи

- ☒ фильтрующий вирус

- ☐ золотистый стафилококк
☐ бета-гемолитический стрептококк
☐ менингококк

363. Выберите единственно правильный ответ
 Источник инфекции при краснухе

- ☐ животные
☐ бактериовыделитель
☒ больной краснухой человек
☐ вирусоноситель

364. Выберите единственно правильный ответ
 Локализация сыпи при краснухе

- ☐ на волосистой части головы
☐ по всему телу
☒ на сгибательных поверхностях конечностей, боковых поверхностях туловища, в естественных складках кожи
☐ в основном, на ладонях и стопах

365. Выберите единственно правильный ответ
 Возбудитель дизентерии

- ☐ эшерихии
☒ шигеллы
☐ сальмонеллы
☐ иерсинии

366. Выберите единственно правильный ответ
 Детям, контактным с больными дизентерией, проводят

- ☐ термометрию
☐ пальпацию живота
☐ осмотр стула
☒ термометрию, пальпацию живота, осмотр стула

367. Выберите единственно правильный ответ
 Срок наблюдения за лицами, общавшимися с больными дизентерией

- ☐ 3 дня
☒ 7 дней
☐ 14 дней
☐ 5 дней

368. Выберите единственно правильный ответ
 Механизм заражения сальмонеллезом

- ☒ фекально-оральный
☐ воздушно-капельный
☐ парентеральный
☐ контактный

369. Выберите единственно правильный ответ
 Пути передачи вирусного гепатита А

- ☐ водный, пищевой, трансмиссивный
☐ водный, пищевой, парентеральный
☐ водный, пищевой, вертикальный
☒ водный, пищевой, контактно-бытовой

370. Выберите единственно правильный ответ
 Приказ, регламентирующий работу по вирусному гепатиту

- ☐ № 36
☒ № 408
☐ № 170
☐ № 430

371. Выберите единственно правильный ответ
 Контактным с больными вирусным гепатитом А проводят

- ☐ осмотр кожи и слизистых оболочек
☐ пальпацию печени
☐ осмотр мочи
☒ осмотр кожи, слизистых, цвета кала и мочи, пальпацию печени

372. Выберите единственно правильный ответ
 Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами гепатита В

- ☐ не проводится
☐ длится 1 месяц
☐ длится 6 месяцев
☒ длится 12 месяцев

373. Выберите единственно правильный ответ
 Правила сбора кала для исследования на яйца глистов

- ☒ кал свежесобранный трехкратно
☐ кал свежесобранный однократно
☐ кал суточной давности
☐ кал после клизмы

374. Определите соответствие между заболеваниями и сроками карантина

вирусный гепатит А	35 дней
ветряная оспа	21 день
	10 дней

375. Определите соответствие между вакцинами и заболеваниями, которые они профилактируют

АКДС	коклюш
ОПВ	полиомиелит
	корь

376. Определите соответствие между вакцинами и заболеваниями, которые они профилактируют

АКДС	дифтерия
БЦЖ	туберкулез
	корь

377. Определите соответствие между заболеваниями и его возбудителем

скарлатина	стрептококк
корь	РНК - вирус рода морбилливирусов
Ветряная оспа	ДНК - вирус из семейства вирусов герпеса
	менингококк

378. Определите соответствие между заболеваниями и механизмами их передачи

вирусный гепатит А	фекально - оральный
вирусный гепатит В	кровяной
	контактный

379. Определите соответствие между заболеваниями и механизмами их передачи

менингококковая инфекция	аэрогенный
дизентерия	фекально - оральный
	кровяной

380. Определите соответствие между заболеваниями и механизмами их передачи

коли - инфекция	фекально - оральный
скарлатина	аэрогенный
	кровяной

381. Определите соответствие между заболеванием и характером сыпи

скарлатина	точечная (пятнистая)
ветряная оспа	везикулярная
	уртикарная

382. Определите соответствие между заболеванием и характером сыпи

корь	пятнисто - папулезная
краснуха	пятнистая
	везикулярная

383. Определите соответствие между заболеванием и характером сыпи

скарлатина	мелкоточечная
менингококковая инфекция	геморрагическая «звездчатая»
	везикулярная

384. Определите соответствие между заболеванием и источником инфекции

дизентерия	человек
сальмонеллез	животные и человек
	животные

385. Определите соответствие между болезнями почек и результатами анализов мочи

гломерулонефрит	эритроцитурия, протеинурия
пиелонефрит	лейкоцитурия, бактериурия
	глюкозурия, бактериурия

386. Определите последовательность периодов инфекционного заболевания

- 1: инкубационный
- 2: начальный
- 3: разгара
- 4: реконвалесценции

387. Определите последовательность периодов бронхиальной астмы

- 1: предвестников
- 2: приступный
- 3: послеприступный
- 4: межприступный

388. Определите последовательность развития дефицита железа при анемии

- 1: прелатентный
- 2: латентный
- 3: явный

389. Определите последовательность этапов лечения ревматизма

- 1: стационар
- 2: поликлиника
- 3: санаторий

390. Определите последовательность развития периодов рахита

- 1: начальный
- 2: разгар заболевания
- 3: реконвалесценция
- 4: остаточных явлений

3. Умение квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно – технической информации

391. Выберите единственно правильный ответ
Риск развития пролежней по приказу № 123 определяют по шкале

- ☐ Нортон
- ☐ Симса
- ☐ Фаулера
- ☒ Ватерлоу

392. Выберите единственно правильный ответ
Передавать персональные данные третьим лицам можно в случае

- ☒ письменного согласия работника
- ☐ без согласия работника
- ☐ по устному разрешению
- ☐ по согласованию с администрацией

393. Выберите единственно правильный ответ
Должностные инструкции это

- ☐ свод законов
- ☐ локальный акт
- ☐ служебная записка
- ☒ документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника

394. Выберите единственно правильный ответ
Должностным преступлением является

- ☐ злоупотребление властью или служебным положением
- ☒ халатность
- ☐ оскорбление
- ☐ клевета

395. Выберите три правильных ответа

Требованием к современным послеоперационным повязкам является

- ☒ стерильность
- ☐ эстетичность
- ☐ удобство наложения
- ☐ не дорогие по стоимости
- ☒ хорошие сорбционные свойства
- ☒ гипоаллергенность

396. Выберите единственно правильный ответ
Для определения уровня квалификации специалиста и присвоения квалификационной категории проводится процедура

- ☒ аттестация
- ☐ сертификация
- ☐ аккредитация
- ☐ лицензирование

397. Выберите три правильных ответа

Цель современной фиксирующей повязки при катетеризации периферических вен

- ☒ защита места пункции от проникновения инфекции
- ☐ возможность движения катетера
- ☒ фиксация катетера
- ☐ эстетичность
- ☒ возможность визуального контроля места пункции

398. Выберите единственно правильный ответ
Главной причиной ИСМП (инфекций, связанных с медицинской помощью) является

- ☒ руки персонала
- ☐ медицинская аппаратура
- ☐ предметы ухода
- ☐ заболевание пациента

399. Выберите единственно правильный ответ
Термин инконтиненция обозначает

- ☐ недержание кала
- ☐ слюнотечение
- ☒ недержание мочи
- ☐ головная боль

400. Выберите три правильных ответа

Современные требования к средствам по уходу за кожей для профилактики пролежней

- ☒ отсутствие парникового эффекта
- ☐ поддержание pH для кожи пациента в пределах до 10
- ☐ эстетичность
- ☒ поддержание кожи в сухом состоянии
- ☒ поддержание pH для кожи пациента в пределах 4,5-5,5

401. Выберите два правильных ответа

Признаки передозировки сердечных гликозидов

- ☐ тахикардия
- ☐ нормокардия
- ☐ повышение АД
- ☒ тошнота
- ☒ нарушение цветового зрения

402. Выберите единственно правильный ответ
Повышенная чувствительность организма на повторное введение лекарственного вещества называется

- ☐ привыкание
- ☐ пристрастие
- ☐ кумуляция
- ☒ сенсibilизация

403. Выберите единственно правильный ответ
Эритроцитарная масса применяется с целью

- ☐ увеличения объема циркулирующей крови
- ☐ парентерального питания
- ☐ дезинтоксикации
- ☒ лечения анемии

404. Выберите единственно правильный ответ
Свежезамороженная плазма размораживается при температуре +37 °C на водяной бане

- ☒ непосредственно перед переливанием
- ☐ за несколько часов до переливания

- ☐ за сутки до переливания
- ☐ срок размораживания значения не имеет

405. Выберите единственно правильный ответ
Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- ☐ Уголовный кодекс
- ☐ Конституция РФ
- ☐ Трудовой кодекс
- ☒ Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

406. Выберите единственно правильный ответ
Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании

- ☒ обязательном
- ☐ добровольном
- ☐ возвратном
- ☐ социальном

407. Выберите два правильных ответа
Виды медицинского страхования

- ☒ обязательное
- ☒ добровольное
- ☐ индивидуальное
- ☐ общественное

408. Выберите единственно правильный ответ
Обязательное медицинское страхование

- ☒ всеобщее
- ☐ коллективное
- ☐ групповое
- ☐ индивидуальное

409. Выберите единственно правильный ответ
Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- ☒ обязательно
- ☐ желательно
- ☐ необязательно
- ☐ по согласованию

410. Выберите единственно правильный ответ
Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- ☒ да
- ☐ нет
- ☐ исходя из обстоятельств
- ☐ по согласованию

411. Выберите три правильных ответа
Показатели, характеризующие здоровье населения

- ☒ демографические
- ☒ заболеваемость
- ☒ инвалидность
- ☐ уровень медицинской активности населения
- ☐ уровень жизни населения
- ☐ качество жизни населения

412. Выберите два правильных ответа
Доврачебная помощь детям при одышке

- ☐ горизонтальное положение тела
- ☐ пузырь со льдом на область живота
- ☐ грелка на область грудной клетки

- ☒ оксигенотерапия
- ☒ расслабление одежды

413. Выберите единственно правильный ответ

Доврачебная помощь ребёнку при рвоте

- ☐ придать сидячее положение
- ☒ уложить на бок
- ☐ уложить на спину
- ☐ уложить на живот

414. Выберите единственно правильный ответ

Продукты, не рекомендуемые к употреблению при запорах у детей

- ☐ кисломолочные продукты
- ☐ фрукты
- ☒ рисовую кашу
- ☐ овощи

415. Выберите один правильный ответ

Продукты, рекомендуемые к употреблению при диарее у детей

- ☐ манную кашу
- ☒ кисель
- ☐ фрукты
- ☐ помидоры

416. Выберите два правильных ответа

Вещества, ограничиваемые при заболеваниях почек у детей ограничивают

- ☒ соль
- ☒ жидкость
- ☐ углеводы
- ☐ жиры

417. Выберите два правильных ответа

Помощь больному ребёнку при функциональных запорах

- ☒ слабительные травы
- ☐ лечебные клизмы
- ☒ диета
- ☐ отвар вяжущих трав

418. Выберите единственно правильный ответ

Помощь больному ребёнку при диарее

- ☐ уменьшение объема жидкости
- ☐ слабительная фитотерапия
- ☒ глюкозо - солевые растворы
- ☐ лечебные клизмы

419. Определите последовательность доврачебной помощи при стенозе гортани у детей

1: успокоить ребёнка

2: доступ свежего воздуха

3: «тропические Ванны»

4: ингаляции со щелочными растворами

420. Выберите два правильных ответа

Влияние на диурез ребенка (здорового) оказывают

- ☒ температура окружающего воздуха
- ☐ атмосферное давление
- ☐ метеоусловия
- ☐ экология
- ☒ питьевой режим ребенка

421. Выберите единственно правильный ответ

Закаливающие водные процедуры у детей

- ☒ контрастные обливания

- ☐ горячие ножные ванны
- ☐ плавание в ванной
- ☐ холодные ножные ванны

422. Выберите единственно правильный ответ

Ребёнок 8 лет потерял сознание в школе. Что из доврачебной помощи при обмороке у детей вы исключите

- ☒ надавливание на область сонной артерии
- ☐ похлопывание по щекам
- ☐ вдыхание нашатырного спирта
- ☐ обрызгивание лица холодной водой

423. Определите соответствие между степенью тяжести состояния ребёнка и клиническими проявлениями

тяжелое состояние	вынужденное положение в постели
удовлетворительное состояние	активное положение в постели

424. Определите соответствие между степенью тяжести состояния ребёнка и клиническими проявлениями

тяжелое состояние	потеря сознания
удовлетворительное состояние	ясное сознание

425. Выберите единственно правильный ответ

Влияние щадящей диеты при хроническом гастрите у детей

- ☐ повышает выделение желудочного сока
- ☐ повышает секрецию желчи
- ☐ повышает секрецию сока поджелудочной железы
- ☒ уменьшает раздражение слизистой оболочки желудка

426. Выберите единственно правильный ответ

Питание ребенка при хроническом гастрите

- ☒ 5-разовое питание малыми порциями
- ☐ 2-3разовое питание малыми порциями
- ☐ водно-чайная пауза
- ☐ питание по потребности

427. Выберите единственно правильный ответ

Действия медсестры при рвоте у ребенка

- ☐ усадить на стул
- ☒ уложить с возвышенным головным концом, голову повернуть набок
- ☐ уложить с опущенным головным концом, голову повернуть набок
- ☐ уложить на горизонтальную поверхность, поднять ноги

428. Выберите два правильных ответа

Причины гипогликемической комы у детей с сахарным диабетом

- ☐ холод
- ☒ физическая перегрузка
- ☒ передозировка инсулина
- ☐ прием пищи богатой углеводами

429. Выберите единственно правильный ответ

Положение ребёнка при проведении сердечно-легочной реанимации

- ☒ на спине, на ровной твердой поверхности
- ☐ на спине, на кровати
- ☐ оставить положение, в котором он был обнаружен
- ☐ роли не играет

430. Выберите два правильных ответа

Клинические симптомы обморока у детей

- ☐ понижение аппетита
- ☒ падение АД
- ☒ бледные кожные покровы
- ☐ олигурия
- ☐ гиперемия кожных покровов

431. Выберите два правильных ответа

Наиболее эффективные средства для купирования анафилактического шока у ребенка

- ☒ адреналин
- ☒ преднизолон
- ☐ димедрол
- ☐ актовегин
- ☐ пенициллин

432. Выберите единственно правильный ответ

Неотложная помощь ребенку с гипогликемической комой включает введение

- ☒ раствора глюкозы
- ☐ преднизолона
- ☐ адреналина
- ☐ инсулина

433. Выберите единственно правильный ответ

Площадь ожогов у детей до 5 лет определяется по правилу

- ☐ девяток
- ☒ ладони
- ☐ семерок
- ☐ десятков

434. Выберите единственно правильный ответ

Главный критерий эффективности реанимационных мероприятий

- ☐ появление розовой окраски кожных покровов
- ☐ сужение зрачков
- ☐ движение грудной клетки
- ☒ появление пульса на сонной артерии

435. Выберите единственно правильный ответ

Положение, создаваемое ребенку при носовом кровотечении

- ☐ укладывают в постель лицом вниз
- ☐ усаживают с запрокинутой головой
- ☒ усаживают с опущенным головным концом
- ☐ удерживают на ногах

436. Выберите единственно правильный ответ

Частота контроля температуры тела у ребенка при гипертермическом синдроме

- ☐ каждые 15–30 минут
- ☒ каждые 30–60 минут
- ☐ каждые 60–90 минут
- ☐ каждые 90–120 минут

437. Выберите единственно правильный ответ

Случайные отравления наиболее часто происходят, при употреблении ребенком

- ☒ лекарственных препаратов
- ☐ растительных ядов
- ☐ препаратов бытовой химии
- ☐ ядовитых грибов

438. Выберите единственно правильный ответ

Первоочередное действие при пероральном отравлении у ребенка

- ☐ провести форсированный диурез
- ☐ ввести слабительное средство
- ☐ поставить сифонную клизму
- ☒ промыть желудок

439. Выберите два правильных ответа

Клинические проявления стенозирующего ларингита у детей

- ☒ грубый лающий кашель
- ☒ развитие дыхательной недостаточности
- ☐ тихий голос
- ☐ сухой кашель
- ☐ влажный кашель

440. Выберите единственно правильный ответ

Судороги у детей раннего возраста могут проявляться при

- ☒ гипертермии
- ☐ рвоте
- ☐ повороте головы
- ☐ гипотермии

441. Выберите единственно правильный ответ

Глюкотест при сахарном диабете у детей используется для определения

- ☐ ацетона в моче
- ☐ ацетона в крови
- ☒ сахара в моче
- ☐ сахара в крови

442. Определите соответствие между заболеваниями у детей и симптомами

гломерулонефрит	гематурия
пиелонефрит	бактериурия
	понижение АД

443. Определите последовательность постановки очистительной клизмы ребенку

- 1: объяснить цель и ход процедуры
- 2: подготовить необходимое оснащение
- 3: вымыть руки, надеть фартук
- 4: смазать наконечник баллончика вазелиновым маслом
- 5: уложить ребенка на левый бок и ввести воду в прямую кишку

444. Определите последовательность стадий стеногического ларинготрахеита у детей

- 1: катаральная
- 2: стеногическая
- 3: асфиктическая

Специальность «Сестринское дело в педиатрии»

Высшая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите единственно правильный ответ

Понятие медицинская деонтология включает в себя

- ☐ изучение психики человека в условиях болезни
- ☐ влияние особенностей психики больного на развитие и течение болезни
- ☐ взаимоотношение медицинского работника и пациента

☒ учение о профессиональном долге

2. Выберите единственно правильный ответ

Внутренняя картина болезни

- ☐ фрустрация
- ☐ апатия
- ☒ реакция пациентов на болезнь
- ☐ депрессия

3. Выберите единственно правильный ответ

Придумывание симптомов болезни, желание убедить в их наличии медицинский персонал

- ☐ диссимуляция
- ☒ симуляция
- ☐ аггравация
- ☐ фобия

4. Выберите единственно правильный ответ

Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из окружающей среды

- ☐ невроз
- ☐ лихорадка
- ☐ фобии
- ☒ стресс

5. Выберите единственно правильный ответ

Детская эвтаназия в РФ

- ☐ поощряется
- ☐ законодательно разрешена
- ☐ не поощряется
- ☒ законодательно запрещена

6. Выберите единственно правильный ответ

Нормы поведения в определенных условиях во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

- ☒ деонтология
- ☐ этика
- ☐ биоэтика
- ☐ мораль

7. Выберите единственно правильный ответ

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинской сестры и пациента

- ☐ релаксация
- ☒ эмпатия (сопереживание)
- ☐ психотерапия
- ☐ рефлексия

8. Выберите три правильных ответа

Уровни общения в сестринском деле

- ☐ доверительный
- ☒ общественный

☐ убеждающий

☒ внутриличностный

☒ межличностный

☐ избегание

9. Выберите единственно правильный ответ

На медицинскую сестру, обязанность хранить профессиональную тайну распространяется

- ☒ всегда
- ☐ не распространяется
- ☐ по указанию врача
- ☐ иногда

10. Выберите единственно правильный ответ

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- ☐ в условиях стационара
- ☐ только по назначению врача
- ☒ любому человеку, нуждающемуся в ней
- ☐ в условиях поликлиники

11. Выберите единственно правильный ответ

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- ☐ сестринский процесс
- ☐ медицинский этикет
- ☒ медицинская этика
- ☐ медицинская деонтология

12. Выберите два правильных ответа

Эффективному общению с пациентами и медицинской сестрой способствует

- ☒ положительная обратная связь
- ☐ тревожность пациента
- ☐ замечания медицинской сестры
- ☒ доброжелательность медицинской сестры

13. Выберите единственно правильный ответ

Трагическое переживание болезни у пациента проявляется

- ☐ повышенной требовательностью к медицинской сестре
- ☒ суицидальными действиями
- ☐ массой жалоб
- ☐ отказом от лечения
- ☐ отказом от обследования

14. Выберите единственно правильный ответ

Конфликты с пациентами у персонала возникают по причине

- ☒ медицинский персонал не учитывает эмоции пациентов
- ☐ нарушения санитарно-эпидемического режима
- ☐ отказа пациента от обследования

15. Выберите единственно правильный ответ

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- ☐ 0–45 см

- ☒ 45–120 см
- ☐ 120–400 см
- ☐ 400–500 см

16. Выберите три правильных ответа

Агрессивность пациента может вызываться

- ☒ психическими заболеваниями
- ☒ болью и стрессом
- ☒ страхом
- ☐ низким уровнем артериального давления
- ☐ изменением климатических условий
- ☐ тахикардией

17. Выберите два правильных ответа

Естественные реакции пациентов перед операцией, манипуляциями

- ☒ тревога
- ☒ страх
- ☐ эйфория
- ☐ радость
- ☐ безразличие

18. Выберите два правильных ответа

Причины депрессии у пациентов

- ☒ травматическая потеря органа
- ☐ плохие санитарно-гигиенические условия в отделении
- ☐ хорошие анализы
- ☒ нарушение двигательной активности
- ☐ неудовлетворенность медицинской помощью

19. Выберите два правильных ответа

Определение понятия профессиональная тайна

- ☒ сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- ☐ сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- ☐ сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам
- ☒ сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

20. Выберите единственно правильный ответ

Ятрогенные заболевания обусловлены

- ☐ вредными факторами производства
- ☒ неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- ☐ заболеваниями с неблагоприятным прогнозом
- ☐ заболеваниями наследственного генеза

21. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание туберкулезом является

- ☐ наследственным
- ☒ социальным
- ☐ зоонозным
- ☐ соматическим

22. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем туберкулеза является

- ☐ вирус
- ☐ грибы
- ☒ микобактерия
- ☐ клебсиелла

23. Выберите единственно правильный ответ

Срок жизнеспособности возбудителя туберкулеза в закрытых помещениях

- ☐ до 1 месяца
- ☐ до 2 месяцев
- ☒ до 3 месяцев
- ☐ до 4 месяцев

24. Выберите два правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающие заболевание у человека

- ☒ человеческий
- ☒ бычий
- ☐ птичий
- ☐ мышинный
- ☐ собачий

25. Выберите два правильных ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- ☒ больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- ☐ больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- ☐ бактерионоситель
- ☒ больное животное
- ☐ собака

26. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ кошки

27. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ предметы быта

28. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный
- ☐ внутриутробный

29. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи туберкулеза

- ☐ воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- ☒ аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- ☐ воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- ☐ аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

30. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- ☐ производственный
- ☒ семейный

☐ в общественном транспорте

☐ половой

31. Выберите единственно правильный ответ

Цель проведения массового флюорографического обследования

☐ контроль состояния больных

☐ диагностика туберкулеза

☐ предупреждение туберкулеза

☒ раннее выявление больных туберкулезом

32. Выберите единственно правильный ответ

Ранние симптомы туберкулеза легких

☐ кровохарканье, лихорадка

☐ кашель с гнилостной мокротой, боль в боку, лихорадка

☒ слабость, покашливание, субфебрилитет

☐ влажный кашель, слабость, снижение веса

33. Выберите единственно правильный ответ

Раннему активному выявлению больных туберкулезом среди взрослых способствует

☐ массовый осмотр населения

☐ рентгеноскопия легких

☒ массовое флюорографическое обследование

☐ туберкулинодиагностика

34. Выберите единственно правильный ответ

Особенности питания при туберкулезе

☐ ограничение поваренной соли

☒ рекомендуется диета с повышенным содержанием белка и витаминов

☐ рекомендуется диета с повышенным содержанием витаминов и углеводов

☐ ограничение копченостей

35. Выберите два правильных ответа

Осложнения при туберкулезе

☐ анафилактический шок

☒ легочное кровотечение

☒ пневмоторакс

☐ пневмосклероз

☐ бронхит

36. Выберите два правильных ответа

Профилактика туберкулеза включает

☒ вакцинацию и ревакцинацию против туберкулеза

☐ химиопрофилактику контактными лицам

☐ проведение текущей дезинфекции в очаге

☒ раннее выявление больных туберкулезом

☐ проведение заключительной дезинфекции в очаге

37. Выберите единственно правильный ответ

БЦЖ является

☒ живой вакциной

☐ инаktivированной вакциной

☐ анатоксин

☐ сыворотка

38. Выберите единственно правильный ответ

Медицинские отходы из туберкулезного стационара, загрязненные мокротой относятся к отходам класса

☐ А

☐ Б

☒ В

☐ Д

39. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель ВИЧ-инфекции

☐ бактерии

☐ микобактерии

☒ вирусы

☐ кокки

40. Выберите единственно правильный ответ

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире называется

☐ вспышка

☐ эпидемия

☒ пандемия

☐ групповые заболевания

41. Выберите единственно правильный ответ

Условия гибели ВИЧ

☒ нагревание при 56 °С в течение 30 минут

☐ ультрафиолетовое облучение

☐ низкая температура

☐ воздействие радиации

42. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителем ВИЧ-инфекции является

☐ цитомегаловирус

☐ аденовирус

☒ ретровирус

☐ пикорнавирус

43. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

☐ больной гриппом человек

☐ больное животное

☐ больные птицы

☒ человек с момента заражения

44. Выберите единственно правильный ответ

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

☐ аденовирусов

☒ ретровирусов

☐ энтеровирусов

☐ пикорнавирусов

45. Выберите единственно правильный ответ

Источник заражения ВИЧ-инфекцией

☒ зараженный человек

☐ домашнее животное

☐ комары

☐ клещи

46. Выберите единственно правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

☐ слюна

☐ слезная жидкость

☒ кровь

☐ спинномозговая жидкость

47. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителя ВИЧ-инфекции

☒ артифициальный

☐ фекально-оральный

- ☐ воздушно-капельный
- ☐ трансмиссивный

48. Выберите единственно правильный ответ

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- ☒ парентеральный, половой, вертикальный
- ☐ трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- ☐ вертикальный, контактный, пищевой
- ☐ половой, водный, контактно-бытовой

49. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный путь передачи возможен

- ☒ при ВИЧ-инфекции
- ☐ при гриппе
- ☐ при дизентерии
- ☐ при туляремии

50. Выберите два правильных ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- ☐ через рукопожатия
- ☐ через укусы насекомых
- ☒ при половых контактах
- ☒ при гемотрансфузии

51. Выберите два правильных ответа

Существует риск заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери

- ☒ при грудном вскармливании
- ☒ во время родов
- ☐ при уходе за ребенком
- ☐ при поцелуях

52. Выберите единственно правильный ответ

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ 3–6 месяцев
- ☐ 3–6 недель
- ☒ 2–3 недели
- ☐ 2–3 месяца

53. Выберите единственно правильный ответ

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- ☐ до 8 месяцев
- ☒ до 12 месяцев
- ☐ до 2 лет
- ☐ 5–10 лет

54. Выберите три правильных ответа

Наиболее опасные для передачи ВИЧ биологические жидкости

- ☒ кровь
- ☐ секрет потовых желез
- ☐ моча
- ☒ сперма
- ☒ грудное молоко

55. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ-инфекции поражается

- ☐ костная система
- ☒ иммунная система
- ☐ мышечная система
- ☐ сердечно-сосудистая система

56. Выберите единственно правильный ответ

Латентная стадия ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☐ длительной лихорадкой
- ☐ увеличением печени, селезенки
- ☒ увеличением лимфоузлов
- ☐ вторичными заболеваниями

57. Выберите два правильных ответа

СПИД-маркерными являются заболевания

- ☒ пневмоцистная пневмония
- ☒ кандидоз пищевода, трахеи, бронхов
- ☐ дизентерия
- ☐ грипп
- ☐ дифтерия

58. Выберите единственно правильный ответ

Серонегативный период ВИЧ-инфекции характеризуется

- ☒ наличием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови
- ☐ наличием вируса в организме пациента при определении антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при наличии антител в крови
- ☐ отсутствием вируса в организме пациента при отсутствии антител в крови

59. Выберите единственно правильный ответ

Длительность вирусоносительства при ВИЧ-инфекции

- ☐ от 2 недель до 6 месяцев
- ☐ до 5 лет
- ☐ до 15 лет
- ☒ пожизненно

60. Выберите единственно правильный ответ

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) является

- ☒ стадией ВИЧ-инфекции
- ☐ самостоятельным заболеванием
- ☐ синонимом ВИЧ-инфекции
- ☐ осложнением ВИЧ-инфекции

61. Выберите единственно правильный ответ

Группы препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

- ☐ противовирусные
- ☒ антиретровирусные
- ☐ симптоматические
- ☐ гормональные

62. Выберите единственно правильный ответ

Простые экспресс-тесты на наличие антител к ВИЧ используют

- ☐ для подтверждения диагноза
- ☐ для выявления ВИЧ
- ☒ для тестирования при аварийных ситуациях
- ☐ для ранней диагностики

63. Выберите единственно правильный ответ

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию применяют для обследования

- ☐ доноров в плановом порядке
- ☐ беременных женщин с известным ВИЧ-статусом
- ☒ медицинских работников при аварийной ситуации
- ☐ медицинских работников при медосмотре

64. Выберите единственно правильный ответ
Контингентом с наибольшим риском заражения ВИЧ являются

- ☒ наркоманы
- ☐ беременные
- ☐ доноры
- ☐ реципиенты крови

65. Выберите единственно правильный ответ
Для диагностики ВИЧ-инфекции у больного забирают

- ☐ кал
- ☐ мочу
- ☒ кровь
- ☐ желчь

66. Выберите единственно правильный ответ
Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является

- ☒ серологический
- ☐ генетический
- ☐ люминесцентный
- ☐ бактериологический

67. Выберите единственно правильный ответ
Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 30 минут
- ☒ 2 часа
- ☐ 1 сутки
- ☐ 3 суток

68. Выберите единственно правильный ответ
Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским работником после аварийной ситуации

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 24 часа
- ☒ 72 часа

69. Выберите единственно правильный ответ
Наиболее эффективной мерой профилактики ВИЧ-инфекции среди населения является

- ☐ применение антиретровирусных препаратов среди групп риска
- ☐ массовое лабораторное обследование населения на ВИЧ-инфекцию
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- ☒ пропаганда здорового образа жизни

70. Выберите три правильных ответа
Терминальными состояниями являются

- ☒ преагония
- ☒ агония
- ☒ клиническая смерть
- ☐ биологическая смерть
- ☐ коллапс
- ☐ шок

71. Выберите три правильных ответа
Признаками клинической смерти является

- ☐ угнетение сознания

- ☐ бледность кожных покровов
- ☒ отсутствие сознания, широкие зрачки
- ☒ отсутствие дыхания
- ☒ отсутствие кровообращения

72. Выберите единственно правильный ответ
Длительность реанимационных мероприятий при их неэффективности

- ☐ 60 минут
- ☒ 30 минут
- ☐ 40 минут
- ☐ 20 минут

73. Выберите единственно правильный ответ
Реанимационные мероприятия начинаются

- ☐ с непрямого массажа сердца
- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей
- ☐ с искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☐ не имеет значения, с чего начинаются реанимационные мероприятия
- ☒ с укладывания на ровную и твердую поверхность

74. Выберите единственно правильный ответ
При проведении непрямого массажа сердца у детей 14 лет руки реаниматора располагаются

- ☐ в нижней трети грудины
- ☐ на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
- ☐ в верхней трети грудины
- ☒ в средней трети грудины

75. Выберите единственно правильный ответ
Сочетание компрессий и вдуваний при проведении реанимационных мероприятий

- ☐ 10:1
- ☐ 5:2
- ☒ 30:2
- ☐ 15:2

76. Выберите три правильных ответа

Клиническими признаками коллапса является

- ☐ потеря сознания
- ☐ повышение артериального давления
- ☒ поверхностное дыхание
- ☒ слабый, частый пульс
- ☐ редкий, слабый пульс
- ☒ резкое снижение артериального давления

77. Выберите единственно правильный ответ
Наиболее частая причина развития терминального состояния при электротравме

- ☐ титанический спазм дыхательной мускулатуры
- ☒ фибрилляция желудочков сердца
- ☐ угнетение стволовых функций головного мозга
- ☐ коллапс

78. Выберите единственно правильный ответ
При отсутствии кровообращения на фоне электротравмы реанимационные мероприятия начинают

- ☐ с восстановления проходимости дыхательных путей

- ☐ с искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ с купирования фибрилляции желудочков сердца
- ☐ с непрямого массажа сердца

79. Выберите три правильных ответа

Признаками геморрагического шока является

- ☒ бледность кожных покровов
- ☐ цианоз кожных покровов
- ☐ гиперемия кожных покровов
- ☐ обычный цвет кожных покровов
- ☒ тахипноэ
- ☒ частый, слабый пульс

80. Выберите единственно правильный ответ

Шоковый индекс Альговера – это соотношение

- ☒ частоты пульса за одну минуту к систолическому артериальному давлению
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к диастолическому артериальному давлению
- ☐ частоты пульса за одну минуту к артериальному давлению диастолическому
- ☐ частоты сердечных сокращений за одну минуту к систолическому артериальному давлению

81. Выберите единственно правильный ответ

При оказании неотложной помощи при обмороке, пациенту придать следующее положение

- ☐ горизонтальное
- ☒ горизонтальное с опущенной головой и приподнятыми ногами
- ☐ полусидя
- ☐ горизонтальное с приподнятой головой

82. Выберите единственно правильный ответ

Купирование анафилактического шока начинается с введения

- ☒ адреналина
- ☐ полиглюкина
- ☐ димедрола
- ☐ преднизолона

83. Выберите единственно правильный ответ

Для коматозного состояния наиболее характерным является следующий симптом

- ☐ угнетение сознания
- ☒ отсутствие сознания
- ☐ угнетение сердечной деятельности
- ☐ угнетение дыхания

84. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипогликемической комы является

- ☒ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

85. Выберите единственно правильный ответ

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения

- ☒ 40 % раствора глюкозы
- ☐ 10 % раствора глюкозы
- ☐ 5 % раствора глюкозы
- ☐ инсулина

86. Выберите единственно правильный ответ

Клиническими признаками гипергликемической комы является

- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- ☐ сознание отсутствует, кожа бледная холодная, одышка, зрачки различной величины
- ☒ сознание отсутствует, кожа сухая, гиперемия, дыхание шумное типа Куссмауля
- ☐ сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

87. Выберите единственно правильный ответ

Промывание желудка в коме проводят

- ☐ без интубации трахеи
- ☒ после интубации трахеи
- ☐ не имеет значения
- ☐ не проводят

88. Выберите единственно правильный ответ

Отек легких относится

- ☐ к острой правожелудочковой недостаточности
- ☐ к острой бивентрикулярной недостаточности
- ☒ к острой левожелудочковой недостаточности
- ☐ к острой предсердной недостаточности

89. Выберите два правильных ответа

Пациенту с носовым кровотечением следует придать положение

- ☒ усадить
- ☐ уложить
- ☐ не имеет значения
- ☐ голову запрокинуть
- ☒ голову опустить

90. Выберите единственно правильный ответ

Последовательность действий при остром лекарственном отравлении

- ☒ промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма
- ☐ прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма
- ☐ очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка
- ☐ промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

91. Выберите три правильных ответа

Клиническими симптомами внутреннего кровотечения является

- ☒ снижение артериального давления
- ☒ нитевидный пульс
- ☒ резкая слабость
- ☐ гиперемия кожных покровов
- ☐ затрудненное дыхание

92. Выберите единственно правильный ответ

При отморожении мягких тканей, в качестве неотложной помощи в до реактивного периода рекомендуется

- ☐ легкое постепенное согревание
- ☐ активное согревание пораженных участков
- ☒ наложение термоизолирующей повязки
- ☐ обработка отмороженных участков спиртом

93. Выберите три правильных ответа

Беззондовый метод промывания желудка противопоказан при

- ☒ судорожном синдроме
- ☒ отравлении прижигающими ядами
- ☒ отсутствии сознания
- ☐ отравлении не прижигающими ядами и сохраненном сознании
- ☐ не имеет значения

94. Выберите два правильных ответа

При отравлении угарным газом необходимо

- ☒ вывести пострадавшего из зараженной зоны
- ☐ провести непрямой массаж сердца
- ☐ провести искусственное дыхание
- ☐ уложить пострадавшего
- ☒ провести оксигенацию легких

95. Выберите единственно правильный ответ

Основной механизм развития геморрагического шока

- ☒ уменьшение объема циркулирующей крови
- ☐ сердечная недостаточность
- ☐ парез сосудов
- ☐ плазмопотеря

96. Выберите единственно правильный ответ

Тройной прием Сафара применяют

- ☐ для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- ☒ для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- ☐ для проведения прекардиального удара
- ☐ для закрытого массажа сердца

97. Выберите три правильных ответа

Критериями правильного наложения кровоостанавливающего жгута является

- ☒ остановка кровотечения
- ☒ отсутствие пульса ниже жгута
- ☐ цианоз конечности
- ☐ гиперемия конечности
- ☒ бледность конечности

98. Выберите три правильных ответа

Клиническими признаками обморока является

- ☒ потеря сознания
- ☒ поверхностное дыхание
- ☐ слабый, частый пульс
- ☒ редкий, слабый пульс
- ☐ повышенное АД

99. Выберите единственно правильный ответ

Внезапная кардиальная смерть чаще развивается вследствие

- ☒ фибрилляции желудочков сердца
- ☐ остановки дыхания
- ☐ асистолии желудочков сердца
- ☐ электромеханической диссоциации

100. Выберите единственно правильный ответ

Максимальная продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет

- ☐ 2 часа
- ☐ 4 часа
- ☐ 1,5 часа
- ☒ 30 минут

101. Выберите единственно правильный ответ

При проведении сердечно-легочной реанимации у ребенка 14 лет, количество компрессий за минуту должно быть не менее

- ☐ 60
- ☐ 80
- ☒ 100
- ☐ 120

102. Выберите два правильных ответа

При травме позвоночника пострадавшего транспортируют в положении

- ☐ полусидя
- ☒ на спине и на щите
- ☒ на носилках, на животе
- ☐ на спине
- ☐ в положении лягушки

103. Выберите единственно правильный ответ

При поверхностных ожогах оказание помощи начинают

- ☐ с наложения повязки
- ☒ с охлаждения ожога холодной проточной водой
- ☐ с обработки ожога спиртом
- ☐ с обезболивания

104. Выберите единственно правильный ответ

Для промывания желудка температура воды составляет

- ☐ +37 °C
- ☐ +25 °C
- ☒ +18 °C
- ☐ +10 °C

105. Выберите единственно правильный ответ

При отравлении уксусной эссенцией промывание желудка проводится

- ☐ теплой водой
- ☐ холодной водой
- ☒ после обезболивания и введения атропина
- ☐ слабым раствором соды

106. Выберите два правильных ответа

Специфическими признаками перелома кости конечности является

- ☐ боль
- ☐ отек
- ☒ патологическая подвижность отломков в месте перелома
- ☐ деформация
- ☒ крепитация в месте перелома

107. Выберите три правильных ответа

Признаками биологической смерти являются

- ☒ помутнение и высыхание роговицы
- ☐ отсутствие кровообращения
- ☐ отсутствие дыхания
- ☒ симптом «Кошачий глаз»

- ☒ трупное окоченение

108. Выберите единственно правильный ответ
Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является

- ☐ введение антигистаминных препаратов
☒ введение адреналина и глюкокортикоидов
☐ наложение жгута выше места инъекции
☐ восполнение объема циркулирующей крови

109. Выберите единственно правильный ответ
Основными мероприятиями при открытом переломе являются

- ☐ восполнение объема циркулирующей крови, введение адреналина
☒ остановка кровотечения, обезболивание, иммобилизация
☐ введение сердечных гликозидов, гепарина
☐ иммобилизация, обезболивание

110. Выберите два правильных ответа

Причинами развития анафилактического шока являются

- ☒ снижение тонуса сосудов
☒ снижение объема циркулирующей крови
☐ сердечная недостаточность
☐ болевой синдром
☐ дыхательная недостаточность

111. Выберите единственно правильный ответ
Пациенту придается устойчивое боковое положение для предупреждения

- ☒ аспирации рвотными массами
☐ шока
☐ скопления мокроты в бронхах
☐ ларингоспазма

112. Выберите два правильных ответа

Критериями эффективности реанимации является

- ☐ отсутствие реакции зрачков на свет, усиление цианоза кожи
☐ отсутствие реакции зрачков на свет, уменьшение цианоза кожи
☐ отсутствие дыхательных движений, расширение зрачков
☒ восстановление сердечной деятельности и дыхания
☒ положительная реакция сужения зрачков на свет, уменьшение цианоза

113. Выберите единственно правильный ответ
Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности

- ☐ 1 час
☐ 30 минут
☐ 2 часа
☒ до восстановления жизнедеятельности

114. Выберите единственно правильный ответ
Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии

- ☐ до 3–4 минут
☐ до 10–12 минут
☐ до 2–3 минут
☒ до 5–6 минут

115. Выберите единственно правильный ответ
Наиболее эффективным препаратом при бронхоспазме является

- ☐ пипольфен
☐ но-шпа
☐ преднизолон
☒ эуфиллин

116. Выберите три правильных ответа

При желудочном кровотечении необходимы следующие мероприятия

- ☐ тепло на область желудка
☐ обезболивание
☐ приподнятый головной конец
☒ горизонтальное положение
☒ холод на область желудка
☒ экстренная госпитализация

117. Выберите три правильных ответа

Наиболее характерными проблемами у пациента с сотрясением головного мозга являются

- ☐ падение артериального давления
☐ повышение артериального давления
☒ головная боль
☒ тошнота, рвота
☐ очаговые неврологические симптомы
☒ кратковременная потеря сознания

118. Выберите единственно правильный ответ

При явлениях острой сосудистой недостаточности больному необходимо придать положение

- ☐ сидя
☒ горизонтальное положение с опущенной головой и приподнятыми ногами
☐ полусидячее
☐ горизонтальное с приподнятой головой и опущенными ногами

119. Выберите единственно правильный ответ

При переломе костей средней трети голени необходимо зафиксировать

- ☐ 1 сустав
☒ 2 сустава
☐ 3 сустава
☐ не имеет значения

120. Выберите единственно правильный ответ

Из перечисленных препаратов наиболее часто вызывают развитие анафилактического шока

- ☐ гормональные препараты
☒ местные анестетики
☐ антигистаминные препараты
☐ сердечные гликозиды

121. Выберите единственно правильный ответ

Временный гемостаз осуществляется при помощи

- ☐ наложения сосудистого шва
☒ пальцевого прижатия
☐ диатермокоагуляции
☐ пузыря со льдом

122. Выберите два правильных ответа

При попадании прижигающего яда на кожу или слизистые оболочки, активная детоксикация сводится

- ☒ к промыванию пораженных участков большим количеством проточной воды
- ☐ к промыванию пораженных участков большим количеством нейтрализующих растворов
- ☒ к наложению на пораженные участки сухих асептических повязок

- ☐ к наложению на пораженные участки мазевых повязок с нейтрализующим эффектом
- ☐ к наложению на пораженные участки гелевых повязок с нейтрализующим эффектом

123. Выберите два правильных ответа

Мероприятия по удалению инородных тел из трахеи при обтурационной асфиксии на догоспитальном этапе

- ☐ ларингоскопия, интубация трахеи, искусственная вентиляция легких
- ☐ коникотомия, искусственная вентиляция легких
- ☒ удар ладонью по спине
- ☒ компрессия в эпигастрии

124. Выберите единственно правильный ответ

Поздним признаком биологической смерти является

- ☐ остановка дыхания
- ☐ отсутствие сердечной деятельности более 30 минут (при нормотермии)
- ☐ зрачок не реагирует на свет, максимально расширен
- ☐ отсутствие роговичного рефлекса
- ☒ гипостатические пятна в отлогих местах тела, трупное окоченение

125. Выберите три правильных ответа

Причины гипогликемической комы

- ☒ голодание
- ☒ физическая перегрузка
- ☒ передозировка инсулина
- ☐ прием пищи богатой углеводами

126. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее ранний признак эффективности сердечно-легочной реанимации

- ☒ сужение зрачков
- ☐ появление пульса на сонной артерии
- ☐ повышение артериального давления до 60–70 мм рт. ст.
- ☐ появление дыхательных движений

127. Выберите единственно правильный ответ

Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

- ☒ на спине, на ровной твердой поверхности
- ☐ на спине, на кровати
- ☐ оставить положение, в котором он был обнаружен
- ☐ роли не играет

128. Выберите единственно правильный ответ

При диагностике клинической смерти необходимо определить в первую очередь

- ☒ сознание
- ☐ частоту пульса
- ☐ дыхание

- ☐ время с момента смерти

- ☐ степень одышки

129. Выберите единственно правильный ответ

При отсутствии сознания оценивают

- ☐ пульс, артериальное давление
- ☐ величину зрачков
- ☐ время с момента травмы и заболевания
- ☐ данные осмотра, пальпацию
- ☒ наличие дыхания, кровообращения, величину зрачков и их реакцию на свет

130. Выберите единственно правильный ответ

Ранние признаки биологической смерти

- ☐ трупные пятна, трупное окоченение
- ☐ отсутствие дыхания
- ☐ судорожные подергивания
- ☒ помутнение роговицы глаза, симптом «Кошачьего глаза»

131. Выберите единственно правильный ответ

Меры профилактики внутрибольничной инфекции предусмотрены инструкциями

- ☒ по санитарно-противоэпидемическому режиму
- ☐ по лечению нозологических форм болезни
- ☐ по лечебно-охранительному режиму
- ☐ по исследованиям пациента

132. Выберите единственно правильный ответ

Систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности в лечебно-профилактическом учреждении организует

- ☐ главный врач
- ☐ главная медсестра
- ☐ старшая медсестра
- ☒ эпидемиолог

133. Выберите единственно правильный ответ

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в стационаре несет

- ☒ главный врач
- ☐ главная медсестра
- ☐ старшая медсестра
- ☐ заведующий отделением

134. Выберите два правильных ответа

Ответственность за организацию и контроль санитарно-эпидемиологического режима в отделении возлагается

- ☐ на главную медицинскую сестру
- ☒ на старшую медицинскую сестру
- ☐ на главного врача
- ☒ на заведующего отделением

135. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности, является

- ☐ карантинным
- ☐ особо опасным
- ☒ внутрибольничным (ВБИ)
- ☐ эндемичным

136. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение

- ☒ микроорганизмов
- ☐ грызунов
- ☐ насекомых
- ☐ членистоногих

137. Выберите единственно правильный ответ

Механическим методом дезинфекции является

- ☒ проветривание
- ☐ кварцевание
- ☐ кипячение
- ☐ автоклавирование
- ☐ пастеризация

138. Выберите единственно правильный ответ

УФО является методом

- ☐ стерилизации
- ☒ дезинфекции
- ☐ дезинсекции
- ☐ дератизации

139. Выберите единственно правильный ответ

Физическим методом дезинфекции является

- ☐ уборка помещений
- ☐ проветривание
- ☐ стирка
- ☒ кипячение

140. Выберите единственно правильный ответ

Профилактическую дезинфекцию проводят

- ☐ вокруг больного
- ☐ вокруг носителя
- ☐ после выздоровления больного
- ☒ для предупреждения распространения инфекции

141. Выберите единственно правильный ответ

Химический метод дезинфекции медицинского инструментария проводят

- ☐ паром под давлением
- ☐ сухим горячим воздухом
- ☐ УФ-лучами
- ☒ дезинфицирующими средствами

142. Выберите единственно правильный ответ

Перед дезинфекцией растворами многократного применения инструменты отмываются от биологических сред

- ☐ да
- ☐ нет
- ☒ в зависимости от инструкции по применению
- ☐ не имеет значения

143. Выберите единственно правильный ответ

Режим дезинфекции фендоскопа

- ☐ протирание 4% раствором перекиси водорода
- ☐ протирание 3% раствором перекиси водорода
- ☐ протирание 6% раствором перекиси водорода
- ☒ протирание 70% раствором этилового спирта, двух - кратно

144. Выберите единственно правильный ответ

Генеральную уборку процедурного кабинета проводят с периодичностью

- ☐ 1 раз в 3 дня

- ☒ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☐ 1 раз в месяц

145. Выберите единственно правильный ответ

Текущую уборку процедурного кабинета проводят

- ☐ 1 раз в день
- ☐ 3 раза в сутки
- ☒ 2 раза в день
- ☐ 4 раза в сутки

146. Выберите единственно правильный ответ

Генеральную уборку палат проводят

- ☐ 1 раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☒ 1 раз в месяц

147. Выберите два правильных ответа

Методы дезинфекции для предметов ухода за больными (грелок, пузырей, клеенок)

- ☐ орошение
- ☐ промывание
- ☒ замачивание
- ☒ протирание

148. Выберите единственно правильный ответ

Проба для определения остатков скрытой крови на инструментах

- ☐ аспириновая
- ☒ азопирамовая
- ☐ фенолфталеиновая
- ☐ с суданом III

149. Выберите единственно правильный ответ

Проба для определения остатков моющих средств на инструментах

- ☐ бензидиновая
- ☐ азопирамовая
- ☒ фенолфталеиновая
- ☐ с суданом III

150. Выберите единственно правильный ответ

При положительной пробе на остатки крови на инструменте появляется окраска

- ☐ зеленая
- ☒ сине-фиолетовая
- ☐ розовая
- ☐ желтая

151. Выберите единственно правильный ответ

При положительной пробе на остатки моющих средств на инструменте появляется окраска

- ☐ зеленая
- ☒ розовая
- ☐ сине-фиолетовая
- ☐ желтая

152. Выберите единственно правильный ответ

В пакетах из мешочной бумаги (крафт-пакетах) изделия стерилизуются

- ☒ паровым методом
- ☐ радиационным методом
- ☐ химическим методом
- ☐ воздушным

153. Выберите единственно правильный ответ

Количество инструментов, которое необходимо взять для контроля качества предстерилизационной очистки

- ☐ 3 % от обработанной партии
- ☐ 5 % от обработанной партии
- ☒ 1 % от обработанной партии
- ☐ 1 инструмент

154. Выберите единственно правильный ответ

Индикаторы стерилизации изделий из металла в автоклаве

- ☐ ИС – 180 °С
- ☐ ИС – 160 °С
- ☒ ИС – 132 °С
- ☐ ИС – 120 °С

155. Выберите единственно правильный ответ

Индикаторы стерилизации перевязочного материала, белья

- ☐ ИС – 180 °С
- ☐ ИС – 160 °С
- ☒ ИС – 132 °С
- ☐ ИС – 120 °С

156. Выберите единственно правильный ответ

Документ, регламентирующий стерилизацию и дезинфекцию изделий медицинского назначения

- ☐ приказ № 720
- ☐ приказ № 408
- ☐ приказ № 747
- ☒ ОСТ 42-21-2-85

157. Выберите единственно правильный ответ

Уровень деcontаминации рук медицинского персонала перед и после кормления пациента

- ☐ профилактический
- ☐ терапевтический
- ☒ гигиенический
- ☐ хирургический

158. Выберите единственно правильный ответ

Цель хирургической обработки рук медицинского персонала

- ☐ обеспечение кратковременной стерильности
- ☒ обеспечение продолжительной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

159. Выберите единственно правильный ответ

Цель гигиенической деcontаминации рук медицинского персонала

- ☐ обеспечение продолжительной стерильности
- ☒ создание кратковременной стерильности
- ☐ профилактика профессионального заражения
- ☐ удаление бытового загрязнения

160. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность мытья рук после любой манипуляции

- ☐ 5 минут
- ☒ 1 минута
- ☐ 30 секунд
- ☐ 15 секунд

161. Выберите единственно правильный ответ

Естественная среда обитания и резервуар стафилококка в организме человека

- ☐ кожа
- ☐ кишечник
- ☒ передние отделы носа
- ☐ мочевыделительная система

162. Выберите единственно правильный ответ

Для медицинских работников наиболее надежным способом профилактики инфекционного контакта с ВИЧ-инфекцией, гепатитами является

- ☐ обследование всех пациентов
- ☐ профилактические прививки
- ☒ соблюдение стандартных мер защиты
- ☐ полноценное питание

163. Выберите единственно правильный ответ

Частота смены маски при карантине по гриппу в ЛПУ

- ☐ 1 час
- ☒ 2 часа
- ☐ 3 часа
- ☐ 4 часа

164. Выберите единственно правильный ответ

Периодичность смены халата в процедурном кабинете ЛПУ

- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ 1 раз в 2 дня
- ☒ 1 раз в смену
- ☐ 1 раз в 3 дня

165. Выберите единственно правильный ответ

При выполнении инъекций смену перчаток рекомендуется проводить

- ☒ после каждого пациента
- ☐ после всех инъекций
- ☐ после 3-х пациентов
- ☐ после 5 пациентов

166. Выберите единственно правильный ответ

Кожа инъекционного поля протирается стерильным ватным тампоном с кожным антисептиком

- ☐ однократно
- ☒ последовательно дважды
- ☐ последовательно трижды
- ☐ последовательно четырежды

167. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность измерения температуры в подмышечной области составляет

- ☐ 2–5 минут
- ☐ 5–7 минут
- ☒ 7–10 минут
- ☐ до 15 минут

168. Выберите единственно правильный ответ

Температура тела здорового человека, измеряемая в прямой кишке, составляет

- ☐ 35–36 °С
- ☐ 36–37 °С
- ☒ 37–38 °С
- ☐ 38–39 °С

169. Выберите единственно правильный ответ

Температура тела называется фебрильной, если она находится в интервале

- ☐ 36–37 °C
- ☐ 37–38 °C
- ☒ 38–39 °C
- ☐ 39–40 °C

170. Выберите единственно правильный ответ

Для сужения кровеносных сосудов кожи и глубже расположенных тканей и органов используют

- ☐ банки
- ☐ горячую ванну
- ☒ пузырь со льдом
- ☐ горчичники

171. Выберите единственно правильный ответ

Для расширения кровеносных сосудов и расслабления гладкой мускулатуры применяется

- ☐ пузырь со льдом
- ☒ грелка
- ☐ прохладная ванна
- ☐ холодный компресс

172. Выберите единственно правильный ответ

Показание для применения согревающего компресса или грелки

- ☐ острый аппендицит
- ☐ кровотечение
- ☐ ушибы в первые часы
- ☒ инфильтрат на месте инъекций

173. Выберите два правильных ответа

Пузырь со льдом применяется

- ☐ при приступе почечной колики
- ☐ при лихорадке в I периоде
- ☐ при пневмонии
- ☒ при кровотечении
- ☒ при лихорадке во II периоде

174. Выберите единственно правильный ответ

Полуспиртовый согревающий компресс целесообразно использовать

- ☐ 2–3 часа
- ☐ 10–15 минут
- ☐ 30–40 минут
- ☒ 4–6 часов

175. Выберите единственно правильный ответ

В лечебном отделении должен быть запас лекарств, обеспечивающий

- ☐ суточную потребность
- ☒ двух-трехдневную потребность
- ☐ недельную потребность
- ☐ месячную потребность

176. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной столовой ложки составляет

- ☐ 5 мл
- ☐ 10 мл
- ☒ 15 мл
- ☐ 30 мл

177. Выберите единственно правильный ответ

Вместимость одной чайной ложки составляет

- ☒ 5 мл
- ☐ 10 мл

☐ 15 мл

☐ 30 мл

178. Выберите единственно правильный ответ

Шприц Жане применяется

- ☐ для подкожных инъекций
- ☐ для внутримышечных инъекций
- ☐ для внутривенных инъекций
- ☒ для промывания полостей

179. Выберите единственно правильный ответ

Область ягодицы для внутримышечных инъекций

- ☐ верхневнутренний квадрант
- ☒ верхненаружный квадрант
- ☐ нижненаружный квадрант
- ☐ нижневнутренний квадрант

180. Выберите единственно правильный ответ

Артериальное давление зависит

- ☐ только от частоты сокращений сердца
- ☐ только от силы сокращений сердца
- ☐ только от тонуса артериальной стенки
- ☒ как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериального столба

181. Выберите единственно правильный ответ

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением является

- ☐ максимальным артериальным давлением
- ☐ минимальным артериальным давлением
- ☒ пульсовым давлением
- ☐ дефицитом пульса

182. Выберите единственно правильный ответ

Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Пролежни», определен приказом МЗ РФ

- ☒ № 123
- ☐ № 330
- ☐ № 408
- ☐ № 720

183. Выберите единственно правильный ответ

При обработке глаз ресницы и веки протирают по направлению

- ☐ от центра к углам глаза
- ☒ от наружного края к внутреннему
- ☐ произвольно
- ☐ от внутреннего угла к наружному

184. Выберите два правильных ответа

Преимуществом введения лекарственных веществ через рот является

- ☐ частичная инаktivация в печени
- ☒ простота и доступность
- ☐ требуется соблюдение стерильности
- ☒ введение не требует специально подготовленного персонала

185. Выберите единственно правильный ответ

Преимуществом внутривенного пути введения является

- ☐ простота и доступность
- ☐ не требуется соблюдение стерильности
- ☒ обеспечение более управляемого и быстрого лекарственного воздействия
- ☐ отсутствие аллергических реакций

186. Выберите два правильных ответа

Местами возможной локализации опрелостей являются

- ☒ под молочными железами
- ☐ на затылке
- ☐ на лопатках
- ☒ в паховых складках

187. Выберите единственно правильный ответ

Для постановки очистительной клизмы для ребенка 14 лет готовят

- ☐ 100 мл касторового масла
- ☒ 1 литр чистой воды
- ☐ 10 литров чистой воды
- ☐ 100 мл отвара ромашки

188. Выберите единственно правильный ответ

Пассивный искусственный иммунитет формируется на введение

- ☐ живой ослабленной вакцины
- ☐ убитой (инактивированной) вакцины
- ☐ анатоксинов
- ☒ иммуноглобулинов

189. Выберите единственно правильный ответ

Перед проведением профилактической прививки проводится

- ☒ медицинский осмотр, термометрия
- ☐ медицинский осмотр, термометрия, проведение анализов мочи, крови
- ☐ медицинский осмотр, термометрия, иммунологическое исследование

190. Выберите единственно правильный ответ

Общие прививочные реакции на АКДС-вакцинацию

- ☒ повышение температуры тела
- ☐ общие токсические осложнения
- ☐ общие аллергические реакции немедленного и замедленного типа
- ☐ осложнения со стороны центральной нервной системы

191. Выберите единственно правильный ответ

Аллергическое осложнение немедленного типа при АКДС-вакцинации

- ☒ анафилактический шок
- ☐ повышение температуры тела до 37,5 °С
- ☐ вялость
- ☐ головная боль

192. Выберите единственно правильный ответ

Цель постановки пробы Манту

- ☐ лечебная
- ☒ диагностическая
- ☐ профилактическая
- ☐ лечебно - диагностическая

193. Выберите единственно правильный ответ

Иммунобиологический препарат, используемый для постановки пробы Манту

- ☐ вакцина БЦЖ
- ☒ туберкулин
- ☐ бруцеллин
- ☐ дизентерин

194. Выберите единственно правильный ответ

Способ введения туберкулина

- ☐ подкожно
- ☒ внутрикожно
- ☐ внутримышечно
- ☐ подкожно

195. Выберите единственно правильный ответ

Постоянные противопоказания к вакцинации

- ☐ железодефицитная анемия легкой степени
- ☐ стабильные неврологические состояния
- ☐ рахит
- ☒ анафилактический шок на предыдущее введение вакцины

196. Выберите единственно правильный ответ

Относительные противопоказания к вакцинации

- ☐ первичный иммунодефицит
- ☐ злокачественные заболевания
- ☒ острые заболевания
- ☐ сильная реакция на предыдущую дозу этой вакцины

197. Выберите единственно правильный ответ

Схема вакцинации против гепатита В

- ☐ 0–3–7 месяцев
- ☐ 1–4–8 месяцев
- ☒ 0–1–6 месяцев
- ☐ 2–4–10 месяцев

198. Выберите единственно правильный ответ

Признаки местной прививочной реакции на вакцинацию

- ☒ инфильтрат менее 8 см в диаметре
- ☐ крапивница
- ☐ абсцесс
- ☐ некроз тканей

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

199. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- ☐ слабость
- ☐ недомогание
- ☐ снижение аппетита
- ☒ кашель

200. Выберите единственно правильный ответ

Решающее значение в диагностике пневмонии у детей имеет

- ☐ общий анализ крови
- ☐ общий анализ мочи
- ☒ рентгенография легких
- ☐ спирография

201. Выберите единственно правильный ответ
Этиотропная терапия пневмонии у детей - это применение

- ☒ противомикробные препараты
- ☐ десенсибилизирующие препараты
- ☐ отхаркивающие препараты
- ☐ бронхолитические препараты

202. Выберите единственно правильный ответ
Причина затрудненного дыхания при остром рините у детей

- ☒ отек слизистой, гиперсекреция слизи
- ☐ отек слизистой, гиперсекреция мокроты
- ☐ атрофия слизистой, гиперсекреция слизи
- ☐ атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты

203. Выберите единственно правильный ответ
Ведущим симптомом при остром отите у детей является

- ☐ кашель
- ☐ одышка
- ☐ боль в грудной клетке
- ☒ боль в ухе

204. Выберите единственно правильный ответ
Для закапывания капель в наружный слуховой проход у детей раннего возраста ушную раковину оттягивают

- ☒ книзу
- ☐ вверх
- ☐ влево
- ☐ вправо

205. Выберите единственно правильный ответ
Острый бронхит у детей вызывается преимущественно

- ☒ вирусами
- ☐ пневмококками
- ☐ микоплазмой
- ☐ хламидиями

206. Выберите единственно правильный ответ
При бронхите у детей поражается

- ☐ бронхи мелкого калибра
- ☒ бронхи разного калибра
- ☐ паренхима лёгкого
- ☐ бронхи главные

207. Выберите единственно правильный ответ
Укажите наиболее характерное проявление простого бронхита у детей

- ☒ сухой кашель, повышение температуры тела в течение 2-3-х дней
- ☐ дистанционные хрипы
- ☐ интоксикация, повышение температуры тела в течение 5-7 дней
- ☐ отсутствие эффекта от антибиотиков

208. Выберите единственно правильный ответ
Для обструктивного бронхита у детей наиболее характерны

- ☐ сухие хрипы
- ☒ сухие свистящие хрипы
- ☐ влажные разнокалиберные хрипы
- ☐ влажные хрипы

209. Выберите единственно правильный ответ
У детей в возрасте до 1 года пневмония вызывается преимущественно

- ☐ вирусами
- ☒ стафилококками
- ☐ гемофильной палочкой
- ☐ микоплазмой

210. Выберите единственно правильный ответ
Бронхиальная астма – это

- ☐ острое аллергическое воспалительное заболевание бронхов
- ☐ хроническое воспалительное заболевание бронхов
- ☒ хроническое аллергическое воспаление бронхов
- ☐ острое воспалительное заболевание бронхов

211. Выберите единственно правильный ответ
Тяжесть течения БА у детей определяется в первую очередь

- ☒ наличием астматического статуса в анамнезе
- ☐ частотой ночных приступов
- ☐ способом купирования приступов
- ☐ частотой дневных приступов

212. Выберите единственно правильный ответ
Неотложную помощь при приступе БА у детей следует начинать с введения

- ☒ сальбутамола
- ☐ ипратропиума бромид
- ☐ эуфиллина
- ☐ преднизолона

213. Выберите единственно правильный ответ
О хронизации бронхолегочного процесса следует говорить, если он сохраняется

- ☐ 3 месяца
- ☐ 6 недель
- ☐ 1 месяц
- ☒ 6 месяцев

214. Выберите единственно правильный ответ
Бронхиальная астма у ребенка характеризуется

- ☐ лихорадкой
- ☐ судорогами
- ☒ приступами удушья
- ☐ отеками

215. Выберите единственно правильный ответ
Наиболее частое осложнение ОРВИ у детей

- ☐ лейкоз
- ☒ пневмония
- ☐ сахарный диабет
- ☐ туберкулез

216. Выберите единственно правильный ответ
Независимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы у ребенка

- ☐ провести оксигенотерапию
- ☐ ввести бронхолитики
- ☒ освободить от стесняющей одежды
- ☐ ввести глюкокортикоиды

217. Выберите единственно правильный ответ
Клинические симптомы назофарингита у детей

- ☐ отеки

- ☐ желтуха
- ☐ кровотечения
- ☒ кашель

218. Выберите единственно правильный ответ
Возможное осложнение ринита у грудных детей

- ☒ отит
- ☐ асфиксия
- ☐ ложный круп
- ☐ ангина

219. Выберите единственно правильный ответ
Содержание глюкозы в плазме крови у детей составляет

- ☐ 1,5 – 2,5 ммоль/л
- ☐ 2,6 – 3,2 ммоль/л
- ☒ 3,3 – 5,5 ммоль/л
- ☐ 8,2 – 9,5 ммоль/л

220. Выберите единственно правильный ответ
Одной из наиболее частых причин хронического гастрита у детей является

- ☐ длительный прием салицилатов
- ☐ пищевая аллергия
- ☒ нерегулярное и неполноценное по составу питание
- ☐ хронические заболевания печени и желчевыводящих путей

221. Выберите единственно правильный ответ
Существенную роль в язвообразовании у детей отводят

- ☐ кишечной палочке
- ☐ протее
- ☒ хеликобактерным микроорганизмам
- ☐ палочке молочно-кислого брожения

222. Выберите единственно правильный ответ
При желудочно-кишечном кровотечении у ребёнка медсестра в первую очередь обеспечит

- ☒ экстренную транспортировку в стационар
- ☐ промывание желудка раствором аминокaproновой кислоты
- ☐ проведение гемостатической терапии
- ☐ направление на ФГДС

223. Выберите единственно правильный ответ
При глистных инвазиях боли локализуются

- ☐ в правом подреберье
- ☐ в эпигастральной области
- ☐ в левом подреберье
- ☒ в околопупочной области

224. Выберите единственно правильный ответ
Выберите жалобу, характеризующую диспептические расстройства у детей раннего возраста

- ☐ головная боль
- ☐ утомляемость
- ☒ метеоризм
- ☐ похудании

225. Выберите единственно правильный ответ
Назовите возбудителя герпетического стоматита у детей

- ☒ вирус
- ☐ стрептококк

- ☐ острица
- ☐ хеликобактер

226. Выберите единственно правильный ответ
Приоритетная проблема при энтеробиозе у детей

- ☐ кашель
- ☐ боль в животе
- ☐ запор
- ☒ зуд в перианальной области

227. Выберите единственно правильный ответ
Вид питания ребёнка, больного стоматитом

- ☐ острые блюда
- ☐ продукты, богатые клетчаткой
- ☒ теплую, жидкую, полужидкую пищу
- ☐ слизкогонные продукты

228. Выберите единственно правильный ответ
Соскоб с перианальных складок проводится для диагностики у детей

- ☐ лямблиоза
- ☒ энтеробиоза
- ☐ эшерихеоза
- ☐ аскаридоза

229. Выберите единственно правильный ответ
Приоритетная проблема при кандидозном стоматите у детей

- ☐ головная боль
- ☐ слюнотечение
- ☒ высыпания и боль в полости рта
- ☐ насморк

230. Выберите единственно правильный ответ
Энтеробиоз у детей может приводить к развитию

- ☐ кишечного кровотечения
- ☐ менингита
- ☒ вульвовагинита
- ☐ пенетрации

231. Выберите единственно правильный ответ
В клинике афтозного стоматита у детей характерно

- ☐ раздражительность
- ☐ лихорадка
- ☒ гиперсаливация
- ☐ боль в животе

232. Выберите единственно правильный ответ
Осложнение аскаридоза

- ☐ перфорация
- ☐ пенетрация
- ☐ аутоинвазия
- ☒ кишечная непроходимость

233. Выберите единственно правильный ответ
Сорбент, применяемый у детей младшего возраста

- ☐ мотилиум
- ☐ кларитромицин
- ☒ смекта
- ☐ тетрациклин

234. Выберите единственно правильный ответ
Ангацид, применяемый у детей в старшем возрасте

- ☐ анальгин
- ☐ ампициллин
- ☒ альмагель
- ☐ аминазин

235. Выберите единственно правильный ответ
При дисфункциональных расстройствах билиарного тракта по гипертонической форме, у детей исключается

- ☒ сливочное масло
- ☐ отварное мясо
- ☐ свежий хлеб
- ☐ творожная запеканка

236. Выберите единственно правильный ответ
Желчегонный препарат, применяемый у детей

- ☐ омепразол
- ☒ оксафенамид
- ☐ оксациллин
- ☐ ортофен

237. Выберите единственно правильный ответ
Для диагностики язвенной болезни и 12-перстной кишки ребёнку проводится

- ☐ УЗИ органов брюшной полости
- ☐ анализ на скрытую кровь
- ☒ ФГДС
- ☐ дуоденальное зондирования

238. Выберите единственно правильный ответ
Для копрологического исследования у детей берут кал

- ☐ утром натощак
- ☐ после очистительной клизмы
- ☐ стерильной петлей
- ☒ из разных мест при самостоятельной дефекации

239. Выберите единственно правильный ответ
Костный возраст ребенка определяется по

- ☒ рентгенограмме кисти
- ☐ содержанию кальция в крови
- ☐ биологическому возрасту
- ☐ содержанию фосфора в крови

240. Выберите единственно правильный ответ
Сроки формирования вторичных половых признаков у мальчиков

- ☐ с 8-9 лет до 16 лет
- ☒ с 10-11 лет до 17-21
- ☐ с 6-8 лет до 15 лет
- ☐ с 5-8 лет до 14 лет

241. Выберите единственно правильный ответ
Антибактериальная (противовоспалительная) терапия должна проводиться с учетом

- ☐ возраста ребенка
- ☐ тяжести заболевания
- ☒ верно всё
- ☐ массы тела

242. Выберите единственно правильный ответ
Приём лекарственных средств в стационаре осуществляется детьми

- ☐ самостоятельно
- ☒ в присутствии медицинской сестры
- ☐ в присутствии родителей
- ☐ в присутствии врача

243. Выберите два правильных ответа
Частоту пульса у детей определяют на

- ☒ лучевой артерии

- ☐ локтевой артерии
- ☒ плечевой артерии
- ☐ подколенной артерии

244. Выберите единственно правильный ответ
Артериальное давление у детей

- ☐ выше, чем у взрослых
- ☒ ниже, чем у взрослых
- ☐ такое же, как у взрослых
- ☐ лабильное

245. Выберите единственно правильный ответ
ЭКГ- исследование проводится

- ☒ после 10-15 минут отдыха
- ☐ после физической нагрузки
- ☐ после сна

246. Выберите единственно правильный ответ
При ЭКГ-исследовании оценивают

- ☒ регулярность и частоту сердечных сокращений
- ☐ шумы в сердце
- ☐ тоны сердца
- ☐ скорость кровотока

247. Выберите единственно правильный ответ
Фонокардиография позволяет оценить

- ☒ характеристику тонов
- ☐ структуру сердца
- ☐ скорость кровотока
- ☐ частоту сердечных сокращений

248. Выберите единственно правильный ответ
Доплерография позволяет оценить

- ☒ скорость кровотока
- ☐ шумы в сердце
- ☐ тоны сердца
- ☐ частоту сердечных сокращений

249. Выберите единственно правильный ответ
При измерении артериального давления манжетка должна находиться на уровне

- ☒ сердца
- ☐ головы
- ☐ кушетки
- ☐ живота

250. Выберите единственно правильный ответ
К принципам диеты при заболеваниях сердечно - сосудистой системы относятся

- ☒ ограничение соли
- ☐ ограничение белков
- ☐ ограничение сахара
- ☐ ограничение углеводов

251. Выберите единственно правильный ответ
Решающее значение в этиологии острой ревматической лихорадки имеет у детей

- ☒ β -гемолитический стрептококк группы А
- ☐ β -гемолитический стрептококк группы В
- ☐ стафилококки
- ☐ вирусы

252. Выберите единственно правильный ответ
Длительность диспансерного наблюдения за ребёнком, перенёсшим ревматизм

- ☐ 2 года
- ☐ 3 года

☐ 5 лет

☒ до передачи в подростковый кабинет

253. Выберите единственно правильный ответ

При любом врождённом пороке у детей осложнением могут быть

☐ пневмония

☐ гипоксический криз

☐ тромбоэмболия

☒ недостаточность кровообращения

254. Выберите единственно правильный ответ

Ревматическая хорея у детей проявляется

☒ гиперкинезами

☐ ларингоспазм

☐ пилоростенозом

☐ удушьем

255. Выберите единственно правильный ответ

Гематрозы у детей характерны для заболевания

☒ гемофилия

☐ острый лейкоз

☐ аллергоз

☐ паразитарная инвазия

256. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой носа

☒ ринит

☐ фарингит

☐ отит

☐ менингит

257. Выберите единственно правильный ответ

Повышение сахара в крови

☒ гипергликемия

☐ гипогликемия

☐ анемия

☐ гипокальциемия

258. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление мышечной оболочки сердца

☒ миокардит

☐ эндокардит

☐ перикардит

☐ панкардит

259. Выберите единственно правильный ответ

Ночное недержание мочи у детей

☒ энурез

☐ никтурия

☐ энкопрез

☐ ишурия

260. Выберите единственно правильный ответ

Кратковременная остановка дыхания у детей

☒ апноэ

☐ тахипноэ

☐ брадипноэ

☐ асфиксия

261. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой оболочки полости носа и глотки у детей

☒ назофарингит

☐ трахеит

☐ гайморит

☐ фронтит

262. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление среднего уха у детей

☒ отит

☐ мастит

☐ перитонит

☐ мастоидит

263. Выберите единственно правильный ответ

Поражение нервной системы при ревматизме у детей

☒ хорея

☐ менингит

☐ энцефалит

☐ энцефалопатия

264. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление тонкого и толстого кишечника у детей

☒ энтероколит

☐ гастроэнтерит

☐ гастроэнтероколит

☐ колит

265. Выберите единственно правильный ответ

Уменьшение суточного объема мочи у ребенка

☒ олигурия

☐ полиурия

☐ гематурия

☐ протеинурия

266. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление яичек у мальчика

☒ орхит

☐ баланопостит

☐ простатит

☐ дуоденит

267. Выберите единственно правильный ответ

Воспаление слизистой желудка у детей

☒ гастрит

☐ колит

☐ энтерит

☐ дуоденит

268. Выберите единственно правильный ответ

При запорах у детей рекомендуется исключить из рациона

☐ кисломолочные продукты

☐ фрукты

☒ рисовую кашу

☐ овощи

269. Выберите единственно правильный ответ

При диарее у детей рекомендуют употреблять

☐ манную кашу

☒ кисель

☐ фрукты

☐ помидоры

270. Выберите единственно правильный ответ

Помощью больному ребёнку при диарее является

☐ уменьшение объема жидкости

☐ увеличение объема жидкости

☐ слабительная фитотерапия

☒ глюкозо-солевые растворы

271. Выберите единственно правильный ответ

Закаливающими водными процедурами у детей являются

- ☒ контрастные обтирания
- ☐ горячие ножные ванны
- ☐ плавание в ванной
- ☐ душ

272. Выберите два правильных ответа

Особенностями ревматического полиартрита являются

- ☐ симметричное поражение мелких суставов
- ☒ поражение крупных суставов
- ☒ летучий характер полиартрита
- ☐ постоянный характер полиартрита
- ☐ продолжительность полиартрита более 10 дней

273. Выберите два правильных ответа

Преимущественно при ревматической лихорадке у детей поражается ткань

- ☐ эпителиальная
- ☒ соединительная
- ☒ нервная
- ☐ костная
- ☐ мышечная

274. Выберите два правильных ответа

Преимущественно при ревматизме у детей поражается

- ☒ сердце
- ☐ почки
- ☐ печень
- ☐ кишечник
- ☒ нервная система

275. Выберите два правильных ответа

Проявления недостаточности кровообращения у детей

- ☒ тахикардия
- ☐ спленомегалия
- ☐ брадикардия
- ☐ рвота
- ☒ одышка

276. Выберите два правильных ответа

Заболеванию ревматизмом у детей могут предшествовать

- ☒ ангина
- ☐ менингит
- ☒ скарлатина
- ☐ насморк
- ☐ дизентерия

277. Выберите два правильных ответа

При лечении синдрома недостаточности кровообращения используются препараты следующих групп:

- ☒ сердечные гликозиды
- ☒ диуретики
- ☐ антигистаминные
- ☐ антибиотики
- ☐ витамины

278. Выберите два правильных ответа

В план обследования при подозрении на ревматизм входят

- ☒ общий анализ крови
- ☒ биохимический анализ крови
- ☐ биохимический анализ мочи
- ☐ общий анализ кала
- ☐ общий анализ мочи

279. Выберите два правильных ответа

Лечение атаки ревматизма с явлениями кардита обязательно включает

- ☒ антибактериальные препараты пенициллинового ряда
- ☒ НПВС
- ☐ седативные препараты
- ☐ сердечные гликозиды
- ☐ диуретики

280. Выберите два правильных ответа

При рахите у ребенка наблюдаются

- ☐ артриты
- ☐ переломы
- ☐ гемартрозы
- ☒ О- и Х-образные ноги
- ☒ рёберные чётки

281. Выберите два правильных ответа

При осмотре кожи ребенка оценивается

- ☐ влажность
- ☐ температура
- ☒ цвет
- ☐ эластичность
- ☒ наличие сыпи

282. Выберите два правильных ответа

Проявления недостаточности кровообращения у детей

- ☐ спленомегалия
- ☐ брадикардия
- ☐ рвота
- ☒ одышка
- ☒ отеки

283. Выберите два правильных ответа

Симптомы кишечного эксикоза у детей

- ☒ сухость кожи
- ☐ полиурия, влажность кожи
- ☐ одышка, тахикардия
- ☒ олигурия
- ☐ судороги

284. Выберите два правильных ответа

Наиболее частые признаки заболеваний органов пищеварения у детей

- ☒ боль в животе
- ☒ нарушение аппетита
- ☐ сухость во рту
- ☐ желтушность кожи
- ☐ рвота

285. Выберите два правильных ответа

Основные признаки пиелонефрита у детей

- ☒ интоксикация
- ☐ запоры
- ☒ дизурические расстройства
- ☐ ангина
- ☐ насморк

286. Выберите два правильных ответа

Основные клинические симптомы стоматита у детей

- ☐ кашель
- ☒ отек слизистой полости рта
- ☒ боль при приеме пищи
- ☐ жидкий стул
- ☐ сухость во рту

287. Выберите два правильных ответа

Основные формы ангины у детей

- ☐ стеногическая
- ☒ лакунарная
- ☐ вирулентная
- ☒ фолликулярная
- ☐ бактериальная

288. Выберите два правильных ответа

Клинические симптомы сахарного диабета у детей

- ☒ полифагия
- ☐ боли в пояснице
- ☒ полиурия
- ☐ кашель
- ☐ боли в животе

289. Выберите два правильных ответа

Способ введения инсулина при лечении сахарного диабета

- ☒ внутривенно
- ☐ внутримышечно

- ☒ подкожно
- ☐ внутриочно
- ☐ внутриагтериально

290. Выберите два правильных ответа

Применяют для лечения гломерулонефрита у детей

- ☒ диуретики
- ☒ гипотензивные препараты
- ☐ гемостатические препараты
- ☐ противовирусные препараты
- ☐ витамины

291. Выберите два правильных ответа

Метод исследования при подозрении на дискинезию желчевыводящих путей у детей

- ☒ УЗИ желчных протоков, холецистография
- ☐ эндоскопия
- ☒ фракционное дуоденальное зондирование
- ☐ радиоизотопный
- ☐ общеклинические анализы

292. Выберите два правильных ответа

Вид обследования для выявления скрытого сахарного диабета у детей

- ☐ общий анализ мочи
- ☐ общий анализ крови
- ☐ анализ мочи по Нечипоренко
- ☒ тест толерантности к глюкозе
- ☒ сахарная кривая

3. Умение квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза

293. Выберите единственно правильный ответ

Содержание глюкозы в плазме крови у детей составляет

- ☐ 1,5 – 2,5 ммоль/л
- ☐ 2,6 – 3,2 ммоль/л
- ☒ 3,3 - 5,5 ммоль/л
- ☐ 8,2 - 9,5 ммоль/л

294. Выберите два правильных ответа

Дети группы риска по сахарному диабету

- ☒ дети с наследственной отягощенностью
- ☐ недоношенные
- ☐ с аномалией конституции
- ☐ с гипотрофией
- ☒ дети с избыточным весом

295. Выберите два правильных ответа

Активную иммунизацию против кори проводят детям

- ☒ живой коревой вакциной
- ☐ человеческим иммуноглобулином
- ☐ туберкулином
- ☐ аскорбиновой кислотой
- ☒ тривакциной

296. Выберите два правильных ответа

Детям с лейкозом особенно большое внимание при уходе уделяют

- ☐ лечебной физкультуре
- ☒ санитарно-эпидемиологическому режиму

- ☐ диетотерапии
- ☐ режиму дня
- ☒ строгий приём лекарственных препаратов

297. Выберите два правильных ответа

Ребенок с гемофилией должен постоянно наблюдаться

- ☐ детским травматологом
- ☒ гематологом специализированного центра
- ☐ детским хирургом
- ☐ главным врачом поликлиники
- ☒ участковым педиатром

298. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи вирусного гепатита В

- ☐ алиментарный путь
- ☒ парентеральный путь
- ☐ водный путь
- ☐ воздушно – капельный путь

299. Выберите единственно правильный ответ

Описторхоз поражает

- ☐ тонкий и толстый кишечник
- ☐ двенадцатиперстную кишку и толстый кишечник
- ☒ желчевыводящие пути, двенадцатиперстную кишку
- ☐ желудок и тонкий кишечник

300. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи дифтерии

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ алиментарный
- ☐ половой
- ☐ вертикальный

301. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее частая форма дифтерии – дифтерия

- ☒ зева
- ☐ носа
- ☐ гортани
- ☐ кожи

302. Выберите единственно правильный ответ

Характер налетов на миндалинах при дифтерии зева

- ☐ гнойные
- ☐ некротические
- ☐ гнойно - некротические
- ☒ фибриновые

303. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятие, которое необходимо провести в очаге дифтерии после изоляции больного

- ☐ текущую дезинфекцию
- ☒ заключительную дезинфекцию
- ☐ влажную уборку
- ☐ проветривание

304. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при дифтерии

- ☒ больной и носитель токсигенных бактерий дифтерии
- ☐ больной легкой ангиной
- ☐ носитель нетоксических бактерий дифтерии
- ☐ больное животное

305. Выберите единственно правильный ответ

Бактериологическое исследование на дифтерию проводится путем взятия

- ☒ мазка из носа и зева
- ☐ мазка с конъюнктивы
- ☐ мазка с задней стенки глотки
- ☐ мазка с небных миндалин

306. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, проводимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

- ☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются
- ☐ не отстраняются от посещения коллектива
- ☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются
- ☐ не госпитализируются

307. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☒ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

308. Выберите единственно правильный ответ

Метод введения противодифтерийной антитоксической сыворотки

- ☒ дробно (по Безредко)
- ☐ одномоментно вся доза

- ☐ не имеет значения

- ☐ 2 раза в день

309. Выберите единственно правильный ответ

Корь по механизму передачи

- ☐ кишечная инфекция
- ☒ воздушно-капельная инфекция
- ☐ трансмиссивная инфекция
- ☐ инфекция кожных покровов

310. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при кори

- ☐ животные
- ☐ бактериовыделитель
- ☒ больной корью человек
- ☐ почва

311. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинация живой коревой вакциной в очаге кори проводится в течение

- ☐ первого дня
- ☒ первых 3 дней
- ☐ первых 5 дней
- ☐ первых 7 дней

312. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее характерный симптом кори в начальном периоде

- ☐ катаральные явления
- ☐ светобоязнь
- ☒ пятна Бельского–Филатова
- ☐ ангина

313. Выберите единственно правильный ответ

Сыпь при кори высыпает

- ☐ одномоментно
- ☐ этапно, в течение 2 дней
- ☒ этапно в течение 3 дней
- ☐ в течение 5 дней

314. Выберите единственно правильный ответ

Вторичные элементы после угасания сыпи при кори

- ☐ корочки
- ☒ пигментация
- ☐ рубцы
- ☐ расчесы

315. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинации живой коревой вакциной по эпидемиологическим показаниям подлежат дети

- ☒ ранее не болевшие и не привитые
- ☐ имеющие противопоказания к вакцинации
- ☐ ранее болевшие корью
- ☐ имеющие относительные противопоказания к вакцинации

316. Выберите единственно правильный ответ

Мазок при подозрении на коклюш берут

- ☐ из носа сухим тампоном
- ☐ из зева сухим тампоном
- ☐ с небных миндалин сухим тампоном
- ☒ методом кашлевых пластинок

317. Выберите единственно правильный ответ

Характерные особенности кашля при коклюше

- ☒ приступы спазматического кашля с репризами

- ☐ влажный кашель, с обильной мокротой
- ☐ влажный кашель со скудной мокротой
- ☐ сухой лающий кашель, осиплость голоса

318. Выберите единственно правильный ответ

Продолжительность периода спазматического кашля

- ☐ 3 - 5 дней
- ☐ 5 - 7 дней
- ☐ 7 - 10 дней
- ☒ 2 – 4 недели

319. Выберите единственно правильный ответ

Длительно кашляющие дети подлежат бактериологическому обследованию

- ☐ на дифтерию
- ☐ на дизентерию
- ☐ на скарлатину
- ☒ на коклюш

320. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк
- ☒ нейссерия

321. Выберите единственно правильный ответ

Мазок для бактериологического исследования на менингококковую инфекцию берут

- ☐ из носа
- ☐ с миндалин
- ☒ с задней стенки глотки
- ☐ с языка

322. Выберите единственно правильный ответ

Характер сыпи при менингококковой инфекции

- ☐ мелкоточечная на гиперемизованном фоне кожных покровов
- ☐ пятнисто-папулезная на бледном фоне кожных покровов
- ☐ везикулезная на обычном фоне кожных покровов
- ☒ геморрагическая звездчатая на бледном фоне кожных покровов

323. Выберите два правильных варианта ответа

Локализованная форма менингококковой инфекции

- ☒ носительство менингококка
- ☐ менингококцемия
- ☐ менингококковый менингит
- ☒ менингококковый ринофарингит

324. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина при менингококковой инфекции

- ☐ 7 дней
- ☒ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

325. Выберите два правильных ответа

Следует ограничить в питании при уходе за ребенком с сердечной недостаточностью

- ☐ белки, жиры,

- ☐ белки, углеводы

- ☒ жидкость

- ☒ поваренная соль

326. Выберите два правильных ответа

Первостепенное значение в лечении детей с гастритом имеет

- ☒ режим питания
- ☒ диетотерапия
- ☐ назначение лекарственных препаратов
- ☐ физиотерапия
- ☐ режим дня

327. Выберите два правильных ответа

Исключают из питания при лечении сахарного диабета у детей

- ☐ нежирное мясо
- ☐ кефир
- ☐ гречневую крупу
- ☒ конфеты
- ☒ сахар

328. Выберите два правильных ответа

Заболевания детей, требующие диспансерного наблюдения

- ☐ ОРВИ
- ☒ пневмония
- ☒ железодефицитная анемия
- ☐ опрелости
- ☐ насморк

329. Выберите два правильных ответа

К доврачебной помощи при одышке у детей относятся

- ☐ горизонтальное положение тела
- ☐ пузырь со льдом на область живота
- ☒ оксигенотерапия
- ☒ расслабление одежды
- ☐ приподнятый головной конец

330. Выберите два правильных ответа

При заболеваниях почек у детей ограничивают

- ☒ соль
- ☒ жидкость
- ☐ углеводы
- ☐ жиры
- ☐ витамины

331. Выберите два правильных ответа

Помощь больному ребёнку при функциональных запорах

- ☒ слабительные травы
- ☐ лечебные клизмы
- ☒ диета
- ☐ прием пищи богатой белками
- ☐ прием пищи богатой жирами

332. Выберите два правильных ответа

На диурез ребенка (здорового) оказывают влияние

- ☒ температура окружающего воздуха
- ☐ атмосферное давление
- ☒ питьевой режим ребенка
- ☐ экология
- ☐ прием пищи богатой жирами

333. Выберите два правильных ответа

Причины гипогликемической комы у детей с сахарным диабетом

- ☐ холод
- ☒ физическая перегрузка
- ☒ передозировка инсулина
- ☐ прием пищи богатой углеводами
- ☐ прием пищи богатой жирами

334. Выберите два правильных ответа

Клинические симптомы обморока у детей

- ☐ понижение аппетита
- ☒ падение АД
- ☒ бледный кожный покров
- ☐ олигурия
- ☐ сухие слизистые

335. Выберите два правильных ответа

Наиболее эффективные средства для купирования анафилактического шока у ребенка

- ☒ адреналин
- ☒ преднизолон
- ☐ димедрол
- ☐ актовегин
- ☐ пенициллин

336. Выберите два правильных ответа

4. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

339. Определите последовательность стадий стенотического ларинготрахеита у детей

- 1: катаральная
- 2: стенотическая
- 3: асфиктическая

340. Определите последовательность периодов бронхиальной астмы у детей

- 1: предвестников
- 2: приступный
- 3: послеприступный

341. Определите последовательность независимого сестринского вмешательства при обмороке у детей

- 1: уложить с приподнятым ножным концом
- 2: расстегнуть стесняющую одежду
- 3: обеспечить доступ свежего воздуха
- 4: сбрызнуть лицо и тело ребенка холодной водой
- 5: дать вдохнуть пары нашатырного спирта

342. Определите последовательность независимых и зависимых сестринских вмешательств при носовом кровотечении у детей

- 1: усадить ребенка с опущенной головой
- 2: расстегнуть стесняющую одежду
- 3: обеспечить доступ свежего воздуха
- 4: применить тампон с 3%-м раствором перекиси водорода

343. Определите последовательность сестринских независимых и зависимых сестринских вмешательств при коллапсе у детей

- 1: уложить на твердую поверхность с приподнятым ножным концом

Клинические проявления стенозирующего ларингита у детей

- ☒ грубый лающий кашель
- ☒ развитие дыхательной недостаточности
- ☐ тихий голос
- ☐ сухой кашель
- ☐ влажный кашель

337. Определите последовательность доврачебной помощи при стенозе гортани у детей

- 1: успокоить ребёнка
- 2: доступ свежего воздуха
- 3: «тропические ванны»
- 4: ингаляции со щелочными растворами

338. Определите последовательность постановки очистительной клизмы ребенку

- 1: объяснить цель и ход процедуры
- 2: подготовить необходимое оснащение
- 3: вымыть руки, надеть фартук
- 4: смазать наконечник баллончика вазелиновым маслом
- 5: уложить ребенка на левый бок и ввести воду в прямую кишку

- 2: расстегнуть стесняющую одежду
- 3: обеспечить доступ свежего воздуха
- 4: измерить артериальное давление
- 5: ввести сосудосуживающие средства: мезатон или норадrenalин

344. Определите соответствие между степенью тяжести состояния ребёнка и клиническими проявлениями

тяжелое состояние	вынужденное положение в постели
удовлетворительное состояние	активное положение в постели

345. Определите соответствие между заболеваниями у детей и симптомами

гломерулонефрит	гематурия
пиелонефрит	бактериурия
	понижение АД

346. Определите соответствие между критериями диагностики ревматизма и признаками у детей

основные	кардит
дополнительные	артралгии
	протеинурия

347. Определите соответствие между врожденными пороками сердца у детей по классификации

синего типа	транспозиция магистральных сосудов
белого типа	открытый артериальный проток

348. Определите соответствие между степенью тяжести состояния ребёнка и клиническими проявлениями

тяжелое состояние	потеря сознания
удовлетворительное состояние	ясное сознание

349. Определите соответствие между заболеваниями детей и их возбудителями

молочница	грибы
герпетический стоматит	вирус
пузырчатка новорожденных	стафилококк
	хламидии

350. Определите соответствие между заболеваниями и характерными симптомами у детей

брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная складка на ладони	болезнь (синдром) Дауна
светлые кожа и волосы, голубые глаза, «мышинный» запах	фенилкетонурия
«четки» на ребрах, «куриная» грудь, О-образные ноги	рахит
	сахарный диабет

351. Определите соответствие между инфекционными заболеваниями у детей и основными путями передачи

гепатит В	парентеральный
краснуха	воздушно-капельный
ветряная оспа	бытовой

352. Определите соответствие между состоянием и группой здоровья у детей

здоровые дети	первая (1;I)
хроническое заболевание в стадии компенсации	третья (3;III)
хроническое заболевание в стадии декомпенсации	пятая (5;V)
	вторая (2;II)

353. Определите соответствие между заболеваниями и проводимыми при них пробами (тестами) у детей

проба Сулковича	рахит
глюкотест	сахарный диабет
	бронхиальная астма

354. Выберите единственно правильный ответ
У ребёнка 10 лет в детском саду началось носовое кровотечение после падения во время игры. Известно, что у ребёнка гемофилия. Что вы исключите из помощи при носовом кровотечении

- ☐ вызвать скорую помощь
☒ наложение резинового жгута
☐ пузырь со льдом на область носа
☐ тампонада носа с гемостатиком

355. Выберите единственно правильный ответ
Ребёнок 8 лет потерял сознание в школе. Что из доврачебной помощи при обмороке у детей вы исключите

- ☒ надавливание на область сонной артерии
☐ похлопывание по щекам
☐ вдыхание нашатырного спирта
☐ обрызгивание лица холодной водой

356. Выберите единственно правильный ответ
Профилактика инфекционных заболеваний, в т. ч. иммунопрофилактика, осуществляется

- ☒ на платной и бесплатной основе
☐ исключительно на платной основе

- ☐ исключительно на бесплатной основе
☐ платно только органами местного самоуправления

357. Выберите единственно правильный ответ
Первая помощь в ситуациях угрожающих их жизни и здоровью оказывается

- ☒ до оказания медицинской помощи
☐ в ходе оказания медицинской помощи
☐ после оказания медицинской помощи
☐ на этапе специализированной помощи

358. Выберите единственно правильный ответ
при хроническом гастрите у детей применяется щадящая диета, которая

- ☐ повышает выделение желудочного сока
☐ повышает секрецию желчи
☐ повышает секрецию сока поджелудочной железы
☒ уменьшает раздражение слизистой оболочки желудка

359. Выберите единственно правильный ответ
При хроническом гастрите ребенку обеспечивается

- ☒ 5-разовое питание малыми порциями
☐ 2-3-х разовое питание малыми порциями
☐ водно-чайная пауза
☐ питание по потребности

360. Выберите единственно правильный ответ

При рвоте у ребенка, необходимо

- ☐ усадить на стул
☒ уложить с возвышенным головным концом, голову повернуть набок
☐ уложить с опущенным головным концом, голову повернуть набок
☐ уложить на горизонтальную поверхность, поднять ноги

361. Выберите единственно правильный ответ
Купирование гипогликемической комы у детей начинается с введения

- ☒ 40 % раствора глюкозы
☐ 10 % раствора глюкозы
☐ 5 % раствора глюкозы
☐ инсулина

362. Выберите единственно правильный ответ
Положение ребёнка при проведении сердечно-легочной реанимации

- ☒ на спине, на ровной твердой поверхности
☐ на спине, на кровати
☐ оставить положение, в котором он был обнаружен
☐ роли не играет

363. Выберите единственно правильный ответ
При оказании неотложной помощи ребенку с гипогликемической комой применяют

- ☒ раствор глюкозы
☐ преднизолон
☐ адреналин
☐ инсулин

364. Выберите единственно правильный ответ
Площадь ожогов у детей до 5 лет определяется по правилу

- ☐ девяток
- ☒ ладони
- ☐ семерок
- ☐ десятков

365. Выберите единственно правильный ответ

Главный критерий эффективности реанимационных мероприятий

- ☐ появление розовой окраски кожных покровов
- ☐ сужение зрачков
- ☐ движение грудной клетки
- ☒ появление пульса на сонной артерии

366. Выберите единственно правильный ответ

При носовом кровотечении ребенка

- ☐ укладывают в постель лицом вниз
- ☐ усаживают с запрокинутой головой
- ☒ усаживают с опущенной головой
- ☐ удерживают на ногах

367. Выберите единственно правильный ответ

При гипертермическом синдроме температуру тела у ребенка контролируют через

- ☐ 15–30 минут
- ☒ 30–60 минут
- ☐ 60–90 минут
- ☐ 90–120 минут

368. Выберите единственно правильный ответ

Случайные отравления наиболее часто происходят от употребления ребенком

- ☒ лекарственных препаратов
- ☐ растительных ядов
- ☐ препаратов бытовой химии
- ☐ ядовитых грибов

369. Выберите единственно правильный ответ

При пероральном отравлении ребенку в первую очередь необходимо

- ☐ провести форсированный диурез
- ☐ ввести слабительное средство
- ☐ поставить сифонную клизму
- ☒ промыть желудок

370. Выберите единственно правильный ответ

Судороги у детей раннего возраста могут проявляться при

- ☒ гипертермии
- ☐ рвоте
- ☐ повороте головы

- ☐ гипотермии

371. Выберите единственно правильный ответ

Глюкотест при сахарном диабете у детей используется для определения

- ☐ ацетона в моче
- ☐ ацетона в крови
- ☒ сахара в моче
- ☐ сахара в крови

372. Выберите три правильных ответа

Паллиативная медицинская помощь обеспечивает

- ☒ улучшение качества жизни
- ☒ купирование боли
- ☐ этиотропное лечение
- ☐ патогенетическое лечение
- ☒ симптоматическое лечение

373. Выберите единственный правильный ответ

Порядок и стандарты оказания медицинской помощи утверждаются

- ☒ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- ☐ муниципальными властями
- ☐ лечебно-профилактическими учреждениями
- ☐ общественными организациями

374. Выберите единственный правильный ответ

Медицинские изделия для массового использования

- ☒ подлежат государственной регистрации
- ☐ не подлежат государственной регистрации
- ☐ исследуются на предмет безопасности без государственной регистрации
- ☐ исследуются на предмет эффективности без государственной регистрации

375. Определите последовательность этапов оказания медицинской помощи

- 1: диагностика
- 2: первичная профилактика
- 3: лечение
- 4: реабилитация

376. Определите последовательность оказания медицинской помощи

- 1: лечение основного заболевания
- 2: лечение сопутствующих заболеваний
- 3: профилактика заболеваний
- 4: реабилитация