

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ

ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы специалистов со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием Новосибирской области
по специальности «Стоматология»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа квалифи-
кационного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	17
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	23

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задания **закрытой формы около 50%**, задание на установление соответствия **до 50%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	31
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	44
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	50

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задания **закрытой формы - около 50%**, задания на установление соответствия - **около 20%**, задания на установление правильного порядка - **около 20%**, типовые задачи - **около 10%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	59
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	67
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	73
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	80

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Стоматология»
Вторая квалификационная категория

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите правильный вариант ответа

Заболеваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
- интенсивность кариеса
- распространенность кариеса
- недостаток фтора в воде

2. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
- число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число здоровых зубов у одного человека

3. Выберите правильный вариант ответа

Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- депульпированным

4. Выберите правильный вариант ответа

Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
- число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

5. Выберите правильный вариант ответа

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная накожная проба
- наличие гиперемии и отека
- отсутствие продромальных явлений

6. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление вторичной профилактики стоматологических заболеваний на

- предупреждение возникновения заболеваний
- предупреждение осложнений заболевания
- восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- предупреждение воздействия факторов

7. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление третичной профилактики стоматологических заболеваний на

- предупреждение возникновения заболеваний
- предупреждение осложнений заболевания
- восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- предупреждение воздействия факторов

8. Выберите правильный вариант ответа

Лечение кариеса зубов относится к методам профилактики

- Первичной
- Вторичной
- Третичной
- Четвертичной

9. Выберите правильный вариант ответа

Устранение дефектов зубного ряда с помощью протезирования относится к методам профилактики

- Первичной
- Вторичной
- Третичной
- Четвертичной

10. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики кариеса зубов является

- Герметизация фиссур
- Пломбирование кариозных полостей
- Эндодонтическое лечение
- Удаление зубов по поводу осложненного кариеса

11. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- Кюретажпародонтальных карманов
- Местная противовоспалительная терапия
- Шинирование подвижных зубов
- Профессиональная гигиена полости рта

12. Выберите правильный вариант ответа

Материалы для лечения глубокого кариеса должны

- обладать антимикробным и одонтотропным действием
- обладать быстрым отверждением
- обладать хорошей вводимостью
- обладать хорошей пластичностью

13. Выберите правильный вариант ответа

Для протравливания эмали перед пломбированием композиционным материалом используется кислота

- соляная
- плавиковая
- ортофосфорная
- серная

14. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе дентина (глубоком кариесе) в сочетании с гиперемией пульпы необходимо

- экстирпировать пульпу
- провести неполную некротомию и наложить пасту с противовоспалительными свойствами
- удалить, по возможности, весь пораженный дентин, избегая обнажения пульпы, и наложить пасту с противовоспалительными свойствами
- тщательно удалить весь пораженный дентин и оставить полость открытой для оттока экссудата

15. Выберите правильный вариант ответа

Из предложенных методов лечения 12 зуба наиболее рационально применять при остром очаговом пульпите

- витальную экстирпацию
- витальную ампутацию
- девитализацию пульпы
- девитальную ампутацию

16. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе дентина (глубоком кариесе) наиболее рациональны прокладки

- обладающие одонтотропными свойствами
- антимикробного действия
- индифферентные
- противовоспалительного действия

17. Выберите правильный вариант ответа

Пульпоэкстрактор служит для

- для удаления мягких тканей из корневого канала
- для определения длины корневого канала
- для расширения корневого канала
- для пломбирования корневого канала

18. Выберите правильный вариант ответа

Геометрическая кодировка инструментов обозначает

- длину
- профиль
- диаметр
- ширину

19. Выберите правильный вариант ответа

К- файл служит

- для прохождения и расширения корневого канала
- для удаления мягких тканей
- для расширения устья корневого канала
- для пломбирования канала

20. Выберите правильный вариант ответа

Силиконовые ограничители (стопы) на эндодонтическом инструменте нужны для

- безопасности манипуляций в канале на рабочей длине
- стерилизации
- ограничения распространения микрофлоры
- кодирования

21. Выберите правильный вариант ответа

Для пломбирования корневого канала второго резца целесообразнее применить

- метапекс
- крезопасту
- гуттаперчу
- серебро

22. Выберите правильный вариант ответа

Боры Гейтса используются

- для расширения устья корневого канала
- для резекции верхушки корня
- для уплотнения пломбировочного материала
- для ограничения распространения микрофлоры

23. Выберите правильный вариант ответа

Пломбирование хорошо проходимых корневых каналов целесообразнее произвести

- гуттаперчей и пастами на основе эпоксидных смол
- фосфат-цементом со штифтом
- резорцин-формалиновой пастой
- параценом

24. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании гуттаперчей используется методика

- многоконусная
- латеральной и вертикальной конденсации
- одиночный конус
- краун-даун

25. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации количество гуттаперчевых штифтов составляет

- один
- два
- необходимое для полного заполнения канала
- три

26. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- кюретаж пародонтальных карманов
- местная противовоспалительная терапия
- шинирование подвижных зубов
- профессиональная гигиена полости рта

27. Выберите правильный вариант ответа

Условия, необходимые для возникновения кариеса зубов

- углеводы

- белки
- перенесенные сопутствующие заболевания
- углеводы и микроорганизмы в контакте с эмалью

28. Выберите правильный вариант ответа

Симптомы, характерные для начального кариеса

- боли от температурных раздражителей
- белые пятна, расположенные в области шеек зубов
- наличие кариозной полости
- боли от химических раздражителей

29. Выберите правильный вариант ответа

Последствия при пломбировании без изолирующей прокладки глубокого кариеса композитами

- плохая адгезия
- воспаление и некроз пульпы
- выпадение пломбы
- вторичный кариес

30. Выберите правильный вариант ответа

При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять

- амальгаму
- силидонт
- стеклоиономерные цементы
- эвикрол

31. Выберите правильный вариант ответа

Поверхности зуба, являющиеся иммунными к кариесу

- апроксимальные
- пришеечные
- режущий край
- фиссуры

32. Выберите правильный вариант ответа

Микроорганизм, играющий ведущую роль в возникновении кариеса зубов

- Streptococcus mutans*
- лактобактерии
- стафилококк
- актиномицеты

33. Выберите правильный вариант ответа

Углевод, обладающий наибольшим кариесогенным потенциалом

- лактоза
- сахароза
- глюкоза
- крахмал

34. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки поражаемости зубов кариесом согласно номенклатуре ВОЗ используются показатели

- интенсивность, распространенность, прирост интенсивности кариеса
- индекс гигиены
- индекс РМА
- индекс ПИ

35. Выберите правильный вариант ответа

Причины развития гиперпластического гингивита

- нерациональное протезирование
- недостаточная гигиена
- патология прикуса
- гормональные изменения в организме

36. Выберите правильный вариант ответа

При язвенном гингивите наблюдается

- кровоточивость и боли в деснах при приеме пищи
- изъязвление десневого края с усеченностью вершин сосочков, боли в деснах, гнилостный запах изо рта
- разрастание десен, кровоточивость при дотрагивании
- кровоточивость десен при приеме пищи, глубина десневых карманов 6-7 мм

37. Выберите правильный вариант ответа

Характеристика кариеса в стадии меловидного пятна

- поражает эмаль на всю глубину
- не исчезает ни при каких обстоятельствах
- может исчезнуть в результате реминерализации
- всегда исчезает со временем

38. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто очаги деминерализации эмали локализуются на коронке зуба в области

- бугров
- пришеечной
- режущего края
- экватора

39. Выберите правильный вариант ответа

При дифференциальной диагностике хронического гингивита и пародонтита легкой степени тяжести решающим является

- глубина пародонтальных карманов до 5 мм
- отсутствие круговой связки зуба, наличие пародонтальных карманов
- воспаление десневого края и десневых сосочков
- подвижность и смещение зубов

40. Выберите правильный вариант ответа

Состояние зубодесневого прикрепления при хроническом гингивите на нижней челюсти у детей

- зубодесневое прикрепление не нарушено, круговая связка зуба не повреждена
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной до 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,0 мм

41. Выберите правильный вариант ответа

Наличие пародонтального кармана характерно

- для гингивита

- для пародонтита
 для пародонтомы
 для пульпита
- 42. Выберите правильный вариант ответа**
 При флюорозе пациент жалуется на
 гиперчувствительность
 изменение цвета твердых тканей зубов
 стертость зубов
 подвижность зубов
- 43. Выберите правильный вариант ответа**
 При определении гигиенического состояния полости рта с помощью гигиенического индекса Федорова – Володкиной окрашиваются
 вестибулярные поверхности б нижних фронтальных зубов
 вестибулярные поверхности б верхних фронтальных зубов
 язычные поверхности первых постоянных моляров
 вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов
- 44. Выберите правильный вариант ответа**
 Наиболее благоприятный прогноз имеет перелом корня зуба
 Поперечный
 продольный
 оскольчатый
 смешанный
- 45. Выберите правильный вариант ответа**
 Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует
 приём фторидсодержащих таблеток
 проведение профессиональной гигиены
 реминерализующая терапия
 массаж
- 46. Выберите правильный вариант ответа**
 К эпителизирующим средствам относят
 мазь Солкосерила
 р-р Люголя
 3% р-р перекись водорода
 0,05% р-р хлоргексидина
- 47. Выберите правильный вариант ответа**
 Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является
 содержание фтора в питьевой воде свыше мг/л
 нарушение общего обмена веществ
 неясная причина
 несовершенный остеогенез
- 48. Выберите правильный вариант ответа**
 Клиническим симптомом при клиновидном дефекте является
 дефект на вестибулярной поверхности зубов в виде овала
 изменение формы зуба
 дефект на вестибулярной поверхности шейки зуба в виде клина
- дефект режущего края и бугров в виде площадки
- 49. Выберите правильный вариант ответа**
 Наиболее точным при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является
 термометрия
 рентгенография
 зондирование полости зуба
 электроодонтодиагностика
- 50. Выберите правильный вариант ответа**
 К противовоспалительным средствам относятся
 гепариновая мазь
 мазь солкосерил
 бутадиононовая мазь
 желе солкосерила
- 51. Выберите правильный вариант ответа**
 Пародонтит легкой степени дифференцируют с
 пародонтитом средней тяжести и катаральным гингивитом
 пародонтозом
 пульпитом
 гипертрофическим гингивитом
- 52. Выберите правильный вариант ответа**
 Индекс Федорова – Володкиной используют для определения гигиенического состояния полости рта
 детей дошкольного возраста
 подростков
 взрослых
 пациентов с брекет – системами
- 53. Выберите правильный вариант ответа**
 При подозрении на озлокачествление хронической язвы губы предпочтительнее провести
 полное иссечение с гистологическим исследованием
 криодеструкцию
 биопсию с гистологическим исследованием
 симптоматическую терапию
- 54. Выберите правильный вариант ответа**
 Метод витальной ампутации нельзя применять в однокорневых зубах
 в связи с отсутствием анатомически выраженной границы между коронковой и корневой пульпой
 воспаление в этих случаях быстро переходит на корневую пульпу
 так как изменяется цвет зубов
 благодаря малому объему полости
- 55. Выберите правильный вариант ответа**
 Для лечения молочницы применяют
 мазь "Солкосерил"
 витамин А
 мазь декаминовая 0,5%, раствор буры в глицерине 20%

оксолиновая мазь 2%, интерфероновая мазь 10%

56. Выберите правильный вариант ответа

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

сразу после прорезывания первого временного зуба

2 лет

3 лет

5-6 лет

57. Выберите правильный вариант ответа

Клинический признак, характерный для кандидоза

слизистая оболочка ярко гиперемирована

обильный белый налет на слизистой оболочке

язык бледно-розового цвета

усиление боли от раздражающей пищи

58. Выберите правильный вариант ответа

К локальному пародонтиту приводит

гиповитаминоз

гипервитаминоз

приём противосудорожных препаратов

отсутствие контактного пункта между соседними зубами

59. Выберите правильный вариант ответа

Для высушивания корневого канала целесообразнее использовать

эфир

бумажные штифты

ручной пустер

спирт

60. Выберите правильный вариант ответа

Виды инфльтрационной анестезии

Интралигаментарная

Туберальная

мандибулярная

резцовая

61. Выберите правильный вариант ответа

К общим осложнениям местной анестезии относится

аллергические реакции

вирусный гепатит

анафилактический шок

парез лицевого нерва

62. Выберите правильный вариант ответа

Очаг разряжения с четким контуром округлой или овальной формы, размером около 0,5 см. в диаметре определяется на рентгенограмме при

хроническом гранулематозном периодонтите

хроническом фиброзном периодонтите

хроническом гранулирующем периодонтите

хроническом фиброзном пульпите

63. Выберите правильный вариант ответа

На контрольной рентгенограмме при лечении пульпита канал должен быть

равномерно заполнен пломбировочным материалом с выведением его за верхушку

равномерно заполнен пломбировочным материалом на 2 трети

равномерно заполнен пломбировочным материалом до верхушки

равномерно заполнен пломбировочным материалом, не доходя 1-1,5 мм до верхушки корня

64. Выберите правильный вариант ответа

Под термином "опаковость" в реставрационной стоматологии понимают

темный оттенок материала

непрозрачность

насыщенность цвета

прозрачность

65. Выберите правильный вариант ответа

Процесс кондиционирования дентина

нанесение адгезива на поверхность дентина

нанесение протравливающей кислоты на поверхность дентина

нанесение праймера на поверхность дентина

нанесение на поверхность дентина фторлака

66. Выберите правильный вариант ответа

Раскрытие полости зуба при эндодонтическом лечении проводится с целью

удаления коронковой пульпы

создания доступа к корневым каналам

улучшения фиксации пломбы

улучшения эстетики

67. Выберите правильный вариант ответа

Для успешного лечения периодонтита каналы должны быть

изогнутыми

хорошо проходимыми на всю длину

облитерированными

склерозированными

68. Выберите правильный вариант ответа

При лечении пульпита канал пломбируют

до анатомического апикального отверстия

до физиологического апикального отверстия

за апикальное отверстие

через апикальное отверстие

69. Выберите правильный вариант ответа

Эндодонтический инструмент для прохождения корневых каналов

пульпоэкстрактор

К-файл

спредер

Н-файл

70. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологический признак характерный для хронического гранулирующего периодонтита постоянного зуба

очаг разряжения кости в области верхушки корня с четкими границами

равномерное расширение периодонтальной щели

очаг разряжения костной ткани в области верхушки корня с нечеткими границами

изменений на рентгенограмме нет

71. Выберите правильный вариант ответа
Заболевание, вызываемое вирусом обычного герпеса

острый герпетический стоматит

опоясывающий герпес

герпетическая ангина

ветряная оспа

72. Выберите правильный вариант ответа
При кариесе пациенты жалуются на боль

самопроизвольную

сохраняющуюся после устранения раздражителя

только при наличии раздражителя

самопроизвольную, с иррадиацией

73. Выберите правильный вариант ответа

Причина острой травмы периодонта

грубая эндодонтическая обработка каналов

завышенная пломба

выведение пломбы из прикуса

хронический пародонтит

74. Выберите правильный вариант ответа

Для выявления зубного налета используется метод

окрашивания

перкуссии

пальпации

электроодонтодиагностики

75. Выберите правильный вариант ответа

Основные возбудители хронического язвенно-некротического гингивита Венсана

стрепто- и стафилококки

фузобактерии и спирохеты

лактобактерии

вирусы

76. Выберите правильный вариант ответа

Клиническая картина при хроническом гингивите у детей

отмечается кровоточивость десен

гипертрофия сосочков

зубы подвижны

изъязвление десневого края

77. Выберите правильный вариант ответа

Детский возраст, характерный для возникновения острого герпетического стоматита

1-й год жизни

от 6 месяцев до 3 лет

5-6 лет

старше 9 лет

78. Выберите правильный вариант ответа

Течение заболевания острое, полиморфизм высыпаний в полости рта, сезонность поражения, кожные проявления - кокардная сыпь характерны для

острого герпетического стоматита

многоформной экссудативной эритемы

пузырчатки

сифилиса

79. Выберите правильный вариант ответа

Возможные последствия при пломбировании без изолирующей прокладки композитами

плохая адгезия

выпадение пломбы

воспаление и некроз пульпы

вторичный кариес

80. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные приспособления к основному эндодонтическому инструментарию

эндо-блок, эндодонтическая линейка

флексобенд

клинстенд

матрицы, клинышки

81. Выберите правильный вариант ответа

Наличие рецессии десны не характерно

для пародонтита

для стоматита

для пародонтоза

для гингивита

82. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариозных полостей по Блеку создана на принципе

систематизации обработки кариозных полостей

симметричности кариозного процесса

локализации кариозного процесса в конкретном зубе

обеспечения условий фиксации пломбы

83. Выберите правильный вариант ответа

Метод удаления предварительно некротизированной пульпы из корневых каналов называется

девитальная экстирпация

витальная экстирпация

биологический

девитальная ампутация

84. Выберите правильный вариант ответа

Электроодонтометрия применяется

для определения возбудимости нервных окончаний пульпы зуба

для определения состояния нервных окончаний пародонта

для определения состояния нервных окончаний периодонта

для определения состояния нервных окончаний кожи

85. Выберите правильный вариант ответа

При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять

- стеклоиономерные цементы
- силикатные цементы
- амальгаму
- композитные материалы химического отверждения

86. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хронических пульпитах постоянных зубов

- 2-6 мкА
- 20-60 мкА
- свыше 150 мкА
- свыше 250 мкА

87. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хроническом периодонтите в постоянных зубах

- 1-6 мкА
- 20-60 мкА
- 60-80 мкА
- 100-200 мкА

88. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления острого токсического периодонтита

- острая боль при накусывании на зуб
- отёк мягких тканей лица
- свищ на десне с гнойным отделяемым
- свищ на десне с серозным отделяемым

89. Выберите правильный вариант ответа

В возникновении кариеса важную роль играет свойство микроорганизмов

- образование органических кислот
- устойчивость к антибиотикам
- способность вызывать дисбактериоз
- приспособление к изменяющимся условиям внешней среды

90. Выберите правильный вариант ответа

Для хронического фиброзного пульпита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- зондирование вскрытого рога пульпы безболезненно
- зондирование вскрытого рога пульпы болезненно
- гиперемия десневого сосочка

91. Выберите правильный вариант ответа

Основной дифференциально-диагностический признак пародонтита

- гноетечение из пародонтальных карманов
- повреждение круговой связки зуба с образованием пародонтального кармана
- кровоточивость и гноетечение при надавливании на десневой сосочек
- увеличение десневых сосочков, гиперемия, синюшность, кровоточивость

92. Выберите правильный вариант ответа

Кариес в стадии меловидного пятна - это

- поражение эмали и дентина

- деминерализация поверхности эмали
- деминерализация до эмалево-дентинной границы
- поражение дентина

93. Выберите правильный вариант ответа

Точным, при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является

- зондирование полости зуба
- термометрия
- рентгенография
- тонометрия

94. Выберите правильный вариант ответа

К эпителизирующим средствам относятся

- гвоздичное масло
- р-р Люголя
- мазь солкосерила, масляный раствор витамина А
- р-р хлоргексидина

95. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективный анестетик

- новокаин
- тримекаин
- лидокаин
- артикаин

96. Выберите правильный вариант ответа

Для безболезненного эндодонтического вмешательства на молярах нижней челюсти целесообразно провести обезболивание

- аппликационное
- общее
- проводниковое
- инфильтрационное

97. Выберите правильный вариант ответа

Распад пульпы из канала удаляется

- мелко, по частям
- одномоментно
- в 2 посещения
- в 3 посещения

98. Выберите правильный вариант ответа

На рентгенограмме определяется равномерное расширение периодонтальной щели с четким ее контуром при

- хроническом гранулематозном периодонтите
- хроническом гранулирующем периодонтите
- хроническом фиброзном пульпите
- хроническом фиброзном периодонтите

99. Выберите правильный вариант ответа

Метод витальной экстирпации пульпы заключается

- в удалении пульпы без анестезии
- в удалении только коронковой пульпы без анестезии
- в удалении пульпы после девитализации
- в удалении живой пульпы под анестезией

100. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых

каналов можно использовать

- дистиллированную воду
- гипохлорит натрия
- физиологический раствор
- эфир

101. Выберите правильный вариант ответа

Местные анестетики, обладающие наибольшей длительностью действия, но не используемый у детей

- бупивакаин
- мепивакаин
- лидокаин
- артикаин

102. Выберите правильный вариант ответа

Поверхность реставрируемого зуба при выборе цвета композита должна быть

- естественно увлажненной
- сухой
- не имеет значения
- закрытой

103. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых каналов эффективнее использовать поочередное сочетание

- дистиллированную воду и перекись водорода
- гипохлорит натрия и перекись водорода
- физиологический раствор и эфир
- эфир и гипохлорит натрия

104. Выберите правильный вариант ответа

Окрашивание очага деминерализации эмали раствором метиленового синего происходит вследствие

- повышения проницаемости эмали в зоне поражения
- снижения pH зубного налета
- разрушения поверхностного слоя эмали
- колонизации бактерий на поверхности зуба

105. Выберите правильный вариант ответа

При отсутствии реакции на ток до 100 мкА можно предположить заболевание

- гангренозный пульпит
- глубокий кариес
- хронический периодонтит
- интактный зуб

106. Выберите правильный вариант ответа

Канал при лечении пульпита пломбируют

- до физиологического апикального отверстия
- до анатомического апикального отверстия
- за апикальное отверстие
- через апикальное отверстие

107. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров

- I класс

- 2 класс

- 3 класс

- 5 класс

108. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках

- I класс

- 2 класс

- 3 класс

- 5 класс

109. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий диагностический признак хронического периодонтита временного зуба

- отек переходной складки

- изменение цвета

- подвижность зуба

- рентгенологические изменения

110. Выберите правильный вариант ответа

Температурная проба применяется для диагностики

- периодонтита

- пульпита

- пародонтита

- гингивита

111. Выберите правильный вариант ответа

Хронический пульпит

- фиброзный

- очаговый

- диффузный

- гранулематозный

112. Выберите правильный вариант ответа

Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают своё формирование

- к 10 годам

- к 12 годам

- к 13 годам

- к 15 годам

113. Выберите правильный вариант ответа

Символом спирали по системе ISO

(International Standard Organization) обозначается

- H-файл

- каналонаполнитель Лентулло

- ример

- K-файл

114. Выберите правильный вариант ответа

Причиной диастемы постоянного прикуса является

- скученность зубов

- укороченная уздечка верхней губы

- макродентия

- мелкое преддверие полости рта

115. Выберите правильный вариант ответа

Цветовое кодирование H-файла, имеющего диаметр 035, 070, 130

- желтый

- синий

- черный

зелёный

116. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность поражений кариесом определяется индексом

CPITN

КПУ

ГИ

ПМА

117. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы обследования

расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика

расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация

оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование

термодиагностика, рентгенодиагностика

118. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные методы обследования

осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика

термодиагностика, электродиагностика, лабораторные

расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика

цитология

119. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

заболевания пародонта

болезни слизистой оболочки

кариес зубов

заболевания пульпита и периодонтита

120. Выберите правильный вариант ответа

При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

считаются при подсчете КПУ зубов

не учитываются совсем

на усмотрение врача

не имеет значения

121. Выберите правильный вариант ответа

В понятие «пародонт» входит

десна, круговая связка, периодонт

десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент

костная ткань альвеолы, пульпа, цемент

ткани зуба, периодонт

122. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении

зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях

зуб смещается в боковом направлении

зуб подвижен вокруг своей оси

123. Выберите правильный вариант ответа

Если зуб подвижен в вестибулярно-оральном направлении, то это

1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

124. Выберите правильный вариант ответа

Резорбция костной ткани межзубной перегородки - это

разрушение

наложение

истончение

утолщение

125. Выберите правильный вариант ответа

Инструмент для исследования пародонтального кармана

пуговчатый градуированный зонд

штыковидный зонд

гладилка

угловой зонд

126. Выберите правильный вариант ответа

Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к

пальпации

перкуссии

зондированию

оценке состояния прикуса

127. Выберите правильный вариант ответа

Пальпация - это

выстукивание

выслушивание

ощупывание

осмотр

128. Выберите правильный вариант ответа

С помощью пальпации можно определить

наличие зубного камня

кариес

подвижность тканей и органов

качество рентгеновского снимка

129. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности II степени

зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении

зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях

зуб смещается в боковом направлении

зуб подвижен вокруг своей оси

130. Выберите правильный вариант ответа

Ткань образующая основную массу зуба

эмаль

дентин

цемент

пульпа

131. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариеса по течению

начальный, поверхностный, средний, глубокий

- фиссурный, пришеечный, апроксимальный
- острый, хронический, острейший, приостановившийся

- начальный, острый, хронический

132. Выберите правильный вариант ответа

Явление сухости во рту - это

- сиалорея
- ксеростомия
- гипосаливация
- гиперсаливация

133. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости выявляются с помощью

- пинцета
- гладилки
- зонда
- экскаватора

134. Выберите правильный вариант ответа

Характерные изменения в десне при гингивите

- воспаление
- дистрофия
- атрофия
- лизис

135. Выберите правильный вариант ответа

Эрозия, как элемент поражения слизистой оболочки полости рта представляет собой

- бесполостное образование
- поверхностный дефект эпителия
- полостное образование с экссудатом
- изменение цвета

136. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- «тетрациклиновые» зубы
- гипоплазия эмали

137. Выберите правильный вариант ответа

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

138. Выберите правильный вариант ответа

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

- твердых тканях зуба
- пульпе
- периодонте
- эмали

139. Выберите правильный вариант ответа

Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения

- жалоб
- причины потери зубов
- наличия системных заболеваний
- наличия профессиональных вредностей

140. Выберите правильный вариант ответа

К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относится

- гипоплазия
- флюороз
- клиновидный дефект
- несовершенный амелогенез

141. Выберите правильный вариант ответа

К субъективным методам обследования относится

- инструментальный
- опрос больного
- лабораторный
- функциональный

142. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариеса по глубине поражения

- фиссурный, апроксимальный, пришеечный
- острый, хронический, приостановившийся, острейший
- начальный, поверхностный, средний, глубокий
- апроксимальный, поверхностный, острый

143. Выберите правильный вариант ответа

Сущность пародонтоза в

- резорбции альвеолярной кости
- дистрофии тканей пародонта
- хроническом воспалении тканей пародонта
- разрастании одной из пародонтальных тканей

144. Выберите правильный вариант ответа

К первичным элементам поражения не относится

- пятно
- бугорок
- афта
- папула

145. Выберите правильный вариант ответа

Причиной эндемического флюороза является

- недостаток кальция в организме ребенка
- инфекционное заболевание ребенка
- повышенное содержание фтора в питьевой воде
- недостаток фтора в организме матери

146. Выберите правильный вариант ответа

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

147. Выберите правильный вариант ответа

Кариес в стадии пятна диагностируют

- 5% раствором йода
- раствором Шиллера-Писарева
- 2% раствором метиленового синего
- 5% раствором бриллиантового зеленого

148. Выберите правильный вариант ответа

При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо

- устранить раздражитель
- провести антисептическую обработку
- обработать слизистую кератопластиком
- провести санацию полости рта

149. Выберите правильный вариант ответа

Причина возникновения лейкоплакии

- вирусы
- курение, алкоголь, раздражающая пища
- лучевые поражения
- бактерии

150. Выберите правильный вариант ответа

Промежутки между зубами

- протрузия
- тремы
- тортоаномалии
- дистопии

151. Выберите правильный вариант ответа

Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают

- скученность зубов
- наличие физиологических трем и диастем
- оральное смещение зубов
- вестибулярное смещение зубов

152. Выберите правильный вариант ответа

Количество зубов в молочном прикусе

- 20
- 24
- 28
- 32

153. Выберите правильный вариант ответа

Апикальное отверстие находится

- на небной поверхности вторых резцов
- на верхушке корня зуба
- на вестибулярной поверхности первых моляров
- на уровне рога пульпы

154. Выберите правильный вариант ответа

Кариес в стадии пятна дифференцируют

- с клиновидным дефектом
- с флюорозом
- со средним кариесом
- с эрозией эмали

155. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов

- рентгенологический
- зондирование
- пальпация
- цитология

156. Выберите правильный вариант ответа

Экскаватором

- вносят в полость лекарственные вещества
- формируют пломбирочный материал, удаляют размягченный дентин
- уплотняют пломбирочный материал, удаляют временные пломбы

- удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы

157. Выберите правильный вариант ответа

Вторичный морфологический элемент поражения слизистой оболочки полости рта

- волдырь
- абсцесс
- гнойничок
- чешуйка

158. Выберите правильный вариант ответа

Симптомами гингивита являются

- кровоточивость и отечность десен
- жжение языка и ксеростомия
- патологическая стираемость и подвижность зубов
- изменения прикуса и рецессия десны

159. Выберите правильный вариант ответа

Особенностью стоматологического пинцета является

- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек

160. Выберите правильный вариант ответа

Наличие сообщения кариозной полости с полостью зуба определяют с помощью

- пинцета
- экскаватора
- зонда
- бора

161. Выберите правильный вариант ответа

Инструментами для конденсации гуттаперчи являются

- файлы и римеры
- каналонаполнитель и дрельбор
- корневые буравы и файлы
- спредеры и плагеры

162. Выберите правильный вариант ответа

Характерные симптомы острых форм пульпита

- боль локальная, тупая
- боль острая, самопроизвольная
- перкуссия резко болезненна
- боль проходит сразу после удаления раздражителя

163. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез заболевания (morbi) включает в себя

- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
- вредные привычки пациента
- применение лекарственных препаратов, соматические заболевания

164. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез жизни (anamnesis vitae) пациента включает

- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
- жалобы и время возникновения заболевания
- характер боли, факторы, её провоцирующие

165. Выберите 2 правильных ответа

Рентгеноконтрастными являются

- пульпа
- мышцы
- десна
- эмаль
- металл

166. Выберите 2 правильных ответа

Нерентгеноконтрастными являются

- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- золото
- металл

167. Выберите правильный вариант ответа

Диастема относится к аномалии

- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии

168. Выберите правильный вариант ответа

Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии

- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов
- прикуса

169. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор
- молибден
- калий
- цинк

170. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

171. Выберите правильный вариант ответа

При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень
- постоянные зубы и кости скелета
- постоянные зубы и ногти
- молочные, постоянные зубы и почки

172. Выберите правильный вариант ответа

Флюороз развивается при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л
- 0,8 мг/л

1 мг/л

2 мг/л

173. Выберите правильный вариант ответа

Пациенты при флюорозе жалуются на

- изменение цвета зубов
- повышенную чувствительность
- стертость зубов
- подвижность зубов

174. Выберите правильный вариант ответа

Назовите местный карисогенный фактор

- диета
- функциональное состояние зубов
- экстремальные воздействия
- зубной налет

175. Выберите правильный вариант ответа

Край искусственной коронки при правильном положении

- доходит до уровня десневого края
- не доходит до уровня десневого края
- погружается в десневой карман на 0,5 мм
- погружается в десневой карман на 1 – 1,5 мм

176. Выберите правильный вариант ответа

Бруксизм это

- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании

177. Выберите правильный вариант ответа

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

178. Выберите правильный вариант ответа

Диастема - это расстояние между

- центральными резцами более 1 мм
- центральными и боковыми резцами более 1 мм
- премолярами более 1 мм
- премолярами и молярами больше 1 мм

179. Выберите правильный вариант ответа

Ложный пародонтальный карман характерен для

- пародонтита
- пародонтоза
- катарального гингивита
- гипертрофического гингивита

180. Выберите правильный вариант ответа

Основным местным фактором риска возникновения гингивита является

- наследственность
- наличие микробного налета
- вредные привычки
- подвижность зубов

181. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит
- гингивит
- стоматит
- травма

182. Выберите правильный вариант ответа

Воспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- пародонтома
- пародонтолиз

183. Выберите правильный вариант ответа

Системные заболевания, обуславливающие заболевание пародонта

- вирусные
- грибковые
- органов дыхания
- сахарный диабет, заболевания крови

184. Выберите правильный вариант ответа

Формирование корня после прорезывания постоянного зуба завершается через

- 3-4 года
- 2 года
- 6 месяцев
- 1 год

185. Выберите правильный вариант ответа

Количество слюны, секретлируемое в норме в сутки (в мл)

- 100
- 200
- 800
- 1500

186. Выберите правильный вариант ответа

Характерные боли для острых форм пульпита

- постоянные, нарастающие от холодного
- приступообразные, самопроизвольные, усиливаются от раздражителей и ночью
- кратковременные от раздражителей, быстро проходящие

пульсирующие постоянного характера

187. Выберите правильный вариант ответа

Лечение острого остеомиелита предусматривает

- антибиотики и мажевые повязки
- создание оттока экссудата из периодонта
- общее лечение организма и антибиотики
- удаление «причинных» зубов и общее лечение

188. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее целесообразные действия врача при медикаментозном стоматите

- назначение внутрь антигистаминных препаратов
- отмена лекарств
- назначение антисептика в виде аппликаций или полосканий

назначение стероидных гормонов

189. Выберите правильный вариант ответа

Диагноз «контактный стоматит» ставится на данных

- анамнеза
- клинических симптомов
- лабораторных анализов
- дополнительных методов исследования

190. Выберите правильный вариант ответа

Действие врача при стоматите, вызванном протезом

- изъятие протеза сроком на 2-3 недели
- покрытие поверхности протеза специальными инертными составами
- назначение противовоспалительных медикаментозных средств
- замена протеза

191. Выберите правильный вариант ответа

Изменение цвета слизистой оболочки на ограниченном участке

- корка
- налет
- пятно
- бугорок

192. Выберите правильный вариант ответа

Полостное образование, имеющее соединительнотканную капсулу и эпителиальную выстилку

- киста
- пузырь
- волдырь
- афта

193. Выберите правильный вариант ответа

Этиологию лейкоплакии связывают с

- вирусной инфекцией
- аутосенсбилизацией
- врожденными и генетически обусловленными заболеваниями
- травмой и местными раздражителями

194. Выберите правильный вариант ответа

При лейкоплакии поражается

- только кожа
- слизистые оболочки полости рта
- кожа и слизистые оболочки
- альвеолярный отросток

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

195. Выберите правильный вариант ответа

При среднем кариесе боли после устранения раздражителя

- усиливаются
- держатся 20 минут
- исчезают
- держатся 10 минут

196. Выберите правильный вариант ответа

Поверхностный кариес возникает на месте

- белого пятна
- неизменного участка
- эрозии
- гипоплазии

197. Выберите правильный вариант ответа

К 4-му классу по Блеку относятся кариозные полости

- на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения целостности режущего края
- в пришеечной области резцов и клыков
- в слепых ямках резцов
- на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края

198. Выберите правильный вариант ответа

Болезненная перкуссия характерна для пульпита

- острого серозного
- хронического фиброзного
- хронического гипертрофического
- острого гнойного

199. Выберите правильный вариант ответа

При остром пульпите провоцируют боль

- прикосновение к зубу
- температурные раздражители
- накусывание на зуб
- раздражители в области триггерных зон

200. Выберите правильный вариант ответа

Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает удаление пульпы

- коронковой
- корневой
- коронковой и корневой
- половины корневой

201. Выберите правильный вариант ответа

По распространенности процесса пародонтит бывает

- генерализованный и локализованный
- генерализованный
- хронический и обострившийся
- острый и хронический

202. Выберите правильный вариант ответа

Основные клинические признаки пародонтита

- кровоточивость десен, подвижность зубов, выделение гноя из десневых карманов
- обнажение шеек зубов и повышенная их чувствительность, отсутствие воспаления десны, отсутствие подвижности зубов

подвижность зубов, болезненность и кровоточивость десен

отсутствие зубодесневых карманов, подвижность зубов, гиперемия десны

203. Выберите правильный вариант ответа

Особенностью рентгенологической картины костной ткани при легкой степени пародонтита является

- резорбция компактных пластинок и резорбция межальвеолярных перегородок до трети длины корня
- резорбция костной ткани альвеолярного отростка на половину длины корня
- изменений костной ткани альвеолярного отростка нет
- резорбция компактных пластинок

204. Выберите правильный вариант ответа

Кюретаж зубодесневых карманов проводят при

- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтите средней степени тяжести
- гипертрофическом гингивите

205. Выберите правильный вариант ответа

Декубитальная язва образуется при

- механическом повреждении тканей
- нарушении трофики тканей
- туберкулезном поражении
- лучевом поражении

206. Выберите правильный вариант ответа

Электровозбудимость пульпы при среднем кариесе (в мка)

- 2-6
- 10-12
- 20-30
- 80-100

207. Выберите правильный вариант ответа

Дистопия - это

- зуб неправильно расположен в зубном ряду
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет

208. Выберите правильный вариант ответа

Основную часть слюны у человека выделяют слюнные железы

- околоушные
- подчелюстные
- подъязычные
- малые слюнные железы

209. Выберите правильный вариант ответа

Обследование пациента в стоматологическом кабинете начинается с

- перкуссии
- пальпации
- опроса

осмотра

210. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительным методом обследования является

- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография

211. Выберите правильный вариант ответа

Первая жалоба при остром перикороните

- боли при открывании рта
- боли при глотании
- боли в области зуба мудрости
- плохое самочувствие

212. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов

- фтора
- карбонатов
- кальция
- натрия

213. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей

- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания

214. Выберите правильный вариант ответа

Аппликационное обезболивание – это

- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу

215. Выберите 2 правильных ответа

Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена

- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса
- на восстановление дефектов зубного ряда
- на восстановление утраченной функции

216. Выберите правильный вариант ответа

Фторлак применяется для

- профилактики кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита
- лечения заболеваний пародонта

217. Выберите правильный вариант ответа

Противопоказание к герметизации фиссур

- фиссурный кариес
- гипосаливация

глубокие фиссуры

неоконченная минерализация зуба

218. Выберите правильный вариант ответа

Проведение реминерализующей терапии подразумевает

- эндогенная безлекарственная профилактика
- экзогенная безлекарственная профилактика
- эндогенная лекарственная профилактика
- экзогенная лекарственная профилактика

219. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию с целью профилактики следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

220. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

221. Выберите правильный вариант ответа

Поверхности клиновидного дефекта

- шероховатые, светлые
- мягкие, темные
- гладкие, твердые
- мягкие, блестящие

222. Выберите правильный вариант ответа

Характерное течение при остром гнойном одонтогенном периостите челюсти

- медленное вялое
- бурное развитие и быстрое разрешение процесса
- бурное развитие, но медленное разрешение процесса
- медленное развитие и быстрое разрешение воспалительного процесса

223. Выберите правильный вариант ответа

Для контактного аллергического стоматита характерно

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная накожная проба
- наличие гиперемии и отека
- наличие эрозий или пузырей

224. Выберите правильный вариант ответа

Ретракционная нить применяется для

- отодвигания десны с целью обеспечения сухости рабочего поля
- очистки межзубных промежутков
- временного шинирования челюстей
- наложения внутриротовых швов

225. Выберите правильный вариант ответа

К съемным протезам, кроме пластиночных, относятся

- мостовидные протезы
- бюгельные протезы
- штифтовые зубы
- вкладки

226. Выберите правильный вариант ответа

Зубное протезирование относится к виду стоматологической помощи

- ортопедический
- терапевтический
- хирургической
- ортодонтической

227. Выберите правильный вариант ответа

Пластмассовые коронки по сравнению с металлическими более

- эстетичные
- прочные
- гигиеничные
- долговечные

228. Выберите правильный вариант ответа

Количество классов в классификации полостей по Блэку

- три
- четыре
- пять
- семь

229. Выберите правильный вариант ответа

Искусственная коронка – это

- несъемный протез
- гипсовый оттиск
- съемный протез
- частично съемный протез

230. Выберите правильный вариант ответа

Адентия зубов относится к аномалиям

- количества зубов
- сроков прорезывания зубов
- структуры зубов
- положения зубов

231. Выберите правильный вариант ответа

Один из важных клинических признаков перелома нижней челюсти

- нарушение прикуса при сомкнутых челюстях
- невозможность закрыть рот
- глубокое перекрытие нижних зубов верхними
- дистальный сдвиг нижней челюсти

232. Выберите правильный вариант ответа

Фиксация эластических слепочных материалов к ложке осуществляется путем

- использование перфорированных ложек
- обклеивание краев ложки воском
- смазывания ложки мономером
- нанесение на ложку адгезива

233. Выберите правильный вариант ответа

Использованные при анестезии карпулы, относят к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

234. Выберите правильный вариант ответа

Использованные одноразовые перчатки перед утилизацией

- моют
- дезинфицируют
- разрезают
- автоклавируют

235. Выберите правильный вариант ответа

Радиоактивные медицинские отходы – это класс

- «Б»
- «В»
- «Г»
- «Д»

236. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов
- 24 часа
- 72 часа
- 1 неделя
- 2 недели

237. Выберите правильный вариант ответа

Эмпатия это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров
- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

238. Выберите правильный вариант ответа

Интерес к партнеру по общению на невербальном уровне можно выразить

- интенсивно жестикулируя
- пронзительным голосом
- наклонив голову в сторону
- пристальным взглядом

239. Выберите правильный вариант ответа

Информацию о внутренних переживаниях, эмоциональном состоянии человека представляют

- в равной степени вербальные и невербальные средства коммуникации
- в большей степени вербальные средства
- в большей степени невербальные средства
- интуиция

240. Выберите правильный вариант ответа

Использованные иглы для карпульного инъектора относятся к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

241. Выберите правильный вариант ответа

Инфильтрационная анестезия не эффективна в области

- 17 - 16 зубов
- 13 - 23 зубов
- 43 - 33 зубов
- 36 - 38 зубов

242. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании

- обязательном медицинском
- добровольном медицинском
- возвратном
- социальном

243. Выберите правильный вариант ответа

Поликлиника оказывает населению помощь

- социальную
- первичную лечебно-профилактическую
- санитарно-противоэпидемическую
- стационарную

244. Выберите правильный вариант ответа

Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

245. Выберите правильный вариант ответа

Основные законодательные документы по охране здоровья граждан в РФ

- Конституция РФ, Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ
- Этический кодекс медицинской сестры России
- СанПиНы
- Всеобщая декларация прав человека

246. Выберите правильный вариант ответа

Пациент самостоятельно принимает решение о согласии на медицинское вмешательство при достижении им возраста

- 15 лет
- 14 лет
- без ограничения
- 12 лет

247. Выберите правильный вариант ответа

Показатели артериального давления в норме менее

- 120/80
- 130/80
- 139/85
- 140/90

248. Выберите правильный вариант ответа

Для моделирования контактной поверхности зуба при пломбировании используют

- матрицу
- плаггер
- штопфер

- штрипсы

249. Выберите правильный вариант ответа

Галогеновые лампы используют для

- полимеризации композита
- реминерализации эмали
- полимеризации амальгамы
- полимеризации фосфат-цемента

250. Выберите правильный вариант ответа

Для адгезии композитного материала при реставрации используется

- бондигловая система
- фосфорная кислота
- антисептические препараты
- препараты фторида натрия

251. Выберите правильный вариант ответа

Усадка светоотверждаемого композита происходит в сторону

- источника света
- полости зуба
- от источника света
- независимую от источника света

252. Выберите 2 правильных ответа

Для расширения корневого канала по диаметру применяют

- К-ример
- К-файл
- Н-файл
- спредер
- плагер
- пульпоэкстрактор

253. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи применяют

- Н-файл
- спредер
- плагер
- пульпоэкстрактор

254. Выберите правильный вариант ответа

Символом К-римера является:

- треугольник
- квадрат
- круг
- ромб

255. Выберите правильный вариант ответа

Символом Н-файла является

- треугольник
- квадрат
- круг
- ромб

256. Выберите правильный вариант ответа

Консервативное лечение периодонтита может быть успешным в случае

- полноценного пломбирования канала
- не полностью запломбированного канала
- лечения причинного зуба в одно посещение

- длительного наблюдения за состоянием пародонта
- 257. Выберите правильный вариант ответа**
Отсутствие контактного пункта между зубами ведёт к развитию
- локализованному пародонтиту
 - генерализованному пародонтозу
 - генерализованному пародонтиту
 - декубитальной язве
- 258. Выберите правильный вариант ответа**
Пародонтальные карманы при пародонтозе:
- отсутствуют
 - менее 3 - 5 мм
 - более 5 мм
 - более 7 мм
- 259. Выберите правильный вариант ответа**
При артериальном кровотечении жгут накладывают
- ниже раны
 - на рану
 - выше раны
 - ниже и выше раны
- 260. Выберите правильный вариант ответа**
Инструмент «Штопфер-гладилка» используют для
- пломбирования полости
 - замешивания пломбировочных материалов
 - осмотра полости рта
 - удаления пломбы из полости
- 261. Выберите правильный вариант ответа**
Количество зубов в постоянном прикусе
- 18-20
 - 26-27
 - 28-32
 - 20-30
- 262. Выберите правильный вариант ответа**
Ятрогенными называются заболевания, вызванные
- неосторожным действием врача
 - снижением иммунной защиты
 - стрессом
 - неспецифическими микробными агентами
- 263. Выберите правильный вариант ответа**
Число сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме
- 60 - 80
 - 49 - 60
 - 90 - 100
 - 100 - 120
- 264. Выберите правильный вариант ответа**
Артериальное давление зависит
- как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной стенки сосуда
 - только от силы сокращения сердца
 - только от тонуса артериальной стенки
 - только от частоты сокращений сердца
- 265. Выберите правильный вариант ответа**

- Универсальная проба для проверки медицинского инструментария на наличие скрытой крови называется
- азопирамовой
 - бензидиновой
 - фенолфталеиновой
 - бензойной
- 266. Выберите правильный вариант ответа**
Уровень обработки рук медицинской сестры перед выполнением инъекции
- гигиенический
 - социальный
 - хирургический
 - стерильный
- 267. Выберите правильный вариант ответа**
Длительность использования накрытого стерильного стола в часах
- 6
 - 24
 - 18
 - 12
- 268. Выберите правильный вариант ответа**
Асептика
- предупреждение попадания инфекции в рану или организм пациента
 - специальный уход за пациентом
 - уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
 - дезинфекция инструментов
- 269. Выберите правильный вариант ответа**
Генеральная уборка процедурного кабинета проводится
- 1 раз в неделю
 - через день
 - 1 раз в месяц
 - по мере загрязнения
- 270. Выберите правильный вариант ответа**
Медицинские инструменты в крафт-пакете сохраняют стерильность в течение
- 3 суток
 - 1 суток
 - 10 суток
 - 7 суток
- 271. Выберите правильный вариант ответа**
Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции
- переливание инфицированной крови
 - рукопожатие
 - приём пищи из одной посуды
 - укусы насекомых
- 272. Выберите правильный вариант ответа**
В "упаковочном" отделении ЦСО проводят
- укладку материала в биксы для стерилизации
 - закладывание биксов в автоклав
 - контроль качества предстерилизационной очистки
 - предстерилизационную очистку
- 273. Выберите правильный вариант ответа**

Предстерилизационную очистку медицинского инструментария проводят в

- "моечном" отделении ЦСО
- "упаковочном" отделении ЦСО
- "автоклавном" отделении ЦСО
- "приемном" отделении ЦСО

274. Выберите правильный вариант ответа

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется

- стерилизацией
- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией

275. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения закрытого стерильного бикса без фильтра

- 3 суток
- 1 сутки
- 6 часов
- 20 суток

276. Выберите правильный вариант ответа

Антисептика - это комплекс мероприятий

- по борьбе с инфекцией в ране
- по профилактике попадания инфекции в рану
- по профилактике попадания инфекции на руки
- по дезинфекции инструментов

277. Выберите правильный вариант ответа

Инъекционное поле обрабатывают

- 70 процентным спиртом
- 40 процентным спиртом
- 90 процентным спиртом
- 96 процентным спиртом

278. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация воздушным методом изделий из стекла и металла

- t-180 град. С, время-60 мин
- t-180 град. С, время- 120 мин
- t-160 град, С время- 60 мин
- t-160 град, С время - 120 мин

279. Выберите правильный вариант ответа

Подсушивание инструментов в ЦСО перед стерилизацией проводится

- в сухожаровом шкафу или на простынях на воздухе
- в автоклаве
- в среде нагретых шариков
- методом вытирания

280. Выберите правильный вариант ответа

В ЦСО азопирамовая проба с целью самоконтроля проводится

- ежедневно в каждой партии инструментария
- один раз в неделю в каждой партии инструментария
- два раза в неделю в каждой партии инструмента
- один раз в месяц в каждой партии инструментария

281. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильности неэксплуатированного инструмента при хранении его в УФ - бактерицидных камерах составляет

- 7 суток
- 5 суток
- 3 суток
- 1 сутки

282. Выберите правильный вариант ответа

Стоматологические инструменты после стерилизации химическим способом ополаскивают

- стерильной дистиллированной водой
- кипяченой водой
- стерильной водой
- проточной водой

283. Выберите правильный вариант ответа

Положительная азопирамовая проба дает окрасивание

- фиолетовое
- оранжевое
- ярко-зелёное
- жёлтое

3. Умение квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации.

284. Выберите правильный вариант ответа

Некариозные поражения (клиновидный дефект, эрозия) чаще встречаются

- при пародонтозе
- при пародонтите
- при гингивите
- при стоматите

285. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологическая картина хронического гранулематозного периодонтита

- очаг деструкции в области верхушки корня с нечеткими контурами
- очаг деструкции с четкими контурами
- равномерное расширение периодонтальной щели
- деструкция альвеолярных перегородок

286. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологическая картина хронического гранулирующего периодонтита

- очаг деструкции в области верхушки корня с нечеткими контурами
- наличие очагов остеосклероза
- равномерное расширение периодонтальной щели
- наличие очагов остепороза

287. Выберите правильный вариант ответа

Воспаление десны называется

- гингивит
- эпюлис
- периодонтит
- кандидоз

288. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит
- гингивит
- стоматит
- травма

289. Выберите правильный вариант ответа

Образование зубной бляшки от употребления пищи, богатой углеводами

- ускоряется
- замедляется
- остается неизменным
- прекращается

290. Выберите правильный вариант ответа

Местным кариесогенным фактором является

- диета
- функциональное состояние зубов
- экстремальные воздействия
- зубной налет

291. Выберите 2 правильных ответа

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта

- атрофия десны
- бледность слизистой
- кандидоз
- гипертрофия десны
- кровоточивость десен
- "волосатая» лейкоплакия

292. Выберите правильный вариант ответа

Основной компонент лечения хронического гингивита

- физиотерапия
- антибиотикотерапия
- устранение раздражающего фактора
- витаминотерапия

293. Выберите 2 правильных ответа

Задачи патогенетического лечения пародонтита

- стабилизация дистрофического процесса в пародонте
- устранение ксеростомии
- устранение рецессии
- устранение галитоза
- устранение воспалительного процесса в пародонте
- устранение десневых и костных карманов

294. Выберите правильный вариант ответа

Лечебные прокладки способствуют отложению заместительного дентина

- да
- нет
- только в постоянных зубах
- только в молочных зубах

295. Выберите правильный вариант ответа

Для проведения реминерализующей терапии используют раствор

- 10% глюконата кальция
- 5% хлористого кальция
- 2% перекиси водорода
- 1% йодиола

296. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию растворами фторида натрия рекомендуется сочетать с

- 10 % раствором глюконата кальция
- герметизацией фиссур
- покрытие зубов фторсодержащим лаком
- полоскание полости рта фторсодержащими растворами

297. Выберите правильный вариант ответа

К реминерализующим средствам относится раствор

- перекиси водорода 10%
- эуфиллина 2,4%
- метиленового синего 2%
- фторида натрия 2%

298. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию рекомендуется проводить при

- кариесе в стадии пятна
- среднем кариесе
- глубоком кариесе
- осложненном кариесе

299. Выберите правильный вариант ответа

Для проводниковой анестезии используют растворы лидокаина

- 0,5%
- 4%
- 2%
- 10%

300. Выберите правильный вариант ответа

Герметизация фиссур проводится для

- профилактики кариеса
- лечения кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита

301. Выберите правильный вариант ответа

Начальной стадией кариеса является

- реминерализация
- минерализация
- деминерализация
- флюоризация

302. Выберите правильный вариант ответа

Функции пародонта

- регуляция жевательного давления, трофическая
- регуляция жевательного давления, трофическая, амортизирующая
- опорно-удерживающая, амортизирующая, трофическая, регуляция жевательного давления, пластическая
- защитная, пластическая

303. Выберите правильный вариант ответа

К воспалительным заболеваниям пародонта относятся

- пульпит, периодонтит
- гингивит, пародонтит
- периодонтит, сиалоаденит
- стоматит, хейлит

304. Выберите правильный вариант ответа

Клиническая коронка зуба- это

- часть зуба, которая выступает над десной
- часть зуба, покрытая эмалью
- часть зуба под десной
- часть зуба покрытая цементом

305. Выберите правильный вариант ответа

Начальной стадией кариеса является

- реминерализация
- минерализация
- деминерализация
- зубной налёт

306. Выберите правильный вариант ответа

По международной системе обозначения зубов каждый зуб обозначается цифрами

- одной
- двумя
- тремя
- четырьмя

307. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле кариес обозначается символом

- Ks
- C
- Ka
- Car

308. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле интактный зуб обозначается символом

- C
- 0
- И
- установленный символ отсутствует

309. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом

- Иск
- C
- K
- И

310. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле периодонтит обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

311. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле пульпит обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

312. Выберите правильный вариант ответа

Пломба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- R
- Пл

313. Выберите правильный вариант ответа

Главным при диагностике острого очагового пульпита является

- характер болей
- характер болей и фактор времени
- данные электроодонтодиагностики
- данные термодиагностики

314. Выберите правильный вариант ответа

Метод сохранения жизнеспособной пульпы в корневых каналах называется

- девитальная ампутация
- девитальнаяэкстирпаци
- витальная ампутация
- витальная экстирпация

315. Выберите правильный вариант ответа

Решающим тестом в дифференциальной диагностике хронического периодонтита и пульпита является

- перкуссия
- характер болей
- рентгенодиагностика
- зондирование

316. Выберите правильный вариант ответа

Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

317. Выберите правильный вариант ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

318. Выберите правильный вариант ответа

К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат

- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

319. Выберите правильный вариант ответа

Матрицы применяются с целью

- уменьшения количества материала
- улучшения цветостойкости
- формирования контуров пломбы
- косметического эффекта

320. Выберите правильный вариант ответа

Депо анестетика при проведении инфльтрационной анестезии для удаления зуба создается

- в сосудистом русле
- в подслизистом слое
- под надкостницей
- внутрикостно

321. Выберите правильный вариант ответа

Угол наклона иглы к альвеолярному отростку при инфльтрационной анестезии составляет

- 30 градусов
- 45 градусов
- 60 градусов
- 90 градусов

322. Выберите правильный вариант ответа

Мандибулярная анестезия исключает болевую чувствительность

- моляров
- моляров и премоляров
- всех зубов нижней челюсти с данной стороны
- всех зубов кроме резцов

323. Выберите правильный вариант ответа

Целесообразно использовать для аппликационной анестезии на слизистой оболочке ротовой полости

- 2% лидокаина
- 5% лидокаина
- 10% лидокаина
- 5% новокаина

324. Выберите правильный вариант ответа

Показания к применению композитов

- кариозные полости всех классов
- изолирующие прокладки
- временные пломбы
- для корневых каналов

325. Выберите правильный вариант ответа

Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы
- силикатные цементы
- эвикрол

326. Выберите правильный вариант ответа

Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

- светотвердеющие материалы
- цинкофосфатные цементы
- фосфатные
- силикофосфатные

327. Выберите правильный вариант ответа

Толщина слоя светоотверждаемого композита при послойном нанесении

- 4 мм
- 2 мм
- 1 мм
- 5 мм

328. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека уничтожается

- при нагревании до 56 градусов Цельсия 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
- при высушивании, при облучении в течение 3 суток
- при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
- при промывании проточной водой

329. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция - это уничтожение

- патогенных микроорганизмов
- всех микроорганизмов
- бактерий
- анаэробных бактерий

330. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация - это уничтожение

- вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
- патогенных бактерий
- микробов на поверхности
- микробов внутри

331. Выберите правильный вариант ответа

Применяют для высушивания корневых каналов штифты

- гуттаперчевые
- резиновые
- деревянные
- бумажные

332. Выберите 2 правильных ответа

Парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания

- простой герпес
- гепатит А
- гепатит В
- гепатит С
- грипп
- стоматит

333. Выберите правильный вариант ответа

Температура (градусов по Цельсию) воздуха при стерилизации воздушным методом

- 120-140
- 160-180
- 200-220
- 240-260

334. Выберите правильный вариант ответа

В автоклаве стерилизация осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

335. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

336. Выберите правильный вариант ответа

При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

- остатков моющих средств
- микроорганизмов
- слюны
- крови

337. Выберите правильный вариант ответа

При аппликационной анестезии анестетик применяется

- поверхностно, на слизистую оболочку полости рта
- вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца
- внутривенно
- ингаляционно

338. Выберите правильный вариант ответа

Шпатель предназначен для

- уплотнения пломбирочного материала в кариозной полости
- растирания и замешивания пломбирочных материалов
- удаления избытков пломбирочного материала из кариозной полости
- удержания мягких тканей полости рта

339. Выберите правильный вариант ответа

Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

- одноразовые кисточки
- полировочные головки
- полировочные штрипсы
- суперфлоссы

340. Выберите правильный вариант ответа

Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдаются в соотношении

- указанном в инструкции
- увеличением количества жидкости
- увеличением количества порошка
- в произвольных соотношениях

341. Выберите правильный вариант ответа

Сосудосуживающий эффект обеспечивается

- викасолом

- адреналином
- димедролом
- хлористым кальцием

342. Выберите правильный вариант ответа

Выдавливать фурункул на лице нельзя потому что

- после заживания остаются рубцы на лице
- замедляется заживание
- озлокачествление
- возникновение общих тяжелых осложнений

343. Выберите правильный вариант ответа

Асфиксия – это

- вид травмы ЧЛЮ
- вид ожога
- удушье
- потеря памяти

344. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто аллергические реакции развиваются при использовании для местного обезболивания

- новокаина
- лидокаина
- тримекаина
- ультракаина

345. Выберите правильный вариант ответа

Ранение сосудов при проводниковой анестезии приводит к

- возникновению болей
- возникновению парестезии
- образованию некроза
- образованию гематомы

346. Выберите правильный вариант ответа

При обмороке вводят под кожу

- 0,5 мл адреналина
- 1 мл кордиамина
- 2 мл димедрола
- 2 мл эуфиллина

347. Выберите правильный вариант ответа

Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

- массаж сердца
- искусственная вентиляция лёгких
- нитроглицерин под язык
- анальгин

348. Выберите правильный вариант ответа

При гипертоническом кризе вводят

- троксевазин
- нифедипин
- тетралгин
- адреналин

349. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом бронхиальной астмы

- одышка
- боль за грудиной
- приступ удушья
- приступ тахикардии

350. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо ввести при приступе бронхиальной астмы

- эуфиллин
- нифедипин
- преднизолон
- диазолин

351. Выберите правильный вариант ответа
Ингалятор для снятия приступа бронхиальной астмы

- сальбутамол
- каметон
- бекотид
- ингалипт

352. Выберите правильный вариант ответа
Коллапс – это

- аллергическая реакция на антиген
- потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- воспалительная реакция

353. Выберите правильный вариант ответа
Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

- ввести фенobarбитал
- ввести седативные препараты
- ввести транквилизаторы
- ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка

354. Выберите правильный вариант ответа
Причиной постэкстракционного кровотечения не является

- повышение АД
- понижение АД
- снижение свёртываемости крови
- разрыв слизистой оболочки

355. Выберите правильный вариант ответа
Периостотомия при лечении гнойного периостита челюсти является

- обязательной
- желательной
- не желательной
- необязательной

356. Выберите правильный вариант ответа
При лечении фурункула до абсцедирования запрещено

- УФО
- УВЧ
- обработка спиртом
- обработка гепариновой мазью

357. Выберите правильный вариант ответа
Следует при перикоронарите и нормальном расположении третьего нижнего моляра

- удалить зуб
- провести иссечение «капюшона»
- сделать новокаиновую блокаду
- начать иглорефлексотерапию

358. Выберите правильный вариант ответа

Основным симптомом для диагностики перелома нижней челюсти является

- боль в области челюсти
- симптом ступеньки
- симптом крепитации
- патологическая подвижность отломков

359. Выберите 2 правильных ответа
Специализированная помощь при травмах челюстей

- оперативное вмешательство, репозиция
- наложение повязок, общее лечение
- наложение шинирующих аппаратов
- общее лечение
- симптоматическое лечение
- обезболивание, иммобилизация

360. Выберите правильный вариант ответа
В начале терапии анафилактического шока показано

- аминазин подкожно
- раствор адреналина внутривенно (внутримышечно)
- кофеин бензоат натрия внутримышечно
- введение больших доз кортикостероидов

361. Выберите правильный вариант ответа

Причина расширения показания к удалению молочных зубов с хроническим воспалительным очагом в периодонте у детей

- дают частые обострения
- приводят к гибели зачатков постоянных зубов
- невозможно провести качественное консервативное лечение
- потому что молочные зубы заменяются постоянными

362. Выберите правильный вариант ответа

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

- ввести подкожно раствор кофеина
- уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха
- вывести в другое помещение, ввести эуфиллин
- прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

363. Выберите правильный вариант ответа

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

- неминерализованным
- минерализованным
- смешанным
- пищевым

364. Выберите 2 правильных варианта ответов

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- зубная бляшка
- зубной камень

- дентин
- цемент корня

365. Выберите правильный вариант ответа

Время чистки зубов составляет

- 1 минуту
- 3 минуты
- 1,5 минуты
- 15 минут

366. Выберите правильный вариант ответа

Для профилактики заболеваний пародонта чистить зубы необходимо

- 3-5 раз в день
- два раза – утром и вечером
- только вечером
- один раз утром

367. Выберите правильный вариант ответа

Основной недостаток зубных порошков

- быстрая загрязняемость микроорганизмами
- отсутствие пенообразования
- слабая абразивность
- неприятный вкус

368. Выберите правильный вариант ответа

При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- флоссы
- зубные щетки
- полоскания
- межзубные стимуляторы

369. Выберите правильный вариант ответа

Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости
- отсутствие срединного канала
- возможность фигурной подстрижки
- нет преимуществ

370. Выберите правильный вариант ответа

Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие

- индивидуальной гигиены полости рта
- профессиональной гигиены полости рта
- профессиональной чистки зубов
- контролируемой чистки зубов

371. Выберите правильный вариант ответа

Использование флоссов рекомендуется с возраста

- 4-5
- 6-8
- 9-12
- 15-16

372. Выберите правильный вариант ответа

Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить

- утром
- вечером
- утром и вечером
- в очищении нет необходимости

373. Выберите два правильных варианта ответа

К гигиеническим индексам относятся

- Грина-Вермильона
- ПИ
- КПИ
- CPITN
- Федорова-Володкиной
- ПМА

374. Выберите правильный вариант ответа

Замену зубной щетки проводят один раз в

- 12 месяцев
- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2-3 месяца

375. Выберите правильный вариант ответа

В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки

- фторида натрия
- эритрозина
- глюконата кальция
- аскорбиновой кислоты

376. Выберите правильный вариант ответа

Фторидсодержащие зубные пасты рекомендуется использовать детям с возраста (лет)

- 1,5 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6
- 10 - 12

377. Выберите 2 правильных ответа

Противокариозные зубные пасты содержат

- кальций
- фтор
- экстракт ромашки
- водоросли
- триклозан
- экстракт шалфея

378. Выберите правильный вариант ответа

Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости

- мягкой и очень мягкой
- жесткой
- средней жесткости
- любой

379. Выберите правильный вариант ответа

Оптимальное содержание фтора в питьевой воде

- 0,1 мг/л
- 1 мг/л
- 5 мг/л
- 10 мг

380. Выберите правильный вариант ответа

Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки

- очень мягкие
- очень жесткие
- средней жесткости
- жёсткие

381. Выберите 2 правильных ответа

Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены

- зубная бляшка
- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- белое вещество
- биоплёнка

382. Выберите правильные варианты ответов

Для механического удаления зубного камня используют

- боры, экскаваторы, плаггеры
- экскаваторы, крючки, кюреты
- долото, элеватор, зонд
- эмалевые ножи, штопфер, гладилку

383. Выберите правильный вариант ответа

Для удаления зубного камня используют инструменты

- скейлеры, кюреты, экскаватор
- экскаватор, штопфер, гладилку
- зонд, зеркало, пинцет
- пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

384. Выберите правильный вариант ответа

Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатым воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

385. Выберите правильный вариант ответа

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

386. Выберите правильный вариант ответа

Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

387. Выберите правильный вариант ответа

Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

388. Выберите правильный вариант ответа

Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

389. Выберите правильный вариант ответа

Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

390. Выберите правильный вариант ответа

За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание
- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

391. Выберите правильный вариант ответа

Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия
- разрешения руководителя медицинского учреждения
- требований родственников
- наличия страхового полиса

392. Выберите правильный вариант ответа

Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- утверждается нотариально

393. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма

- № 067/у
- № 043/у
- № 086/у
- № 237/у

394. Выберите правильный вариант ответа

Трудовой договор заключается

- в устной форме;
- в письменной форме;
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки;
- в письменной форме с нотариальным удостоверением.

395. Выберите правильный вариант ответа

Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме

- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

396. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками остановки сердца являются

- отсутствие пульса на сонной артерии
- остановка дыхания
- широкие зрачки
- узкие зрачки

397. Выберите правильный вариант ответа

Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий является

- расширение зрачков
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- судороги
- увеличение цианоза

398. Выберите правильный вариант ответа

От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- тщательная запись выполненных манипуляций
- сниженный преискуртант

399. Выберите 2 правильных ответа

Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- медсестра
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента
- родственники врача
- родственники медсестры

Специальность «Стоматология»

Первая квалификационная категория

1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите правильный вариант ответа

Заболеваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
- интенсивность кариеса
- распространенность кариеса
- недостаток фтора в воде

2. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
- число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число здоровых зубов у одного человека

3. Выберите правильный вариант ответа

Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- депульпированным

4. Выберите правильный вариант ответа

Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
- число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных
- число пораженных кариесом зубов у одного человека

- число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

5. Выберите правильный вариант ответа

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная накожная проба
- наличие гиперемии и отека
- отсутствие продромальных явлений

6. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление вторичной профилактики стоматологических заболеваний на

- предупреждение возникновения заболеваний
- предупреждение осложнений заболевания
- восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- предупреждение воздействия факторов

7. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление третичной профилактики стоматологических заболеваний на

- предупреждение возникновения заболеваний
- предупреждение осложнений заболевания
- восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- предупреждение воздействия факторов

8. Выберите правильный вариант ответа

Лечение кариеса зубов относится к методам профилактики

- Первичной
 Вторичной
 Третичной
 Четвертичной

9. Выберите правильный вариант ответа

Устранение дефектов зубного ряда с помощью протезирования относится к методам профилактики

- Первичной
 Вторичной
 Третичной
 Четвертичной

10. Определите соответствие групповой принадлежности зубов и их условного обозначения

моляры	16, 26, 37
премоляры	44, 25, 45
резцы	12, 21, 42
клыки	13, 43, 33

11. Установите соответствие корневых каналов зубу

первый моляр верхней челюсти (16)	медиально-щёчный, дистально-щёчный, нёбный
первый моляр нижней челюсти (36)	медиально-щёчный, медиально-язычный, дистальный
первый премоляр верхней челюсти (24)	нёбный, вестибулярный

12. Установите соответствие

первый верхний правый моляр	16
второй верхний левый резец	22
первый нижний правый премоляр	44

13. Установите соответствие цветовой кодировки эндодонтического инструмента

015	белый
020	жёлтый
025	красный
040	чёрный

14. Установите соответствие постоянных зубов и обозначения по международной системе

третий верхний правый моляр	18
второй нижний левый премоляр	35
первый нижний правый резец	41
	31
	13

15. Установите соответствие постоянных зубов и обозначения по международной системе

второй левый нижний резец	32
первый нижний левый премоляр	34
второй верхний левый премоляр	25
	46
	42

16. Установите соответствие временных (молочных) зубов и их обозначения по международной системе

второй левый нижний резец	72
первый нижний левый моляр	74
второй верхний левый моляр	65

17. Установите соответствие временных (молочных) зубов и их обозначения по международной системе

правый верхний первый резец	51
первый нижний правый моляр	84
левый верхний клык	63

18. Установите соответствие метода обследования

перкуссия	постукивание
пальпация	ощупывание
аускультация	выслушивание
	прикладывание
	зондирование

19. Установите соответствие основного метода исследования при данном заболевании

острый периодонтит	перкуссия
средний кариес	зондирование
начальный кариес	витальное окрашивание
хронический периодонтит	рентгенологический

20. Установите соответствие

первая	смещение зуба в вестибулярно-оральном направлении
вторая	смещение зуба в вестибулярно-оральном и медио-дистальном направлении
третья	смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и вокруг оси зуба
четвёртая	смещение в вестибуло-оральном, медио-дистальном, вертикальном и вращение зуба по оси
	выпадение зуба из альвеолы

21. Установите соответствие

средний кариес	2-6 мкА
периодонтит	100-120 мкА
гангренозный пульпит	50-80 мкА
острый диффузный пульпит	30-50 мкА
	200-250 мкА

22. Установите соответствие

хронический средний кариес	отсутствие болей
периодонтит	боль при накусывании
поверхностный кариес	боль от сладкого
пульпит	самопроизвольная боль
	боль в интактных зубах

23. Установите соответствие

актиномикоз	лучистый грибок
туберкулёз	бактерия Коха
сифилис	бледная спирохета
	стафилококк
	стрептококк

24. Установите соответствие

Кариес в стадии пятна	деминерализация эмали
Поверхностный кариес	дефект твёрдых тканей в пределах эмали
Средний кариес	дефект твёрдых тканей в пределах части дентина
Глубокий кариес.	значительные изменения дентина
	поражение пульпы

25. Установите соответствие

пародонтолиз	идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта
кандидоз	заболевание, вызываемое грибом
лейкоплакия	хроническое заболевание слизистых оболочек
флюороз	заболевание, связанное с интоксикацией фтором
	венерическое заболевание

26. Установите соответствие

средний кариес	болезненность при зондировании стенок
клиновидный дефект	повышенная плотность эмали и дентина
хронический пульпит	интенсивная боль от температурных раздражителей
	болезненность при накусывании

27. Установите соответствие

индекс ПМА	гингивит
рентгенограмма	периодонтит
электроодонтодиагностика	пульпит
микробиологическое исследование	кандидоз

28. Установите соответствие

средние сроки прорезывания 2-х постоянных моляров	14-15 лет
средние сроки прорезывания 1-х постоянных моляров	5-6 лет
средние сроки прорезывания 3-х постоянных моляров	14-20 лет

29. Установите соответствие

глубокий кариес	боль при перкуссии отсутствует
обострение фиб-	реакция на перкуссию

роznego пульпита	отличается от здорового зуба
острый гнойный периодонтит	резкая, усиливающаяся боль при перкуссии

30. Установите соответствие

окклюзия	одновременное и одномоментное смыкание зубных рядов
артикуляция	всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
антагонист	противоположный зуб
бифуркация	место расхождения корней у двухкорневого зуба
трифуркация	место расхождения корней у трёхкорневого зуба

31. Установите соответствие

пальпация	подвижность тканей и органов, наличие уплотнений, состояние лимфатических узлов
перкуссия	состояние верхушечного периодаonta
зондирование	расположение устьев каналов

32. Определите соответствие степени ожога и клинической картины

1-я степень	покраснение и отёк кожи
2-я степень	образование пузырей с серозной жидкостью
3-я степень	поражены все слои кожи
4-я степень	поражена кожа и подлежащие ткани

33. Выберите правильный вариант ответа
Углевод, обладающий наибольшим кариесогенным потенциалом

- лактоза
 сахароза
 глюкоза
 крахмал

34. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки поражаемости зубов кариесом согласно номенклатуре ВОЗ используются показатели

- интенсивность, распространенность, прирост интенсивности кариеса
 индекс гигиены
 индекс РМА
 индекс ПИ

35. Выберите правильный вариант ответа

Причины развития гиперпластического гингивита

- нерациональное протезирование
 недостаточная гигиена
 патология прикуса

- гормональные изменения в организме

36. Выберите правильный вариант ответа

При язвенном гингивите наблюдается

- кровоточивость и боли в деснах при приеме пищи
- изъязвление десневого края с усеченностью вершин сосочков, боли в деснах, гнилостный запах изо рта
- разрастание десен, кровоточивость при дотрагивании
- кровоточивость десен при приеме пищи, глубина десневых карманов 6-7 мм

37. Выберите правильный вариант ответа
Характеристика кариеса в стадии меловидного пятна

- поражает эмаль на всю глубину
- не исчезает ни при каких обстоятельствах
- может исчезнуть в результате реминерализации
- всегда исчезает со временем

38. Выберите правильный вариант ответа
Наиболее часто очаги деминерализации эмали локализуются на коронке зуба в области

- бугров
- пришеечной
- режущего края
- экватора

39. Выберите правильный вариант ответа
При дифференциальной диагностике хронического гингивита и пародонтита легкой степени тяжести решающим является

- глубина пародонтальных карманов до 5 мм
- отсутствие круговой связки зуба, наличие пародонтальных карманов
- воспаление десневого края и десневых сосочков
- подвижность и смещение зубов

40. Выберите правильный вариант ответа
Состояние зубодесневого прикрепления при хроническом гингивите на нижней челюсти у детей

- зубодесневое прикрепление не нарушено, круговая связка зуба не повреждена
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной до 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,0 мм

41. Выберите правильный вариант ответа
Наличие пародонтального кармана характерно

- для гингивита
- для пародонтита
- для пародонтомы
- для пульпита

42. Выберите правильный вариант ответа
При флюорозе пациент жалуется на

- гиперчувствительность
- изменение цвета твердых тканей зубов
- стертость зубов

- подвижность зубов

43. Выберите правильный вариант ответа

При определении гигиенического состояния полости рта с помощью гигиенического индекса Федорова – Володкиной окрашиваются

- вестибулярные поверхности б нижних фронтальных зубов
- вестибулярные поверхности б верхних фронтальных зубов
- язычные поверхности первых постоянных моляров
- вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов

44. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее благоприятный прогноз имеет перелом корня зуба

- Поперечный
- продольный
- оскольчатый
- смешанный

45. Выберите правильный вариант ответа

Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует

- приём фторидсодержащих таблеток
- проведение профессиональной гигиены
- реминерализующая терапия
- массаж

46. Выберите правильный вариант ответа

К эпителизирующим средствам относят

- мазь Солкосерила
- р-р Люголя
- 3% р-р перекись водорода
- 0,05% р-р хлоргексидина

47. Выберите правильный вариант ответа

Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является

- содержание фтора в питьевой воде свыше мг/л
- нарушение общего обмена веществ
- неясная причина
- несовершенный остеогенез

48. Выберите правильный вариант ответа

Клиническим симптомом при клиновидном дефекте является

- дефект на вестибулярной поверхности зубов в виде овала
- изменение формы зуба
- дефект на вестибулярной поверхности шейки зуба в виде клина
- дефект режущего края и бугров в виде площадки

49. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее точным при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является

- термометрия
- рентгенография
- зондирование полости зуба

электроодонтодиагностика

50. Выберите правильный вариант ответа

К противовоспалительным средствам относятся

- гепариновая мазь
- мазь солкосерил
- бутадионовая мазь
- желе солкосерила

51. Выберите правильный вариант ответа

Пародонтит легкой степени дифференцируют с

- пародонтитом средней тяжести и катаральным гингивитом
- пародонтозом
- пульпитом
- гипертрофическим гингивитом

52. Выберите правильный вариант ответа

Индекс Федорова – Володкиной используют для определения гигиенического состояния полости рта

- детей дошкольного возраста
- подростков
- взрослых
- пациентов с брекет – системами

53. Выберите правильный вариант ответа

При подозрении на озлокачествление хронической язвы губы предпочтительнее провести

- полное иссечение с гистологическим исследованием
- криодеструкцию
- биопсию с гистологическим исследованием
- симптоматическую терапию

54. Выберите правильный вариант ответа

Метод витальной ампутации нельзя применять в однокорневых зубах

- в связи с отсутствием анатомически выраженной границы между коронковой и корневой пульпой
- воспаление в этих случаях быстро переходит на корневую пульпу
- так как изменяется цвет зубов
- благодаря малому объему полости

55. Выберите правильный вариант ответа

Для лечения молочницы применяют

- мазь "Солкосерил"
- витамин А
- мазь декаминовая 0,5%, раствор буры в глицерине 20%
- оксолиновая мазь 2%, интерфероновая мазь 10%

56. Выберите правильный вариант ответа

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

- сразу после прорезывания первого временного зуба
- 2 лет
- 3 лет

5-6 лет

57. Выберите правильный вариант ответа

Клинический признак, характерный для кандидоза

- слизистая оболочка ярко гиперемирована
- обильный белый налет на слизистой оболочке
- язык бледно-розового цвета
- усиление боли от раздражающей пищи

58. Выберите правильный вариант ответа

К локальному пародонтиту приводит

- гиповитаминоз
- гипервитаминоз
- приём противосудорожных препаратов
- отсутствие контактного пункта между соседними зубами

59. Выберите правильный вариант ответа

Для высушивания корневого канала целесообразнее использовать

- эфир
- бумажные штифты
- ручной пюстер
- спирт

60. Выберите правильный вариант ответа

Виды инфильтрационной анестезии

- интралигаментарная
- туберальная
- мандибулярная
- резцовая

61. Выберите правильный вариант ответа

К общим осложнениям местной анестезии относится

- аллергические реакции
- вирусный гепатит
- анафилактический шок
- парез лицевого нерва

62. Выберите правильный вариант ответа

Очаг разряжения с четким контуром округлой или овальной формы, размером около 0,5 см. в диаметре определяется на рентгенограмме при

- хроническом гранулематозном периодонтите
- хроническом фиброзном периодонтите
- хроническом гранулирующем периодонтите
- хроническом фиброзном пульпите

63. Выберите правильный вариант ответа

На контрольной рентгенограмме при лечении пульпита канал должен быть

- равномерно заполнен пломбировочным материалом с выведением его за верхушку
- равномерно заполнен пломбировочным материалом на 2 трети
- равномерно заполнен пломбировочным материалом до верхушки

равномерно заполнен пломбировочным материалом, не доходя 1-1,5 мм до верхушки корня

64. Выберите правильный вариант ответа
Под термином "опаковость" в реставрационной стоматологии понимают

темный оттенок материала

непрозрачность

насыщенность цвета

прозрачность

65. Выберите правильный вариант ответа
Процесс кондиционирования дентина

нанесение адгезива на поверхность дентина

нанесение протравливающей кислоты на поверхность дентина

нанесение праймера на поверхность дентина

нанесение на поверхность дентина фторлака

66. Выберите правильный вариант ответа
Раскрытие полости зуба при эндодонтическом лечении проводится с целью

удаления коронковой пульпы

создания доступа к корневым каналам

улучшения фиксации пломбы

улучшения эстетики

67. Выберите правильный вариант ответа
Для успешного лечения периодонтита каналы должны быть

изогнутыми

хорошо проходимыми на всю длину

облитерированными

склерозированными

68. Выберите правильный вариант ответа
При лечении пульпита канал пломбируют

до анатомического апикального отверстия

до физиологического апикального отверстия

за апикальное отверстие

через апикальное отверстие

69. Выберите правильный вариант ответа
Эндодонтический инструмент для прохождения корневых каналов

пульпоэкстрактор

К-файл

спредер

Н-файл

70. Выберите правильный вариант ответа
Рентгенологический признак характерный для хронического гранулирующего периодонтита постоянного зуба

очаг разряжения кости в области верхушки корня с четкими границами

равномерное расширение периодонтальной щели

очаг разряжения костной ткани в области верхушки корня с нечеткими границами

изменений на рентгенограмме нет

71. Выберите правильный вариант ответа
Заболевание, вызываемое вирусом обычного герпеса

острый герпетический стоматит

опоясывающий герпес

герпетическая ангина

ветряная оспа

72. Выберите правильный вариант ответа
При кариесе пациенты жалуются на боль

самопроизвольную

сохраняющуюся после устранения раздражителя

только при наличии раздражителя

самопроизвольную, с иррадиацией

73. Выберите правильный вариант ответа
Причина острой травмы периодонта

грубая эндодонтическая обработка каналов

завышенная пломба

выведение пломбы из прикуса

хронический пародонтит

74. Выберите правильный вариант ответа
Для выявления зубного налета используется метод

окрашивания

перкуссии

пальпации

электроодонтодиагностики

75. Выберите правильный вариант ответа
Основные возбудители хронического язвенно-некротического гингивита Венсана

стрепто- и стафилококки

фузобактерии и спирохеты

лактобактерии

вирусы

76. Выберите правильный вариант ответа
Клиническая картина при хроническом гингивите у детей

отмечается кровоточивость десен

гипертрофия сосочков

зубы подвижны

изъязвление десневого края

77. Выберите правильный вариант ответа
Детский возраст, характерный для возникновения острого герпетического стоматита

1-й год жизни

от 6 месяцев до 3 лет

5-6 лет

старше 9 лет

78. Выберите правильный вариант ответа
Течение заболевания острое, полиморфизм высыпаний в полости рта, сезонность поражения, кожные проявления - кокардная сыпь характерны для

острого герпетического стоматита

многоформной экссудативной эритемы

пузырчатки

сифилиса

79. Выберите правильный вариант ответа

Возможные последствия при пломбировании без изолирующей прокладки композитами

- плохая адгезия
- выпадение пломбы
- воспаление и некроз пульпы
- вторичный кариес

80. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные приспособления к основному эндодонтическому инструментарию

- эндо-блок, эндодонтическая линейка
- флексобенд
- клинстенд
- матрицы, клинышки

81. Выберите правильный вариант ответа

Наличие рецессии десны не характерно

- для пародонтита
- для стоматита
- для пародонтоза
- для гингивита

82. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариозных полостей по Блеку создана на принципе

- систематизации обработки кариозных полостей
- симметричности кариозного процесса
- локализации кариозного процесса в конкретном зубе
- обеспечения условий фиксации пломбы

83. Выберите правильный вариант ответа

Метод удаления предварительно некротизированной пульпы из корневых каналов называется

- девитальная экстирпация
- витальная экстирпация
- биологический
- девитальная ампутация

84. Выберите правильный вариант ответа

Электроодонтометрия применяется

- для определения возбудимости нервных окончаний пульпы зуба
- для определения состояния нервных окончаний пародонта
- для определения состояния нервных окончаний периодонта
- для определения состояния нервных окончаний кожи

85. Выберите правильный вариант ответа

При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять

- стеклоиономерные цементы
- силикатные цементы
- амальгаму
- композитные материалы химического отверждения

86. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хронических пульпитах постоянных зубов

- 2-6 мкА
- 20-60 мкА
- свыше 150 мкА
- свыше 250 мкА

87. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хроническом периодонтите в постоянных зубах

- 1-6 мкА
- 20-60 мкА
- 60-80 мкА
- 100-200 мкА

88. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления острого токсического периодонтита

- острая боль при накусывании на зуб
- отёк мягких тканей лица
- свищ на десне с гнойным отделяемым
- свищ на десне с серозным отделяемым

89. Выберите правильный вариант ответа

В возникновении кариеса важную роль играет свойство микроорганизмов

- образование органических кислот
- устойчивость к антибиотикам
- способность вызывать дисбактериоз
- приспособление к изменяющимся условиям внешней среды

90. Выберите правильный вариант ответа

Для хронического фиброзного пульпита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- зондирование вскрытого рога пульпы безболезненно
- зондирование вскрытого рога пульпы болезненно
- гиперемия десневого сосочка

91. Выберите правильный вариант ответа

Основной дифференциально-диагностический признак пародонтита

- гноетечение из пародонтальных карманов
- повреждение круговой связки зуба с образованием пародонтального кармана
- кровоточивость и гноетечение при надавливании на десневой сосочек
- увеличение десневых сосочков, гиперемия, синюшность, кровоточивость

92. Выберите правильный вариант ответа

Кариес в стадии меловидного пятна - это

- поражение эмали и дентина
- деминерализация поверхности эмали
- деминерализация до эмалево-дентинной границы
- поражение дентина

93. Выберите правильный вариант ответа

Точным, при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является

- зондирование полости зуба
- термометрия
- рентгенография

тонометрия

94. Выберите правильный вариант ответа

К эпителизирующим средствам относятся

гвоздичное масло

р-р Люголя

мазь солкосерила, масляный раствор витамина А

р-р хлоргексидина

95. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективный анестетик

новокаин

тримекаин

лидокаин

артикаин

96. Выберите правильный вариант ответа

Для безболезненного эндодонтического вмешательства на молярах нижней челюсти целесообразно провести обезболивание

аппликационное

общее

проводниковое

инфильтрационное

97. Выберите правильный вариант ответа

Распад пульпы из канала удаляется

мелко, по частям

одномоментно

в 2 посещения

в 3 посещения

98. Выберите правильный вариант ответа

На рентгенограмме определяется равномерное расширение периодонтальной щели с четким ее контуром при

хроническом гранулематозном периодонтите

хроническом гранулирующем периодонтите

хроническом фиброзном пульпите

хроническом фиброзном периодонтите

99. Выберите правильный вариант ответа

Метод витальной экстирпации пульпы заключается

в удалении пульпы без анестезии

в удалении только коронковой пульпы без анестезии

в удалении пульпы после девитализации

в удалении живой пульпы под анестезией

100. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых каналов можно использовать

дистиллированную воду

гипохлорит натрия

физиологический раствор

эфир

101. Выберите правильный вариант ответа

Местные анестетики, обладающие наибольшей длительностью действия, но не используемые у детей

бупивакаин

мепивакаин

лидокаин

артикаин

102. Выберите правильный вариант ответа

Поверхность реставрируемого зуба при выборе цвета композита должна быть

естественно увлажненной

сухой

не имеет значения

закрытой

103. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых каналов эффективнее использовать поочередное сочетание

дистиллированную воду и перекись водорода

гипохлорит натрия и перекись водорода

физиологический раствор и эфир

эфир и гипохлорит натрия

104. Выберите правильный вариант ответа

Окрашивание очага деминерализации эмали раствором метиленового синего происходит вследствие

повышения проницаемости эмали в зоне поражения

снижения pH зубного налета

разрушения поверхностного слоя эмали

колонизации бактерий на поверхности зуба

105. Выберите правильный вариант ответа

При отсутствии реакции на ток до 100 мкА

можно предположить заболевание

гангренозный пульпит

глубокий кариес

хронический периодонтит

интактный зуб

106. Выберите правильный вариант ответа

Канал при лечении пульпита пломбируют

до физиологического апикального отверстия

до анатомического апикального отверстия

за апикальное отверстие

через апикальное отверстие

107. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров

1 класс

2 класс

3 класс

5 класс

108. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках

1 класс

2 класс

3 класс

5 класс

109. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий диагностический признак хронического периодонтита временного зуба

- отек переходной складки
- изменение цвета
- подвижность зуба
- рентгенологические изменения

110. Выберите правильный вариант ответа

Температурная проба применяется для диагностики

- периодонтита
- пульпита
- пародонтита
- гингивита

111. Выберите правильный вариант ответа

Хронический пульпит

- фиброзный
- очаговый
- диффузный
- гранулематозный

112. Выберите правильный вариант ответа

Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают своё формирование

- к 10 годам
- к 12 годам
- к 13 годам
- к 15 годам

113. Выберите правильный вариант ответа

Символом спирали по системе ISO (International Standard Organization) обозначается

- Н-файл
- каналонаполнитель Лентулло
- ример
- К-файл

114. Выберите правильный вариант ответа

Причиной диастемы постоянного прикуса является

- скученность зубов
- укороченная уздечка верхней губы
- макродентия
- мелкое преддверие полости рта

115. Выберите правильный вариант ответа

Цветовое кодирование Н-файла, имеющего диаметр 035, 070, 130

- желтый
- синий
- черный
- зелёный

116. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность поражений кариесом определяется индексом

- CPITN
- КПУ
- ГИ
- ПМА

117. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы обследования

- расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика
- расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование
- термодиагностика, рентгенодиагностика

118. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные методы обследования

- осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика
- термодиагностика, электродиагностика, лабораторные
- расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика
- цитология

119. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпита и периодонтита

120. Выберите правильный вариант ответа

При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

- считаются при подсчете КПУ зубов
- не учитываются совсем
- на усмотрение врача
- не имеет значения

121. Выберите правильный вариант ответа

В понятие «пародонт» входит

- десна, круговая связка, периодонт
- десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент
- костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- ткани зуба, периодонт

122. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

123. Выберите правильный вариант ответа

Если зуб подвижен в вестибулярно-оральном направлении, то это

- 1 степень
- 2 степень
- 3 степень
- 4 степень

124. Выберите правильный вариант ответа

Резорбция костной ткани межзубной перегородки - это

- разрушение
- наложение

истончение

утолщение

125. Выберите правильный вариант ответа

Инструмент для исследования пародонтального кармана

пуговчатый градуированный зонд

штыковидный зонд

гладилка

угловой зонд

126. Выберите правильный вариант ответа

Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к

пальпации

перкуссии

зондированию

оценке состояния прикуса

127. Выберите правильный вариант ответа

Пальпация - это

постукивание

выслушивание

ощупывание

осмотр

128. Выберите правильный вариант ответа

С помощью пальпации можно определить

наличие зубного камня

кариес

подвижность тканей и органов

качество рентгеновского снимка

129. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности II степени

зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении

зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях

зуб смещается в боковом направлении

зуб подвижен вокруг своей оси

130. Выберите правильный вариант ответа

Ткань образующая основную массу зуба

эмаль

дентин

цемент

пульпа

131. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариеса по течению

начальный, поверхностный, средний, глубокий

фиссурный, пришеечный, апроксимальный

острый, хронический, острейший, приостановившийся

начальный, острый, хронический

132. Выберите правильный вариант ответа

Явление сухости во рту - это

сиалорея

ксеростомия

гипосаливация

гиперсаливация

133. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости выявляются с помощью

пинцета

гладилки

зонда

экскаватора

134. Выберите правильный вариант ответа

Характерные изменения в десне при гингивите

воспаление

дистрофия

атрофия

лизис

135. Выберите правильный вариант ответа

Эрозия, как элемент поражения слизистой оболочки полости рта представляет собой

бесполостное образование

поверхностный дефект эпителия

полостное образование с экссудатом

изменение цвета

136. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

средний кариес

кариес в стадии пятна

«тетрациклиновые» зубы

гипоплазия эмали

137. Выберите правильный вариант ответа

Определяя индекс РМА, окрашивают

все зубы с вестибулярной поверхности

окрашивается только десна

фронтальные зубы со всех сторон

жевательные зубы

138. Выберите правильный вариант ответа

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

твердых тканях зуба

пульпе

периодонте

эмали

139. Выберите правильный вариант ответа

Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения

жалоб

причины потери зубов

наличия системных заболеваний

наличия профессиональных вредностей

140. Выберите правильный вариант ответа

К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относится

гипоплазия

флюороз

клиновидный дефект

несовершенный амелогенез

141. Выберите правильный вариант ответа

К субъективным методам обследования относится

инструментальный

опрос больного

- лабораторный
 - функциональный
- 142. Выберите правильный вариант ответа**
Классификация кариеса по глубине поражения
- фиссурный, апроксимальный, пришеечный
 - острый, хронический, приостановившийся, острейший
 - начальный, поверхностный, средний, глубокий
 - апроксимальный, поверхностный, острый
- 143. Выберите правильный вариант ответа**
Сущность пародонтита в
- резорбции альвеолярной кости
 - дистрофии тканей пародонта
 - хроническом воспалении тканей пародонта
 - разрастании одной из пародонтальных тканей
- 144. Выберите правильный вариант ответа**
К первичным элементам поражения не относится
- пятно
 - бугорок
 - афта
 - папула
- 145. Выберите правильный вариант ответа**
Причиной эндемического флюороза является
- недостаток кальция в организме ребенка
 - инфекционное заболевание ребенка
 - повышенное содержание фтора в питьевой воде
 - недостаток фтора в организме матери
- 146. Выберите правильный вариант ответа**
Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это
- прикус
 - показатели кариеса
 - заболеваемость
 - анатомическая форма пломбы
- 147. Выберите правильный вариант ответа**
Кариес в стадии пятна диагностируют
- 5% раствором йода
 - раствором Шиллера-Писарева
 - 2% раствором метиленового синего
 - 5% раствором бриллиантового зеленого
- 148. Выберите правильный вариант ответа**
При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо
- устранить раздражитель
 - провести антисептическую обработку
 - обработать слизистую кератопластиком
 - провести санацию полости рта
- 149. Выберите правильный вариант ответа**
Причина возникновения лейкоплакии
- вирусы
 - курение, алкоголь, раздражающая пища
 - лучевые поражения
 - бактерии

- 150. Выберите правильный вариант ответа**
Промежутки между зубами
- протрузия
 - тремы
 - тортоаномалии
 - дистопии
- 151. Выберите правильный вариант ответа**
Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают
- скученность зубов
 - наличие физиологических трем и диастем
 - оральное смещение зубов
 - вестибулярное смещение зубов
- 152. Выберите правильный вариант ответа**
Количество зубов в молочном прикусе
- 20
 - 24
 - 28
 - 32
- 153. Выберите правильный вариант ответа**
Апикальное отверстие находится
- на небной поверхности вторых резцов
 - на верхушке корня зуба
 - на вестибулярной поверхности первых моляров
 - на уровне рога пульпы
- 154. Выберите правильный вариант ответа**
Кариес в стадии пятна дифференцируют
- с клиновидным дефектом
 - с флюорозом
 - со средним кариесом
 - с эрозией эмали
- 155. Выберите правильный вариант ответа**
Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов
- рентгенологический
 - зондирование
 - пальпация
 - цитология
- 156. Выберите правильный вариант ответа**
Экскаватором
- вносят в полость лекарственные вещества
 - формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин
 - уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы
 - удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы
- 157. Выберите правильный вариант ответа**
Вторичный морфологический элемент поражения слизистой оболочки полости рта
- волдырь
 - абсцесс
 - гнойничок
 - чешуйка
- 158. Выберите правильный вариант ответа**
Симптомами гингивита являются
- кровоточивость и отёчность десен

- жжение языка и ксеростомия
- патологическая стираемость и подвижность зубов
- изменения прикуса и рецессия десны

159. Выберите правильный вариант ответа

Особенностью стоматологического пинцета является

- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек

160. Выберите правильный вариант ответа

Наличие сообщения кариозной полости с полостью зуба определяют с помощью

- пинцета
- экскаватора
- зонда
- бора

161. Выберите правильный вариант ответа

Инструментами для конденсации гуттаперчи являются

- файлы и римеры
- каналонаполнитель и дрельбор
- корневые буравы и файлы
- спредеры и плагеры

162. Выберите правильный вариант ответа

Характерные симптомы острых форм пульпита

- боль локальная, тупая
- боль острая, самопроизвольная
- перкуссия резко болезненна
- боль проходит сразу после удаления раздражителя

163. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез заболевания (morbi) включает в себя

- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
- вредные привычки пациента
- применение лекарственных препаратов, соматические заболевания

164. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез жизни (anamnesis vitae) пациента включает

- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
- жалобы и время возникновения заболевания
- характер боли, факторы, её провоцирующие

165. Выберите 2 правильных ответа

Рентгеноконтрастными являются

- пульпа
- мышцы
- десна
- эмаль

- металл

166. Выберите 2 правильных ответа

Нерентгеноконтрастными являются

- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- золото
- металл

167. Выберите правильный вариант ответа

Диастема относится к аномалии

- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии

168. Выберите правильный вариант ответа

Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии

- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов
- прикуса

169. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор
- молибден
- калий
- цинк

170. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

171. Выберите правильный вариант ответа

При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень
- постоянные зубы и кости скелета
- постоянные зубы и ногти
- молочные, постоянные зубы и почки

172. Выберите правильный вариант ответа

Флюороз равняется при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л
- 0,8 мг/л
- 1 мг/л
- 2 мг/л

173. Выберите правильный вариант ответа

Пациенты при флюорозе жалуются на

- изменение цвета зубов
- повышенную чувствительность
- стертость зубов
- подвижность зубов

174. Выберите правильный вариант ответа

Назовите местный кариесогенный фактор

- диета
- функциональное состояние зубов

экстремальные воздействия

зубной налет

175. Выберите правильный вариант ответа

Край искусственной коронки при правильном положении

доходит до уровня десневого края

не доходит до уровня десневого края

погружается в десневой карман на 0,5 мм

погружается в десневой карман на 1 – 1,5 мм

176. Выберите правильный вариант ответа

Бруксизм это

крепитация при пальпации

ограничение открывания рта

скрежет зубами

боль при жевании

177. Выберите правильный вариант ответа

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

гиперсаливация

частичная адентия

массивные зубные отложения

хроническая травма слизистой оболочки

178. Выберите правильный вариант ответа

Диастема - это расстояние между

центральными резцами более 1 мм

центральными и боковыми резцами более 1 мм

премолярами более 1 мм

премолярами и молярами больше 1 мм

179. Выберите правильный вариант ответа

Ложный пародонтальный карман характерен для

пародонтита

пародонтоза

катарального гингивита

гипертрофического гингивита

180. Выберите правильный вариант ответа

Основным местным фактором риска возникновения гингивита является

наследственность

наличие микробного налета

вредные привычки

подвижность зубов

181. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, предшествующее пародонтиту

периодонтит

гингивит

стоматит

травма

182. Выберите правильный вариант ответа

Воспалительное заболевание пародонта

пародонтоз

пародонтит

пародонтома

пародонтолиз

183. Выберите правильный вариант ответа

Системные заболевания, обуславливающие заболевание пародонта

вирусные

грибковые

органов дыхания

сахарный диабет, заболевания крови

184. Выберите правильный вариант ответа
Формирование корня после прорезывания постоянного зуба завершается через

3-4 года

2 года

6 месяцев

1 год

185. Выберите правильный вариант ответа

Количество слюны, секретируемое в норме в сутки (в мл)

100

200

800

1500

186. Выберите правильный вариант ответа

Характерные боли для острых форм пульпита

постоянные, нарастающие от холодного

приступообразные, самопроизвольные, усиливаются от раздражителей и ночью

кратковременные от раздражителей, быстро проходящие

пульсирующие постоянного характера

187. Выберите правильный вариант ответа

Лечение острого остеомиелита предусматривает

антибиотики и мажевые повязки

создание оттока экссудата из периодонта

общее лечение организма и антибиотики

удаление «причинных» зубов и общее лечение

188. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее целесообразные действия врача при медикаментозном стоматите

назначение внутрь антигистаминных препаратов

отмена лекарств

назначение антисептика в виде аппликаций или полосканий

назначение стероидных гормонов

189. Выберите правильный вариант ответа

Диагноз «контактный стоматит» ставится на данных

анамнеза

клинических симптомов

лабораторных анализов

дополнительных методов исследования

190. Выберите правильный вариант ответа

Действие врача при стоматите, вызванном протезом

изъятие протеза сроком на 2-3 недели

покрытие поверхности протеза специальными инертными составами

назначение противовоспалительных медикаментозных средств

замена протеза

191. Выберите правильный вариант ответа

Изменение цвета слизистой оболочки на ограниченном участке

корка

налет

пятно

бугорок

192. Выберите правильный вариант ответа

Полостное образование, имеющее соединительнотканную капсулу и эпителиальную выстилку

киста

пузырь

волдырь

афта

193. Выберите правильный вариант ответа

Этиологию лейкоплакии связывают с

вирусной инфекцией

аутосенсibilизацией

врожденными и генетически обусловленными заболеваниями

травмой и местными раздражителями

194. Выберите правильный вариант ответа

При лейкоплакии поражается

только кожа

слизистые оболочки полости рта

кожа и слизистые оболочки

альвеолярный отросток

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

195. Выберите правильный вариант ответа

При среднем кариесе боли после устранения раздражителя

усиливаются

держатся 20 минут

исчезают

держатся 10 минут

196. Выберите правильный вариант ответа

Поверхностный кариес возникает на месте

белого пятна

неизменного участка

эрозии

гипоплазии

197. Выберите правильный вариант ответа

К 4-му классу по Блеку относятся кариозные полости

на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения целостности режущего края

в пришеечной области резцов и клыков

в слепых ямках резцов

на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края

198. Выберите правильный вариант ответа

Болезненная перкуссия характерна для пульпита

острого серозного

хронического фиброзного

хронического гипертрофического

острого гнойного

199. Выберите правильный вариант ответа

При остром пульпите провоцируют боль

прикосновение к зубу

температурные раздражители

накусывание на зуб

раздражители в области триггерных зон

200. Выберите правильный вариант ответа

Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает удаление пульпы

коронковой

корневой

коронковой и корневой

половины корневой

201. Выберите правильный вариант ответа

По распространенности процесса пародонтит бывает

генерализованный и локализованный

генерализованный

хронический и обострившийся

острый и хронический

202. Выберите правильный вариант ответа

Основные клинические признаки пародонтоза

кровоточивость десен, подвижность зубов, выделение гноя из десневых карманов

обнажение шеек зубов и повышенная их чувствительность, отсутствие воспаления десны, отсутствие подвижности зубов

подвижность зубов, болезненность и кровоточивость десен

отсутствие зубодесневых карманов, подвижность зубов, гиперемия десны

203. Выберите правильный вариант ответа

Особенностью рентгенологической картины костной ткани при легкой степени пародонтита является

резорбция компактных пластинок и резорбция межальвеолярных перегородок до трети длины корня

резорбция костной ткани альвеолярного отростка на половину длины корня

- изменений костной ткани альвеолярного отростка нет
- резорбция компактных пластинок
- 204. Выберите правильный вариант ответа**
Кюретаж зубодесневых карманов проводят при
- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтозе средней степени тяжести
- гипертрофическом гингивите
- 205. Выберите правильный вариант ответа**
Декубитальная язва образуется при
- механическом повреждении тканей
- нарушении трофики тканей
- туберкулезном поражении
- лучевом поражении
- 206. Выберите правильный вариант ответа**
Электровозбудимость пульпы при среднем кариесе (в мкА)
- 2-6
- 10-12
- 20-30
- 80-100
- 207. Выберите правильный вариант ответа**
Дистопия - это
- зуб неправильно расположен в зубном ряду
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет
- 208. Выберите правильный вариант ответа**
Основную часть слюны у человека выделяют слюнные железы
- околоушные
- подчелюстные
- подъязычные
- малые слюнные железы
- 209. Выберите правильный вариант ответа**
Обследование пациента в стоматологическом кабинете начинается с
- перкуссии
- пальпации
- опроса
- осмотра
- 210. Выберите правильный вариант ответа**
Дополнительным методом обследования является
- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография
- 211. Выберите правильный вариант ответа**
Первая жалоба при остром перикороните
- боли при открывании рта
- боли при глотании
- боли в области зуба мудрости
- плохое самочувствие
- 212. Выберите правильный вариант ответа**
При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов
- фтора
- карбонатов
- кальция
- натрия
- 213. Выберите правильный вариант ответа**
Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей
- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания
- 214. Выберите правильный вариант ответа**
Аппликационное обезболивание – это
- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу
- 215. Выберите 2 правильных ответа**
Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена
- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса
- на восстановление дефектов зубного ряда
- на восстановление утраченной функции
- 216. Выберите правильный вариант ответа**
Фторлак применяется для
- профилактики кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита
- лечения заболеваний пародонта
- 217. Выберите правильный вариант ответа**
Противопоказание к герметизации фиссур
- фиссурный кариес
- гипосаливация
- глубокие фиссуры
- неоконченная минерализация зуба
- 218. Выберите правильный вариант ответа**
Проведение реминерализующей терапии подразумевает
- эндогенная безлекарственная профилактика
- экзогенная безлекарственная профилактика
- эндогенная лекарственная профилактика
- экзогенная лекарственная профилактика
- 219. Выберите правильный вариант ответа**

Реминерализующую терапию с целью профилактики следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

220. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

221. Выберите правильный вариант ответа

Поверхности клиновидного дефекта

- шероховатые, светлые
- мягкие, темные
- гладкие, твердые
- мягкие, блестящие

222. Выберите правильный вариант ответа

Характерное течение при остром гнойном одонтогенном периостите челюсти

- медленное вялое
- бурное развитие и быстрое разрешение процесса
- бурное развитие, но медленное разрешение процесса
- медленное развитие и быстрое разрешение воспалительного процесса

223. Выберите правильный вариант ответа

Для контактного аллергического стоматита характерно

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная кожная проба
- наличие гиперемии и отека
- наличие эрозий или пузырей

224. Выберите правильный вариант ответа

Ретракционная нить применяется для

- отодвигания десны с целью обеспечения сухости рабочего поля
- очистки межзубных промежутков
- временноошинирования челюстей
- наложения внутриротовых швов

225. Выберите правильный вариант ответа

К съемным протезам, кроме пластиночных, относятся

- мостовидные протезы
- бюгельные протезы
- штифтовые зубы
- вкладки

226. Выберите правильный вариант ответа

Зубное протезирование относится к виду стоматологической помощи

- ортопедический
- терапевтический
- хирургической
- ортодонтической

227. Выберите правильный вариант ответа

Пластмассовые коронки по сравнению с металлическими более

- эстетичные
- прочные
- гигиеничные
- долговечные

228. Выберите правильный вариант ответа

Количество классов в классификации полостей по Блэку

- три
- четыре
- пять
- семь

229. Выберите правильный вариант ответа

Искусственная коронка – это

- несъемный протез
- гипсовый оттиск
- съемный протез
- частично съемный протез

230. Выберите правильный вариант ответа

Адентия зубов относится к аномалиям

- количества зубов
- сроков прорезывания зубов
- структуры зубов
- положения зубов

231. Выберите правильный вариант ответа

Один из важных клинических признаков перелома нижней челюсти

- нарушение прикуса при сомкнутых челюстях
- невозможность закрыть рот
- глубокое перекрытие нижних зубов верхними
- дистальный сдвиг нижней челюсти

232. Выберите правильный вариант ответа

Фиксация эластических слепочных материалов к ложке осуществляется путем

- использование перфорированных ложек
- обклеивание краев ложки воском
- смазывания ложки мономером
- нанесение на ложку адгезива

233. Выберите правильный вариант ответа

Использованные при анестезии карпулы относят к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

234. Выберите правильный вариант ответа

Использованные одноразовые перчатки перед утилизацией

- моют
- дезинфицируют
- разрезают
- автоклавируют

235. Выберите правильный вариант ответа

Радиоактивные медицинские отходы – это класс

- «Б»
- «В»
- «Г»
- «Д»

236. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов
- 24 часа
- 72 часа
- 1 неделя
- 2 недели

237. Выберите правильный вариант ответа

Эмпатия это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров
- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

238. Выберите правильный вариант ответа

Интерес к партнеру по общению на невербальном уровне можно выразить

- интенсивно жестикулируя
- пронзительным голосом
- наклонив голову в сторону
- пристальным взглядом

239. Выберите правильный вариант ответа

Информацию о внутренних переживаниях, эмоциональном состоянии человека представляют

- в равной степени вербальные и невербальные средства коммуникации
- в большей степени вербальные средства
- в большей степени невербальные средства
- интуиция

240. Выберите правильный вариант ответа

Использованные иглы для карпульного инъектора относятся к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

241. Выберите правильный вариант ответа

Инфильтрационная анестезия не эффективна в области

- 17 - 16 зубов
- 13 - 23 зубов
- 43 - 33 зубов
- 36 - 38 зубов

242. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании

- обязательном медицинском
- добровольном медицинском

- возвратном
- социальном

243. Выберите правильный вариант ответа

Поликлиника оказывает населению помощь

- социальной
- первичную лечебно-профилактическую
- санитарно-противоэпидемическую
- стационарную

244. Выберите правильный вариант ответа

Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

245. Выберите правильный вариант ответа

Основные законодательные документы по охране здоровья граждан в РФ

- Конституция РФ, Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ
- Этический кодекс медицинской сестры России
- СанПиНы
- Всеобщая декларация прав человека

246. Выберите правильный вариант ответа

Пациент самостоятельно принимает решение о согласии на медицинское вмешательство при достижении им возраста

- 15 лет
- 14 лет
- без ограничения
- 12 лет

247. Выберите правильный вариант ответа

Показатели артериального давления в норме менее

- 120/80
- 130/80
- 139/85
- 140/90

248. Выберите правильный вариант ответа

Для моделирования контактной поверхности зуба при пломбировании используют

- матрицу
- плаггер
- штопфер
- штрипсы

249. Выберите правильный вариант ответа

Галогеновые лампы используют для

- полимеризации композита
- реминерализации эмали
- полимеризации амальгамы
- полимеризации фосфат-цемента

250. Выберите правильный вариант ответа

Для адгезии композитного материала при реставрации используется

- бондигловая система
- фосфорная кислота

антисептические препараты

препараты фторида натрия

251. Выберите правильный вариант ответа

Усадка светоотверждаемого композита

происходит в сторону

источника света

полости зуба

от источника света

независящую от источника света

252. Выберите 2 правильных ответа

Для расширения корневого канала по диаметру

применяют

К-ример

К-файл

Н-файл

спредер

плагер

пульпоэкстрактор

253. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании корневых каналов методом

латеральной конденсации гуттаперчи

применяют

Н-файл

спредер

плагер

пульпоэкстрактор

254. Выберите правильный вариант ответа

Символом К-римера является:

треугольник

квадрат

круг

ромб

255. Выберите правильный вариант ответа

Символом Н-файла является

треугольник

квадрат

круг

ромб

256. Выберите правильный вариант ответа

Консервативное лечение периодонтита может

быть успешным в случае

полноценного пломбирования канала

не полностью запломбированного канала

лечения причинного зуба в одно посещение

длительного наблюдения за состоянием

периодонта

257. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствие контактного пункта между зубами

ведёт к развитию

локализованному пародонтиту

генерализованному пародонтозу

генерализованному пародонтиту

декубитальной язве

258. Выберите правильный вариант ответа

Пародонтальные карманы при пародонтозе

отсутствуют

менее 3 - 5 мм

более 5 мм

более 7 мм

259. Выберите правильный вариант ответа

При артериальном кровотечении жгут накладывают

ниже раны

на рану

выше раны

ниже и выше раны

260. Выберите правильный вариант ответа

Инструмент «Штопфер-гладилка» используют

для

пломбирования полости

замешивания пломбировочных материалов

осмотра полости рта

удаления пломбы из полости

261. Выберите правильный вариант ответа

Количество зубов в постоянном прикусе

18-20

26-27

28-32

20-30

262. Выберите правильный вариант ответа

Ятрогенными называются заболевания, вызванные

неосторожным действием врача

снижением иммунной защиты

стрессом

неспецифическими микробными агентами

263. Выберите правильный вариант ответа

Число сердечных сокращений в одну минуту

у взрослого в норме

60 - 80

49 - 60

90 - 100

100 - 120

264. Выберите правильный вариант ответа

Артериальное давление зависит

как от систолического объема сердца, так

и от тонуса артериальной стенки сосуда

только от силы сокращения сердца

только от тонуса артериальной стенки

только от частоты сокращений сердца

265. Выберите правильный вариант ответа

Универсальная проба для проверки медицинского

инструментария на наличие скрытой

крови называется

азопирамовой

бензидиновой

фенолфталеиновой

бензойной

266. Выберите правильный вариант ответа

Уровень обработки рук медицинской сестры

перед выполнением инъекции

гигиенический

социальный

хирургический

стерильный

267. Выберите правильный вариант ответа

Длительность использования накрытого стерильного стола в часах

- 6
- 24
- 18
- 12

268. Выберите правильный вариант ответа

Асептика

- предупреждение попадания инфекции в рану или организм пациента
- специальный уход за пациентом
- уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
- дезинфекция инструментов

269. Выберите правильный вариант ответа

Генеральная уборка процедурного кабинета проводится

- 1 раз в неделю
- через день
- 1 раз в месяц
- по мере загрязнения

270. Выберите правильный вариант ответа

Медицинские инструменты в крафт-пакете сохраняют стерильность в течение

- 3 суток
- 1 суток
- 10 суток
- 7 суток

271. Выберите правильный вариант ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- переливание инфицированной крови
- рукопожатие
- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых

272. Выберите правильный вариант ответа

В "упаковочном" отделении ЦСО проводят

- укладку материала в биксы для стерилизации
- закладывание биксов в автоклав
- контроль качества предстерилизационной очистки
- предстерилизационную очистку

273. Выберите правильный вариант ответа

Предстерилизационную очистку медицинского инструментария проводят в

- "моечном" отделении ЦСО
- "упаковочном" отделении ЦСО
- "автоклавном" отделении ЦСО
- "приемном" отделении ЦСО

274. Выберите правильный вариант ответа

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется

- стерилизацией
- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией

275. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения закрытого стерильного бикса без фильтра

- 3 суток
- 1 сутки
- 6 часов
- 20 суток

276. Выберите правильный вариант ответа

Антисептика - это комплекс мероприятий

- по борьбе с инфекцией в ране
- по профилактике попадания инфекции в рану
- по профилактике попадания инфекции на руки
- по дезинфекции инструментов

277. Выберите правильный вариант ответа

Инъекционное поле обрабатывают

- 70 процентным спиртом
- 40 процентным спиртом
- 90 процентным спиртом
- 96 процентным спиртом

278. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация воздушным методом изделий из стекла и металла

- t-180 град. С, время-60 мин
- t-180 град. С, время- 120 мин
- t-160 град, С время- 60 мин
- t-160 град, С время - 120 мин

279. Выберите правильный вариант ответа

Подсушивание инструментов в ЦСО перед стерилизацией проводится

- в сухожаровом шкафу или на простынях на воздухе
- в автоклаве
- в среде нагретых шариков
- методом вытирания

280. Выберите правильный вариант ответа

В ЦСО азопирамовая проба с целью самоконтроля проводится

- ежедневно в каждой партии инструментария
- один раз в неделю в каждой партии инструментария
- два раза в неделю в каждой партии инструмента
- один раз в месяц в каждой партии инструментария

281. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильности невогребованного инструмента при хранении его в УФ - бактерицидных камерах составляет

- 7 суток
- 5 суток
- 3 суток
- 1 сутки

282. Выберите правильный вариант ответа

Стоматологические инструменты после стерилизации химическим способом ополаскивают

- стерильной дистиллированной водой
- кипяченой водой
- стерильной водой
- проточной водой

283. Выберите правильный вариант ответа

Положительная азопирамовая проба дает окрасивание

- фиолетовое
- оранжевое
- ярко-зелёное
- жёлтое

3. Умение квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации.

284. Выберите правильный вариант ответа

Некариозные поражения (клиновидный дефект, эрозия) чаще встречаются

- при пародонтозе
- при пародонтите
- при гингивите
- при стоматите

285. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологическая картина хронического гранулематозного периодонтита

- очаг деструкции в области верхушки корня с нечеткими контурами
- очаг деструкции с четкими контурами
- равномерное расширение периодонтальной щели
- деструкция альвеолярных перегородок

286. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологическая картина хронического гранулирующего периодонтита

- очаг деструкции в области верхушки корня с нечеткими контурами
- наличие очагов остеосклероза
- равномерное расширение периодонтальной щели
- наличие очагов остепороза

287. Выберите правильный вариант ответа

Воспаление десны называется

- гингивит
- эпюлис
- периодонтит
- кандидоз

288. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит
- гингивит
- стоматит
- травма

289. Выберите правильный вариант ответа

Образование зубной бляшки от употребления пищи, богатой углеводами

- ускоряется
- замедляется
- остается неизменным
- прекращается

290. Выберите правильный вариант ответа

Местным кариесогенным фактором является

- диета

- функциональное состояние зубов
- экстремальные воздействия
- зубной налет

291. Выберите 2 правильных ответа

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта

- атрофия десны
- бледность слизистой
- кандидоз
- гипертрофия десны
- кровоточивость десен
- "волосатая» лейкоплакия

292. Выберите правильный вариант ответа

Основной компонент лечения хронического гингивита

- физиотерапия
- антибиотикотерапия
- устранение раздражающего фактора
- витаминотерапия

293. Выберите 2 правильных ответа

Задачи патогенетического лечения пародонтита

- стабилизация дистрофического процесса в пародонте
- устранение ксеростомии
- устранение рецессии
- устранение галитоза
- устранение воспалительного процесса в пародонте
- устранение десневых и костных карманов

294. Выберите правильный вариант ответа

Лечебные прокладки способствуют отложению заместительного дентина

- да
- нет
- только в постоянных зубах
- только в молочных зубах

295. Выберите правильный вариант ответа

Для проведения реминерализующей терапии используют раствор

- 10% глюконата кальция
- 5% хлористого кальция
- 2% перекиси водорода
- 1% йодиола

296. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию растворами фторида натрия рекомендуется сочетать с

- 10 % раствором глюконата кальция
 - герметизацией фиссур
 - покрытие зубов фторсодержащим лаком
 - полоскание полости рта фторсодержащими растворами
- 297. Выберите правильный вариант ответа**
К реминерализующим средствам относится раствор
- перекиси водорода 10%
 - зуфиллина 2,4%
 - метиленового синего 2%
 - фторида натрия 2%
- 298. Выберите правильный вариант ответа**
Реминерализующую терапию рекомендуют проводить при
- кариесе в стадии пятна
 - среднем кариесе
 - глубоком кариесе
 - осложненном кариесе
- 299. Выберите правильный вариант ответа**
Для проводниковой анестезии используют растворы лидокаина
- 0,5%
 - 4%
 - 2%
 - 10%
- 300. Выберите правильный вариант ответа**
Герметизация фиссур проводится для
- профилактики кариеса
 - лечения кариеса
 - профилактики пульпита
 - лечения пульпита
- 301. Выберите правильный вариант ответа**
Начальной стадией кариеса является
- реминерализация
 - минерализация
 - деминерализация
 - флюоризация
- 302. Выберите правильный вариант ответа**
Функции пародонта
- регуляция жевательного давления, трофическая
 - регуляция жевательного давления, трофическая, амортизирующая
 - опорно-удерживающая, амортизирующая, трофическая, регуляция жевательного давления, пластическая
 - защитная, пластическая
- 303. Выберите правильный вариант ответа**
К воспалительным заболеваниям пародонта относятся
- пульпит, периодонтит
 - гингивит, пародонтит
 - периодонтит, сиалоаденит
 - стоматит, хейлит
- 304. Выберите правильный вариант ответа**
Клиническая коронка зуба- это
- часть зуба, которая выступает над десной

- часть зуба, покрытая эмалью
 - часть зуба под десной
 - часть зуба покрытая цементом
- 305. Выберите правильный вариант ответа**
Начальной стадией кариеса является
- реминерализация
 - минерализация
 - деминерализация
 - зубной налёт
- 306. Выберите правильный вариант ответа**
По международной системе обозначения зубов каждый зуб обозначается цифрами
- одной
 - двумя
 - тремя
 - четырьмя
- 307. Выберите правильный вариант ответа**
В зубной формуле кариес обозначается символом
- Ks
 - C
 - Ka
 - Car
- 308. Выберите правильный вариант ответа**
В зубной формуле интактный зуб обозначается символом
- C
 - 0
 - И
 - установленный символ отсутствует
- 309. Выберите правильный вариант ответа**
В зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом
- Иск
 - C
 - K
 - И
- 310. Выберите правильный вариант ответа**
В зубной формуле периодонтит обозначается символом
- P
 - П
 - R
 - Pt
- 311. Выберите правильный вариант ответа**
В зубной формуле пульпит обозначается символом
- P
 - П
 - R
 - Pt
- 312. Выберите правильный вариант ответа**
Пломба в зубной формуле обозначается символом
- P
 - П
 - R
 - Пл

313. Выберите правильный вариант ответа

Главным при диагностике острого очагового пульпита является

- характер болей
- характер болей и фактор времени
- данные электроодонтодиагностики
- данные термодиагностики

314. Выберите правильный вариант ответа

Метод сохранения жизнеспособной пульпы в корневых каналах называется

- девитальная ампутация
- девитальнаяэкстирпации
- витальная ампутация
- витальная экстирпация

315. Выберите правильный вариант ответа

Решающим тестом в дифференциальной диагностике хронического периодонтита и пульпита является

- перкуссия
- характер болей
- рентгенодиагностика
- зондирование

316. Выберите правильный вариант ответа

Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

317. Выберите правильный вариант ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

318. К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат
- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

319. Выберите правильный вариант ответа

Матрицы применяются с целью

- уменьшения количества материала
- улучшения цветостойкости
- формирования контуров пломбы
- косметического эффекта

320. Выберите правильный вариант ответа

Депо анестетика при проведении инфльтрационной анестезии для удаления зуба создается

- в сосудистом русле
- в подслизистом слое
- под надкостницей
- внутрикостно

321. Выберите правильный вариант ответа

Угол наклона иглы к альвеолярному отростку при инфльтрационной анестезии составляет

- 30 градусов
- 45 градусов
- 60 градусов
- 90 градусов

322. Выберите правильный вариант ответа

Мандибулярная анестезия исключает болевую чувствительность

- моляров
- моляров и премоляров
- всех зубов нижней челюсти с данной стороны
- всех зубов кроме резцов

323. Выберите правильный вариант ответа

Целесообразно использовать для аппликационной анестезии на слизистой оболочке ротовой полости

- 2% лидокаина
- 5% лидокаина
- 10% лидокаина
- 5% новокаина

324. Выберите правильный вариант ответа

Показания к применению композитов

- кариозные полости всех классов
- изолирующие прокладки
- временные пломбы
- для корневых каналов

325. Выберите правильный вариант ответа

Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы
- силикатные цементы
- эвикрол

326. Выберите правильный вариант ответа

Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

- светотвердеющие материалы
- цинкофосфатные цементы
- фосфатные
- силикофосфатные

327. Выберите правильный вариант ответа

Толщина слоя светоотверждаемого композита при послойном нанесении

- 4 мм
- 2 мм
- 1 мм
- 5 мм

328. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека уничтожается

- при нагревании до 56 градусов Цельсия 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
- при высушивании, при облучении в течение 3 суток

при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода

при промывании проточной водой

329. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция - это уничтожение

патогенных микроорганизмов

всех микроорганизмов

бактерий

анаэробных бактерий

330. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация - это уничтожение

вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов

патогенных бактерий

микробов на поверхности

микробов внутри

331. Выберите правильный вариант ответа

Применяют для высушивания корневых каналов штифты

гуттаперчевые

резиновые

деревянные

бумажные

332. Выберите 2 правильных ответа

Парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания

простой герпес

гепатит А

гепатит В

гепатит С

грипп

стоматит

333. Выберите правильный вариант ответа

Температура (градусов по Цельсию) воздуха при стерилизации воздушным методом

120-140

160-180

200-220

240-260

334. Выберите правильный вариант ответа

В автоклаве стерилизация осуществляется методом

воздушным

паровым

химическим

газовым

335. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом

воздушным

паровым

химическим

газовым

336. Выберите правильный вариант ответа

При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

остатков моющих средств

микроорганизмов

слюны

крови

337. Выберите правильный вариант ответа

При аппликационной анестезии анестетик применяется

поверхностно, на слизистую оболочку полости рта

вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца

внутривенно

ингаляционно

338. Выберите правильный вариант ответа

Шпатель предназначен для

уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости

растирания и замешивания пломбировочных материалов

удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости

удержания мягких тканей полости рта

339. Выберите правильный вариант ответа

Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

одноразовые кисточки

полировочные головки

полировочные штрипсы

суперфлоссы

340. Выберите правильный вариант ответа

Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдаются в соотношении

указанном в инструкции

увеличением количества жидкости

увеличением количества порошка

в произвольных соотношениях

341. Выберите правильный вариант ответа

Сосудосуживающий эффект обеспечивается

викасолом

адреналином

димедролом

хлористым кальцием

342. Выберите правильный вариант ответа

Выдавливать фурункул на лице нельзя потому что

после заживания остаются рубцы на лице

замедляется заживание

озлокачивается

возникновение общих тяжелых осложнений

343. Выберите правильный вариант ответа

Асфиксия – это

вид травмы ЧЛЮ

вид ожога

удушье

потеря памяти

344. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто аллергические реакции развиваются при использовании для местного обезболивания

- новокаина
- лидокаина
- тримекаина
- ультракаина

345. Выберите правильный вариант ответа

Ранение сосудов при проводниковой анестезии приводит к

- возникновению болей
- возникновению парестезии
- образованию некроза
- образованию гематомы

346. Выберите правильный вариант ответа

При обмороке вводят под кожу

- 0,5 мл адреналина
- 1 мл кордиамина
- 2 мл димедрола
- 2 мл эуфиллина

347. Выберите правильный вариант ответа

Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

- массаж сердца
- искусственная вентиляция лёгких
- нитроглицерин под язык
- анальгин

348. Выберите правильный вариант ответа

При гипертоническом кризе вводят

- троксевазин
- нифедипин
- тетралгин
- адреналин

349. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом бронхиальной астмы

- одышка
- боль за грудиной
- приступ удушья
- приступ тахикардии

350. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо ввести при приступе бронхиальной астмы

- эуфиллин
- нифедипин
- преднизолон
- диазолин

351. Выберите правильный вариант ответа

Ингалятор для снятия приступа бронхиальной астмы

- сальбутамол
- каметон
- бекотид
- ингалипт

352. Выберите правильный вариант ответа

Коллапс – это

- аллергическая реакция на антиген
- потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса

проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

воспалительная реакция

353. Выберите правильный вариант ответа

Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

- ввести фенобарбитал
- ввести седативные препараты
- ввести транквилизаторы
- ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка

354. Выберите правильный вариант ответа

Причиной постэкстракционного кровотечения не является

- повышение АД
- понижение АД
- снижение свёртываемости крови
- разрыв слизистой оболочки

355. Выберите правильный вариант ответа

Периостотомия при лечении гнойного периостита челюсти является

- обязательной
- желательной
- не желательной
- необязательной

356. Выберите правильный вариант ответа

При лечении фурункула до абсцедирования запрещено

- УФО
- УВЧ
- обработка спиртом
- обработка гепариновой мазью

357. Выберите правильный вариант ответа

Следует при перикоронарите и нормальном расположении третьего нижнего моляра

- удалить зуб
- провести иссечение «капюшона»
- сделать новокаиновую блокаду
- начать иглорефлексотерапию

358. Выберите правильный вариант ответа

Основным симптомом для диагностики перелома нижней челюсти является

- боль в области челюсти
- симптом ступеньки
- симптом крепитации
- патологическая подвижность отломков

359. Выберите 2 правильных ответа

Специализированная помощь при травмах челюстей

- оперативное вмешательство, репозиция
- наложение повязок, общее лечение
- наложение шинирующих аппаратов
- общее лечение
- симптоматическое лечение
- обезболивание, иммобилизация

360. Выберите правильный вариант ответа

В начале терапии анафилактического шока показано

- аминазин подкожно
- раствор адреналина внутривенно (внутри-мышечно)
- кофеин бензоат натрия внутримышечно
- введение больших доз кортикостероидов

361. Выберите правильный вариант ответа

Причина расширения показания к удалению молочных зубов с хроническим воспалительным очагом в периодонте у детей

- дают частые обострения
- приводят к гибели зачатков постоянных зубов
- невозможно провести качественное консервативное лечение
- потому что молочные зубы заменяются постоянными

362. Выберите правильный вариант ответа

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

- ввести подкожно раствор кофеина
- уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха
- вывести в другое помещение, ввести эуфиллин
- прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

363. Выберите правильный вариант ответа

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

- неминерализованным
- минерализованным
- смешанным
- пищевым

364. Выберите 2 правильных ответа

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- зубная бляшка
- зубной камень
- дентин
- цемент корня

365. Выберите правильный вариант ответа

Время чистки зубов составляет

- 1 минуту
- 3 минуты
- 1,5 минуты
- 15 минут

366. Выберите правильный вариант ответа

Для профилактики заболеваний пародонта

чистить зубы необходимо

- 3-5 раз в день
- два раза – утром и вечером
- только вечером
- один раз утром

367. Выберите правильный вариант ответа

Основной недостаток зубных порошков

- быстрая загрязняемость микроорганизмами
- отсутствие пенообразования

- слабая абразивность

- неприятный вкус

368. Выберите правильный вариант ответа

При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- флоссы
- зубные щетки
- полоскания
- межзубные стимуляторы

369. Выберите правильный вариант ответа

Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости
- отсутствие срединного канала
- возможность фигурной подстрижки
- нет преимуществ

370. Выберите правильный вариант ответа

Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие

- индивидуальной гигиены полости рта
- профессиональной гигиены полости рта
- профессиональной чистки зубов
- контролируемой чистки зубов

371. Выберите правильный вариант ответа

Использование флоссов рекомендуется с возраста

- 4-5
- 6-8
- 9-12
- 15-16

372. Выберите правильный вариант ответа

Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить

- утром
- вечером
- утром и вечером
- в очищении нет необходимости

373. Выберите правильный вариант ответа

К гигиеническим индексам относятся

- Грина-Вермильона
- ПИ
- КПИ
- CPITN
- Федорова-Володкиной
- ПМА

374. Выберите правильный вариант ответа

Замену зубной щетки проводят один раз в

- 12 месяцев
- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2-3 месяца

375. Выберите правильный вариант ответа

В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки

- фторида натрия
- эритрозина

- глюконата кальция
- аскорбиновой кислоты

376. Выберите правильный вариант ответа

Фторидсодержащие зубные пасты рекомендуются использовать детям с возраста (лет)

- 1,5 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6
- 10 - 12

377. Выберите 2 правильных ответа

Противокариозные зубные пасты содержат

- кальций
- фтор
- экстракт ромашки
- водоросли
- триклозан
- экстракт шалфея

378. Выберите правильный вариант ответа

Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости

- мягкой и очень мягкой
- жесткой
- средней жесткости
- любой

379. Выберите правильный вариант ответа

Оптимальное содержание фтора в питьевой воде

- 0,1 мг/л
- 1 мг/л
- 5 мг/л
- 10 мг

380. Выберите правильный вариант ответа

Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки

- очень мягкие
- очень жесткие
- средней жесткости
- жёсткие

381. Выберите правильные варианты ответов

Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены

- зубная бляшка
- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- белое вещество
- биоплёнка

382. Выберите правильные варианты ответов

Для механического удаления зубного камня используют

- боры, экскаваторы, плаггеры
- экскаваторы, крючки, кюреты
- долото, элеватор, зонд
- эмалевые ножи, штопфер, гладилку

383. Выберите правильный вариант ответа

Для удаления зубного камня используют инструменты

- скейлеры, кюреты, экскаватор
- экскаватор, штопфер, гладилку
- зонд, зеркало, пинцет
- пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

384. Выберите правильный вариант ответа

Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатым воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

385. Выберите правильный вариант ответа

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

386. Выберите правильный вариант ответа

Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

387. Выберите правильный вариант ответа

Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

388. Выберите правильный вариант ответа

Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

389. Выберите правильный вариант ответа

Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

390. Выберите правильный вариант ответа

За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание

- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

391. Выберите правильный вариант ответа

Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия
- разрешения руководителя медицинского учреждения
- требований родственников
- наличия страхового полиса

392. Выберите правильный вариант ответа

Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- утверждается нотариально

393. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма

- № 067/у
- № 043/у
- № 086/у
- № 237/у

394. Выберите правильный вариант ответа

Трудовой договор заключается

- в устной форме;
- в письменной форме;
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки;
- в письменной форме с нотариальным удостоверением.

395. Выберите правильный вариант ответа

Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме
- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

396. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками остановки сердца являются

- отсутствие пульса на сонной артерии
- остановка дыхания
- широкие зрачки
- узкие зрачки

397. Выберите правильный вариант ответа

Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий является

- расширение зрачков
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- судороги
- увеличение цианоза

398. Выберите правильный вариант ответа

От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- тщательная запись выполненных манипуляций
- сниженный преискурент

399. Выберите 2 правильных ответа

Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- зубной техник
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента
- родственники врача
- родственники зубного техника

400. Выберите правильный вариант ответа

Запись в журнале контроля качества стерилизации делается

- после каждого проведённого цикла стерилизации
- ежедневно
- дважды в сутки
- еженедельно

401. Выберите правильный вариант ответа

Запись в журнале контроля качества предстерилизационной очистки делается

- после проведённого цикла предстерилизационной очистки
- перед циклом предстерилизационной очистки
- после замечания руководителя
- до и после проведённого цикла предстерилизационной очистки

402. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция и стерилизация кварцевой камеры для хранения стерильных стоматологических инструментов проводится не реже одного раза

- в сутки
- в неделю
- в месяц
- в смену

403. Выберите правильный вариант ответа

Кварцевую камеру для хранения стерильных стоматологических инструментов необходимо не реже 1 раза в неделю

- Дезинфицировать и стерилизовать
- Дезинфицировать двукратно
- Проветривать
- Дезинфицировать однократно

404. Выберите правильный вариант ответа

Рекомендуемый срок хранения журналов контроля качества стерилизации составляет

- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2 недели

3 месяца

405. Выберите 2 правильных ответа

Правильной тактикой медицинского специалиста при работе с новым средством дезинфекции будет

Внимательно прочитать инструкцию к применению

Определить режим дезинфекции по инструкции

Руководствоваться инструкцией к предыдущему средству

Руководствоваться интуицией

Разведение рабочего раствора 1:1

Руководствоваться советом коллег

406. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекцию стоматологических наконечников проводят путём

протирания

замачивания в дезрастворе

нагревания до 50 градусов

кипячения

407. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекцию стоматологических инструментов проводят путём

протирания

замачивания в дезрастворе

кипячения

промывания под проточной водой

408. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекцию мелких стоматологических инструментов проводят путём

протирания

замачивания в дезрастворе

кипячения

промывания под проточной водой

409. Выберите 2 правильных ответа

Использование ультразвуковой мойки для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологических инструментов способствует

сокращению времени очистки

повышению качества очистки

стерилизации

снижению затрат

дезинфекции воздуха

улучшению микроклимата

410. Выберите правильный вариант ответа

Последовательная замена дезинфектанта из одной химической группы на дезинфектант из другой химической группы называется

ротацией

конвергенцией

экспозицией

дислокацией

411. Выберите правильный вариант ответа

Совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой стоматологических инструментов возможно при использовании

специальных растворов

перекиси водорода

хлоргексидина

хлорамина

412. Выберите правильный вариант ответа

Нагрудные салфетки стоматологического пациента подлежат смене

1 раз в неделю

1 раз в месяц

После рабочего дня

После каждого пациента

413. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекцию поверхностей предметов, находящихся в зоне лечения (стол для инструментов, кнопки управления, светильник), проводят после

каждого пациента

рабочего дня

замечания руководителя

предписания

414. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекцию подголовника и подлокотников стоматологического кресла проводят после

каждого пациента

рабочего дня

каждого 3 пациента

предписания

415. Выберите правильный вариант ответа

Фунгицидное действие направлено на уничтожение

Грибов

Вирусов

Бактерий

простейших

416. Выберите правильный вариант ответа

Вирулицидное действие направлено на уничтожение

Грибов

Вирусов

Бактерий

Простейших

417. Выберите правильный вариант ответа

Бактерицидное действие направлено на уничтожение

Грибов

Вирусов

Бактерий

простейших

418. Выберите правильный вариант ответа

Перед направлением и после получения из зуботехнической лаборатории: стоматологические оттиски, заготовки зубных протезов

дезинфицируют

стерилизуют

высушивают

взвешивают

419. Выберите правильный вариант ответа

Ультразвуковые стоматологические наконечники и насадки к ним стерилизуют методом

- паровым
 химическим
 воздушным
 кипячения

420. Выберите правильный вариант ответа

Эндодонтические инструменты с пластмассовыми хвостовиками стерилизуют методом

- паровым
 химическим
 воздушным
 кипячения

Специальность «Стоматология» Высшая квалификационная категория

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите правильный вариант ответа

Заболееваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
 интенсивность кариеса
 распространенность кариеса
 недостаток фтора в воде

2. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
 число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
 число пораженных кариесом зубов у одного человека
 число здоровых зубов у одного человека

3. Выберите правильный вариант ответа

Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
 кариозным
 запломбированным
 депульпированным

4. Выберите правильный вариант ответа

Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
 число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных
 число пораженных кариесом зубов у одного человека
 число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

5. Определите соответствие групповой принадлежности зубов и их условного обозначения

моляры	16, 26, 37
премоляры	44, 25, 45
резцы	12, 21, 42
клыки	13, 43, 33

6. Установите соответствие корневых каналов зубу

первый моляр верхней челюсти (16)	медиально-щёчный, дистально-щёчный, нёбный
первый моляр нижней челюсти (36)	медиально-щёчный, медиально-язычный, дистальный
первый премоляр верхней челюсти (24)	нёбный, вестибулярный

7. Установите соответствие

первый верхний правый моляр	16
второй верхний левый резец	22
первый нижний правый премоляр	44

8. Установите соответствие цветовой кодировки эндодонтическому инструменту

015	белый
020	жёлтый
025	красный
040	чёрный

9. Установите соответствие постоянных зубов и обозначения по международной системе

третий верхний правый моляр	18
второй нижний левый премоляр	35
первый нижний правый резец	41
	31
	13

10. Установите соответствие постоянных зубов и обозначения по международной системе

второй левый нижний резец	32
первый нижний левый премоляр	34
второй верхний левый премоляр	25
	46
	42

11. Установите соответствие временных (молочных) зубов и их обозначения по международной системе

второй левый нижний резец	72
первый нижний левый моляр	74
второй верхний левый моляр	65

12. Установите соответствие временных (молочных) зубов и их обозначения по международной системе

правый верхний первый резец	51
первый нижний правый моляр	84
левый верхний клык	63

13. Установите соответствие метода обследования

перкуссия	постукивание
пальпация	ощупывание
аускультация	выслушивание
	прикладывание
	зондирование

14. Установите соответствие основного метода исследования при данном заболевании

острый периодонтит	перкуссия
средний кариес	зондирование
начальный кариес	витальное окрашивание
хронический периодонтит	рентгенологический

15. Выберите правильный вариант ответа

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная накожная проба
- наличие гиперемии и отека
- наличие эрозий или пузырей

16. Выберите правильный вариант ответа

Основное направление третичной профилактики стоматологических заболеваний на

- предупреждение возникновения заболеваний
- предупреждение осложнений заболевания
- восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы
- предупреждение воздействия факторов

17. Выберите правильный вариант ответа

Лечение кариеса зубов относится к методам профилактики

- Первичной
- Вторичной
- Третичной
- Четвертичной

18. Выберите правильный вариант ответа

Устранение дефектов зубного ряда с помощью протезирования относится к методам профилактики

- Первичной
- Вторичной
- Третичной
- Четвертичной

19. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики кариеса зубов является

- Герметизация фиссур
- Пломбирование кариозных полостей
- Эндодонтическое лечение
- Удаление зубов по поводу осложненного кариеса

20. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- Кюретаж пародонтальных карманов
- Местная противовоспалительная терапия
- Шинирование подвижных зубов
- Профессиональная гигиена полости рта

21. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики кариеса зубов является

- Герметизация фиссур
- Пломбирование кариозных полостей
- Эндодонтическое лечение
- Удаление зубов по поводу осложненного кариеса

22. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- Кюретаж пародонтальных карманов
- Местная противовоспалительная терапия
- Шинирование подвижных зубов
- Профессиональная гигиена полости рта

23. Выберите правильный вариант ответа

Материалы для лечения глубокого кариеса должны

- обладать антимикробным и одонтотропным действием
- обладать быстрым отверждением
- обладать хорошей вводимостью
- обладать хорошей пластичностью

24. Выберите правильный вариант ответа

Для протравливания эмали перед пломбированием композиционным материалом используется кислота

- соляная
- плавиковая
- ортофосфорная
- серная

25. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе дентина (глубоком кариесе) в сочетании с гиперемией пульпы необходимо

- экстирпировать пульпу
- провести неполную некротомию и наложить пасту с противовоспалительными свойствами
- удалить, по возможности, весь пораженный дентин, избегая обнажения пульпы, и наложить пасту с противовоспалительными свойствами

тщательно удалить весь пораженный дентин и оставить полость открытой для оттока экссудата

26. Выберите правильный вариант ответа

Из предложенных методов лечения 12 зуба наиболее рационально применять при остром очаговом пульпите

- витальную экстирпацию
- витальную ампутацию
- девитализацию пульпы
- девитальную ампутацию

27. Выберите правильный вариант ответа

Пульпоэкстрактор служит для

- для удаления мягких тканей из корневого канала
- для определения длины корневого канала
- для расширения корневого канала
- для пломбирования корневого канала

28. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе дентина (глубоком кариесе) наиболее рациональны прокладки

- обладающие одонтоотропными свойствами
- антимикробного действия
- индифферентные
- противовоспалительного действия

29. Выберите правильный вариант ответа

При хроническом периодонтите временных зубов резорбция корней

- физиологическая
- ювенальная
- патологическая
- смешанная

30. Выберите правильный вариант ответа

Пульпоэкстрактор служит для

- для удаления мягких тканей из корневого канала
- для определения длины корневого канала
- для расширения корневого канала
- для пломбирования корневого канала

31. Выберите правильный вариант ответа

Геометрическая кодировка инструментов обозначает

- длину
- профиль
- диаметр
- ширину

32. Выберите правильный вариант ответа

К- файл служит

- для прохождения и расширения корневого канала
- для удаления мягких тканей
- для расширения устья корневого канала
- для пломбирования канала

33. Выберите правильный вариант ответа

Силиконовые ограничители (стопы) на эндодонтическом инструменте нужны для

- безопасности манипуляций в канале на рабочей длине

стерилизации

ограничения распространения микрофлоры

кодирования

34. Выберите правильный вариант ответа

Для пломбирования корневого канала второго резца целесообразнее применить

- метапекс
- крезопасту
- гуттаперчу
- серебро

35. Выберите правильный вариант ответа

Боры Гейтса используются

- для расширения устья корневого канала
- для резекции верхушки корня
- для уплотнения пломбировочного материала
- для ограничения распространения микрофлоры

36. Выберите правильный вариант ответа

Пломбирование хорошо проходимых корневых каналов целесообразнее произвести

- гуттаперчей и пастами на основе эпоксидных смол
- фосфат-цементом со штифтом
- резорцин-формалиновой пастой
- параценом

37. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании гуттаперчей используется методика

- многоконусная
- латеральной и вертикальной конденсации
- одиночный конус
- краун-даун

38. Выберите правильный вариант ответа

При пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации количество гуттаперчевых штифтов составляет

- один
- два
- необходимое для полного заполнения канала
- три

39. Выберите правильный вариант ответа

Пломбирование хорошо проходимых корневых каналов целесообразнее произвести

- гуттаперчей и пастами на основе эпоксидных смол
- фосфат-цементом со штифтом
- резорцин-формалиновой пастой
- параценом

40. Выберите правильный вариант ответа

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- кюретаж пародонтальных карманов
- местная противовоспалительная терапия
- шинирование подвижных зубов
- профессиональная гигиена полости рта

41. Выберите правильный вариант ответа

Условия, необходимые для возникновения кариеса зубов

- углеводы
- белки
- перенесенные сопутствующие заболевания
- углеводы и микроорганизмы в контакте с эмалью

42. Выберите правильный вариант ответа

Симптомы, характерные для начального кариеса

- боли от температурных раздражителей
- белые пятна, расположенные в области шеек зубов
- наличие кариозной полости
- боли от химических раздражителей

43. Выберите правильный вариант ответа

Последствия при пломбировании без изолирующей прокладки глубокого кариеса композитами

- плохая адгезия
- воспаление и некроз пульпы
- выпадение пломбы
- вторичный кариес

44. Выберите правильный вариант ответа

При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять

- амальгаму
- силидонт
- стеклоиономерные цементы
- эвикрол

45. Выберите правильный вариант ответа

Поверхности зуба, являющиеся иммунными к кариесу

- апроксимальные
- пришеечные
- режущий край
- фиссуры

46. Выберите правильный вариант ответа

Микроорганизм, играющий ведущую роль в возникновении кариеса зубов

- Streptococcus mutans*
- лактобактерии
- стафилококк
- актиномицеты

47. Выберите правильный вариант ответа

Углевод, обладающий наибольшим кариесогенным потенциалом

- лактоза
- сахароза
- глюкоза
- крахмал

48. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки поражаемости зубов кариесом согласно номенклатуре ВОЗ используются показатели

- интенсивность, распространенность, прирост интенсивности кариеса

индекс гигиены

индекс РМА

индекс ПИ

49. Выберите правильный вариант ответа

Углевод, обладающий наибольшим кариесогенным потенциалом

- лактоза
- сахароза
- глюкоза
- крахмал

50. Выберите правильный вариант ответа

Комплекс симптомов: кариозная полость после препарирования в пределах дентина, дно плотное, ЭОД 6 мкА, зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, характерен для

- пульпита
- среднего кариеса
- начального кариеса
- периодонтита

51. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки поражаемости зубов кариесом согласно номенклатуре ВОЗ используются показатели

- интенсивность, распространенность, прирост интенсивности кариеса
- индекс гигиены
- индекс РМА
- индекс ПИ

52. Выберите правильный вариант ответа

Причины развития гиперпластического гингивита

- нерациональное протезирование
- недостаточная гигиена
- патология прикуса
- гормональные изменения в организме

53. Выберите правильный вариант ответа

При язвенном гингивите наблюдается

- кровоточивость и боли в деснах при приеме пищи
- изъязвление десневого края с усеченностью вершин сосочков, боли в деснах, гнилостный запах изо рта
- разрастание десен, кровоточивость при дотрагивании
- кровоточивость десен при приеме пищи, глубина десневых карманов 6-7 мм

54. Выберите правильный вариант ответа

Характеристика кариеса в стадии меловидного пятна

- поражает эмаль на всю глубину
- не исчезает ни при каких обстоятельствах
- может исчезнуть в результате реминерализации
- исчезает в любом случае

55. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто очаги деминерализации эмали локализируются на коронке зуба в области

- бугров
- пришеечной
- режущего края
- экватора

56. Выберите правильный вариант ответа

При дифференциальной диагностике хронического гингивита и пародонтита легкой степени тяжести решающим является

- глубина пародонтальных карманов до 5 мм
- отсутствие круговой связки зуба, наличие пародонтальных карманов
- пародонтальных карманов нет, круговая связка сохранена
- воспаление десневого края и десневых сосочков
- подвижность и смещение зубов

57. Выберите правильный вариант ответа

Состояние зубодесневого прикрепления при хроническом гингивите на нижней челюсти у детей

- зубодесневое прикрепление не нарушено, круговая связка зуба не повреждена
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной до 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,0 мм

58. Выберите правильный вариант ответа

Наличие пародонтального кармана характерно

- для гингивита
- для пародонтита
- для пародонтомы
- для стоматита

59. Выберите правильный вариант ответа

При флюорозе пациент жалуется на

- гиперчувствительность
- изменение цвета твердых тканей зубов
- стертость зубов
- подвижность зубов

60. Выберите правильный вариант ответа

При определении гигиенического состояния полости рта с помощью гигиенического индекса Федорова – Володкиной окрашиваются

- вестибулярные поверхности 6 нижних фронтальных зубов
- вестибулярные поверхности 6 верхних фронтальных зубов
- язычные поверхности первых постоянных моляров
- вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов

61. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее благоприятный прогноз имеет перелом корня зуба

- поперечный
- продольный

- оскольчатый
- смешанный

62. Выберите правильный вариант ответа

Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует

- приём фторидсодержащих таблеток
- приём витаминов
- проведение профессиональной гигиены
- реминерализирующая терапия

63. Выберите правильный вариант ответа

К эпителизирующим средствам относят

- мазь Солкосерила
- р-р Люголя
- 3% р-р перекись водорода
- р-р хлоргексидина

64. Выберите правильный вариант ответа

Тяжесть пародонтита определяет

- подвижность зубов, глубина пародонтальных карманов, степень деструкции костной ткани
- выраженность воспаления десны, отёчность
- выраженность воспаления десны, кровоточивость
- кровоточивость, гноетечение

65. Выберите правильный вариант ответа

Причиной, ведущей к флюорозу зубов, является

- содержание фтора в питьевой воде свыше 1,5 мг/л
- нарушение общего обмена веществ
- неясная причина
- несовершенный остеогенез

66. Выберите правильный вариант ответа

Клиническим симптомом при клиновидном дефекте является

- дефект на вестибулярной поверхности зубов в виде овала
- изменение формы зуба
- дефект на вестибулярной поверхности шейки зуба в виде клина
- дефект режущего края и бугров в виде площадки

67. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее точным при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является

- термометрия
- рентгенография
- зондирование полости зуба
- электроодонтодиагностика

68. Выберите правильный вариант ответа

К противовоспалительным средствам относятся

- гепариновая мазь
- мазь солкосерил
- бутадионовая мазь
- аскорбиновая кислота

69. Выберите правильный вариант ответа

Пародонтит легкой степени дифференцируют с

- пародонтитом средней тяжести и катаральным гингивитом
- пародонтозом
- гипертрофическим гингивитом
- стоматитом

70. Выберите правильный вариант ответа

Индекс Федорова – Володкиной используют для определения гигиенического состояния полости рта

- детей дошкольного возраста
- подростков
- взрослых
- пациентов с брекет – системами

71. Выберите правильный вариант ответа

При подозрении на озлокачествление хронической язвы губы предпочтительнее провести

- полное иссечение с гистологическим исследованием
- криодеструкцию
- симптоматическую терапию
- биопсию с гистологическим исследованием

72. Выберите правильный вариант ответа

Метод витальной ампутации нельзя применять в однокорневых зубах

- в связи с отсутствием анатомически выраженной границы между коронковой и корневой пульпой
- воспаление в этих случаях быстро переходит на корневую пульпу
- так как изменяется цвет зубов
- благодаря малому объему полости

73. Выберите правильный вариант ответа

Для лечения молочницы применяют

- мазь "Солкосерил"
- витамин А
- мазь декаминовая 0,5%, раствор буры в глицерине 20%
- оксолиновая мазь 2%, интерфероновая мазь 10%

74. Выберите правильный вариант ответа

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

- сразу после прорезывания первого временного зуба
- 2 лет
- 3 лет
- 5-6 лет

75. Выберите правильный вариант ответа

Клинический признак, характерный для кандидоза

- слизистая оболочка ярко гиперемирована
- обильный белый налет на слизистой оболочке
- язык бледно-розового цвета

- усиление боли от раздражающей пищи

76. Выберите правильный вариант ответа

К локальному пародонтиту приводит

- гиповитаминоз
- гипervитаминоз
- приём противосудорожных препаратов
- отсутствие контактного пункта между соседними зубами

77. Выберите правильный вариант ответа

Для высушивания корневого канала целесообразнее использовать

- эфир
- бумажные штифты
- ручной пустер
- спирт

78. Выберите правильный вариант ответа

Виды инфильтрационной анестезии

- интралигаментарная
- туберальная
- мандибулярная
- торусальная

79. Выберите правильный вариант ответа

К общим осложнениям местной анестезии относится

- аллергические реакции
- вирусный гепатит
- анафилактический шок
- парез лицевого нерва

80. Выберите правильный вариант ответа

Очаг разрежения с четким контуром округлой или овальной формы, размером около 0,5 см. в диаметре определяется на рентгенограмме при

- хроническом гранулематозном периодонтите
- хроническом фиброзном периодонтите
- хроническом гранулирующем периодонтите
- хроническом пульпите

81. Выберите правильный вариант ответа

На контрольной рентгенограмме при лечении пульпита канал должен быть

- равномерно заполнен пломбировочным материалом с выведением его за верхушку
- равномерно заполнен пломбировочным материалом до верхушки
- равномерно заполнен пломбировочным материалом, не доходя 1-1,5 мм до верхушки корня
- заполнен пломбировочным материалом на две трети

82. Выберите правильный вариант ответа

Под термином "опаковость" в реставрационной стоматологии понимают

- темный оттенок материала
- непрозрачность
- насыщенность цвета
- прозрачность

83. Выберите правильный вариант ответа

Процесс кондиционирования дентина

- нанесение адгезива на поверхность дентина
- нанесение протравливающей кислоты на поверхность дентина
- нанесение праймера на поверхность дентина
- охлаждение поверхности дентина

84. Выберите правильный вариант ответа

Раскрытие полости зуба при эндодонтическом лечении проводится с целью

- удаления коронковой пульпы
- создания доступа к корневым каналам
- улучшения фиксации пломбы
- улучшения эстетики

85. Выберите правильный вариант ответа

Для успешного лечения периодонтита каналы должны быть

- изогнутыми
- хорошо проходимыми на всю длину
- облитерированными
- склерозированными

86. Выберите правильный вариант ответа

При лечении пульпита канал пломбируют

- до анатомического апикального отверстия
- до физиологического апикального отверстия
- за апикальное отверстие
- через апикальное отверстие

87. Выберите правильный вариант ответа

Эндодонтический инструмент для прохождения корневых каналов

- пульпоэкстрактор
- К-файл
- спредер
- Н-файл

88. Выберите правильный вариант ответа

Рентгенологический признак характерный для хронического гранулирующего периодонтита постоянного зуба

- очаг разряжения кости в области верхушки корня с четкими границами
- равномерное расширение периодонтальной щели
- очаг разряжения костной ткани в области верхушки корня с нечеткими границами
- изменений на рентгенограмме нет

89. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, вызываемое вирусом обычного герпеса

- острый герпетический стоматит
- опоясывающий герпес
- ветряная оспа
- герпетическая ангина

90. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе пациенты жалуются на боль

- самопроизвольную

- сохраняющуюся после устранения раздражителя

- самопроизвольную, иррадиирующую

- только при наличии раздражителя

91. Выберите правильный вариант ответа

Причина острой травмы периодонта

- грубая эндодонтическая обработка каналов
- завышенная пломба
- выведение пломбы из прикуса
- несвоевременная экстирпация

92. Выберите правильный вариант ответа

Для выявления зубного налета используется метод

- окрашивания
- перкуссии
- пальпации
- микробиологический

93. Выберите правильный вариант ответа

Основные возбудители хронического язвенно-некротического гингивита Венсана

- стрепто- и стафилококки
- фузобактерии и спирохеты
- лактобактерии
- вирусы

94. Выберите правильный вариант ответа

Клиническая картина при хроническом гингивите у детей

- отмечается кровоточивость десен
- гипертрофия сосочков
- зубы подвижны
- изъязвление десневого края

95. Выберите правильный вариант ответа

Детский возраст, характерный для возникновения острого герпетического стоматита

- 1-й год жизни
- от 6 месяцев до 3 лет
- 5-6 лет
- старше 9 лет

96. Выберите правильный вариант ответа

Течение заболевания острое, полиморфизм высыпаний в полости рта, сезонность поражения, кожные проявления - кокардная сыпь характерны для

- острого герпетического стоматита
- многоформной экссудативной эритемы
- пузырчатки
- вторичный сифилис

97. Выберите правильный вариант ответа

Возможные последствия при пломбировании без изолирующей прокладки композитами

- плохая адгезия
- выпадение пломбы
- воспаление и некроз пульпы
- вторичный кариес

98. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные приспособления к основному эндодонтическому инструментарию

- эндо-блок, эндодонтическая линейка

- флексобенд
- клинстенд
- матрицы, клинышки

99. Выберите правильный вариант ответа

Наличие рецессии десны не характерно

- для пародонтита
- для пародонтоза
- для стоматита
- для гингивита

100. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариозных полостей по Блеку создана на принципе

- систематизации обработки кариозных полостей
- симметричности кариозного процесса
- локализации кариозного процесса в конкретном зубе
- обеспечения условий фиксации пломбы

101. Выберите правильный вариант ответа

Метод удаления предварительно некротизированной пульпы из корневых каналов называется

- девитальная экстирпация
- витальная экстирпация
- девитальная ампутация
- витальная ампутация

102. Выберите правильный вариант ответа

Электроодонтометрия применяется

- для определения возбудимости нервных окончаний пульпы зуба
- для определения состояния нервных окончаний слизистой
- для определения состояния нервных окончаний пародонта
- для определения состояния нервных окончаний периодонта

103. Выберите правильный вариант ответа

При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять

- стеклоиономерные цементы
- силикатные цементы
- амальгаму
- композитные материалы химического отверждения

104. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хронических пульпитах постоянных зубов

- 2-6 мкА
- 20-60 мкА
- свыше 150 мкА
- свыше 250 мкА

105. Выберите правильный вариант ответа

ЭОД при хроническом периодонтите в постоянных зубах

- 1-6 мкА
- 20-60 мкА
- 35 - 45 мкА
- 100-200 мкА

106. Выберите правильный вариант ответа

Клинические проявления острого токсического периодонтита

- острая боль при накусывании на зуб
- отёк мягких тканей лица
- свищ на десне с гнойным отделяемым
- отсутствие симптомов

107. Выберите правильный вариант ответа

В возникновении кариеса важную роль играет свойство микроорганизмов

- образование органических кислот
- способность вызывать дисбактериоз
- приспособление к изменяющимся условиям внешней среды
- выделение экзотоксинов

108. Выберите правильный вариант ответа

Для хронического фиброзного пульпита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- болезненность при пальпации по переходной складке
- зондирование вскрытого рога пульпы безболезненно
- зондирование вскрытого рога пульпы болезненно

109. Выберите правильный вариант ответа

Основной дифференциально-диагностический признак пародонтита

- гноетечение из пародонтальных карманов
- повреждение круговой связки зуба с образованием пародонтального кармана
- кровоточивость и гноетечение при надавливании на десневой сосочек
- увеличение десневых сосочков, гиперемия, синюшность, кровоточивость

110. Выберите правильный вариант ответа

Кариес в стадии меловидного пятна

- это поражение эмали и дентина
- это поражение дентина и цемента
- это деминерализация поверхности эмали
- это деминерализация до эмалево-дентинной границы

111. Выберите правильный вариант ответа

Точным, при дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита является

- зондирование полости зуба
- термометрия
- рентгенография
- пальпация

112. Выберите правильный вариант ответа

К эпителизирующим средствам относится

- гвоздичное масло
- р-р Люголя
- р-р хлоргексидина
- мазь солкосерила, масляный раствор витамина А

113. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективный анестетик

- новокаин
- тримекаин

- лидокаин
- артикаин

2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

114. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивность поражений кариесом определяется индексом

- СРITN
- КПУ
- GI
- ПМА

115. Выберите правильный вариант ответа

Основные методы обследования

- расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика
- расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование
- термодиагностика, рентгенодиагностика

116. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные методы обследования

- осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика
- термодиагностика, электродиагностика, лабораторные
- расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика
- цитология

117. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпита и периодонтита

118. Выберите правильный вариант ответа

При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

- считаются при подсчете КПУ зубов
- не учитываются совсем
- на усмотрение врача
- не имеет значения

119. Выберите правильный вариант ответа

В понятие «пародонт» входит

- десна, круговая связка, периодонт
- десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент
- костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- ткани зуба, периодонт

120. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

121. Выберите правильный вариант ответа

Если зуб подвижен в вестибулярно-оральном направлении, то это

- 1 степень
- 2 степень
- 3 степень
- 4 степень

122. Выберите правильный вариант ответа

Резорбция костной ткани межзубной перегородки - это

- разрушение
- наложение
- истончение
- утолщение

123. Выберите правильный вариант ответа

Инструмент для исследования пародонтального кармана

- пуговчатый градуированный зонд
- штыковидный зонд
- гладилка
- угловой зонд

124. Выберите правильный вариант ответа

Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к

- пальпации
- перкуссии
- зондированию
- оценке состояния прикуса

125. Выберите правильный вариант ответа

Пальпация - это

- выстукивание
- выслушивание
- ощупывание
- осмотр

126. Выберите правильный вариант ответа

С помощью пальпации можно определить

- наличие зубного камня
- кариес
- подвижность тканей и органов
- качество рентгеновского снимка

127. Выберите правильный вариант ответа

Каково состояние зуба при подвижности II степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

128. Выберите правильный вариант ответа

Ткань образующая основную массу зуба

- эмаль
- дентин
- цемент
- пульпа

129. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариеса по течению

- начальный, поверхностный, средний, глубокий
- фиссурный, пришеечный, апроксимальный
- острый, хронический, острейший, приостановившийся
- начальный, острый, хронический

130. Выберите правильный вариант ответа

Явление сухости во рту - это

- сиалорея
- ксеростомия
- гипосаливация
- гиперсаливация

131. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости выявляются с помощью

- пинцета
- гладилки
- зонда
- экскаватора

132. Выберите правильный вариант ответа

Характерные изменения в десне при гингивите

- воспаление
- дистрофия
- атрофия
- лизис

133. Выберите правильный вариант ответа

Эрозия, как элемент поражения слизистой оболочки полости рта представляет собой

- бесполостное образование
- поверхностный дефект эпителия
- полостное образование с экссудатом
- изменение цвета

134. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- «тетрациклиновые» зубы
- гипоплазия эмали

135. Выберите правильный вариант ответа

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон

- жевательные зубы

136. Выберите правильный вариант ответа

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

- твердых тканях зуба
- пульпе
- периодонте
- эмали

137. Выберите правильный вариант ответа

Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения

- жалоб
- причины потери зубов
- наличия системных заболеваний
- наличия профессиональных вредностей

138. Выберите правильный вариант ответа

К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относится

- гипоплазия
- флюороз
- клиновидный дефект
- несовершенный амелогенез

139. Выберите правильный вариант ответа

К субъективным методам обследования относится

- инструментальный
- опрос больного
- лабораторный
- функциональный

140. Выберите правильный вариант ответа

Классификация кариеса по глубине поражения

- фиссурный, апроксимальный, пришеечный
- острый, хронический, приостановившийся, острейший
- начальный, поверхностный, средний, глубокий

- апроксимальный, поверхностный, острый

141. Выберите правильный вариант ответа

Сущность пародонтоза в

- резорбции альвеолярной кости
- дистрофии тканей пародонта
- хроническом воспалении тканей пародонта
- разрастании одной из пародонтальных тканей

142. Выберите правильный вариант ответа

К первичным элементам поражения не относится

- пятно
- бугорок
- афта
- папула

143. Выберите правильный вариант ответа

Причиной эндемического флюороза является

- недостаток кальция в организме ребенка
- инфекционное заболевание ребенка
- повышенное содержание фтора в питьевой воде

- недостаток фтора в организме матери
- 144. Выберите правильный вариант ответа**
Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это
- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы
- 145. Выберите правильный вариант ответа**
Кариес в стадии пятна диагностируют
- 5% раствором йода
- раствором Шиллера-Писарева
- 2% раствором метиленового синего
- 5% раствором бриллиантового зеленого
- 146. Выберите правильный вариант ответа**
При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо
- устранить раздражитель
- провести антисептическую обработку
- обработать слизистую кератопластиком
- провести санацию полости рта
- 147. Выберите правильный вариант ответа**
Причина возникновения лейкоплакии
- вирусы
- курение, алкоголь, раздражающая пища
- лучевые поражения
- бактерии
- 148. Выберите правильный вариант ответа**
Промежутки между зубами
- протрузия
- тремы
- тортоаномалии
- дистопии
- 149. Выберите правильный вариант ответа**
Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают
- скученность зубов
- наличие физиологических трем и диастем
- оральное смещение зубов
- вестибулярное смещение зубов
- 150. Выберите правильный вариант ответа**
Количество зубов в молочном прикусе
- 20
- 24
- 28
- 32
- 151. Выберите правильный вариант ответа**
Апикальное отверстие находится
- на небной поверхности вторых резцов
- на верхушке корня зуба
- на вестибулярной поверхности первых моляров
- на уровне рога пульпы
- 152. Выберите правильный вариант ответа**
Кариес в стадии пятна дифференцируют
- с клиновидным дефектом
- с флюорозом
- со средним кариесом

- с эрозией эмали
- 153. Выберите правильный вариант ответа**
Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов
- рентгенологический
- зондирование
- пальпация
- цитология
- 154. Выберите правильный вариант ответа**
Экскаватором
- вносят в полость лекарственные вещества
- формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин
- уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы
- удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы
- 155. Выберите правильный вариант ответа**
Вторичный морфологический элемент поражения слизистой оболочки полости рта
- волдырь
- абсцесс
- гнойничок
- чешуйка
- 156. Выберите правильный вариант ответа**
Симптомами гингивита являются
- кровоточивость и отечность десен
- жжение языка и ксеростомия
- патологическая стираемость и подвижность зубов
- изменения прикуса и рецессия десны
- 157. Выберите правильный вариант ответа**
Особенностью стоматологического пинцета является
- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек
- 158. Выберите правильный вариант ответа**
Наличие сообщения кариозной полости с полостью зуба определяют с помощью
- пинцета
- экскаватора
- зонда
- бора
- 159. Выберите правильный вариант ответа**
Инструментами для конденсации гуттаперчи являются
- файлы и римеры
- каналонаполнитель и дрельбор
- корневые буравы и файлы
- спредеры и плагеры
- 160. Выберите правильный вариант ответа**
Характерные симптомы острых форм пульпита

- боль локальная, тупая
- боль острая, самопроизвольная
- перкуссия резко болезненна
- боль проходит сразу после удаления раздражителя

161. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез заболевания (morbi) включает в себя

- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
- вредные привычки пациента
- применение лекарственных препаратов
- соматические заболевания

162. Выберите правильный вариант ответа

Анамнез жизни (anamnesi vitae) пациента включает

- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
- жалобы
- время возникновения заболевания
- характер боли, факторы, её провоцирующие

163. Выберите правильный вариант ответа

При помощи аппарата «Diagnodent» определяют

- степень рецессии десны
- наличие скрытых кариозных полостей
- глубину корневых каналов
- жизнеспособность пульпы

164. Выберите 2 правильных ответа

Рентгеноконтрастными являются

- пульпа
- мышцы
- слизистая
- десна
- эмаль
- металл

165. Выберите 2 правильных ответа

Нерентгеноконтрастными являются

- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- металл
- серебро

166. Установите соответствие

предраковые заболевания	хроническая травма, приём острой пищи
гингивит	наличие микробного налёта
анафилактический шок	непереносимость лекарственных веществ
туберкулезная волчанка	микобактерии туберкулёза

167. Установите соответствие

первая	смещение зуба в вестибулярно-оральном направлении
вторая	смещение зуба в вестибулярно-

	оральном и медио-дистальном направлении
третья	смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и вокруг оси зуба
четвёртая	смещение в вестибуло-оральном, медио-дистальном, вертикальном и вращение зуба по оси
	выпадение зуба из альвеолы

168. Установите соответствие

средний кариес	2-6 мкА
периодонтит	100-120 мкА
гангренозный пульпит	50-80 мкА
острый диффузный пульпит	30-50 мкА
	200-250 мкА

169. Установите соответствие

хронический средний кариес	отсутствие болей
периодонтит	боль при накусывании
поверхностный кариес	боль от сладкого
пульпит	самопроизвольная боль
	боль в интактных зубах

170. Установите соответствие

актиномикоз	лучистый грибок
туберкулёз	бактерия Коха
сифилис	бледная спирохета
	стафилококк
	стрептококк

171. Установите соответствие

Кариес в стадии пятна	деминерализация эмали
Поверхностный кариес	дефект твёрдых тканей в пределах эмали
Средний кариес	дефект твёрдых тканей в пределах части дентина
Глубокий кариес	значительные изменения дентина
	поражение пульпы

172. Установите соответствие

пародонтолиз	идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта
кандидоз	заболевание, вызываемое грибом
лейкоплакия	хроническое заболевание слизистых оболочек
флюороз	заболевание, связанное с интоксикацией фтором
	венерическое заболевание

173. Установите соответствие

средний кариес	болезненность при зон-
----------------	------------------------

	диловании стенок
клиновидный дефект	повышенная плотность эмали и дентина
хронический пульпит	интенсивная боль от температурных раздражителей
	болезненность при накусывании

174. Установите соответствие

индекс ПМА	гингивит
рентгенограмма	периодонтит
электроодонтодиагностика	пульпит
микробиологическое исследование	кандидоз

175. Установите соответствие

средние сроки прорезывания 2-х постоянных моляров	14-15 лет
средние сроки прорезывания 1-х постоянных моляров	5-6 лет
средние сроки прорезывания 3-х постоянных моляров	14-20 лет

176. Установите соответствие

глубокий кариес	боль при перкуссии отсутствует
обострение фиброзного пульпита	реакция на перкуссию отличается от здорового зуба
острый гнойный периодонтит	резкая, усиливающаяся боль при перкуссии

177. Установите соответствие

окклюзия	одновременное и одномоментное смыкание зубных рядов
артикуляция	всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
антогонист	противоположный зуб
бифуркация	место расхождения корней у двухкорневого зуба
трифуркация	место расхождения корней у трёхкорневого зуба

178. Выберите правильный вариант ответа

Диастема относится к аномалии

- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии

179. Выберите правильный вариант ответа

Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии

- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов
- прикуса

180. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор
- молибден
- калий
- цинк

181. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

182. Выберите правильный вариант ответа

При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень
- постоянные зубы и кости скелета
- постоянные зубы и ногти
- молочные, постоянные зубы и почки

183. Выберите правильный вариант ответа

Флюороз равняется при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л
- 0,8 мг/л
- 1 мг/л
- 2 мг/л

184. Выберите правильный вариант ответа

Пациенты при флюорозе жалуются на

- изменение цвета зубов
- повышенную чувствительность
- стертость зубов
- подвижность зубов

185. Выберите правильный вариант ответа

Назовите местный кариесогенный фактор

- диета
- функциональное состояние зубов
- экстремальные воздействия
- зубной налет

186. Выберите правильный вариант ответа

Край искусственной коронки при правильном положении

- доходит до уровня десневого края
- не доходит до уровня десневого края
- погружается в десневой карман на 0,5 мм
- погружается в десневой карман на 1 – 1,5 мм

187. Выберите правильный вариант ответа

Бруксизм это

- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании

188. Выберите правильный вариант ответа

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения

- хроническая травма слизистой оболочки
- 189. Выберите правильный вариант ответа**
Диастема - это расстояние между
- центральными резцами более 1 мм
 - центральными и боковыми резцами более 1 мм
 - премолярами более 1 мм
 - премолярами и молярами больше 1 мм
- 190. Выберите правильный вариант ответа**
Ложный пародонтальный карман характерен для
- пародонтита
 - пародонтоза
 - катарального гингивита
 - гипертрофического гингивита
- 191. Выберите правильный вариант ответа**
Основным местным фактором риска возникновения гингивита является
- наследственность
 - наличие микробного налета
 - вредные привычки
 - подвижность зубов
- 192. Выберите правильный вариант ответа**
Заболевание, предшествующее пародонтиту
- периодонтит
 - гингивит
 - стоматит
 - травма
- 193. Выберите правильный вариант ответа**
Воспалительное заболевание пародонта
- пародонтоз
 - пародонтит
 - пародонтома
 - пародонтолиз
- 194. Выберите правильный вариант ответа**
Системные заболевания, обуславливающие заболевания пародонта
- вирусные
 - грибковые
 - органов дыхания
 - сахарный диабет, заболевания крови
- 195. Выберите правильный вариант ответа**
Формирование корня после прорезывания постоянного зуба завершается через
- 3-4 года
 - 2 года
 - 6 месяцев
 - 1 год
- 196. Выберите правильный вариант ответа**
Количество слюны, секретлируемое в норме в сутки (в мл)
- 100
 - 200
 - 800
 - 1500
- 197. Выберите правильный вариант ответа**
Характерные боли для острых форм пульпита
- постоянные, нарастающие от холодного

- приступообразные, самопроизвольные, усиливаются от раздражителей и ночью
 - кратковременные от раздражителей, быстро проходящие
 - пульсирующие постоянного характера
- 198. Выберите правильный вариант ответа**
Лечение острого остеомиелита предусматривает
- антибиотики и мажевые повязки
 - создание оттока экссудата из периодонта
 - общее лечение организма и антибиотики
 - удаление «причинных» зубов и общее лечение
- 199. Выберите правильный вариант ответа**
Наиболее целесообразные действия врача при медикаментозном стоматите
- назначение внутрь антигистаминных препаратов
 - отмена лекарств
 - назначение антисептика в виде аппликаций или полосканий
 - назначение стероидных гормонов
- 200. Выберите правильный вариант ответа**
Диагноз «контактный стоматит» ставится на данных
- анамнеза
 - клинических симптомов
 - лабораторных анализов
 - дополнительных методов исследования
- 201. Выберите правильный вариант ответа**
Действие врача при стоматите, вызванном протезом
- изъятие протеза сроком на 2-3 недели
 - покрытие поверхности протеза специальными инертными составами
 - назначение противовоспалительных медикаментозных средств
 - замена протеза
- 202. Выберите правильный вариант ответа**
Изменение цвета слизистой оболочки на ограниченном участке
- корка
 - налет
 - пятно
 - бугорок
- 203. Выберите правильный вариант ответа**
Полостное образование, имеющее соединительнотканную капсулу и эпителиальную выстилку
- киста
 - пузырь
 - волдырь
 - афта
- 204. Выберите правильный вариант ответа**
Этиологию лейкоплакии связывают с
- вирусной инфекцией
 - аутоенсибилизацией

- врожденными и генетически обусловленными заболеваниями
- травмой и местными раздражителями
- 205. Выберите правильный вариант ответа**
При лейкоплакии поражается
- только кожа
- слизистые оболочки полости рта
- кожа и слизистые оболочки
- альвеолярный отросток
- 206. Выберите правильный вариант ответа**
При среднем кариесе боли после устранения раздражителя
- усиливаются
- держатся 20 минут
- исчезают
- держатся 10 минут
- 207. Выберите правильный вариант ответа**
Поверхностный кариес возникает на месте
- белого пятна
- неизменного участка
- эрозии
- гипоплазии
- 208. Выберите правильный вариант ответа**
К 4-му классу по Блеку относятся кариозные полости
- на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения целостности режущего края
- в пришеечной области резцов и клыков
- в слепых ямках резцов
- на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края
- 209. Выберите правильный вариант ответа**
Болезненная перкуссия характерна для пульпита
- острого серозного
- хронического фиброзного
- хронического гипертрофического
- острого гнойного
- 210. Выберите правильный вариант ответа**
При остром пульпите провоцируют боль

- прикосновение к зубу
- температурные раздражители
- накусывание на зуб
- раздражители в области триггерных зон
- 211. Выберите правильный вариант ответа**
Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает удаление пульпы
- коронковой
- корневой
- коронковой и корневой
- половины корневой
- 212. Выберите правильный вариант ответа**
По распространенности процесса пародонтит бывает
- генерализованный и локализованный
- генерализованный
- хронический и обострившийся
- острый и хронический
- 213. Выберите правильный вариант ответа**
Основные клинические признаки пародонтита
- кровоточивость десен, подвижность зубов, выделение гноя из десневых карманов
- обнажение шеек зубов и повышенная их чувствительность, отсутствие воспаления десны, отсутствие подвижности зубов
- подвижность зубов, болезненность и кровоточивость десен
- отсутствие зубодесневых карманов, подвижность зубов, гиперемия десны
- 214. Выберите правильный вариант ответа**
Особенностью рентгенологической картины костной ткани при легкой степени пародонтита является
- резорбция компактных пластинок и резорбция межальвеолярных перегородок до трети длины корня
- резорбция костной ткани альвеолярного отростка на половину длины корня
- изменений костной ткани альвеолярного отростка нет
- резорбция компактных пластинок

3. Умение квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза

- 215. Выберите правильный вариант ответа**
Кюретаж зубодесневых карманов проводят при
- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтите средней степени тяжести
- гипертрофическом гингивите
- 216. Выберите правильный вариант ответа**
Декубитальная язва образуется при
- механическом повреждении тканей
- нарушении трофики тканей
- туберкулезном поражении

- лучевом поражении
- 217. Выберите правильный вариант ответа**
Электровозбудимость пульпы при среднем кариесе (в мкА)
- 2-6
- 10-12
- 20-30
- 80-100
- 218. Выберите правильный вариант ответа**
Дистопия - это
- зуб неправильно расположен в зубном ряду

- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет

219. Выберите правильный вариант ответа

Основную часть слюны у человека выделяют слюнные железы

- околоушные
- подчелюстные
- подъязычные
- малые слюнные железы

220. Определите правильную последовательность

- 1: жалобы
- 2: анамнез болезни
- 3: анамнез жизни
- 4: оценка общего состояния
- 5: экстраоральный осмотр
- 6: степень открывания рта
- 7: интраоральный осмотр

221. Выберите правильный вариант ответа

Обследование пациента в стоматологическом кабинете начинается с

- перкуссии
- пальпации
- опроса
- осмотра

222. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительным методом обследования является

- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография

223. Выберите правильный вариант ответа

Первая жалоба при остром перикороните

- боли при открывании рта
- боли при глотании
- боли в области зуба мудрости
- плохое самочувствие

224. Выберите правильный вариант ответа

При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов

- фтора
- карбонатов
- кальция
- натрия

225. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей

- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания

226. Выберите правильный вариант ответа

Аппликационное обезболивание – это

- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу

227. Выберите 2 правильных ответа

Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена

- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса
- на восстановление утраченной функции
- на восстановление отсутствующих зубов

228. Выберите правильный вариант ответа

Фторлак применяется для

- профилактики кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита
- лечения заболеваний пародонта

229. Выберите правильный вариант ответа

Противопоказание к герметизации фиссур

- фиссурный кариес
- гипосаливация
- глубокие фиссуры
- неоконченная минерализация зуба

230. Выберите правильный вариант ответа

Проведение реминерализующей терапии подразумевает

- эндогенная безлекарственная профилактика
- экзогенная безлекарственная профилактика
- эндогенная лекарственная профилактика
- экзогенная лекарственная профилактика

231. Выберите правильный вариант ответа

Реминерализующую терапию с целью профилактики следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

232. Выберите правильный вариант ответа

Эндемическое заболевание – это

- гипоплазия
- патологическая стираемость
- кислотный некроз
- флюороз

233. Выберите правильный вариант ответа

Поверхности клиновидного дефекта

- шероховатые, светлые
- мягкие, темные
- гладкие, твердые
- мягкие, блестящие

234. Выберите правильный вариант ответа

Характерное течение при остром гнойном одонтогенном периостите челюсти

- медленное вялое
- бурное развитие и быстрое разрешение процесса
- бурное развитие, но медленное разрешение процесса
- медленное развитие и быстрое разрешение воспалительного процесса

235. Выберите правильный вариант ответа

Для безболезненного эндодонтического вмешательства на молярах нижней челюсти целесообразно провести обезболивание

- аппликационное
- проводниковое
- инфильтрационное
- общее

236. Выберите правильный вариант ответа

Распад пульпы из канала удаляется

- дробно, по частям
- одномоментно
- в 2 посещения
- в 3 посещения

237. Выберите правильный вариант ответа

На рентгенограмме определяется равномерное расширение периодонтальной щели с четким ее контуром при

- хроническом гранулематозном периодонтите
- хроническом гранулирующем периодонтите
- хроническом фиброзном периодонтите
- хроническом стоматите

238. Выберите правильный вариант ответа

Метод витальной экстирпации пульпы заключается

- в удалении некротизированной пульпы без анестезии
- в удалении пульпы после девитализации
- в удалении коронковой пульпы после девитализации
- в удалении "живой" пульпы под анестезией

239. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых каналов можно использовать

- дистиллированную воду
- гипохлорит натрия
- физиологический раствор
- эфир

240. Выберите правильный вариант ответа

Местные анестетики, обладающий наибольшей длительностью действия, но не используемый у детей

- бупивакаин
- мепивакаин
- лидокаин

- артикаин

241. Выберите правильный вариант ответа

Поверхность реставрируемого зуба при выборе цвета композита должна быть

- естественно увлажненной
- сухой
- пересушенной
- закрытой

242. Выберите правильный вариант ответа

Для антисептической обработки корневых каналов эффективнее использовать поочередное сочетание

- дистиллированную воду и перекись водорода
- гипохлорит натрия и перекись водорода
- физиологический раствор и эфир
- эфир и гипохлорит натрия

243. Выберите правильный вариант ответа

Окрашивание очага деминерализации эмали раствором метиленового синего происходит вследствие

- повышения проницаемости эмали в зоне поражения
- снижения pH зубного налета
- разрушения поверхностного слоя эмали
- колонизации бактерий на поверхности зуба

244. Выберите правильный вариант ответа

При отсутствии реакции на ток до 100 мкА можно предположить заболевание

- гангренозный пульпит
- глубокий кариес
- хронический периодонтит
- интактный зуб

245. Выберите правильный вариант ответа

Канал при лечении пульпита пломбируют

- до физиологического апикального отверстия
- до анатомического апикального отверстия
- за апикальное отверстие
- через апикальное отверстие

246. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров

- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс

247. Выберите правильный вариант ответа

Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках

- 1 класс
- 2 класс
- 4 класс
- 5 класс

248. Выберите правильный вариант ответа

Ведущий диагностический признак хронического периодонтита временного зуба

- отек переходной складки
- подвижность зуба
- рентгенологические изменения
- боль от холодного

249. Выберите правильный вариант ответа

Температурная проба применяется для диагностики

- периодонтита
- пульпита
- пародонтита
- гингивита

250. Выберите правильный вариант ответа

Хронический пульпит

- фиброзный
- очаговый
- диффузный
- гранулематозный

251. Выберите правильный вариант ответа

Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают своё формирование

- к 10 годам
- к 12 годам
- к 13 годам
- к 15 годам

252. Выберите правильный вариант ответа

Символом спирали в системе ISO (International Standard Organization) обозначается

- Н-файл
- каналонаполнитель Лентулло
- ример
- К-файл

253. Выберите правильный вариант ответа

Причиной диастемы постоянного прикуса является

- скученность зубов
- укороченная уздечка верхней губы
- макроденития
- мелкое преддверие полости рта

254. Выберите правильный вариант ответа

Цветовое кодирование Н-файла, имеющего диаметр 035, 070, 130

- желтый
- синий
- черный
- зелёный

255. Выберите правильный вариант ответа

Для контактного аллергического стоматита характерно

- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- положительная накожная проба
- наличие гиперемии и отека
- наличие эрозий или пузырей

256. Выберите правильный вариант ответа

Ретракционная нить применяется для

- отодвигания десны с целью обеспечения сухости рабочего поля
- очистки межзубных промежутков

- временного шинирования челюстей

- наложения внутриротовых швов

257. Выберите правильный вариант ответа

К съёмным протезам, кроме пластиночных, относятся

- мостовидные протезы
- бюгельные протезы
- штифтовые зубы
- вкладки

258. Выберите правильный вариант ответа

Зубное протезирование относится к виду стоматологической помощи

- ортопедический
- терапевтический
- хирургической
- ортодонтической

259. Выберите правильный вариант ответа

Пластмассовые коронки по сравнению с металлическими более

- эстетичные
- прочные
- гигиеничные
- долговечные

260. Выберите правильный вариант ответа

Количество классов в классификации полостей по Блэку

- три
- четыре
- пять
- семь

261. Выберите правильный вариант ответа

Искусственная коронка – это

- несъёмный протез
- гипсовый оттиск
- съёмный протез
- частично съёмный протез

262. Выберите правильный вариант ответа

Адентия зубов относится к аномалиям

- количества зубов
- сроков прорезывания зубов
- структуры зубов
- положения зубов

263. Выберите правильный вариант ответа

Один из важных клинических признаков перелома нижней челюсти

- нарушение прикуса при сомкнутых челюстях
- невозможность закрыть рот
- глубокое перекрытие нижних зубов верхними
- дистальный сдвиг нижней челюсти

264. Выберите правильный вариант ответа

Фиксация эластических слепочных материалов к ложке осуществляется путем

- использование перфорированных ложек
- обклеивание краев ложки воском
- смазывания ложки мономером
- нанесение на ложку адгезива

265. Выберите правильный вариант ответа

Использованные при анестезии карпулы относятся к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

266. Выберите правильный вариант ответа

Радиоактивные медицинские отходы – это класс

- «Б»
- «В»
- «Г»
- «Д»

267. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов
- 24 часа
- 72 часа
- 1 неделя

268. Выберите правильный вариант ответа

Эмпатия это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров
- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

269. Выберите правильный вариант ответа

Интерес к партнеру по общению на невербальном уровне можно выразить

- интенсивно жестикулируя
- пронзительным голосом
- наклонив голову в сторону
- пристальным взглядом

270. Выберите правильный вариант ответа

Информацию о внутренних переживаниях, эмоциональном состоянии человека представляют

- в равной степени вербальные и невербальные средства коммуникации
- в большей степени вербальные средства
- в большей степени невербальные средства
- интуиция

271. Выберите правильный вариант ответа

Использованные иглы для карпульного инъектора относятся к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

272. Выберите правильный вариант ответа

Инфильтрационная анестезия не эффективна в области

- 17 - 16 зубов
- 13 - 23 зубов

43 - 33 зубов

36 - 38 зубов

273. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании

- обязательном медицинском
- добровольном медицинском
- возвратном
- социальном

274. Выберите правильный вариант ответа

Поликлиника оказывает населению помощь

- социальной
- первичную лечебно-профилактическую
- санитарно-противоэпидемическую
- стационарную

275. Выберите правильный вариант ответа

Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

276. Выберите правильный вариант ответа

Основные законодательные документы по охране здоровья граждан в РФ

- Конституция РФ, Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ
- Этический кодекс медицинской сестры России
- Трудовой и Уголовный кодекс
- СанПиНы

277. Выберите правильный вариант ответа

Пациент самостоятельно принимает решение о согласии на медицинское вмешательство при достижении им возраста

- 15 лет
- 14 лет
- без ограничения
- 12 лет

278. Выберите правильный вариант ответа

Показатели артериального давления в норме менее

- 120/80
- 130/80
- 139/85
- 140/90

279. Выберите правильный вариант ответа

Для моделирования контактной поверхности зуба при пломбировании используют

- матрицу
- плаггер
- штопфер
- штрипсы

280. Выберите правильный вариант ответа

Галогеновые лампы используют для

- полимеризации композита
- реминерализации эмали

- полимеризации амальгамы
 полимеризации фосфат-цемента
- 281. Выберите правильный вариант ответа**
 Для адгезии композитного материала при реставрации используется
- бондиговая система
 фосфорная кислота
 антисептические препараты
 препараты фторида натрия
- 282. Выберите правильный вариант ответа**
 Усадка светоотверждаемого композита происходит в сторону
- источника света
 полости зуба
 от источника света
 независимую от источника света
- 283. Выберите 2 правильных ответа**
 Для расширения корневого канала по диаметру применяют
- К-ример
 К-файл
 Н-файл
 спредер
 плагер
 анкерный штифт
- 284. Выберите правильный вариант ответа**
 При пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи применяют
- Н-файл
 спредер
 плагер
 пульпоэкстрактор
- 285. Выберите правильный вариант ответа**
 Символом К-римера является:
- треугольник
 квадрат
 круг
 ромб
- 286. Выберите правильный вариант ответа**
 Символом Н-файла является
- треугольник
 квадрат
 круг
 ромб
- 287. Выберите правильный вариант ответа**
 Консервативное лечение периодонтита может быть успешным в случае
- полноценного пломбирования канала
 не полностью запломбированного канала
 лечения причинного зуба в одно посещение
 длительного наблюдения за состоянием периодонта
- 288. Выберите правильный вариант ответа**
 Отсутствие контактного пункта между зубами ведёт к развитию
- локализованному пародонтиту

- генерализованному пародонтозу
 генерализованному пародонтиту
 декубитальной язве
- 289. Выберите правильный вариант ответа**
 Пародонтальные карманы при пародонтозе:
- отсутствуют
 менее 3 - 5 мм
 более 5 мм
 более 7 мм
- 290. Выберите правильный вариант ответа**
 При артериальном кровотечении жгут накладывают
- ниже раны
 на рану
 выше раны
 ниже и выше раны
- 291. Выберите правильный вариант ответа**
 Инструмент «Штопфер-гладилка» используют для
- пломбирования полости
 замешивания пломбировочных материалов
 сепарации круговой связки зуба
 удаления пломбы из полости
- 292. Выберите правильный вариант ответа**
 Количество зубов в постоянном прикусе
- 18-20
 26-27
 28-32
 20-30
- 293. Выберите правильный вариант ответа**
 Ятрогенными называются заболевания, вызванные
- неосторожным действием врача
 снижением иммунной защиты
 стрессом
 специфическими микробными агентами
- 294. Выберите правильный вариант ответа**
 Число сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме
- 60 - 80
 49 - 60
 90 - 100
 100 - 120
- 295. Выберите правильный вариант ответа**
 Артериальное давление зависит
- как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной стенки сосуда
 только от силы сокращения сердца
 только от тонуса артериальной стенки
 только от частоты сокращений сердца
- 296. Выберите правильный вариант ответа**
 Универсальная проба для проверки медицинского инструментария на наличие скрытой крови называется
- азопирамовой
 бензидиновой
 фенолфталеиновой
 бензойной

297. Выберите правильный вариант ответа

Уровень обработки рук медицинской сестры перед выполнением инъекции

- гигиенический
- социальный
- стерильный
- хирургический

298. Выберите правильный вариант ответа

Длительность использования накрытого стерильного стола в часах

- 6
- 24
- 18
- 12

299. Выберите правильный вариант ответа

Асептика- это

- предупреждение попадания инфекции в рану или организм пациента
- специальный уход за пациентом
- уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
- дезинфекция инструментов

300. Выберите правильный вариант ответа

Генеральная уборка процедурного кабинета проводится

- 1 раз в неделю
- через день
- 1 раз в месяц
- по мере загрязнения

301. Выберите правильный вариант ответа

Медицинские инструменты в крафт-пакете сохраняют стерильность в течение

- 3 суток
- 1 суток
- 10 суток
- 7 суток

302. Выберите правильный вариант ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- переливание инфицированной крови
- рукопожатие
- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых

303. Выберите правильный вариант ответа

В "упаковочном" отделении ЦСО проводят

- укладку материала в биксы для стерилизации
- закладывание биксов в автоклав
- контроль качества предстерилизационной очистки
- предстерилизационную очистку

304. Выберите правильный вариант ответа

Предстерилизационную очистку медицинского инструментария проводят в

- "моечном" отделении ЦСО
- "упаковочном" отделении ЦСО
- "автоклавном" отделении ЦСО
- "приемном" отделении ЦСО

305. Выберите правильный вариант ответа

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется

- стерилизацией
- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией

306. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения закрытого стерильного бикса без фильтра

- 3 суток
- 1 сутки
- 6 часов
- 20 суток

307. Выберите правильный вариант ответа

Антисептика - это комплекс мероприятий

- по борьбе с инфекцией в ране
- по профилактике попадания инфекции в рану
- по дезинфекции инструментов
- по профилактике попадания инфекции на руки

308. Выберите правильный вариант ответа

Инъекционное поле обрабатывают

- 70 процентным спиртом
- 40 процентным спиртом
- 90 процентным спиртом
- 96 процентным спиртом

309. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация воздушным методом изделий из стекла и металла

- t-180 град. С, время-60 мин
- t-180 град. С, время- 120 мин
- t-160 град, С время- 60 мин
- t-160 град, С время - 120 мин

310. Выберите правильный вариант ответа

Подсушивание инструментов в ЦСО перед стерилизацией проводится

- в сухожаровом шкафу или на простынях на воздухе
- в автоклаве
- в кварцевой камере
- не проводится

311. Выберите правильный вариант ответа

В ЦСО азопирамовая проба с целью самоконтроля проводится

- ежедневно в каждой партии инструментария
- один раз в неделю в каждой партии инструментария
- два раза в неделю в каждой партии инструмента
- один раз в месяц в каждой партии инструментария

312. Выберите правильный вариант ответа

Срок хранения стерильности невостребованного инструмента при хранении его в УФ - бактерицидных камерах составляет

- 7 суток

- 5 суток
- 3 суток
- 1 сутки

313. Выберите правильный вариант ответа

Стоматологические инструменты после стерилизации химическим способом ополаскивают

- стерильной дистиллированной водой
- кипяченой водой

- стерильной водой
- проточной водой

314. Выберите правильный вариант ответа

Положительная азопирамовая проба дает окрасивание

- фиолетовое
- оранжевое
- ярко-зелёное
- жёлтое

4. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации и использование её для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

315. Выберите правильный вариант ответа

Решающим тестом в дифференциальной диагностике хронического периодонтита и пульпита является

- перкуссия
- характер болей
- рентгенодиагностика
- зондирование

316. Выберите правильный вариант ответа

Сроки прорезывания третьих постоянных моляров

- 6 лет
- 8-9 лет
- 9-10 лет
- 14-20 лет

317. Выберите правильный вариант ответа

Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

318. Выберите правильный вариант ответа

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

319. Выберите правильный вариант ответа

К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат
- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

320. Выберите правильный вариант ответа

Матрицы применяются с целью

- уменьшения количества материала
- улучшения цветостойкости
- формирования контуров пломбы

- косметического эффекта

321. Выберите правильный вариант ответа

Депон анестетика при проведении инфильтрационной анестезии для удаления зуба создается

- в сосудистом русле
- в подслизистом слое
- под надкостницей
- внутрикостно

322. Выберите правильный вариант ответа

Угол наклона иглы к альвеолярному отростку при инфильтрационной анестезии составляет

- 30 градусов
- 45 градусов
- 60 градусов
- 90 градусов

323. Выберите правильный вариант ответа

Мандибулярная анестезия исключает болевую чувствительность

- моляров
- моляров и премоляров
- всех зубов нижней челюсти с данной стороны
- всех зубов кроме резцов

324. Выберите правильный вариант ответа

Целесообразно использовать для аппликационной анестезии на слизистой оболочке раствор

- 2% лидокаина
- 5% лидокаина
- 10% лидокаина
- 5% новокаина

325. Выберите правильный вариант ответа

Показания к применению композитов

- кариозные полости всех классов
- изолирующие прокладки
- временные пломбы
- для корневых каналов

326. Выберите правильный вариант ответа

Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы

силикатные цементы

эвикрол

327. Выберите правильный вариант ответа

Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

светотвердеющие материалы

цинкофосфатные цементы

фосфатные

силикофосфатные

328. Выберите правильный вариант ответа

Толщина слоя светоотверждаемого композита при послойном нанесении

4 мм

2 мм

1 мм

5 мм

329. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека уничтожается

при нагревании до 56 градусов Цельсия 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты

при высушивании, при облучении в течение 3 суток

при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода

при промывании проточной водой

330. Выберите правильный вариант ответа

Дезинфекция - это уничтожение

патогенных микроорганизмов

всех микроорганизмов

бактерий

анаэробных бактерий

331. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация - это уничтожение

вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов

патогенных бактерий

микробов на поверхности

микробов внутри

332. Выберите правильный вариант ответа

Применяют для высушивания корневых каналов штифты

гуттаперчевые

резиновые

деревянные

бумажные

333. Выберите 2 правильных ответа

Парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания

простой герпес

гепатит А

гепатит В

гепатит С

грипп

334. Выберите правильный вариант ответа

Температура (градусов по Цельсию) воздуха при стерилизации воздушным методом

120-140

160-180

200-220

240-260

335. Выберите правильный вариант ответа

В автоклаве стерилизация осуществляется методом

воздушным

паровым

химическим

газовым

336. Выберите правильный вариант ответа

Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом

воздушным

паровым

химическим

газовым

337. Выберите правильный вариант ответа

При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

остатков моющих средств

микроорганизмов

слюны

крови

338. Выберите правильный вариант ответа

При аппликационной анестезии анестетик применяется

поверхностно, на слизистую оболочку полости рта

вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца

внутривенно

ингаляционно

339. Выберите правильный вариант ответа

Шпатель предназначен для

уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости

растирания и замешивания пломбировочных материалов

удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости

удержания мягких тканей полости рта

340. Выберите правильный вариант ответа

Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

одноразовые кисточки

полировочные головки

полировочные штрипсы

суперфлоссы

341. Выберите правильный вариант ответа

Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдают в соотношении

указанном в инструкции

увеличением количества жидкости

увеличением количества порошка

в произвольных соотношениях

342. Установите соответствие

пальпация	подвижность тканей и органов, наличие уплотнений, состояние лимфатических узлов
перкуссия	состояние верхушечного периодонта
зондирование	расположение устьев каналов

343. Установите соответствие

кариес	С
пульпит	Р
периодонтит	Pt
	Г

344. Установите соответствие

инвазивный метод	поверхностная пигментация стенок фиссур
неинвазивный метод	открытые фиссуры, доступные для визуального осмотра, без пигментации и кариозного процесса
профилактическое пломбирование	начальный кариес при отсутствии признаков его стабилизации
	средний кариес

345. Определите соответствие степени ожога и клинической картины

1-я степень	покраснение и отёк кожи
2-я степень	образование пузырей с серозной жидкостью
3-я степень	поражены все слои кожи
4-я степень	поражена кожа и подлежащие ткани

346. Определите правильную последовательность

- 1: введение адреналина
- 2: введение кортикостероидного гормона
- 3: установка капельницы с р-ром глюкозы
- 4: введение антигистаминных препаратов
- 5: введение эуфилина
- 6: симптоматическое лечение

347. Определите правильную последовательность

- 1: дезинфекция
- 2: механическая очистка под проточной водой
- 3: предстерилизационная очистка
- 4: промывание под проточной водой
- 5: ополаскивание в дистиллированной воде
- 6: высушивание
- 7: стерилизация

348. Установите соответствие

дислокационная	западение языка при смещении отломков нижней челюсти
обтурационная	закрытие трахеи кровяным сгустком, инородным телом
стенотиче-	сдавление трахеи гематомой,

ская	инфильтратом
клапанная	закрытие входа в гортань лоскутом мягких тканей
аспирационная	вдыхание крови и рвотных масс

349. Выберите правильный вариант ответа

Сосудосуживающий эффект обеспечивается

- викасолом
- адреналином
- димедролом
- хлористым кальцием

350. Выберите правильный вариант ответа

Выдавливать фурункул на лице нельзя потому что

- после заживания остаются рубцы на лице
- замедляется заживание
- озлокачествление
- возникновение общих тяжелых осложнений

351. Выберите правильный вариант ответа

Асфиксия – это

- вид травмы ЧЛО
- вид ожога
- удушье
- потеря памяти

352. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее часто аллергические реакции развиваются при использовании для местного обезболивания

- новокаина
- лидокаина
- тримекаина
- ультракаина

353. Выберите правильный вариант ответа

Ранение сосудов при проводниковой анестезии приводит к

- возникновению болей
- возникновению парестезии
- образованию некроза
- образованию гематомы

354. Выберите правильный вариант ответа

При обмороке вводят под кожу

- 0,5 мл адреналина
- 1 мл кордиамина
- 2 мл димедрола
- 2 мл эуфиллина

355. Выберите правильный вариант ответа

К воспалительным заболеваниям пародонта относятся

- пульпит, периодонтит
- гингивит, пародонтит
- периодонтит, сиалоаденит
- стоматит, хейлит

356. Выберите правильный вариант ответа

Клиническая коронка зуба- это

- часть зуба, которая выступает над десной
- часть зуба, покрытая эмалью
- часть зуба под десной

часть зуба покрытая цементом

357. Выберите правильный вариант ответа

Начальной стадией кариеса является

реминерализация

резистенция

минерализация

деминерализация

358. Выберите правильный вариант ответа

По международной системе обозначения зу-

бов каждый зуб обозначается цифрами

одной

двумя

тремя

четырьмя

359. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле кариес обозначается сим-

волом

Ks

C

Ka

Car

360. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле пародонтит обозначается

символом

A

P

Pt

И

361. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле интактный зуб обозначает-

ся символом

C

0

И

установленный символ отсутствует

362. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле искусственный зуб обозна-

чается символом

Иск

0

И

установленный символ отсутствует

363. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле искусственная коронка зу-

ба обозначается символом

Иск

C

K

И

364. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле корень разрушенного зуба

обозначается символом

Ks

C

K

R

365. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле периодонтит обозначается

символом

P

П

R

Pt

366. Выберите правильный вариант ответа

В зубной формуле пульпит обозначается сим-

волом

P

П

R

Pt

367. Выберите правильный вариант ответа

Пульпит молочного зуба в зубной формуле

обозначается символом

P

П

Pt

X

368. Выберите правильный вариант ответа

Кариес молочного зуба в зубной формуле

обозначается символом

C

Kм

Ka

Ks

369. Выберите правильный вариант ответа

Удаленный зуб в зубной формуле обозначает-

ся символом

0

R

S

Y

370. Выберите правильный вариант ответа

Отсутствующий зуб у взрослого в зубной

формуле обозначается символом

X

0

R

Y

371. Выберите правильный вариант ответа

Пломба в зубной формуле обозначается сим-

волом

P

П

Pt

Пл

372. Выберите правильный вариант ответа

Штифты для пломбирования корневых кана-

лов

гуттаперчевые

резиновые

стеклянные

деревянные

373. Выберите правильный вариант ответа

Центральные резцы на нижней челюсти (мо-

лочные зубы) прорезываются

- 8 - 12мес
- 6 -8мес
- 16-20мес
- 12-14 мес

374. Выберите правильный вариант ответа

Средние сроки прорезывания первого постоянного моляра

- 6 лет
- 9-10 лет
- 12-13 лет
- 11-13 лет

375. Выберите правильный вариант ответа

Корень зуба- это

- часть зуба покрытая цементом
- часть зуба покрытая эмалью
- часть зуба покрытая дентином
- часть зуба покрытая оболочкой

376. Выберите правильный вариант ответа

Главным при диагностике острого очагового пульпита является

- данные термодиагностики
- характер болей
- характер болей и фактор времени
- данные электроодонтодиагностики

377. Выберите правильный вариант ответа

Метод сохранения жизнеспособной пульпы в корневых каналах называется

- девитальная ампутация
- девитальная экстирпация
- витальная ампутация
- витальная экстирпация

378. Выберите правильный вариант ответа

Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

- массаж сердца
- искусственная вентиляция лёгких
- нитроглицерин под язык
- анальгин

379. Выберите правильный вариант ответа

При гипертоническом кризе вводят

- троксевазин
- нифедипин
- тетралгин
- адреналин

380. Выберите правильный вариант ответа

Основной симптом бронхиальной астмы

- одышка
- боль за грудиной
- приступ удушья
- приступ тахикардии

381. Выберите правильный вариант ответа

Необходимо ввести при приступе бронхиальной астмы

- эуфиллин
- нифедипин
- преднизолон
- диазолин

382. Выберите правильный вариант ответа

Ингалятор для снятия приступа бронхиальной астмы

- сальбутамол
- каметон
- бекотид
- ингалипт

383. Выберите правильный вариант ответа

Коллапс – это

- аллергическая реакция на антиген
- потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- воспалительная реакция

384. Выберите правильный вариант ответа

Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

- ввести фенобарбитал
- ввести седативные препараты
- ввести транквилизаторы
- ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка

385. Выберите правильный вариант ответа

Причиной постэкстракционного кровотечения не является

- повышение АД
- понижение АД
- снижение свёртываемости крови
- разрыв слизистой оболочки

386. Выберите правильный вариант ответа

Периостотомия при лечении гнойного периостита челюсти является

- обязательной
- желательной
- не желательной
- необязательной

387. Выберите правильный вариант ответа

При лечении фурункула до абсцедирования запрещено

- УФО
- УВЧ
- обработка спиртом
- обработка гепариновой мазью

388. Выберите правильный вариант ответа

Следует при перикоронарите и нормальном расположении третьего нижнего моляра

- удалить зуб
- провести иссечение «капюшона»
- сделать новокаиновую блокаду
- начать иглорефлексотерапию

389. Выберите правильный вариант ответа

Основным симптомом для диагностики перелома нижней челюсти является

- боль в области челюсти
- симптом ступеньки
- симптом крепитации
- патологическая подвижность отломков

390. Выберите правильный вариант ответа

- Симптомы при переломе нижней челюсти
- носовое кровотечение, западание фрагментов челюсти, боль
 - смещение отломков челюсти, нарушение прикуса, болевой симптом
 - затруднённое глотание, дыхание без нарушения прикуса
 - потеря сознания, кровотечение, боль

391. Выберите правильный вариант ответа

Положение больного без сознания с повреждением челюстно-лицевой области при транспортировке

- сидя
- лёжа на спине
- лёжа на животе
- полусидя

392. Выберите 2 правильных ответа

Специализированная помощь при травмах челюстей

- оперативное вмешательство, репозиция
- наложение повязок, общее лечение
- наложение шинирующих аппаратов
- общее лечение, обезболивание
- симптоматическое лечение
- иммобилизация, обезоливание

393. Выберите правильный вариант ответа

В начале терапии анафилактического шока показано

- аминазин подкожно
- раствор адреналина внутривенно (внутримышечно)
- кофеин бензоат натрия внутримышечно
- введение больших доз кортикостероидов

394. Выберите правильный вариант ответа

Причина расширения показаний к удалению молочных зубов с хроническим воспалительным очагом в периодонте у детей

- дают частые обострения
- приводят к гибели зачатков постоянных зубов
- невозможно провести качественное консервативное лечение
- потому что молочные зубы заменяются постоянными

395. Выберите правильный вариант ответа

Неотложное состояние, требующее немедленного введения гормонов

- анафилактический шок
- обморок
- эпилептический припадок
- коллапс

396. Выберите правильный вариант ответа

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

- ввести подкожно раствор кофеина
- уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

397. Выберите правильный вариант ответа

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

- неминерализованным
- минерализованным
- смешанным
- пищевым

398. Определите правильную последовательность

1: образование пелликулы на очищенной поверхности зуба

2: прикрепление бактерий к пелликуле зуба

3: рост бактерий и образование зубной бляшки

4: образование минерализованных зубных отложений

399. Выберите 2 правильных ответа

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- зубная бляшка
- зубной камень
- цемент корня
- дентин

400. Выберите правильный вариант ответа

Время чистки зубов составляет

- 1 минуту
- 3 минуты
- 1,5 минуты
- 15 минут

401. Выберите правильный вариант ответа

Для профилактики заболеваний пародонта чистить зубы необходимо

- 3-5 раз в день
- два раза – утром и вечером
- только вечером
- один раз утром

402. Выберите правильный вариант ответа

Основной недостаток зубных порошков

- быстрая загрязняемость микроорганизмами
- отсутствие пенообразования
- слабая абразивность
- неприятный вкус

403. Выберите правильный вариант ответа

При чистке аппроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- флоссы
- зубные щетки
- полоскания
- межзубные стимуляторы

404. Выберите правильный вариант ответа

Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости

- отсутствие срединного канала
 - возможность фигурной подстрижки
 - нет преимуществ
- 405. Выберите правильный вариант ответа**
Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие
- индивидуальной гигиены полости рта
 - профессиональной гигиены полости рта
 - профессиональной чистки зубов
 - контролируемой чистки зубов
- 406. Выберите правильный вариант ответа**
Использование флоссов рекомендуется с возраста
- 4-5
 - 6-8
 - 9-12
 - 15-16
- 407. Выберите правильный вариант ответа**
Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить
- утром
 - вечером
 - утром и вечером
 - в очищении нет необходимости
- 408. Выберите 2 правильных ответа**
К гигиеническим индексам относятся
- Грина-Вермильона
 - СРITN
 - Федорова-Володкиной
 - ПМА
 - КПИ
 - ПИ
- 409. Выберите правильный вариант ответа**
Замену зубной щетки проводят один раз в
- 12 месяцев
 - 1 месяц
 - 6 месяцев
 - 2-3 месяца
- 410. Выберите правильный вариант ответа**
В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки
- фторида натрия
 - эритрозина
 - глюконата кальция
 - аскорбиновой кислоты
- 411. Определите правильную последовательность**
- 1: очень мягкие
 - 2: мягкие
 - 3: средние
 - 4: жёсткие
 - 5: очень жёсткие
- 412. Выберите правильный вариант ответа**
Фторидсодержащие зубные пасты рекомендуется использовать детям с возраста (лет)
- 1,5 - 2

- 3 – 4
 - 5 – 6
 - 10 – 12
- 413. Выберите правильный вариант ответа**
Противокариозные зубные пасты содержат
- кальций, фтор
 - кору дуба
 - экстракт ромашки
 - водоросли
- 414. Выберите правильный вариант ответа**
Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости
- мягкой и очень мягкой
 - жесткой
 - средней жесткости
 - любой
- 415. Выберите правильный вариант ответа**
Оптимальное содержание фтора в питьевой воде
- 0,1 мг/л
 - 1 мг/л
 - 5 мг/л
 - 10 мг
- 416. Выберите правильный вариант ответа**
Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки
- очень мягкие
 - очень жесткие
 - средней жесткости
 - жёсткие
- 417. Выберите два правильных варианта ответов**
Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены
- зубная бляшка
 - поддесневой зубной камень
 - наддесневой зубной камень
 - белое вещество
 - биоплёнка
 - мягкий зубной налёт
- 418. Выберите правильный вариант ответа**
Для механического удаления зубного камня используют
- боры, экскаваторы, плаггеры
 - экскаваторы, крючки, кюреты
 - долото, элеватор, зонд
 - эмалевые ножи, штопфер, гладилку
- 419. Выберите правильный вариант ответа**
Для удаления зубного камня используют инструменты
- скейлеры, кюреты, экскаватор
 - экскаватор, штопфер, гладилку
 - зонд, зеркало, пинцет
 - пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор
- 420. Выберите правильный вариант ответа**
Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатым воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

421. Выберите правильный вариант ответа

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

422. Выберите правильный вариант ответа

Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

423. Выберите правильный вариант ответа

Аттестация среднего медицинского работника проводится

- для установления ему соответствующей квалификационной категории
- для установления его соответствия занимаемой должности
- для решения вопроса о возможности его приема на работу
- для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста

424. Выберите правильный вариант ответа

Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

425. Выберите правильный вариант ответа

Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

426. Выберите правильный вариант ответа

Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

427. Выберите правильный вариант ответа

Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

428. Выберите правильный вариант ответа

За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание
- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

429. Выберите правильный вариант ответа

Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия;
- разрешения руководителя медицинского учреждения;
- требований родственников;
- наличия страхового полиса

430. Выберите правильный вариант ответа

Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- заверяется нотариусом

431. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма

- № 067/у
- № 043/у
- № 086/у
- № 237/у

432. Выберите правильный вариант ответа

Трудовой договор заключается

- в устной форме
- в письменной форме
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки
- в письменной форме с нотариальным удостоверением

433. Выберите правильный вариант ответа

Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме
- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

434. Выберите правильный вариант ответа

Основными признаками остановки сердца являются

- отсутствие пульса на сонной артерии

- остановка дыхания
- широкие зрачки
- узкие зрачки

435. Выберите правильный вариант ответа

Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий являются

- расширение зрачков
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- усиление цианоза
- судороги

436. Выберите правильный вариант ответа

От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- тщательная запись выполненных манипуляций
- сниженный преискурент

437. Выберите 2 правильных ответа

Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- зубной техник
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента
- родственники врача
- родственники техника

438. Выберите правильный вариант ответа

Состояние десны при хроническом гранулирующем периодонтите временного зуба

- не изменена
- на десне обнаруживается свищ
- обнаруживается абсцесс
- цианотична

439. Выберите 2 правильных ответа

Абсолютные противопоказания для проведения физиотерапевтического лечения

- хирургическое лечение болезней пародонта
- возраст до 12 лет
- онкологические заболевания
- инфекционные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой
- диспансерное наблюдение
- возраст до 15 лет

440. Выберите правильный вариант ответа

У пациента: обнажение шеек зубов, ретракция десны, отсутствие воспалительных изменений, отсутствие подвижности зубов, гиперестезия шеек зубов, зуд в деснах – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

441. Выберите правильный вариант ответа

У пациента: отечность, гиперемия десен, глубина пародонтальных карманов от 5 мм, гиперестезия шеек зубов, зуд в деснах – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

442. Выберите правильный вариант ответа

У пациента: отечность, гиперемия, болезненность и кровоточивость десен, пародонтальные карманы отсутствуют, большое количество минерализованных зубных отложений – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

443. Выберите правильный вариант ответа

От глубокого кариеса хронический фиброзный пульпит отличает наличие

- иногда возникающих самопроизвольных болей
- кратковременных причинных болей от горячего
- кратковременных причинных болей от холодного
- глубокой кариозной полости

444. Выберите правильный вариант ответа

Состояние зубодесневого прикрепления при хроническом катаральном гингивите на нижней челюсти у детей

- не нарушено, круговая связка зуба не повреждена
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной до 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,5 мм
- имеются истинные зубодесневые карманы глубиной более 3,0 мм

445. Выберите правильный вариант ответа

У пациента иногда возникающие самопроизвольные боли, болевые приступы, возникающие при переходе из холодного помещения в тёплое – это клинические признаки

- периодонтита
- стоматита
- гингивита
- пульпита