

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к приказу министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 01.12.2025 № 3392-НПА

МАРШРУТИЗАЦИЯ
пациентов с острым коронарным синдромом в зависимости от почечной функции и пациентов с хронической болезнью почек, получающих лечение методом программного гемодиализа, при стабилизации течения острого коронарного синдрома

№	ВАРИАНТ ОКС	ЭТАПЫ МАРШРУТИЗАЦИИ				
		1.	2.	3.	4.	5.
1	ОКС с подъемом ST, инвазивная стратегия	Госпитализация в РСЦ по месту взятия	ЧКВ	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЗПТ в ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» (ПСО № 10)
					ХБП с критическим снижением почечной функции	ЗПТ в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (РСЦ № 9)
					ХБП с умеренно сниженной почечной функции	Наблюдение, консервативное лечение
2	ОКС с подъемом ST, фармако-инвазивная стратегия	Догоспитальный тромболизис	Госпитализация в РСЦ и ПСО по месту жительства	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЧКВ и ЗПТ в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)
					ХБП с критическим снижением почечной функции	
					ХБП с умеренно сниженной почечной функции	ЧКВ в РСЦ по месту прикрепления
3	ОКС без подъема ST, крайне высокий риск	Госпитализация в РСЦ по месту взятия	ЧКВ	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЗПТ в ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» (ПСО № 10)
					ХБП с критическим снижением почечной функции	ЗПТ в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (РСЦ № 9)
					ХБП с умеренно сниженной почечной функции	Наблюдение, консервативное лечение
		Госпитализация в ПСО по месту взятия	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЧКВ в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)	ЗПТ
				ХБП с критическим снижением почечной функции		

№	ВАРИАНТ ОКС	ЭТАПЫ МАРШРУТИЗАЦИИ				
		1.	2.	3.	4.	5.
				ХБП с умеренно сниженной почечной функции	ЧКВ в РСЦ по месту прикрепления	Наблюдение, консервативное лечение
4	ОКС без подъема ST, высокий риск	Госпитализация в РСЦ и ПСО по месту взятия	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЧКВ в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)	ЗПТ
				ХБП с критическим снижением почечной функции		
				ХБП с умеренно сниженной почечной функции	ЧКВ в РСЦ по месту прикрепления	Наблюдение, консервативная тактика
5	ОКС без подъема ST, низкий риск	Госпитализация в РСЦ и ПСО по месту взятия	Оценка почечной функции	ГД-пациенты	ЧКВ после тщательной оценки соотношения риска и пользы данной процедуры, с учетом выраженности нарушения функции почек.	КАГ, ЧКВ в РСЦ по месту прикрепления с переводом в кардиологическое отделение, приближенное к диализному центру пациента
				ХБП с критическим снижением почечной функции		КАГ, ЧКВ в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)
				ХБП с умеренно сниженной почечной функции		КАГ, ЧКВ в РСЦ по месту прикрепления

Маршрутизация пациентов с ХБПс5д, получающих ЗПТ методом программного гемодиализа, при стабилизации течения ОКС
(определяется принадлежностью к амбулаторного диализному центру)

№	Диализный центр	Сосудистый центр
1	«Нефролайн-Новосибирск»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)
2	«Нефролайн-Сибирь»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)
3	«Нефролайн-Сибирь»	ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» (РСЦ № 8),
4	«Б.Браун»	ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (РСЦ № 2)
5	«Б.Браун»	ГБУЗ НСО «ЦКБ» (РСЦ № 6) ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» (ПСО № 4)

		ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ»
6	«Б.Браун»	ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» (ПСО № 5)
7	«Б.Браун»	ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО» (ПСО № 5)
8	«Фрезениус»	ГБУЗ НСО «ГКВСМП № 2» (ПСО № 9)
9	Кабинет гемодиализа на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» (ПСО № 11)

ГД-пациенты, прикрепленные комиссией по ЗПТ к амбулаторным диализным центрам сети «Б.Браун», после выполнения ЧТКВ со стентированием на базе РСЦ № 2, по стабилизации состояния переводятся в кардиологическое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» (ПСО № 10).